






LIX p. 7.

12. 27. 9. 10

~~12. 27. 9. 10~~



LITERARY

101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612

C

HER

AP

C

GERARDI L. B. VAN SWIETEN

*Ordinis sancti Regis Stephani Commendatoris, Augustiss. Imperator.
& Imperatric. a Consiliis Archiat. Com., Bibliothecae Augustae Prae-
fecti, Inclyt. Facult. Medic. Vienn. Praesidis perpetui, nec non
Academiae Reg. Scient. & Chirurg. Paris., Academiae Scient.
Petropolit., Academ. Natur. Curios., Institut. Bonon., Colle-
gii Medici Regii Edinburg., Societ. Scient. Harlem, Bota-
nic. Florent., Germanic., Senens., Degli Agiati di Rove-
red., Academ. Botanic. Cortonens., Honorarii
Academ. Scient. Senens. Membri*

COMMENTARIA

IN

HERMANNI BOERHAAVE APHORISMOS


DE

COGNOSCENDIS, ET CURANDIS
MORBIS.

TOMI QUINTI PARS ALTERA



TAURINI
EX TYPOGRAPHIA REGIA.
MDCCLXXIII



INDEX CAPITUM

HUIUS TOMI PARTIS II.

<i>Lues Venerea</i>	Pag.
<i>Rachitis</i>	207
<i>Rheumatismus</i>	264

REIMPRIMATUR.


F. Ioannes Dominicus Pifelli Ord. Praedic. S. T. M. Vicarius
Generalis s. Officii Taurini.

V. Pratus Medic. Colleg. P. & R.

V. Se ne permette la ristampa.

GALLI per S. E. il sig. Conte CAISSOTTI di s. VITTORIA Gran
Cancelliere.





J E S V E N E R E A .

ost annum 1493 in regno Neapolitano, mox Gallico exercitu, dein per totam Europam lues venerea ora-



ille morbus varia obtinuit nomina olim, dum unusquisque mor-
num mirabatur, addebat nomen gentis, a qua illum originem
bat, & hinc plerumque finitimam, vel commercio mixtam na-
bat; uti demonstrat solita sibi eruditione (a) *celeberrimus Astruc*,
simam opus de hoc morbo scripsit, quod legi & relegi non sine
limento. Obtinuit tandem unanimi fere consensu, *ne odia gen-
is iurgis increbrescerent*, novum luis venerae nomen *confin-
consumeliosum*, & ad significandum morbum, qui *venere contrahi-
e idoneum*. Primus fere fuit *Fernelius*, qui huius nominis usum
uem postea reliqui secuti sunt.

tamen adhuc satis frequenter nomen *Siphyllis* ad designandam
eam. Dum enim *Hieronymus Fracastorius* cum multis aliis medicis
bi causam deduceret a caeli & siderum *constitusionibus*, quae & raro
& magna quum accidunt, possint efficere (b), hinc in suavissimo carmi-
luem venerae descripsit, fingit *Siphyllum regis Alciboi* greges
m, & illorum numero ac pulcritudine superbum insultasse Soli:

— — — *Mibi mille nivis candore iuvencae,*
Mille mibi pascuntur oves, vix est tibi taurus
Unus, vix aries caelo (si vera feruntur)
Unus, & armeni custos canis arida tanti (c).

concludit, non amplius Soli litandum esse, sed uni *Alciboo* regi, qui

— — — *Divum exhibito gavissus honore,*
Non ullum tellure colla, se vindice, numen
Imperat, esse nihil terra se maius in ipsa,
Caelo habitare deos, nec eorum hoc esse, quod infra est:

Ve-

(a) De morbo vener. ven. I pag. 5, 6.
(c) Ibidem pag. 197 B.

(b) *Aphrodisiac*. pag. 202 A.

Verum impiam hanc superbiam illico a tergo gravis poena secuta est. Nam

*Videras hæc, qui cuncta videt, qui singula lustrat,
Sed pater, atque animo secum indignatus, iniquos
Intorsit radios, & lumine fulsit acerbo.
Aspectu, quo terra parens, crepitæque ponti
Aequora, quo tactus viro subcanduit ær.
Protrinus illucies terris ignita profanis
Exoritur; primus, regi qui sanguine fuso
Instituit divina, sacrasque in montibus aras,
Sypbilus, ostendit surpes per corpus acores,
Informes primus nobiles, convulsæque membra,
Sensit, & a primo contraxit nomina morbus;
Siphylidemque ab eo labem dixere soleni.*

Qui a maligno siderum aspectu turpis morbi ortum & causam deducere conabantur, vix poterant aliter opinari, quam quod lues venerea olim caput extulisset, remotis nempe temporibus, dum idem illorum concursus, & situs, quem iam culpabant, adfuerat; atque idem morbus denuo evanuisset, dum mutata siderum positione abfuerat causa, quæ morbum natum conservaverat. De genere morborum, qui oriuntur cessant, redeunt, *Fracastrorius* statuit esse luem venericam:

*Quam tamen (æternum quoniam dilabitur ævum)
Non semel in terris visam, sed sæpe fuisse,
Ducendum est: quamquam n. bis nec nomine nota
Hactenus illa fuit: quoniam longæva vetustas
Cuncta situ involvens & res & nomina delet:
Nec monumenta patrum sibi videre nepotes (d).*

Sed certe lues venerea per ducentos septuaginta annos perstat, licet siderum aspectus tot annorum spatio sæpius mutatus fuerit, quod minime favet huic opinioni.

Multum disputatum fuit ab ipsa morbi origine, an lues novus morbus foret, an vero antiquis medicis iam cognitus & descriptus. Magna animi contentione hæc quaestio fuit agitata, & a magni nominis medicis.

Certum est, partes genitales in utroque sexu morbis variis obnoxias semper fuisse; sed inde non constat, hæc mala, quæ veteres observaverant, a luis contagio fuisse orta. Ab effreni libidine partes has inflammari, excoriari, ulcerari potuisse quisque facile crederet; a retentis in sinu muliebri humoribus

va-

(d) Aphrodisiac, pag. 184.

Egregius autem ille auctor duplici argumentorum specie utitur, ut probet, luem veneream non esse delatam ex America in Europam. Prima species continet argumenta negativa; auctorum nempe, qui de primo *Christophori Columbi* itinere scripserunt, silentia de lue venerea. Secunda species continet illa, quibus probare nititur, luem veneream praeexistisse in Europa ante Columbi reditum ex primo itinere Americano.

Omnes agnoscunt, argumenta negativa semper minoris roboris esse in lite quadam dirimenda. Plurimae enim causae, quae posteros latent, esse potuerunt illius silentii; imprimis apud tales auctores, qui de morbis ex instituto nec scripserunt, nec scribere debuerunt. Verum insuper ex ipsa historia rite considerata patere videtur evidens ratio, quare in primo Columbi ex America reditu nulla mentio luis venereae facta fuerit.

Notum est ex modo dictis, *Columbum* septem menses impendisse in primo itinere, ut adiret Hispaniolam dictam in America insulam, ibi moram faceret, novi orbis divitias rimaretur, & inde rediret. An credibile videtur, quod de indagandis morbis Americanis sollicitus fuerit, quem tot aliae ob RUEBANT curae? An non magis probabile, *Columbum* ignorasse morbum omnino, & ideo reducem ex primo itinere de illo nihil referre potuisse?

Urgetur (i) & illud argumentum, quod *Columbus*, dum rediret, coactus fuerit ob aquae penuriam *Ulyssiponam* appellere. A Rege *Ioanne secundo* comiter accipiebatur, qui & Americanos homines, quos secum duxerat, veste scarlatina donabat. Uade concludere voluit auctor, Lusitanos infici debuissse lue, si classarii Hispani, vel Americani itineratores hoc morbo laborassent. Verum quarta martii navis appulerat, & decima tertia eiusdem mensis inde in Hispaniam navigavit. Non videtur tempore novem dierum frequens occasio fuisse Americanis luem propagandi in Lusitania, nec & classariis, aquae congerendae, vasis mundandis, navis custodiae, aliisque nauticis laboribus occupatis. Et procul dubio *Columbus* hospites Americanos, quos Lusitaniae regi praesentavit, elegit sanos, ne in itinere reliquis molestiam crearent, si fuissent infirmi aut morbofi.

Accedit, quod navarchae, dum necessitatis causa ad portum quemdam appellant, non dare soleant licentiam classariis, ut evagentur absque necessitate; praecipue, si post brevem moram coeptum iter prosequi debeant. Nimis enim noverunt, hoc hominum genus, nisi perpetua & severa coërcita disciplina, in quaevis crimina pronum ruere, & stationes suas deferere. Cui periculo ipsam Lusitaniae Metropolim exponere magnae fuisset imprudentiae.

Videntur hae rationes sufficere ad demonstrandum, quare Lusitania tunc temporis lue venerea non fuerit infecta: simul etiam apparet ratio silentii auctorum, qui de primo itinere *Columbi* scripserunt. Postquam autem *Columbar* in Hispaniam appulit, tunc, classarii successive ad suos redierunt, ut fieri solet, & si quidam ex his lue infecti fuerint, propagari tunc debuit malum; licet omnes eius sequelae non statim cognitae fuerint; quum non semper ci-

(i) A dissertation on the origin of the venereal disease pag. 13, 14.

dierit 4 martii 1493. Verum binorum horum auctorum testimonia minus conveniunt. *Fulgosa* (n) enim dicit sequentia: *Quae pestis (ita enim visa est), primo ex Hispania in Italiam allata, ad Hispanos ex Aethiopia, brevi totum orbem terrarum comprehendit.* Verum *Gaspar Torrella* dixit, luem coepisse in Francia 1493, sicque per viam contagionis pervenisse in Hispaniam, ad insulas (Siciliam) in Italiam, & finaliter serpendo totam Europam peragrassae, imo, si fas est dicere, totum orbem (o). Praeterea notandum videtur, quod *Torrella*, dum scribebat tractatum de pudendagra, qui Romae 1497 prodiiit, se nominet episcopum s. *Iustae*, simulque referat, agi tunc annum decimum, quum circa ecclesiastica occupatus arti medicae minime vacare potuit. Neque videtur semper veritatis adeo religiosus cultor fuisse, quum foedissime aduleter Caesarem Borgiam, hominem sceleratissimum, in epistola nuncupatoria alterius tractatus, quem de dolore in pudendagra edidit circa annum 1500, & qui dialogum inter vulgum & medicum continet; in quo de lue venerea agitur (p), & de eius origine leguntur sequentia: *Gallia manu sortis Italiam ingredientibus, & maxime regno Parthenopaeo occupato, & ibi commorantibus hunc morbum detestam fuisse. Idcirco ab Italii morbum Galliam cognominatum esse, imaginantibus, ipsum Gallis connaturalem esse: in Gallia vero, quia in reversione Regis Caroli cum suis in Galliam, hic morbus apparere coepit, credentes Gallos cum ex Neapoli apportasse, hanc ob causam morbum Neapolitanum vocavisse* (q).

Quum ergo binii illi auctores non dixerint eadem, neque *Torrella* sibi ipsi conitet circa luis venereae originem, horum auctorum testimonia non videntur tantum robur habere, quantum illis eruditissimus auctor tribuit (r); quod & ipse sensisse videtur, dum alio in loco (s), *Fulgosae & Torrellae* opinionem quasi in medio relinquens (*viewing that opinion*), contentus est demonstrasse, quod lues venerea cognita fuerit in Italia & Gallia circa initium anni 1495, vel saltem quam tardissime mense iunio eiusdem anni. Quomodo autem hoc fieri potuerit, ante dictum fuit.

Ex his tamen argumentis credit eruditissimus auctor (t), nihil certius esse, quam quod lues venerea sit morbus epidemicus in Europa natus, & in Americam per homines Europaeos delatus. Causam illius epidemicae constitutionis statuit magis iurationes in variis orbis habitati locis, sequente insolita aeris temperie. Certum est, a talibus causis pessimos morbos produci; sed & aequum est, ab iisdem nunquam luem veneream productam fuisse antea. Pessimas febres ab his causis nasci, innumera observata docent in hominibus, qui talia loca inhabitant, ubi limus ab inundationibus relictus aestivis postea calidioribus putrescit; de qua re in *capitulo de morbis epidemicis* fusius egi. Sed nulla observatione conitat, a tali causa nostris temporibus luem venerream unquam

(n) A dissertation on the origin of the venereal disease lib. I cap. IV in fine pag. 29.

(o) Astruc de morbis vener. torn. 2 pag. 569.

(p) Ibid. pag. 571.

(q) Ibid. pag. 572.

(r) A dissertation on the origin of the venereal disease pag. 17.

(s) Ibid. pag. 9.

(t) Ibid. pag. 75.

n video, cur ergo luis prima origo inde deduci possit. n merito egregius auctor inter perspicacissimos epide-
b servatores laudat, non credidit, luem venerream esse
in Europa natum, sed ex dissita regione ad nos altitum.
endemium contagiosum debere destrui, dum ex ca-
nem transfertur. Numquid idem argumentum retorqueri
ntentiam, qua statuitur, luem, in Europa epidemicum
delatam in regionem calidissimam, postea ibi latissime
eterea notum est, boreales Europae partes a lue vene-
liberas. Mirabatur hoc *Fracastorius* (v): *Constat, aut*
ere eodem, & in Hispania, & Gallia, & Italia, & Ger-
Scythia, visam fuisse: adde, quod praedixisse illam astrom-
is, non parvum inditum est, aliud ipsi subesse principium,
regionem. Vix enim concipere poterat, quomodo tam cito
et serpere malum, si a solo contagio nasceretur: simul firmi-
eros corripere hoc malo, licet nullum praecesserit contagium.
ientem paragrammum patebit, multiplici modo contagium
corpori sano, ita ut morbus sequatur. Et admodum pro-
initio, dum novus ille morbus invadebat, non satis ca-
ontagio, donec suo damno discerent, cautelam adhibendam
quis cum infectis converteretur. Accedebat, quum non tantum
id & turpe foret malum, multos illud celasse; unde &
runt.

m est, morbos epidemicos non perfare longa annorum se-
o alii epidemicis sequentibus excipiuntur, silere, & evane-
post aliquot annos quandoque redituros. In variolis, morbil-
ritanica, dysenteria &c. hoc manifeste patet.
veneraea ab hoc epidemicorum more abludit penitus; nam a
quo innotuit, constanter mansit, nunquam se subduxit, sem-
stans fuit, & quamvis in symptomatibus aliqua mutatio ob-
qua re postea) iam ultra ducentos & septuaginta annos lues
vit, & magnus manet infectorum numerus. An unquam hoc
epidemicum observatum? Ceterum in similibus inquirendis me-
e quandoque nec mirum est, nec aegris nocebit. Libere dixi,
aliter sentientibus eandem libertatem lubens relinquo.

Quae generatione, lactatione, contrectatione, saliva,
sudore, liquido genitali, exhalatione, contagio est.
morbum hunc ab infecto in alium derivari nimis notum est; nec
etiam ab illis, qui affirmant, luem venerream non esse per con-
ta-

Il respicit, pag. 311.

(v) Lib. II de morbis contag. *Aphrodisium*

ragium delatam in Europam, sed aliorum morborum epidemicorum more apud nos prodisse, & lue infectos Europaeos contagio eundem morbum communicasse Americae incolis.

Quum tamen lue venerea, scortatorum flagellum merito dictum, impura venere propagetur imprimis, quandoque nimis securi fuerunt homines, acsi nunquam quis infici posset, qui caste viveret. Observatum enim fuit, pluribus aliis modis tetrum hunc morbum communicari posse.

Generatione. Mirum non videtur, si a lue infectis parentibus nati infantes eodem morbo inquinati in lucem edantur. Quum enim, uti postea patebit, miasma venereum humoribus circulantibus mixtum per totum corpus deferri possit, antequam ad certas corporis partes denuo deponatur, foetus in utero materno vivens ab infecta matre inquinatos humores recipiet perpetuo; adeoque fieri poterit, ut morbosum fomitem iam gerat in corpore, antequam nascatur. *Lahar* (x) quidem testatur, infantes Americanos lue infectos esse, vix non eodem, quo nascuntur, tempore; licet parentes, imo & nutrices, forent sanissimae, vel saltem, uti prudenter addit, viderentur tales. Sed non videtur hoc testimonium magni momenti esse; quum eodem loco affirmet, Batavos in coloniis suis Americanis statim lue infectos fuisse, antequam ullum commercium cum mulieribus indigenis habuissent; postea vero, ubi paludes exsiccaverant, & stagnantes aquas in motum deduxerant, vixisse magis sanos; praecipue postquam silvas densissimas eradicatis arboribus reddidissent ventis persalabiles. Notum autem est, primos colonos Batavos, antequam hoc perficere potuerant, pessimis febribus, aliisque morbis a lue omnino diversis affictos fuisse; quos videtur cum lue venerea confudisse.

Infici posse infantem in utero matris, quae lue laborat, videtur admodum esse verosimile. Imo *comptum est*, ab infecta matre partur edi squalidos, semiputres, ulcerosos, vere syphiliticos (y). Lue autem dubitatur, an a parentum alterutro infecto possit embryoni virus venereum infundi ita, ut tota pueritia fiseat absque noxa, dein adulta aetate excitetur, & absque novo contagio veram luem venereum producat. Hoc vix videtur credibile, quum virus venereum lactatione, vel alio modo teneris infantibus communicatum cito & miserrime depalcatur partes, quas occupavit; uti satis numerosis observationibus constitit. Adeo versatus in huius morbi diagnosi *Astruc* (z) affirmat, se nunquam observasse, luem venereum vere sic dictam & pathognomonice signis conspicuam, lue quasi haereditario, in infantes transmissam. Ut famae aegrotantium consulatur, & pax inter coniuges servetur, videntur medici prudenti consilio hanc causam, tamquam probabilem saltem, in medio reliquisse. Sufficit enim medico, luem praesentem cognoscere, & cognitam curare; licet contagii communicati modum non adeo exacte noverit.

Notandum tamen videtur, foetum, qui sanus in utero materno vixerat, posse nasci lue venerea infectum. Si enim ulcera venerea in pudendis mulie-

(x) *Nouveaux voyages aux I-les d'Amérique* tom. II pag. 120.
morb. vener. lib. II cap. I pag. 121.

(y) *Ibidem.*

(z) *Astruc de*

ns diu haeserit, capite v. g. inclavato, vel alio cor-
 praeternaturali prodeunte, alluitur tabo venereo con-
 icies inficere poterit; uti certa observata docuerunt .
 i in tali casu non silebit ad pubertatem usque; sed brevi
 manifestabit teter morbus. Hoc autem imprimis metuen-
 s diu in ultimis partus angustiiis haeserit: ubi enim ci-
 quum post nativitatem infantes illico calida ablui soleant,
 um, a quo obfiterix inficitur. *Antonius Gallus (a)*, ce-
 s medicus, qui anno 1540 tractatum scripsit *de ligno*
 o, testatur, se obfitericem novisse, quae dum mulieris in-
 peret, hoc morbo correpta fuit, nulla tamen foetui noxa
 pientes enim manus diutius in foeda ulcerosaque vagina ma-
 juentius immitti, ante partum, in ipso partu, & post par-
 n placentam &c.. Ideo monet idem auctor (b), ad con-
 um aliquam moram esse oportet, ut corpora hanc maculam
 non carere periculi suspitione, qui illorum trañant ulcera.
 vix ab interiore nascitur alteratione; sed externa origo est.
 i satis infectio fit papillas sugendo uti observatio sequens
 er quaedam solita sugendo evacuare puerperarum mammas,
 habebat in ore; quod celabat, ne quotidiani lucri iacturam
 lures, & quidem melioris sortis matronas infecit pessime.
 s *Barry*, qui opportunitatem habuit videndi plurimas ex in-
 sbarer celerem malignae luis progressum, quem sic describit.
 leviter inflammabantur; dein sequebatur excoriatio plorans
 & in circuitu loci excoriati sparsim emergebant pustulae ru-
 gradatim per pectus dispersebantur, & nisi medela adhibe-
 producebant. Paulo post inficiebantur pudenda cum pruritu
 :quebantur canceri in his partibus, qui parum liquidi plorabant;
 im temporis spatium pustulae spargebantur per totum corpus.
 lues sic suscepta trium mensium spatio decursum suum absol-
 ab uxoribus inficiebantur, & caneros habebant, a quibus virus
 to dispersebatur, ita ut sequerentur ulcera oris interni, & pu-
 e per corporis habitum.
 aec, quae tot malorum causa fuit, dum examinabatur, inventum
 p. ulcus in radice linguae, & larga recens cicatrix in parte in-
 inferioris. Negabat quidem pertinaciter, ulcus unquam adiuvisse
 catricis; sed postea veritatem fassa dixit, se dissimulasse foedum
 metum infamiae, & lucri iacturam.
 im potuit sollicito examine cognoscere venereum unquam limites
 ptio curanea adiuit, nec videbatur virus
 tui excessisse.

Quae-

(c) Medic. essays and observat.

Introd. fac. pag. 465. (d) Ibidem.
 l. III. anal. XXI pag. 323 & seq.

Quaedam matronae, quarum ubera duxerat, nullum damnum inde senserunt; sed causa huius felicitatis inveniebatur, quod hoc contigerit, postquam largum illud labii inferioris ulcus consolidatum iam fuerat.

Infantes, qui infectarum matrum lac hauserant, inficiebantur pariter, & mixta pars illorum perit. Adeo autem celer erat luis per lactationem susceptae decursus, ut salivatione obicem tanto malo ponere debuerit medicus illico, etiam in talibus, quae leviter tantum infectae videbantur.

Vidi ipsum miserum puellum lue correptum, qua inter tres septimanas perit, dum sanitatae nutrici substituebatur alia, cuius palatum osseum foedo ulcere venero excusum fuit totum. Sero vocatus, nullam adhibere medelam potui. Integrum oppidum infectum fuisse legitur, dum plures mulieres misericordiae motae ubera dederant binis infantibus expositituri, qui lue erant infecti (*).

Consecratione. Si obstetrix infecta fuerit, uti modo dictum, dum puerperae lue venera laboranti solitam opem tulerat, mirum non est, idem periculum manere illos, qui venero tabo manantia loca attrectare audent.

Saliva. Quae omnium maxime periculosa est, si lascivientes iuvenes calida figant basia mulieribus, quae ulcera venera in ore interno habent: quum autem post haec praeludia plerumque & coitus sequi soleat, raro determinari poterit, an solis oculis, linguisque micantibus (ut se expriment veneris nepotuli) sequens lues adscribi debeat. Si castae matronae per suctionem infectae fuerint, dum papillae in tabo ulceris veneri labium inferius excedentis macebantur, facile intelligitur, idem metuendum esse in lingua, & labiis, quae densa cute non teguntur, si virus venerum cum saliva his partibus applicetur. An virus hoc facile se unit salivae? Sic crediderunt quidam, dum videbant, per salivationem virus de corpore expelli.

Sudore. Omnes noverunt, curam per sudores, praecipue post usum largum decocti ligni Guaiaci, sanasse saepius luem veneream; de qua re postea dicendum erit. In tali casu diffatur virus de corpore per totam cutis superficiem. Unde dormire in eodem lecto cum infectis, imprimis si sudent valide, periculosum videtur. Facile enim potest vaporosus sudor exhalans de infecti corpore resorberi saltem pro parte vasibus cutaneis sani hominis, in eodem lecto, & sub iisdem stragulis cubantis. Simili modo crediderunt quidam & lintea, & stragula, & vestes sic maculari posse, si lue infectus his usus fuerit, ut postea ab iisdem virus communicari possit corpori sano. Talis luis propagatio vocatur illa, quae per *sumitem* spargitur (†), & metuebatur contagium, si quis eodem poculo cum infecto biberat, vel iisdem mantilibus os, & labia extenderat. Plures enarrat casus in eodem loco celebres auctor, qui ex probatis auctoribus collecti talis infectionis possibilitatem arguunt.

Quum autem omnia haec ex insectorum narrationibus habeantur, iusta suspicio est plurima ex his aliu, & fallacia conficta fuisse, ut celarentur flagitia: probabile enim est, adultos, & adultas, qui tales morbi causas adserunt, mo-

liori

(*) Tercellon de pudendor. morb. cap. IV, pag. 205.
venereis lib. II, cap. 1, pag. 122.

(†) Astruc de morbis.

n acquisivisse. Quum tamen de veneno variolarum con-
somite morbum variolosum excitare, & propagare possit,
ebriis auctor sequentia: *In summa nollem equidem eam
citer negare* — Verum enim vero vellem multo minus
dum pro comperio admittere, quum experimentis, quae
sint, nondum liqueat.

Simonium magoi ponderis videtur, quum testetur, se
lue veneream posse contrahi ex vestimentis, sudore,
infectis; nec vulgare huius rei exemplum adducit (e).
Indecim annorum interfuit bacchanalibus, & indecora li-
adolefcentibus veste permutaverunt. Non multo post
imentis usa, circa pudenda dolorem, & pruritum perse-
lunt pustulae, & ulcera maligna; ob verecundiam celavit
ore victa nec incedere amplius potens matri indicaverit.
invenit pudenda, partem colli vesicae, & uteri ad in-
sque foetidissimo ulcere exesa, sphincteres vesicae, & in-
unde incontinentia alvi, & urinae. Aderant simul dolo-
ris continua ardens &c., sicque intra paucos dies decessit.
que miserrima haec cum iuramento negavit constanter, se
cum viro habuisse. Inquisitione autem facta adolescens,
& vestes misera haec puella induerat, lue venerea gravissime
est.

ationes docere videntur, phlebotomi aciem potuisse infici, sic ut
staneo quasi attractu lue infunderetur corpori sano. Plures ta-
es habentur apud celeberrimum Astruc (f). Imprimis autem
illa, quae apud Sebensium (g) habentur de lue nova Moraviae,
Gallicum vocabant. Anno enim 1577 mense decembri hye-
, & quidem undecima mensis die omnes, qui Laconicum ingressi,
cum scarificatione sibi applicari curaverant, correpti fuerunt mor-
omni foedae luis symptomata habebat. Nec emerferunt statim
Symptomata; quibusdam per octiduum occultabatur malum,
septimanas, quibusdam per mensem delituit. Insuetus corpori, ani-
vultus tristis, oculi torvi &c. praecedebant morbum emerfurum.
curbitularum turgescencia invasit ardor summus, quem foedi abf. effus
cera putrida &c.. Mirum erat & hoc, quod non omnia cucurbitularum
foedum ulcus degenerarunt, sed unum tantum, aut ad summum
na muliere, cui quindecim cucurbitulae fuerant applicatae, tres in ul-
runt. Habitum corporis foedabant pustulae, scabies foeda, ulcera
quae manabant pingui liquore, mucore lento, qui non pus, sed fa-
eret luridum. Progressu morbi in capite calli concreverunt; quibus
rel discissis melleum quoddam resinofum, & tenax (ceu ex confectis
ar-

Observ. Centur. I, pag. 76.
, 91.

(f) De morb. vener. torn. II, lib. VII, pag.

(g) Observ. medic. rarior. lib. VI, pag. 816, & seq.

arboribus laticem exstillare videmus lentum & viscidum), marcescentis pituitae argumentum exsudabat. Dolores nocturni acerbissimi sequebantur, imprimis circa spinam tibiae &c. Quum plures miserrime sic affligerentur, constitit, nullos sic affectos fuisse praeter illos, quibus cucurbitae in balneo cum scarificatione fuissent adhibitae; & omnes similibus torquebantur malis.

Magistratus omni cum cura inquisivit in mali originem; nec in balnei magistro quid culpie inveniri potuit: suspicio tunc venit in balnei ministrum, cui ob manus agilitatem & promptitudinem delegata erat scarificationis provincia; qui non tam, quod causae minus fideret, quam terculamentis & poenis percussus, fugi sibi consuluit, nec postea usquam comparuit. Hinc de causa nil certi constitit. Describuntur dein plures historiae aegrorum, qui haec mala passi fuerunt, ex quibus evidenter patet, vulgaria remedia nihil profuisse, sed tetrum morbum cessisse tantum illis remediis, quae ad luum veneream curandam adhiberi solent.

Alterum exemplum morbi veneri per fomitem communicati legitur apud Botallum (b); de homine, qui communibus poculis utens cum viro, qui acriter lue venerea divexabatur, infectus fuit. Nec leves videntur esse rationes, ob quas Botallus credidit, hoc verum esse. Vir ille probatae fidei erat, nec habebat ullam rationem, quare tam obviæ tegeter aliam, si adfuisset, morbi causam. Praeterea hominem, a quo infectum se dicebat, optime noverat Botallus, quum per sedecim menses lue venerea cum saevissimis doloribus laborasset: *Ossi quoque narium non levis impendebat caries, & fauces semper aliqua flamma sollicitabat.* Curam eius gesserat ipse Botallus cum fratre suo. Alter autem, qui communi poculo infectus erat, in nulla corporis parte, primis duobus mensibus quid mali passus fuit, *excepta labii inferioris ora, quae a demisso infecto cratere paulo post pruritu quodam levi, mox ulcere corpus efflorescere, nulla tamen de hoc morbo suspitione suscepta.* Verum, uti postea patebit, pars corporis, cui virus venereum applicatur, solet saepe affici omnium primo, & ex ulcere ibi nato lues se dispergit per totum corpus, atque ad varia loca denuo deponitur.

Liquido genitali. Haec via luum communicandi omnium frequentissima & certissima est; de qua re post luum cognitam nemo unquam dubitavit.

Exhalatione. An illi humores, qui undique ex corporis superficie hominis lue venerea laborantis exhalant, abique contactu, in distans possint propagare morbum merito dubitatur. Non novi ullo experimento constare, hominem sanum unquam hac via infectum fuisse: quum ergo a ducentis & septuaginta annis, quibus lues durat, nunquam hoc contigerit, vix videtur verosimile hoc fieri posse.

Praeterea videtur contagium venereum, uti postea dicetur, pinguis & mucosus humoribus irretiri, hinc non ita mobile esse, postquam his unitum est, ac fuisse solum. Verum quidem est, dum per argentum vivum, vel & decoctum guaiaci solvuntur humores, expediti miasma venereum ab his vinculis, quibus

in-

(A) Aphrodisiac. pag. 867.

diffiliari de corpore, sicque per atmosphaeram am-
 dum in aëre calido aegri contineri solent, plures me-
 mali, nec diu cum talibus aegris morantur, sed
 an unquam contigerit, ministrantes in nosocomiis, ubi
 conclavi decumbunt, infectos fuisse, dum per plures
 ali aëre versantur quotidie; sed, quantum novi, illud

ia parte contrahitur, primo se manifestare solet.

atuit, plerumque, vel saltem saepius contagii effectum se
 corporis parte, cui applicatum fuit. Sic a suctione contracta
 circa mammas, si infans infecerit nutricem, & contra in la-
 interno, ac faucibus ulcera venerea nascuntur, si nutritrix
 In illo homine, de quo ad praecedentem paragraphum dictum
 ni poculo utens cum homine pessima lue infecto morbum
 te interiori labii inferioris primum luis vestigium apparuit.
 npra venere in partibus genitalibus toties pustulas, brevi in-
 tura apparere; unde nisi rite curentur, lues toto suo stipa-
 nitur. An autem luis miasma non posset statim recipi venis
 , quibus applicatur, sicque humoribus circulantibus misceri,
 partem illorum in suam naturam convertere, & postea ad varia
 deponi. An semper requiritur, ut locum, per quem ingreditur,
 male afficiat, inflammet, erodat, exulceret, sicque venenatum
 faciat, in quo, tamquam in nido latens, humores affluentes in
 convertat, quorum pars resorpta a venis totam dein humorum
 contagio inquinat. Non videtur saltem universaliter haec neces-
 se; imo e contra satis probabile videtur, miasma venereum servi-
 , venere actuosum redditum posse communicari corpori absque
 sensibili partium genitalium, per quas lues contrahitur.
 & optimos auctores, qui de lue venerea scripserunt, hoc con-
 sic Fracastorius (1) monet, non statim luem se manifestare, sed
 pote delitescere, interdum quidem per mensem, interdum per duos,
 m per quatuor menses. Aderant tamen signa quaedam concepta: labis:
 illud, pallor. Tandem, quod in maiori parte aderat, ulcuscula
 circa pudenda oriebantur. Ubi notandum est, quod non dixerit, in
 regnis adfuisse haec ulcuscula, sed tantum in maiori parte. Praeterea
 ut, an illa pudendorum ulcuscula statim a suscepto venereo miasmate
 nit, an postea successerint. Saltem non obtinent primum locum in enu-
 ne symptomatum, quae susceptum contagium sequebantur, & quae ade-
 am in illis, qui his ulcusculis pudendorum carebant.

Nam

Nam in utroque casu miseris prorumpabant per cutem pustulae, satis magnam in molem crescentes, quae intra paucos dies in ulcera pessima phagaedenica mutabantur: haec autem non a contagio luis topice applicato, sed ab eodem a sanguine, in quo latebat secreto, & ad varia corporis loca deposito ortum ducebant; certissime saltem in illis, quibus nulla fuerant in pudendis ulcuscula.

His sane similia leguntur apud *Bernardum Tomitanum* (k). Monet enim, signa manifesti luis venereae per duos, tres, etiam quatuor menses nondum apparere: Nam ille (*morbus*) videbatur delitescere, & de futuris aliorum calamitatibus, & supplicii meditari. Signa autem latentis mali recenset haec: Corporis inertia, segnitie praeter laborem, gravitas membrorum, lassitudines spontaneae, lentor, & tarditas actionum, somnolentia fere assidua, macies corporis, virium sublatio, perturbatio animi, moeror, dysidentia, metus, pallor faciei, sub oculis nigror, vultus novitas, manuum, & plantarum calor, & alia plurima. Dein addit, in plurimis suborta videbatur caries, pudendis enata, quae ulcuscula afferebat erodentia &c.; unde iterum concludi potest, aliquos saltem miasma venereum suscepisse, licet in pudendis nihil appareret mali.

Apud *Dan. Turner* (l) habetur casus, qui idem confirmat. Homo, qui tempore vitae militaris se non adeo caste vixisse fatebatur ultro, honesta missione obtenta, duxerat uxorem, quam castam, sanam, modestam certo novebat, & cum illa liberos procreaverat. Per decennium in matrimonio caste vivebat, & licet coelibus tempore cum pluribus mulieribus rem habuisset, nunquam tamen vel gonorrhoea, vel alio quocumque malo laboraverat. Quandoque levem in dorso glandis excoriationem senserat post coitum; sed haec, vel sponte, vel inunctione unguenti pomati, aut sebi candelarum sanabatur brevi.

Norum autem est, praecipuum signum diagnosticum ulcusculorum venereorum esse, quod vulgatis remediis pertinaciter resistant. Unde apparet, nihil venerei partibus genitalibus adhaesisse.

Saeptius tamen laboravit post aliquot annos angina, quae venae sectioni, catharticis, & vesicatoriis cedebat. Quum autem recrudesceret idem malum, & quidem maiori cum molestia, consuluit egregium medicum *Turner*, qui invenit utramque tonsillam inflammata, & unam ex illis ulcerosam: sed praeterea dextit in palato fornicato foramen, & unam ex illis ulcerosam: sed praeterea dextit in palato fornicato foramen, quod apicem specilli admittebat, & per quod aeger observaverat quandoque fumum tabaci e naribus exivisse. Quum nullum os tangeretur specillo immisso, partem ossis, quod fornicem palati format, exsiam esse patebat satis: caro autem illud foramen ambiens fungosa erat. *Suspectio cinnabaris* usus fuit *Turner*; unde excitata salivatio fuit malum quidem, sed mansit foramen in palato fornicato, quod digiti apicem facile capiebat: per septem annos sanus vixit post hanc curationem, & dein maligna febre correptus periit.

Haec, & aliorum casus, quos ipse vidi, faciunt, ut non audeam pro generali axiomate pratico statuere celeberrimi *Astruc* assertum; nempe, *virus nuncquam*

(k) Aphrodisiac. pag. 1051, 1052.
& seq.

(l) Siphylis. histor. XVI, pag. 297.

rs, qua admittitur, primum affecta fuerit (m). Omni-
berissimo huic viro, dum monet sequentia: De lue ve-
cales praescribit, ex levioribus quidem signis indicandum
essent, neganti opinioni adhaerendum, vel ad summum
dit, iudicium caute cobibendum, dum signa pathognomonica
o certiora rem in apertissima luce collocent. Proinde facile
veritate ulterius inquiratur. Neque enim obsuit unquam
de iis, quae evidentissima videbantur quaestionem mo-

lla, quae celeberrimus auctor (n) de aliis venenis adfert,
e. Pus variolarum, dum in vulnusculis applicatur, haec loca
exulcerare, dum venenum agere incipit. Verum hoc est
quod infectionis artificio variolis corripitur homo, quis deter-
a contagio primo adhaesit, antequam corpus totum turba-
phobia instat, vulnera morsu canis rabidi infecta inflammari,
es, si iam consolidata fuerint vulnera, attolli, fidelis obser-
d & constat aequae salivam canis rabidi dirum hunc mor-
absque ullo vulnere infecto, uti in capitulo de rabie canina

virus venereum nondum lentis humoribus irretitum, vel si
xibus quacumque de causa liberum, adeo minutum esse, &
giens, ut venire possit in massam humorum circumduktorum,
r totum corpus moveri.

fomite haerente in sanguine talia mala possint oriri, qualia ab
terna oriebantur in partibus corporis. Crescit hoc virus motu
si postea deponatur ad partem quamdam corporis, idem facit,
externe applicatum. Unde posset quis habere luis contagium in
malo apparente in corporis superficie; & tamen postea illud con-
humoribus, quos sibi assimilavit, deponi posset ad quaedam loca
effectus malos producere. Contingit autem aliquando, virus re-
ulcerare venereo glandis, & quidem non adeo magno ad diffusa loca
poni, & illa inflammare, ac exulcerare. Vidi post paucos quan-
fauces lue exulcerari, licet parvum tale ulcusculum dedisset uni-
contagii veneri ab impura venere suscepti. Nec levis osculis
adscripti posse videtur, quum eodem tempore virescens corporis,
, & pustulis deturpetur, deposito malo ad partes resorptum virus
venereo praevenire, dum cum foe-
fomite diffusas. Si ergo ulcere idem contingere, dum cum foe-
corpus infectare, an non poterit idem luis miasma misceatur hu-
volutatur impudens iuventus, ut nempe idem? Postea, ubi de bubo-
licet nullibi in corpore aliquid mali appareat? Postea, ubi de gonorrhoea,
eo agitur, patebit quandoque illum nasci, licet nec gonorrhoea,
venereum praecesserit, adeoque a resorpto contagio tantum.

Me-

(n) Ibid. pag. 96.

Merito cogitarunt medici, an signis quibusdam detegi possit praesentia miasmatis venerici in corpore, antequam ad quemdam corporis locum fuerit depositum, & sensibili effectu se manifestet.

Si attente consideremus illa, quae de *Brunno Galileo*, de quo ad praecedentem paragraphum dictum fuit, leguntur, videtur a suscepto luis contagio sanitas laesa fuisse (s). Dicitur enim, quod non emerferint statim signa labis receptae, sed in quibusdam per mensis spatium siluerit malum. *Interim infusa quadam ignavia, seu torpore gravati, pigri, segnes, inertes ad consueta munia obunda, animo quoque abiecto, tristis vultu, quum nec mens, neque manus, & pedes officium facerent, veluti umbrae, non homines passim oberrantes conspicebantur. Nativus faciei color in pallidum, vigor ipse oculum in sororum, circulo fusco, sicut mulieribus menstruatis deformem, subito immutatus; freni exporcioreior in capratam, & nubilam degeneraverat.* Si iam haec conferantur cum illis, quae ex *Bernardino Tomitano* paullo ante memoravi, apparet, mire similia haec signa esse inter se, quibus uterque auctor usus fuit, dum latentem adhuc in suo quasi seminio luem descriperunt. Verum *Tomitanus* anno 1576 fere septuagenarius (p) decessit Patavii pestilentia sublatum, hinc de *Brunno Galileo* nihil inaudire potuit, & ullo modo credibile apparet, *Iordanum Brunum*, qui coram vidit morbum, ex *Tomitano* latentis luis signa descripsisse.

Verum notandum imprimis est, quod post haec signa praegressa manifestis se prodiderit indicis morbus. Virus enim venereum deponebatur ab humoribus iam separatim ad quaedam corporis loca. *Vestigia cucurbitularum turgescens extemplo ardor invasit immensus, & immedicabilis, quem sedati abscissus, & ulcera excipere putrida sanie, taboque fluentia &c.* Forte credi posset, cutellum, quo scarificationes factae fuerant, insectum reliquisse miasma in locis scarificatis, quod ibi silens per tempus actuosum postea fieri coepit, & pessima haec ulcera produxit. Sed tunc in omnibus locis scarificatis foeda haec ulcera prodissent. At historia morbi aliud docet; ibi (q) enim leguntur sequentia: *Admiratione dignum initio, quod e tot affixis cucurbitis, quum alii decem plus minus, tres quoque tantum nonnulli apponi iussissent, una dumtaxat, aut ad summum duae (socrus Laurentiae sarteris e quindecim treti), ex iis omnibus in foedam transiverint vomitum.* Unde manifeste apparet, luis miasma non inhaesisse fixum in locis scarificatis, sed humoribus mistum turbasse sanitatem micis modis, & dein ad haec loca depositum foedo ulcere devallasse illa; ita ut caro, cucurbitae ambitu circumscripta, corrossa, putrescens, setrum, ut e telephii, ac phagadenicis ulceribus foetorem invexerit.

Ex haecenus dictis patet, luem venereum plerumque se manifestare in illa parte, qua contrahitur, sed non semper tamen.

(s) Schenck. observat. med. rarior. lib. VI, pag. 816, & seq. de morb. vener. tom. II, pag. 766.

(p) Astruc (q) Schenck. in loco modo citato.

rasse, crediderunt multi (r) non tantum, sed & primam eius originem tribuerunt nobili scorto, cuius noctem elephantiacus quidam ex equestri ordine miles quinquaginta aureis emerat; quumque frequens iuventus ad hoc scortum accurreret, intra paucos dies plus quam quadringentos inf. & os fuisse, a quibus dein late disseminatum fuit malum (s). Verum, uti optime notat celeberrimus Astruc (t), per integros quadraginta tres annos *Felix Platerus* elephantiacis inspicendis vacavit; quorum proinde plurimos observandi occasionem habuit; adeoque morbum bene cognovit; sed tamen elephantiasia diversum statuit morbum a lue venerea, cuius signa & symptomata non indiligenter recensuit; quod ipsius tempore cognitu necessarium erat, dum credebatur lues & distans contagium spargere posse; & ideo hac correptos a sanis separandos esse iubebat magistratus, & pro pauperibus pecuniaria nosodochia destinabat, ubi curarentur.

Quum autem per coitum omnium frequentissime morbus propagetur, multi crediderunt, scortatorum illud flagellum ab effroeni libidine originem primam duxisse. In Europa saltem non videtur haec causa assignari posse; neque latuisset per tot secula lues, si inde summisset originem. Perditiſſimos fuisse antiquorum mores, fide historica satis constat; nec tamen luis vestigia in historia antiqua invenimus, nec apud poetas, qui acerrime hominum mores perstrinxerunt, neque pepercerunt seculi sui vitis. Quam vivis coloribus descripsissent *Juvenalis*, *Horatius*, *Martialis* &c., miseras luis venereae victimas, si veneris nepotulos vidissent mutilos, naso truncos, execos, tabo putrido dissidentes. Unde videtur concludi posse, illam causam congeriem, a qua lues venerea sine contagio praegresso nasci potuit, in Europa nondum observatam fuisse.

In fervidissimis autem regionibus, ubi mulierum menstrua acerrima observantur, ubi cuivis obvio stupratori patent omnes, ubi virilis sexus effroeni libidinis oestro in venerem ruit, tetram luem primum ortum habuisse, non videtur omnino improbabile. Probabilis saltem coniecturae instar hoc proponit Astruc (u). Quum ergo in omnibus terrae locis, ubi lues venerea antiquius endemia fuisse videtur, eundem aëris fervorem cum pari incolarum impudicitia coniunctum fuisse, manifestum sit, haud inanis inde locus est colligendi, morbum naturam eundem, quo regiones longissime distat, & inter quas nulla fuit commercii communio, simili modo inselabantur, a simili causarum earundem concursu, in quo tantum convenirent, generatum olim fuisse, & generari etiamnum, si indigenae iisdem moribus vivant.

Voluerunt alii, a nationum commissione luem veneream ortam fuisse, quae olim in plures morbos divisa a medicis, in unum quasi coalescit in castris ad Neapolim. Verum optime notat celeberrimus *Morgagni* (v) sequentia: *Quasi vero iis in castris maior fuisset nationum commissio, quam Romae quondam, quum*

(r) Aphrodisiac. pag. 1 & alibi saepius.

tom. II, pag. 878.

(s) Ibid. 903.

(t) Lib. I cap. XII pag. 93.

causis morborum per anat. indagatis tom. II pag. 379.

(v) De morbo vener.

(v) De sedibus &

ateret *Cattis*, *Germanis*, *Dacis*, *Cilicibus*, *Cappadocibus*,
Una tum *Romae* *deerat* *natio* *Americana*, *quacum*
aut per alios saltem habuissent, in castris illis non deerant;
borum collectio, sed lues, in Europam venerit, intelligatur.
nequeat, *Americanos* *malo victu saepe uti*, *tamen nee*
ereae origo potest; uti pluribus demonstrat celeberrimus
n Europa, *dum in urbibus obsessis, vel & alias ob cau-*
a premit miseros, pessimi quidem excitantur morbi, sed
lues venerea. Unde merito concludi potest, luem non
onte, sed propagari per contagium (2); quod praecipue
coitum, oscula, mammas. Quamvis enim celebris auctor
rasavolus non neget, contagium venereum posse aliis mo-
ndo cum infectis in eodem lecto, bibendo ex iisdem po-
nicari, tamen statuit, addendum esse, ad hoc usque tempus
neque cognitum, quod quispiam nisi per coitum, vel osculum,
c morbum receperit.

irs infecta (1442.) diversio quidem tempore, pro va-
 rietate loci infecti, materiae contagiosae, gradu ca-
 is, temperiei diversitate, pruritu, calore, leni inflam-
 tula subalba, squamosa, erodente, mucosa, insanabili
 ediis cognoscitur primo..

venerea grave adeo malum sit, &c. mora reddatur peius, hinc
 ; opera debet adhiberi, ut cognoscatur quantocyus. Ad §. 1442
 t, luem primo se manifestare solere in illa parte, qua contrahi-
 simul dictum, quandoque miasma venereum humorum massae
 ique eo, quod in parte, per quam contractum fuerat, sui ve-
 inquit; contagium autem illud, nisi bona fortuna diffusetur de cor-
 d aliquando fieri videtur), evanescatque penitus, mutat partem
 umorum, cum quibus per vasa fluit in suam naturam, noxiumque
 in homine antea sano natum per metastasim ad varia corporis
 mitur, & haerere incipit ibidem, sicque varia mala producit.
 paragrapho nunc agendum est de illis mutationibus morbosis, quas
 diversis corporis apparent, dum contagium iis adhaeret, sive primo
 diato contactu alterius hominis infecti, sive per depositionem con-
 : materiae antea humoribus admixtae, & per metastasim nunc ad hanc
 corporis partem delatae.

varietate loci infecti, manifesta observatur diversitas. Loca enim plu-
 orporis tenaci coriacea cure teguntur; quaedam autem his carent. Sic
 ratum sunt, obstrictes, dum tabo venereo madentes partes genitales diu
 at.

Marshall. lib. VII. epigr. 29.
 (1.) Aphrodis. pag. 674.

(2) Lib. I. cap. XII. tom. I. pag. 90 & 169.

attreſcere debebant, affectas fuiſſe luc ubi efficaſſimae malignitatis conta-
gium duram cutim penetrare debuit, ut corpus inſiceret, vel & in ipſa cute
ulcus excitare difficilis admodum curationis: idem toties obſervatur in dorſo
penis, dum ab imputo coitu cutis fordo ulcere eroditur. Ubi autem loca
corporis alius foudo tabus, quae cutim non habent, ceteris paribus plaſti-
cum penetrat viri, neque ſemper formidoloſa adeo mala ſequuntur. Sic no-
tum eſt cutim faciei circa nares, & labia deſinere, ſolam epidermidem alia
tegere, uti & totum os internum. Idem obinet in papillis genitalium mulie-
brium parte interiori, glande virili, & interna praeputii ſuperficie; quae
videntur citius & facilius inſici poſſe etiam a leviori contagio, dum partes
cute rectae melius deſenduntur. Sic ab omnibus obſervatum fuit, minus fre-
quenter inſici ludaeos, ſi reliqua paria fuerint, cum ſeſecto praeputio nudi-
glans penis, veſtibulo perpetuo affricta, calloſior redditur: ſimul etiam in his
intra praeputium & glandem nihil colligi poteſt, vel moram facere, ideoque
penis reddi & acrius. Ob hanc enim rationem videtur in non recutiſtis praepu-
tium ſromenula toties erodi ulcere venereo, quam illud inferiori penis glandis
parti adhaerere, ſiſque intra praeputium colloſco pene connivens, colle-
cta materies virulenta poſt impurum coitum hunc locum alluat diutius.

Materia contagiosa. Diversos malignitatis gradus in contagiosa materia luis observari tota morbi hiftoria docet. Patebit postea dari gonorrhoea venereae satis admodum benignas, in quibus materia e pene fillans ex albo flavescit, & levem tantum in urethra ardorem excitat: in aliis prodit materiae profunde flava, vel ex flavo viridescens, urethram erodens, & intolerabilem dolorem excilians, dum urina emittitur. Imo quandoque adeo acie est fufcepum virus, ut vafa erodat, & urinam reddat languinolentam, & In pessima gonorrhoea, si bona adhibuit medela, venemus pessimum & acerrimam materiam contagiosam gradatim emendari, donec cum insigni omnium symptomatum levamine albicans, aut leviter tantum flavescentia procat minuta simul quantitas, tandemque, aut citius, aut tardius effluens


Facile autem intelligitur tanto peius videri debere mulierem, quo acriore gonorrhoea affigitur homo, cum quo venierem exercet. Idem verum est, si confirmata iam lue totum corpus, non autem una vel altera parte tantum infectum fuerit. Legi merentur illa, quae de varietate contagii apud celeberrimum Astruc (a) habentur.

Gratu caloris excitantur. Quum in calidissimis regionibus lues orta fuisse videtur olim fene contagio, saltem in primo homine, qui lue laboravit, uti præcedente paragrapho dictum fuit, merito videtur statui posse, maiori calore misamini venerei activitatem augeri. Unde in Africæ fervida regione tantam infanrum & puerorum corpora citius depascere foedum hunc morbum: sunt autem ceteris paribus horum corpora calidiora, quam adultorum. Dum turpia prothibula a formosis iuvenibus incitantur ad fervidissimam venerem, peior me-

(a) Lib. II cap. III pag. 94 & seq.

si lue venerea infecta fuerint. Constant observatur, indulgeant, vino aromatibus, liquoribus spirituosissimis omnium sentire augmentum. Dolerunt toties medicinae curationis per argentum vivum, aut decocta imbricia artis praecepta spernere, & gulae ac crapulae se morbi recidivae se exponere, dum, minuta quidem interbi, sed nondum penitus expulsa de corpore, excitant illius, quod adhuc superest, mali, & sic se ipsos, iter fallunt.

It, uti postea in cura luis venerae dicitur, tales egros
refari, dum argento vivo, vel decoctis sanatio tentatur.
Est, ut soluti per vim horum remedium humores, una
vereo, quod illis adhaerebat, exeant de corpore five per
per sudores: huic autem scopo conducit, si tales aegri
calidiori, toto illo tempore, quo morbosa ex corpore ex-
eunt molli diastma sustinentur vires, & restituuntur perdita.
Iud est, actuosam magis reddere contagii vim per calorem,
Iud expellere, solutis prius humoribus, per calorem pruden-
tius etiam in calidis regionibus, si idonea adhibetur methodus,
ter succedit luis venerae sanatio.
veritate. Ex precedentibus sequitur, calidae temperiei homi-
nientisculae a luis contagio affici; in frigidis, leucoplegma-
tismis in obesis ac pinguibus hominibus miasma venereum in-
viscidis, humoribus, atque ex illis difficilior extrahitur. De qua
huc agendum erit.

[illegible]

idiotismo chirurgiam vocare solent (c); quia vulgatis remediis non cedit, vicina loca depalcit sensim, & si crusta tegi videatur, atque exsiccare quasi plures omni dote prioribus similes renascuntur.

Tali sub forma apparere solet primum luis venereae vestigium in parte corporis, quam inficit; dum nempe contagium loco adhæsit. Si enim contagium illud calore magno aëris, temperamenti, fervidissima venere valde actuosum redditum fuerit & mobile, quandoque non manet affixum externis corporis tegumentis, sed venis bibulis reformatum, miscetur humoribus, & partem illorum in suam indolem convertit; per metastasin deinde hæc materia morbosa ad exteriorem corporis habitum deducitur, & similes pustulas producit, uti antea ad §. 1442 dictum fuit.

Quandoque observatur, quod & ipse aliquoties vidi, miasma venereum in sanguinem iam receptum, & dein ad cutim depositum produxisse maculas vix elevatas coloris ex rubro fusci, quae squamosae fiebant, & post plures squamas successive deciduas in ulcus venereum mutabantur, quod copiosum tabum ex flavo viridescetem quotidie eructabat.

Unde simul apparet, maius adesse periculum, si virus venereum non affecta parte, quam primo tetigit, sanguinem ingreditur statim. Licet enim materies morbosa postea denuo a sanguine separaretur, & ad alia loca deponatur, tamen inde patet augmentum materiae morbosae, & non est in potestate medici dirigere talem metastasin ad illa loca, ubi minori cum discrimine possit deponi, & facilius curari. Tristes enim casus docuerunt, non tantum externas, sed & internas corporis partes pessime affectas fuisse; uti sequenti paragrapho dicetur.

Non immerito ergo Astruc (d) statuit, *virus venereum partibus, quascumque afficit, ruborem, calorem, tensionem, dolorem, uno verbo phlogosim, vel inflammationem adferre*. Lenta tamen hæc est inflammatio, & periodum suam tardo gradu percurrit: non enim subita adeo sequitur suppuratio, ut in aliis morbis inflammatoriis, nec reliqui inflammationis exitus, sed simul adest acrimonia, quae partes corporis, quas occupat, ne ossibus quidem exceptis, lenta exesione consumit, & destruit.

Quamvis autem signa, quae occurrunt in loco, quem lues occupat, ad accuratissimum descripta fuerint, caute tamen in hac diagnosi procedendum. Licet enim medicus iustam suspensionem habeat foedi morbi, prudentia exigit, ut non temere illum denunciet, nisi fateatur aeger, se incurrisse luis acquirendae periculum. Multi enim solent hoc pertinacissime negare; imo contumeliosi & opprobriis onerant medicum, qui talia vel suspicari ausus fuit. Simul & famae aegrotantium, & familiarum paci consulendum esse semper, nemo dubitat.

1444
Hinc crescit
inficit
gigas, palatu
ano, bepar, hienem

Mala illud venere
is quod corpore non
manere possit in su
a visio agitatur, i
qua sanum ingredit
in dies totum corp
is morbum excita
indignitatem possit
in, ibi obnoctet.
nas de aegris in
ma piam, amo
tione, dein supi
ulcus aliusque i
compo reales si
vires mobile si
purgantur in
vires totus no
que in aegris i
lone perord
visi, dore ena
interdici im
nemum opor
quia modo
quia digne
quasi, vel
lone etat
lone pui
cappi et
agrorum
mole
am
lone
d.

(c) In praefatione aphrodisiaci.

(d) Lib. II cap. II pag. 82 & seq.

crefcendo , vicina primo , & plerumque externa
fit fimilibus pultulis ulcerofis , dehinc interna ,
latum , linguam , fauces , nafum , cerebrum , pul-
nem , uterum &c.

ereum cum reliquis morbis contagiofis hoc commune ha-
humano fi receptum fuerit etiam faniffimo , humores fa-
n fuam naturam , ficque copia augeri . Conftitit antea , ubi
r , minimam contagii moleculam , omnes fenfus fugientem ,
reffam , & humoribus permiftam illos fic mutare , ut intra
corpus fcareat pure variolofo , cuius vel minima guttula em-
citare valeat in homine fano . Unde patet , quantum crefcere ,
offit morbi huius contagium . In rabie canina , fcabie , pefte
et . Quum ergo lues venerea per contagium propagetur , di-
et in fanos feminium , fve miasma quoddam morboficum , quod
mo pauciffima , quantitate , & inconfpicuis viis , fano corpori in-
copia , viribus , effracia , fimul invalefcens , totam humorum maffam
ue inficere valeat , atque pefundare (e) . Quum ergo minutiffima
s fit in lue venerea , neque ac in aliis morbis fimilibus , ex fua
o fatis foret , & a levioribus etiam caufis per aëra diffufi poffet ,
: in diftans ; uti de contagio variolofo v. g. certo liquet . Sed te-
t non conftat parvibus tenuibus , levibus , volatilibus , penetrabilibus ,
as fpargi poffint , quae in diftans avolent , quae ftrictiffimos poros ce-
vadant , fed craffis , ponderofis , fixis , quae communicari non poffint ,
eualentur , nifi partes obitellae rarae fins & permeabiles , nifi contactus
immediatus & fatis diuturnus (f) . Lento quidem gradu malum ve-
rotorepere folet ; nec femper tamen : quandoque enim infectio nata to-
o fe ftatim manifefcat , & fatis brevi temporis intervallo per totum cor-
ergitur . Gafparus Torrella (g) , qui fcripfit fub finem feculi decimi
adeoque paucis annis poft luem veneream cognitam in Europa , ca-
arrat juvenis vixit quatuor annorum , qui rem habuit cum muliere ha-
videndogram ; quare eadem die ipfe fuis eodem morbo infectus . Quae infectio
apparere in virga ; ut folet ad plurimum aliis evenire : nam fequenti die
uit ulens in virga , cum quadam duritie longa , tendente verfus inguina , ad
m radii , cum forditie , & virulentia . Poft fex dies , ulteri femicurati ,
ritus fuit ab intensiffimis doloribus capitis , colli , fpatularum , brachiorum ,
rum , & colarum , & praefertim in eorum mufculis , cum maximi vigiliis ,
vibus moleftabatur non nifi in nocte poft primum fomnum . Elapfi poft ea
em diebus , apparuerunt multae pultulae in capite , facie , & collo &c.
Ma hiftoria probat , contagium venereum fatis brevi tempore per corpus
fperfum fuiffe , & molefte produxiffe fymptomata .
Quum ergo minuta admodum fit contagii moles , cito videtur diffufi debere

(g) Aphrodisiac. pag. 545.

(i) Aldus . ibidem .

(f) ibidem pag. 90.
B 4

de corpore, vel per venas receptum circulantibus humoribus misceri, sicque totum corpus inficere. Verum observata plura docent, miasma venereum diutius haerere posse in loco quodam, antequam totum corpus inficiatur: hoc autem vix concipi potest, nisi illud miasma, tenaciori humore obvolutum, parti affectae adhaereret.

Haec est ratio, quare celebres medici statuerint, contagium illud, omnes sensus fugiens inhaerere humori tenaciori, qui ipsi pro vehiculo intersit. Tantum enim hic subtilitatem agnovit *Fernelius* (b), ut non modo levis admodum, sed & *secre corporis experti sit*: Hinc, nisi alius iungeretur, in corpus nostrum agere non posset. *Qui enim possit corpori nostro vim inferre virtus incorporata?* Unde postea addit sequentia (i): *Quamquam enim pituitosa videtur materia, veneni tamen maleficio persusa, acrimoniae participi est.* Similiter sensit *Fracastrorius* (k) de lue scribens:

*Porro homine e toto, quod in ipso sanguine crassum
Est sordens lentore foret, foetidissima primum
Curripuit, sese pascens uligine pingui.*

Et paullo post (l), ubi de pustulis venereis corpus deturpantibus agit:

*Pustula summae
Glandis ad effigiem, & pituita marida pingui,
Tempore quae multo non post adapertha debiscens,
Mucosa multum sanie taboque fluctat.*

Contagii illius subtilitatem comparat effluvis odoratis *Helmontius* (m), quae a philosophis solent adduci, ut probetur summa corporum divisibilitas, quae omnem fere imaginationem superat. Notum enim est, asam foetidam, moschum &c. per amplum conclave odorem spargere longo tempore absque sensibili iactura ponderis. Sic autem habet: *Est nimirum lues non quidem morbus constans materia ex qua: sed fermentum duntaxat venenosum, solidis vel liquidis nostri partibus, odoris instar, affusum.*

Haec dum considerabat celeberrimus *Boerhaavius* (n), credidit, hoc mali genus semper sedere in illo humore pingui corporis humani, qui naturaliter in bene sanis replet illam partem, quam adiposum panniculum veteres, moderni cellulosam membranam, vocant.

Constat enim cellulis minimis, & numerosissimis, quarum compages vasculis subtilissimis perreptatur. Cellulae hae omnes in se mutuo parent, & exigua vim mirifice dilatari possunt: unde in emphysemate inflatae aëre turgent immantier, in leucophlegmatia & hydrope anasarca replentur aqua & tument. E

(A) De lue vener. curat. cap. XII pag. 221.
(A) Siphylis. aphrodisiac. pag. 185 D.
(B) Tumulus pestis pag. 847 col. I.

(i) Ibidem pag. 134.
(l) Ibidem pag. 187 B.
(n) In praedicatione aphrodisiac.

afmo penitus depletæ hæc cellulæ sic collabuntur, ut
quant.

maxime, membranam hanc cellulofam ubique curi sub-
ulis incumbere non tantum, fed illas ambire undique,
interpofitione mufculos a fe mutuo feperare, ut liber-
dorum motus, neque ullus impediatur vicinum. Pariter &
eadem hæc membrana cellulofa ambit undique, ut
facillime poffint. Sed & eadem hæc cellulofa fupra pe-
ad offa, & ad iuncturas fupra ligamenta fele expan-
olvit; ipfa tandem in vifcera fub meningibus, membra-
ingente, peritonæi expnfu, fe infinuat (o). Per mufculos
c tunica fic diftribuitur, ut inter diftinctas mufculares par-
naior componitur, fe infinuet ubique, omnes tegat, invol-
ur, ut illæ mufculares partes, quæ maiorem mufculum
modiffima facilitate, diftincto ramen motu inter fe moveri
autem illa tunica cellulofa ad periosteæ ufque pertingat, me-
arteries, a periosteæ vafis advecta, intra cava offis confecta,
ftei partim reecta, ad hæc vafa perveniat, intelligitur fa-
um huius membranæ effectu inter omnes corporis, vel re-
fe invicem partes (p).

mittere neceffarium duxit celeberrimus Boërhaavius, ut intellige-
eius de lue venerea fententia: fedem enim huius morbi præci-
in membrana hæc cellulofa; dum nempe contagiola labes, per-
remidis ingreffa, trans cutis vafcula ufque ad cellulas membranæ
revenir, ibidemque fe occurrenti pingui permifcuerit, tunc oleum
virulentia fua inquinat, rurfumque collectum nidum quali dat,
c. Unde pingue in hac membrana hæc adipofa vocari folet in-
alum contagio venereo. Membrana hæc adipofa continet; ut in na-
oris locis, ubi craffis & vafis molis mufculis infternitur; ut in na-
g; ibi enim craffi adipis copiam continet. Ubi vero teneriffima fim-
uas molis, ut in palpebris, fronte &c., tunc folet dici cellulofa fim-
&c., tunc folet dici cellulofa fim-
subinguem humorem in fuis cel-
continet, qui pariter aptus eft irretiendo luis venereæ effectus
neum ufum habeat hæc doctrina ad intelligendos luis venereæ effectus
antum, verum etiam ad curationem terri mali, parebit ex fequentibus
guare contra naturam veneni, fcu fenuibus hanc opinionem, quæ ipfi videtur
ndi & progrediendi rationem. Pluribus argumentis hoc ftabilire conatur;
videtur inutile, hæc breviter confiderare.

rimo ftatuit, hæc breviter confiderare.
tricus, tamquam primo morbi invade-
embrana infidit. Sed præ tunc viri-
te, quod non antea facta legitur pul-
errimam illam præfationem, qua or-
na-

(*) In præfatione apothecæ,
lib. IX. tom. II. pag. 107.

(C)

) Ibidem.

(1) De lue venerea

navit Boërhavius dilectionem auctorum, qui de huius veneris scripserunt, vigesimo octavo huius seculi anno editam Lugduni Batavorum. Huius editionis curam habui, ut prodiret emulatio; quia optimo præceptoris, cui omnia debbam, gratum fore noveram. Videtur autem celeberrimus Astruc non attendisse ad illam diversitatem tunicae adiposæ & cellulossæ, quæ discretis verbis in hac præfatione legitur (r). In illis autem locis, ubi musculus minimus, minusque agens, membrana hæc adeo parva pingui infuitur, ut ibi adiposam negent omnes fere, cellulossam tantum admittat Ruyschius. Ita in apice, palpebris, facie, siccis, siccis aium abesse, sed falso; adesi quippe, ac tanto parior ibi, quam ad mates, quantum elevator palpebræ superioris, vel corrigator frontis minor est glutinis. Auctoris enim hæc est opinio, huius venereæ contagium irrotiri, & fixari, imprimis in pingui adeo, quod cellulas adiposæ membranæ replet; in illis nempe locis, ubi crassa pinguedo musculus intersternitur; in aliis vero partibus, ubi pinguedo deest, vel parca admodum inuenitur, adest in his cellulis subpinguis mucosus humor, qui omnia lubricat, suavit viscositate luis virus pariter solet irrores, & in loco retinere; siquæ illud retentum mora humores affluentes sibi assimilat; & quom omnes illæ cellulæ in se invicem pateant, hæcque tunica latissime extendatur per interiora & exteriora corporis, poterit auctum mole & malignitate virus propagari per totum corpus, & in variis locis tristissima producere mala; uti fieri in huius veneræ inveterata fideles observationes evincunt.

Notum autem est, cryptas mucosas urethrae viscidum talem eructare humorem, qui ab urinae acrimonia defendit urethrae canalem, & aptissimus est inviscando contagio venereo. Ex his evidens est, gonorrhoeam nullo modo enervare *Boërhavii* sententiam, sed potius illum stabilire: patebit hoc ulterius, quando de gonorrhoea dicetur in sequentibus.

Ob eandem causam adeo frequenter occurrunt in tonsillis, uvula, palato, naribus intensius, sinibus earundem foetidissima ulcera; quia nempe omnia illa loca muco copiosissimo satis viciduo madent perpetuo. Idem & de panis, five bubonibus verum est. Licet enim per venas lymphaticas repletum virus venire possit ad glandulas inguinales, tamen & ipsae in tunica cellulosa five adiposa locantur. Praeterea docet anatomicae, glandulas componi arteriis, venis, nervis, & praeterea adesse substantiam quandam particularem, quae vasa illa ordinat, & varias illarum complicationes, varium nexum, & decursum servat: Simul totus ille apparatus communi involuero membranaceo tegitur. Unde videntur glandulae inguinales non carere tunica cellulosa in ipsa sua substantia. Quod imprimis probatur ex illis, quae ad §. 374 de inflammatione, & §. 125 de hydrope anasarcae dicta sunt; nempe, membranam illam cellulosam per totum corpus dispergi, vasa fere omnia in tali substantia cellulosa decurrere, imo & ipsam viscerum substantiam per partem continere. De bubonibus autem postea suo loco dicetur.

Quid

(r) Quum paginae nullis notatae sint numeris, non potest exacte indicari locus.

errucis venereis sentiendum sit, Boërhavus (1) enim notaverat, glandem penis constare ex pro-
 corpore, supra fines binorum corporum spongioso-
 dicto sequentia: Altera pars, quae ad glandem consti-
 tuit, quae a corona glandis usque ad urebrae orificium
 fabricae spongiosae incumbit, atque exteriorem ita glan-
 di extremi hic nervi, voluptatis & doloris instrumenta pro-
 andis membrana extrema coëcti, sibi mutuo incumbentes,
 am, si deglubitur hoc extremo involucre, liberis, solutis,
 pillis hirta tota, & villosa apparet. Quid si ergo, to-
 im cellulosa distinctae sunt a se mutuo. Si tum cellulosa fabrica
 . Sed vab quantus tum dolor! Uique intolerabilis: neque
 necesse vix aliud atrocius excrucians. Si tum cellulosa verrucis
 ibo venereo, solutae papillae excreverunt, faciemque verrucis
 um symptoma; imprimis horrescens circa coronam glandis;
 dem papillae. Speciatim, & exhorruit terribile hoc malum,
 glandem deformans, praeposuit sere morum omnem impedi-
 r, difficultas haec, a celeberrimo Astruc contra sententiam
 proposita, satis facile solvitur.
 pumentum Astruc desumit a situ & figura ulcusculorum vene-
 liatit haerere in vasculis sebaceis, quibus in viris balanus, balan-
 tum, & frenum; in mulieribus vero cadurda, vulva, pterygia,
 aginae ostium confita sunt (2). Neque illud tantum adfirmat de
 quae ulcusculis venereis maxime infestantur, sed statuit, idem
 intelligi de pustulis venereis, quarum sedes est in sebaceis vasculis,
 per cutem sparsis (3). Tales lacunas in cute reperiri anatomo-
 narum cavum per arterias secretus humor oleosus, dein per emissio-
 a exit, cutim iungit, mollem flexilemque servat; & idem ille hu-
 are exit impeditur quacumque de causa, qui aliquando in magnam molem
 ne. Liquor in hac lacuna secretus, oleosus pinguis est. Si enim
 nini post somnum linteo albo puro facies perfricetur, praecipue circa
 i, pinguis macula invenitur in linteis. Negari quidem lacunas illas se-
 continere humorem, qui itere-
 e inde pustulae venereae in facie
 stui, ut celeberrimus Astruc vult,
 sedem habent, non vero penit-
 solum. Maxime autem miratur,
 et hoc affectum probari credebatur, ne m

(1) In praetentione asperandis.
 pag. 107.

(2) Ibidem.

(3) Astruc de lue venerea lib. IX tom. II

quae cum vasculorum figura apprimè congruit, ac tandem ex cicatrice nulla post curata ulcera supersit, vel tenuissima tantum, & ferme inconspicua; quod proinde, cutaneum integumentum supersitari ad summum, funditus vero minime, erosum fuisse demonstrat. Deinde addit, quod idem obtineat in ulcusculeis veneris, per reliquum corporis cutim sparsis. Ad omnes certe provocare audeo, quae ulcera venerae viderunt, & tractaverunt, an non viderint turpes cicatrices. De hac re dicitur sequenti paragrapho, ubi ulcera venerea ad amissum deferibuntur.

Tertium argumentum, quod adfert Astruc (v), sic incipit: *Neque suam indolem deponit virus venereum, dum veterascit.* Videtur perperam intellexisse verba Bërbarvii (x). Postquam enim descripserat tristem casum nobilis juvenis, cuius totum dorsum latis ulceribus lues venerae depasta fuerat; unde sanatione perscisa, mira deturpati corporis apparebat facies; subiungit sequentia: *Ex hoc casu didici singulare huius morbi ingenium; vidi ex eo lucem, ut in principio sui exortus in Europa se manifestaverat, atque a primis auctoribus in hoc libro describitur; confexi rationem, qua variolae Hispanicis vocaverant primo oriundum in Europa morbum; sed simul intellexi, quam ingens sit discrimen inter malum hoc, quod tum apparebat, & illud, quod nunc pervulgatum Europaeos affigit.* Videtur enim credere, quod Bërbarvii putaverit, virus venereum indolem suam deponere, dum corpore humano receptum inveterascit. Certus sum, illum nunquam sic cogitasse, dum probe noverat, tetrum hoc malum, ubi corpus humanum infecit, vires acquirere eundo. Hoc autem indicare voluit, in ipso luis venereae ingressu in Europam morbum saeviore fuisse, nostris temporibus mitiorem observari, quaedam nunc occurrere in lue, quae antea non aderant &c. Sed hoc confirmat multis argumentis Astruc ipse, uti patebit manifeste ex illis, quae postea dicentur. Statuit autem celeberrimus auctor sequentia (y): *Contaminato quidem sanguine, humores, qui a sanguine scaturiunt, contaminari necesse est, non promiscue tamen, & indiscriminatim, sed ordine certo.* Ordinem autem, secundum quem lues veneream plerumque progredi solet, vocat scalam affinitatum, quam in hoc loco summatis tantum recenset, sed alibi (z) latius describit. Ubi statuit: *Perpetuum est in syphiliticis semen, & seminales humores contaminari; quacunque via, non genitalium modo concubendo, sed etiam mammarum lactando, oris sugendo, vel bastando, cutis cubando &c., contagium conceptum fuerit.* Ex illis autem, quae ad §. 1442 allegata sunt, patet satis, lues veneream corpus exedere posse, licet nullum vitium in genitalibus se manifestet.

Interim & hoc verum est, quod non adeo firmiter confidat celeberrimus Astruc huic scalae affinitatum, acsi omni exceptione maior foret, neque possent symptoma luis venereae a proposita norma vel tantulum unquam declinare. *Quantumvis enim natura, si sibi permittatur, & omnia paria sint, pro-*

(v) Astruc de lue venerea lib. IX. tom. II. pag. 1073.
(y) Astruc de lue ven. tom. II. lib. IX. pag. 1073.
(z) Lib. IV. cap. II. pag. 298 in prima edit.

(x) In praefatione aphrodisiaci.

se videatur, docuit tamen experientia multa sa-
 em varie pervertant & inturbant (a). Dein
 hunc ordinem penitus turbare possunt.
 huic affinitatum scalae, quae seriem successivam
 determinat; sed, ne longus sim, illud solum con-
 audit (b). Statuit celebris auctor seminum vene-
 x ideo cerumen aurium, bilemque serius contagi
 ; quia oppositam acrimoniam, alcalinam nempe
 ecario assumuntur: nam acrimoniae species, quae in
 nullis experimentis demonstrata est, quantum novi-
 liter alcalina non est. Vidi dolens aliquoties immo-
 ecutam fuisse, dum foeda lues auditus organum de-
 n observare potui cerumen aurium a naturali indole
 secutae surditatis ratio deduci posset. Longe promptior
 quam a lue laedi possit auditus organum. Membrana
 s investit, per tubas Eustachianas producitur, illarumque
 fit. Ponit autem (c) Astruc in ordine tertio humorum
 sciendorum mucum, qui a paristhmiis, tonsillis, uvula
 llera venerae occupant haec loca, facile hoc malum per-
 in cavum tympani prorepere potest, quum illarum extre-
 ope tonsillam utramque, pone velum pendulum palatinum,
 adessent ulcera faucium venerae, vel saltem signa manifesta
 . Nunquam mihi contigit observare surditatem a lue vene-
 lum incipere a meatu auditorio, & collecto ibi ceruminae.
 nione humorum diversorum nullam pinguedinis, aut membranae
 capitulando, eandem scalam affinitatis recensuit, omisit numerum
 i in priori editione aderat, & continebat cerumen aurium, ac bi-
 adit sequentia: Sed in his omnibus constat experimento, nec adiposam
 , nec ullas membranas illius lacunas, affici, laedi, pessumdari, ne-
 diposam pinguedinem quae turgescit illius cellulae, ullo modo vitari.
 huic membranae aliquoties inferri, si ulcera mali moris cutim de-
 sine feci; Si virus venericum cum adiposa pinguedine sponse miscatur;
 ur. Tandem concludit: Sed haec neque aquam puto.
 s unde videtur egrisse refelli opinio
 : in numero mox sequenti (e) fatetur,
 dae editionis, in quo nihil de hac re
 dum quotidiana sint, inter insolentia
 is, si unquam, certe tarde & raro
 de sede morbi in adiposa membrana
 r, lucem venericam posse in adiposa mem-

(a) Adde de hoc venere lib. IV cap. II pag. 100.
 (b) Ibid. pag. 101.
 (c) Ibid. pag. 1074.

(b) Ibid. pag. 299.
 (c) Ibidem.

membrana aliquando facere suppurationem; quod peculiaris adiposae membranae conditio locum det mali incrementis opportuniorem. Nemp̃e mollis est, & laxi contextus, tenuissimis, ac praeteneris cellulis tota constat, perpetuo surges congesto succo adiposo, qui tardissime circulator, ac in loco eodem haeret diutissime. Fatetur adipe affecto labem celeriter longe, lateque dispergi, & hoc fieri mulculis suppositis, ac cute incumbente manentibus integris. Quam mira opinio non diversitas in eadem pagina!

Videtur autem Astruc vim argumentorum Boerhaavii percepisse satis; sed quom non convenirent scalae affinitatum, quam statuerat, conatus fuit illa eludere, & tandem opinionem de sede luis venereae in adiposa membrana cuiuscumque pretii esse videtur, si non perfelle expressam, saltem non obsiure osim adumbratam fuisse statuit (f). Hoc autem inde conatur probare, quod ante annum 1570 nonnulli non adiposum panniculum, ut Boerhaavio visum est, sed carnosum panniculum in universo corpore diffusum, illudque regentem constituerent, a quo perniciosae huius luis scaturiginem emanare crederent. Vastam celeberrimi Astruc eruditionem semper miratus fui; nec minor tamen saportiam vel non lectum fuisse a Boerhaavio, vel sit legerit non citatum. Anatores enim gnarus erat, adeoque probe noverat panniculum carnosum in quadrupedibus quidem inveniri, sed non in homine: unde certe alia sedes luis esse debebat; hinc facile poterant refutari qui sic sentiebant.

Postea, ubi de curatione luis agendum erit, patebit, quantum usum habeat emaciatio corporis per dietam, salivationem, sudores &c. Solutio enim vix non omni pingui corporis, & expulso virus venereum a nexu iam liberum diffilatur de corpore, & redit sanitas. Unde opinio Boerhaavii multum confirmari videtur.

Contagium luis dum partem quandam occupat, nisi statim efficax medela adhibeatur, crescendo vicina occupat, & licet in initio plerumque se manifestet in externis per illa signa, quas praecedenti paragrapho dicta fuerunt, tamen semper metus est, ne gliscendo quasi citius, vel serius ad interna perveniat, sicque pessima, & saepe insanabilia mala producat, dum illa occupat.

Labia, gingivae, palatum, linguam, fauces, nasum. Omnes hae partes: crassa cute carent, mucosa membrana teguntur, cui sola epidermis incumbit, numerosas nervas papillas ex membrana mucosa prodeuntes defendens.

Si in lenta, mucosa, pingui, in mille plicas, rugas, sinus convoluta: membrana virus venereum se manifestaverit, nimis notum est, quam difficulter illud inde extricari possit; quum haec membrana aëri nudo semper sit exposita. Unde statim efficax medela adhibenda erit. Sed membrana haec regit ossa palati, nasi, vomeris, ethmoides, spongiosa, unguis, os planum, orbitae ossa; in vestit sinus maxillares, apophytes tenues ossis sphenoidis, eius cryptas subephippippo, sinusque cavos in osse frontis (g), si iam haec membrana ulcera-

(f) Astruc de lue venerea tom. II, pag. 1075.

(g) In praefat. spho.

DE VENEREA.

31

itum corrumpitur necessario, quum tenue, & la-
 tervari potest, sed caries illud occupans procedit
 fliculum hoc vicinis committitur, totumque cor-
 ium corruptas per partes excidit. Periosteo enim
 riuntur, putrescunt, tabescunt carie.
 , nasus subidet, & elegans antea vultus redditur
 affectis turpiter, & complanatur nasus, cartilaginibus
 na nasi turpiter patent perpetuo, & foedissimo aspe-
 em miseri emungere amplius non possunt. Si velum
 in totum, vel pro parte exesum, si uvula destructa
 cibi, & potus, dum deglutiuntur, per nares redeunt,
 la per totam vitam manet, & omnibus obviis testatur,
 coravit miser. Vidi membranam posticam pharyngis
 xesam, ut nuda vertebrarum corpora, sed miserrime
 atarent.
 eiusmodi casibus bona medela reliquum corpus a lue li-
 nis tota vita manebit deformitas. Optime hinc Boërhavius
 practer id, quod artis potestas habet, promittere non ault,
 re, quando scedam, putrem, rancidum, ichorem naribus
 let, aut ulcera lardo similia, faucium posteriora, velum pen-
 membranam crassam palati depasci cernit. Sed, omnia bona
 prudens nihil, varia tentans, semper interim de exitu sollici-
 terna faucium rite distingui, dum interim miseresui acri-
 nalis. Antea, ubi de angina, ne quandoque confundantur cum
 am, aliquot horis distingui, dictum fuit, monui post levem fe-
 iperare maculam albam, dolere fauces, & in hoc, illove oris
 putridum, & acriter dolent. Si & quandoque flavescit; cuius nar-
 In scorbuticis ore exit, & eroduntur quandoque satis profunde pi-
 ubro dolente, & quod remediis facile cedant, ita ut satis cito depu-
 & contrarium autem in malis verereis obtinet; uti praecedenti pa-
 dictum fuit. Color ille lardaceus, qui in ulceribus vanereis faucium
 interni adest, Color ille lardaceus, qui in ulceribus vanereis faucium
 a arentis oculis lustravit. Fallopius (i), haec ulcera venerae, quae
 arnis perinae salivae color; hic non est in medio albus; circumquaque
 us, non pallidus; sed fecae per potest explicari; non enim est ruber,
 un sine coris; & tales apparent sorsum pernam, talis est color hu-
 magis in latum serpunt, quam in palato &c.. Ulcera illa venerae his
 a, & teretissima sequuntur mala. In osundum, hinc successive depascunt
 cadavere senis decrepiti, a lue ve-

) la gland. aphrodis.

nera plurimos iam annos male mulctati, ita ut vix intelligi posset, dum loqueretur, invenit celeberrimus Morgagni (k) sequentia: *Ovula, cuius pars dextrat, linguae posteriori suprema superficies; & annexa olim per ligamenta epiglottidis cartilago, ita erant cicatricosae, ut nihil magis. Itaque ea cartilago inaequaliter contracta in triangularem propemodum verticem desinebat, multo caninae similior, quam humanae. Quin vitium in laryngem reliquit, & huius proximum articuli asperae truncae se propagabat, et atque arytaenoidum altera quasi luxata, non comparari parallela: intra illam autem arteriam inaequales magnique quasi prominerebant lacerti &c.* Non miramur hinc, loquelam difficilem, ingratiſsimam permanere post ulcera faucium. Si autem terum malum per asperam arteriam prorepas, quandoque asthma immedicabile sequitur; quod si supervenerit, monet Fallopius (l), morbum esse incurabilem: *Non crucietis aegrum asthmaticum, quia non sanabitur.* Celebris in arte sua Petii (m) vidit erosam a lue venerea asperam arteriam, & feliciter curavit, postquam annulus cartilagineus a reliquis partibus sanis separatus ad longitudinem quatuor, aut quinque linearum excidisset relicto foramine, quod apicem digiti capere poterat.

Facile patet luem veneream, dum laryngem, & asperam arteriam occupat, declivi quasi via ad pulmonem venire posse. Vidi ipse in lue inveterata tumentem costam veram, obſessam gummi venereo, quod brevi in foedum ulcus degenerabat, & pone costam affectam iam cartilam prorepens, interna thoracis infecit lethali cum eventu. Bennetus (n) toties laudatus in capitulo de phthisi dixit: *Bis morbi Indici virus in thoracis capacitatem refluxum animadverti, conquiescente signorum flagellantium caterva, quibus lues stipata venit, immaniter vero saeviente phthisi; unde anhelitus, suctor nequissimus, & pulmonem fere totalis devulsio per putredinem. Quod ex aperto urisusque patuit cadavere.* Sed & in gonorrhoea non virulenta, & in fluore muliebri de tentis aliquoties observavit, quum tussis acriter premens, & spirabilibus suffragibus supervenerint, simul ac materia tralatiſſima consilientiam extrusioni aptam adeptam fuerat, tussisque aliquantisper sedata desisse profuvium (o). Certe saepius inveteratae lue succedit immedicabilis phthisis, quae quandoque & imputari potest salivationi repetitae, vel imprudenter adhibitae, imprimis in corporibus tenerioris fabricae, quae ex idiosyncrasia in haemoptoem, indeque sequentem phthisin, prona sint. Videantur de his illa, quae dicta fuerunt ad num. 1 §. 1198. Quum autem ex propria sua indole phthisis sit morbus curatu difficilissimus, patet, quam parum spei superſit, dum lues venerea cum hoc morbo concurrat. Notavit etiam Antonius Musa Brasavolus (p) vel leve vulnusculum, quod aliqui viginti quatuor horarum spatio consolidatum fuisset, vix per quadraginta dies sanari potuisse in illis, qui luem veneream perpelli fuerant. Imo pro axioma ponit sequentia: *Quotquot ab hoc affectu male trahati fue-*

(k) De sedibus, & causis morb. &c. tom. II, pag. 198.

pag. 781, 782.

(l) Tabid. theatr. pag. 35.

(m) Académ. royale de chirurg. tom. I, pag. 348 &c.

(o) Ibidem.

(p) Aphrodisiac. pag. 7

(l) Aphrodisiac.

VENEREA,

33

adepti sunt, quemcumque incluserint in morbum, cumque sit specie vehementior in talibus efficitur, et morbo Gallico afficitur. ca, licet qualvis tere partes corporis occupet ali- an superiora invadit: docent hoc pustulae faciei cre- faucium, narium, &c. Quum autem erosio mem- harum partium ossa inficiuntur, malum propagatur a; unde & inclusum his encephalum pessime afficitur, sequuntur. Saepe observantur cerebri laesiones in lue levisima vertigine ad lethalem apoplexiam usque: caecitatem, surditatem &c.. Vidi in lue venerea in- icetur §. 1454, tunc media ossa occupare solet, praeci- lunt oriti tumores gummosi, & exostoses in calvariae li totum os bregmaticis dextrum sic consumuntur fuisse cum- re. Merito hinc adeo suspecti habentur in lue venerea per- res, quos dum Botallus (q) observabat in homine, qui tam- t ob acerrimos circa sinciput, & tempora cruciatus inlomes- dare nolebat aeger, ut hoc tentaretur. Coeperunt oculi vi- um culices quasi circumvolitantes perciperet, & telas atanes: batur perfecta carceitas. Territus aeger concessit, ut cauticum- retur, ubi magis urgebat dolor, sed noluit ferre, ut apertus- perit: Inventum decidua sponte cicatrifabatur. Post quadraginta phaeclatum, putidumque coronati regi latitudine, statimque tra- rio abundans ichor purilaginofus, instar aquae fuligine sumarii, rae, pressus iuber tum perilaginosus, tum per aures, & nates, acile rumpebantur, ut ossa aperituram, tum per aures, & nates, a integre habebant, verum adhuc integras erant, quae Notum est olim hepatis sanguis & cerebrum, & nervi optici, cetera- m praeter venam portae, ingens ficationis munus adscriptum fuisse- cor tenderet, & venae vicerum concurrebant simul- a par rap, & venae vicerum concurrebant simul- par rap, & venae vicerum concurrebant simul- purum; postquam vero sanguis mu- hylopoieticorum concurrerent simul- tum, & venae vicerum concurrebant simul- lum per venas gastricas, & mela- rae, & venae vicerum concurrebant simul- i in sanguinem, totius corporis usi- culatio demonstrata fuit, & exactiora- tum, & venae vicerum concurrebant simul- sanguinem venit, hepar exauctora- pulso, Bartholinus epigraphum scri- qui lue in Europa apparente scri- agium venereum symptomata morbi, quae

Aschaeus. de lue ven. V. par II.

quae in reliquo corpore apparebant. Hinc apud illos auctores de solutione continui in hepate, de varia intemperie huius visceris, secundum quatuor temperamenta definita, longae, nec minus tediosae dissertationes habentur. Curatio autem tetri mali tentabatur imprimis per vacia apozemata, syruposque alterantes, ut his praeparata, & mobilis reddita materia dein facile evacuari posset per vomitum, alvum, sudores &c. Operosi simul admodum erant in congerendis formulis compositis remedium, quae alia debebant esse in sanguineis, quam in pituitosis, in biliosis, quam in atrabiliariis. Quidam etiam combinabant haec temperamenta inter se, & inde novam medendi methodum deducebant, sicque compilabant ingentem formularum sarraginem ad nauseam usque; uti manifeste patebit omnibus, qui collectionem illam auctorum, qui de lue venerea ante annum 1567 scripserunt, perleger, cuius sub *apbrodisiaci* titulo iam saepius mentio facta fuit.

Quidam ex his morbum variae hepatis intemperiei adscripserunt, & illorum plerique suam veneream pro antiquo iam morbo habuerunt. Alii novum contagium agnoverunt quidem, sed ab illo hepar statim affici voluerunt, & deinde ex hepate ad reliquas partes corporis propagati malum, quod varios edebat effectus pro diversa intemperie illius visceris.

Quum ergo omnes hepar accusarent, placuit *Fallopio* (r) indagare veritatem huius asserti in cadaveribus; & quum *Manardus*, utque credebatur, ex illo *Montanus* statuisset adesse solutionem continui in hepate lue venerea laborantium, contrarium demonstravit: At hoc falsum est, quoniam in hepate, non tumoris, non ulceris, non vulneris adest vestigium. Ego volui per anatomem hoc experiri, & scui in uno anno plusquam quinquaginta homines, & nunquam inveni solutionem continui in hepate. Quum autem *Fallopium* fuerit in anatome versatissimus, uti eius anatomicae observationes docent, fidem in his omnino meretur. Deinde in sequentibus capitulis explodit illam sententiam de frigida, calida &c. intemperie hepatis, quatenus luis venereae causa foret. Observationemque recenlet (s) iuvenis unico cum meretrice coitu infecti. Nihil apparuit in pudendo. Sequenti die statim coepit erumpere bubo, & postea tota barba, supercilia, & capilli evanuerunt; laboravitque doloribus interstissimis. Cur ergo hic potuit infecti ita valide, ut sequenti mane hepar materiem ad pubem remisisset? Sed licet hepar non possit culpari, ac si in hoc viscere nasceretur virus venereum, vel a suscepto contagio omnium primo afficeretur, tamen negari nequit hepar aequae ac alias partes internas a lue laesum inventum fuisse. *Marcus Aurelius Severinus* (t) in nosocomio reseritissimo decumbentibus lue venerea plura cadavera secuit, & complures offendit, quibus exulcerati sum ossa phagus, tum trachea, quibus item pustulosus pulmo, pustulosumque iecur, apophymodes vero proflatae sunt animaduersi &c.

In cadavere mulieris celeberrimus *Baader* (u) vidit totam anteriorem hepatis su-

(r) *Aphrodisiac*, pag. 771.
necrea toni. II. pag. 921.
Hist. nat. pag. 181.

(s) *Ibidem* pag. 777.

(u) *Observat. medic. incisionibus cadav. anat.*

(t) Astruc de lue ve.

papulis seu tuberculis plenam, quae omni nota cha-
erant, quae in facie, manibus &c. hominum lue-
duntur. Discissa haec tubercula intus eandem ma-
n gummi veneris, & sciatomatibus alias cernimus.
leguntur (v) apud celeberrimum Morgagnum, qui
, & renes cum suis appendicibus saepius aliquanto
, qui lue hac diu, & graviter laboraverant, quam ex-
ne facile existimes. Addit, quod non meminerit un-
invenisse in lue venerea laborantibus, nec tamen ne-
labem inventam fuisse in corporibus hoc morbo af-
e vir erat probe confusus, hanc luem, ut sub cuiuscum-
delinere, ita quodcumque visus vitare possit. Dein-
s auctoribus observationes, quae docent utrum non tan-
iam totam exulcerata fuisse a lue Gallica. Unde nul-
terna corporis aequae ac externa ab hoc morbo affici-
; virus in ipso ossium medullis corrumpit medullam,
ta producit: de qua re postea ad §. 1452, &c sequentes

ab Antonio Musa Brasavolo (x) a lue venerea ungues ce-
xisse, dentes excidisse, visum periisse oculis destructis; ne-
bant morbo iam inveterato, sed notat ab his morbum
esse. Sic testatur dentium casum aliquoties praecessisse,
cessisse pilorum defluvio. Idem de oculorum iactura affirmat.
impliciter, & illas primas enarratas affectiones, quae in pene sunt,
putridi. Notum est post salivationem, imprimis si valida fue-
ndoque excidere; nec mirum hoc est, quum tunc gingivae mul-
e mutationibus in decursu salivationis mentio fit. Bernardinus Tomi-
circiter a lue initio morbi veneris observatis scribens circa
, & capillorum defluvio; dein addit: Vidit aetate proxima alia in-
dentis, & barbam experiri. *videmus*: ac multo saepius cadere su-
omnibus constat, quam late
ano, quum nulla fere pars sit
icherrimo, dum inveterata lue
t ipso inveteratis flore (a):

Iam

De testibus, &c. cunctis morbor. &c. tom. II
pag. 619.
Culm. subtem pag. 179.

C

2

g. 369.
(c) Ibidem pag. 1052.

(x) Aphrodisiac.
(a) Fra-

intercepta digitis, horum a se invicem abdução-
exsiccata ex viridi flavescens indurefcit cum lin-
c deterfa affiduo manat iterum, nec fiftitur, nec
fanis facit: e contra pars vicina trahens, eamdemque
his novam femper fuppeditat materiam; unde hoc-
cera, quae femper in adipofa membrana haerent,
rde corrumpunt, mufculos fuppositos, denudatos, in-
rimo nitentes oftendunt.

s, fi ad cellulas membranæ adipofae pervenerit, ibi-
gui permiscuerit fe, tunc oleum hoc tenax virulentia
ie oleofo hoc lentore retinetur, fovetur, atque calore,
magisque incenditur, cutim, & cuticulam fuperpositas
erimque fub his circumfufas cellulas oleofas contami-
natio plagæ in panniculo adiposo corrupta reperitur,
fuperposita perdita, & exefa est.
ulcere exiens adeo diverfa eft ab ea, quae in aliis ab-
occurrit, ut morbi peritus illam exemplo diftinguat ab
e, lymphæ carcinomatum. Eadem enim haec materia in
t infat fevi femifufi, lentore vix cohaeret, colore eft fin-
lutefcente, viridefcente; vix acris fentitur ardore, dolore,
n hanc membranam putrefacit absque ingentis doloris fenfu.
ulcerum in locis cute teftis nunquam elata, vel retorrda,
plana, quafi polita, & pallida faepe quafi fluétuant, dum non
amur fupposito panniculo adiposo, qui latius exedi folet,
umbens.

it ulcus tale fanari, tunc femper curis foedo fpectaculo mu-
pofitis accrefcit; cavitates manet profunda faepe in locis, ubi co-
do cuti fubternitur; cavitates manet profunda faepe in locis, ubi co-
e hinc partis rigiditas; uti v: g: in natibus fit; immobilitas mu-
os; ob mufculos cicatrici, & vicinæ
e tenfa, arida, vix perfpirans, & prae forti tensione fplendens
apparet.

tali ulcere, nifi efficax medela
ina fimile priori malum medela
clinquens mala. Quando pluribus
haec ulcera corpus depauperantur
ctus forma, & turpis morbi turpita
dictis patet, in latum morbi turpita
& folam tantum pinguem tunicam
nunt, confumtis vasis cuti fupposita
ita ulcera quadoque occurrunt p
Gouffard (r) optime defcripfit.

contagium deleverit, continenter in
eamdem femitam decurrens, fimilia
in locis vel fimul, vel fucceffive
foedis cicatricibus deturpatur cor-
a vestigia perpetuo manent.
roferpere potius, quam in profun-
pafci; quinimo nec cuti nocere, nifi
fubducto pabulo, haec ipfa perit.
bubones apertos, quae egregius chi-
notavit haec ulcera non efle profun-
da.

da, sed fordida, & materiam, quae exit vix rodentem, sed mucosam esse. Simul monet, in his ulceribus primum cicatricis vestigium in medio ulceris fundi apparere sub forma pelliculae tenuis, & rubrae, quae se extendit ex centro versus omnem ambitum; quum in iis ulceribus, quae non a lue, sed ab aliis causis orta fuerant, cicatrix ab ambitu incipiens versus centrum pergat. Color ille ruber videtur inde oriri, quod destructa omni tunica cellulosa musculorum suppositorum color per teauem hanc pelliculam transluceat. Difficultatem autem ab ambitu ulceris venerei cicatrix incipere potest, quia, ut ante dictum fuit, solet tale ulcus in latum serpere, & sub cute adhuc integra, vel saltem nondum erosa, vicinam membranam cellulofam consumere. Sequitur iam utilis indagatio illorum malorum, quae a lue venerea contagio nasci observantur in diversis corporis locis, & pro varietate partis affectae singulares morbos producunt, licet ab eadem causa pendeant. Quum autem impuro coitu lues venerea contrahatur frequentissime, idcirco in partibus genitalibus primae noxae frequenter occurrunt,

§. 1447 **H**inc in veretro externo cancri; in interno gonorrhoea; in vagina fluor dictus albus.

Quum penis virilis in coitu impuro exponatur quam maxime contagio venereo, mirum non est, frequenter hoc membrum, affici etiam in ipso morbi initio. Antea ad §. 1442 dictum fuit, quod tales pustulae vel a topica applicatione contagii nascantur satis cito, vel ab eodem contagio resorpto per venas, sanguini misto, & postea dein per metastasin ad has, illasve partes depositas; & tunc tardius haec ulcuscula prodire solent. Ad §. 1441, ubi agebatur de lue venerea per lactationem communicata, constitit prima signa mali in papillis, & harum vicinia prodidisse. Postea infecta fuerunt pudenda cum pruritu vehementi, quem sequebantur pudendorum ulcuscula, a quibus mariti inficiebantur, hucque tetrum propagabatur malum.

In illis locis, quibus lue contagium adhaeret statim, vel ad quae per metastasin deposita fuit, oritur macula, in ipso initio plana, stigma variolae nascenturae, vel morsum pulicis fere referens; adest levis pruritus; vix dolet, elevatur paulo post haec macula in papulam eminentem; sub qua forma descripta nascentia haec ulcuscula venerea celeberrimus Astruc (d) sequentibus: *Initio levis exuberans papula militaris, vel miliarem parum superans, rubra, acuminata, calens, prurienti, cuius apex sensum complanatur, Et albescit, ac tandem levi apertura dehiscit, unde icteris quidpiam efficitur. Continuata dein laborum erosione ulcus crescit, dilatatur, excavatur; callis cingitur magis, vel minus duris, densatisque pure crasso, viscido, tenace scateo, Et similia ulcuscula in vicinis partibus plerumque excitat. Haec ulcuscula cancri solent dici, quum vulgaribus remediis non cedant, callosa labia habeant saepe, contumacia sint, & fundus eorum tegatur copia muci albicantis, vel livescantis (e). Aliquoties vidi*

(d) De morbis vener, lib. III, cap. 7, pag. 243

(e) Ibidem pag. 248.

m ex flavo viridescere. Forte si parum sanguinis
istum fuerit, lividus ille color nascitur. Sic facile
la ab excoriatione, & aliis levioribus harum par-
vel sponte, vel solitis remediis sanentur facile.
gnosceret, an haec ulcuscula contagio recenti post
beantur, an vero a lue dudum iam latente in corpore
su. gravius curatio requireretur, quum in recenti malo
solis haerens haec per eadem haec loca iterum educi
reliquit corporis. Verum est, sinceram aegrorum con-
n tollere posse; sed, uti optime monet Astruc (f), fac-
tum malum lue dudum latenti morbum adscribere,
Mulieribus viduis satis familiare est, ut in defunctum ma-
lant culpam; viri iam aetate maturi, ut & qui castitatem
delicta potius fatentur. Probabilis tamen coniectura
ex sequentibus: Si ulcuscula in viris foecum, in feminis
mes, nymphas, aut clitoridem occupent, si multa, maligna,
lissa, quum ea, quae a latente lue dependet, praeputii foec-
benigna carunculas non affeclent praeter reliquis partibus,
paragraphe monitum fuit, ac tarde ut plurimum iudicentur. Sed,
ulcera haec testa, vel hac orbata occupant. Idem in pene virili
la producunt, quam in aliis locis: sic. v. g. erolo tenuissimo
ad glandem, & internam praeputii superficiem tegit, papillae ner-
ic numerosae dissiliunt, & in verrucas degenerant. Longe aliud
, si tale ulcusculum praeputii obideat, ut toties fit,
externa cute penem ambiente haereat. Ulcuscula eadem, dum
raeputii superficiem erodunt, miros tumores, inflatos, pelluci-
tatio, gangraena, de quibus. hymensis sequitur & penis inflama-
exponit celeberrimus Astruc (g). 1449. dicetur.
autem ulcuscula illa, siue canerosi, tamen monet singulis non inferri
iei praeputii, aut reliqua est, & evidenter ex antedictis patet.
a nonquam. latenter oculum testis, & evidentem ex antedictis patet.
desendi morbo exteriori cura, quae penis vestitur; ita & asserit in-
omnes, qui morbo veneris cura, vaginae, aut vulvae interiora, sed ex-
Verum, dum Astruc operose inquirit, sui saepius, & externam penis cutem,
meris occupata fuisse. Nec dubito,
is operam dederunt, idem observave-
bat in causam, quare exteriora penis, &

(f) De morbo veneris, lib. III, cap. 7, pag.
pag. 143.

(g) Ibidem.

(h) Ibidem.

& pudendorum muliebrum, nunquam obfiderentur canceris venereis, credidit, illam deduci posse a peculiari structura illarum partium (*i*), voluitque in vi-
 rim internam praeputii, totamque balani superficiem, praesertim freni latera,
 & coronae glandis peripheriam, *densissime consterni vasculis numerosis, minutissimis, vix semilinea profundis, parallelis, cylindricis, cavis, infima parte caecis, altera extrorsum debilitatis tenui osculo, quae a circumstans sanguine humorem album, sebaceum, virosum fecerunt, secretumque stillatum evomunt; unde par-
 tium laevitas, sensus, mollities, lubricitas iugiter fovetur; sed unde, si locum parcat, sordes brevi cumulantur subalidae, oleosae, foetidi, & gravioris odoris. Similem omnino structuram statuit adesse in mulieribus in facie interna vulvae, & caruncularum omnium, quae in vulvam prominent. Has cryptulas humorem illum virosum sebaceum colligentes, & collectum eructantes, voluit esse cancerorum venereorum veram, & propriam sedem. Hoc argumentum imprimis urget, quia anatomie tales cryptulas in his locis adesse docet, & ex antedictis satis constitit contagium venereum pinguibus, lenis, mucosis humoribus facile irretiri, sique certis locis affigi quasi, quae deinde lenta erosionem destruantur.*

Sed has cryptulas his genitalium locis iam designatis non esse proprias anatomici docuerunt quam evidentissime. *Abrahamus Kuu* (*k*) innatibus, & dorso infantes cryptas tales notabiles invenit, alioque loco (*l*), qui peculiariter his describendis destinatur, monet sequentia: *Est praeterea & aliud exsudationis genus ab interioribus extrorsum, quod aequae obtinet eo in loco, quo cuticula pergit supra papillas, ac ubi cutim investit; quod scilicet sit ope folliculorum, qui ubique in cute haerent, nisi in interiore parte manuum, pedum, & in digitis. Quum glandularum nomini infensior esset celeberrimus Ruyschius, nec horum folliculorum smegmaticorum in cute praesentiam negare posset candidus ille anatomiser tribui solet hoc tempore. Exactissima harum cryptularum descriptio in loco citato legi poterit. Hoc tamen notari meretur, quod celeberrimus Astruc voluerit has cryptas cylindricas esse; e contra celeberrimus Boërhavius invenit esse receptacula quaedam parva, subrotunda, cava, collo angustato conniventia, quae, osculo aperto, nec quod facile humorem intus in folliculo contentum erubat, in epidermide patenti, atque ibidem poros cutis formant satis conspicuos. Harum cryptarum cutanearum figura non inepte refert tormentum bellicum missile, quod handgranaat dici solet.*

Notatur autem, quod folliculi illi, sive cryptae (*m*) eructent lubricum humorem, qui cutim inungit, & quidem ad illas partes imprimi, quae aëri externo, vel motui maxime suis expositae, vel pilis ornatae. Quum ergo pubelescenti pudenda in utroque sexu, natum commissura, & femorum interna pars, non esset tali smegmate iadigant quam maxime ad cavendum attritum, mirum non est,

(*i*) De morbis vener. lib. III, cap. 7, pag. 244.
 cap. V, pag. 44.
 pag. 106.

(*l*) Ibidem cap. XI, pag. 103, & seq.

(*k*) Perspic. dist. Hippoc.
 (*m*) Ibidem

his locis folliculos inveniri. Quod nisi fieret, viderentur homines; uti experiuntur illi, qui dissmegma ex his folliculis exprimunt, hae partes numerosos smegmaticos tales folliculos cum impurum contagio venereo alluantur, patet, sive ulcuscula venerea nasci posse; dum simul vius rei veritatem.

Nomen hoc Latine verti posset *genitale profluvium*; sed longe diversum a golem antiquis temporibus, sed longe diversum a golem hic agitur. Sic, ubi de immunditie legali in sagitur sequentia: Vir, qui patitur fluxum seminis, immundabitur huius vitio subiacere, quum per singula momenta itaque concuperit foedus humor. Canalis urethrae, uti noculis madet humoribus; prostrata glandula suis emissio, unde si quacumque de causa secretio, & excretio talis ur, per urethrae cavum sensum protruderetur lentus talis extremo urethrae, internaeque praeputii superficiei, & quod foedum quidem est, sed nullo modo contagiosum, cat penis summittit; sed foedo stillicidio lintea maculat linguam etiam nomen habet *druper, tripper, &c.* loea venerea innotuit, apud medicos in usu fuit, ut leonista mala gonorrhoeam vocarent quidem, sed simplicem, contagiosa distingueretur. Simplex talis gonorrhoea obassucta potatione *cerevisiae, equitatione nimia, immoderato diureticorum usu, cantharidum applicatione, etiam ex omnia haec vel sponte cessant, vel brevi curantur; quod venerea affirmari nequit nullo modo.* is fluxum debuisse contagiosum fuisse, ut, urgebatur loco huius venerea, & tantae cautela. Sed paratus mundationis praescriberetur, & tantae cauterit, conle per attractum lecti, sed endove, ubi lue affectus sederit, conle sano corpori communicari. Immunditia legalis nil cum commune habet. In eodem enim loco (p) legaliter immundus erat. Praeterea, de quo egreditur *semis, coitus, & mulier menstruens; quam simplici, & lascivius c. pariter immundus erat. Praeterea, sique illo voluptatis sensu, illis, quibus semen profluit invitis, gonorrhoea venerea molestatur frequentibus penis erectionibus; curatio retardatur; sui postea dicitur.*

Cer.

cap. XV, v. 1, 2.
p. 10.

(o) Astruc. de morb. vener. lib. III, cap. XV, v. 16, 29.

(p) Lev. 15, v. 2, 3.

Certum est gonorrhoeam venercam non adfuisse primo tempore, dum lues venerca in Europa grassari coepit; unde & primi auctores, qui scripserunt de lue, nullam mentionem gonorrhoeae fecerunt. *Antonius Musa Brasavolus* (q) tractatum de morbo Gallico scripsit anno 1551, ubi habet sequentia: *A viginti annis citra alias quaedam species ortum habuerunt, quae an declinantem morbum sequantur, an aliquo modo immutatum sit genus, ambigendam esset.* Quinque autem modos mutatae luis describit. Pilorum desuuium, dentium lapsum, unguium casum, oculorum amissionem, & tandem gonorrhoeam. Nam Gallicus affectus ex gonorrhoea incipit, & postea pilorum deplavium sequitur, quandoque incipit a gonorrhoea, & in gonorrhoeam finit. Nam nihil aliud illam sequitur, quam quod ipsa perscuerat; neque facile evinci potest, sed necessarium est, si sedari debeat, generosis uti praesidiis, de quibus postea verba faciemus.

Imprimis in hoc auctore notari meretur, quod iam dubitaverit, an non declinantem iam a prima ferocia luem secuta fuerit gonorrhoea, simulque novaverit, contagium venercum a gonorrhoea incipere, & per hanc finiri, expulsa nempe per hunc fluxum morbi materiei. Observamus nostro tempore in infectis gonorrhoeam tantum (quae, si rite curetur, corpus reliquum a lue liberat), nec ullum ex his malis sequi, quae virus venercum per totum corpus diffusum comitari solent. Unde non sine ratione creditur, per gonorrhoeam bona arte tractatam liberari infectos omnino a contagio venerco. De qua re adhuc agendum erit, dum de curatione luis dicetur. Ubi autem gonorrhoea negligitur, vel perversa methodo tractatur, vel dum perdita libidine aegri repetitis vicibus idem contrahunt ex impuro concubitu malum, lues venerca sequitur. Secundum hunc auctorem gonorrhoea circa annum 1531 primo apparuit, & videtur tempore *Bernardi Tomitani* (r) iam adeo frequens fuisse, ut dixerit: *Quotisqueque est, qui lue Gallica inficiatur auspicio gonorrhoeae?* Profecto qui hoc tempore labores citra hoc seminis prostratum, vix unus aut alter exstat. Ille auctor lauream medicam consecutus est anno 1531. Verosimile est, quod artem exercuerit, saltem usque ad annum 1538, quando logicam coepit docere in ordinem professorum cooptatus, & perrexerit in hoc munere usque ad annum 1563, quando professori muneri valcdixit, ut se totum curandis aegris manciparet. Neque videtur illo tempore, quo docebat, cessasse ab artis medicae exercitio. Nam in proëmio, quod praefixit libris duobus de morbo Gallico, ab ipso exaratis, dicit (s): *Quum differendi rationem & magistrum invito animo potius, quam infeliciter tractaverim, nihil tamen aut naturae meae rationi magis consensaneum, aut dignitati meae opportunius fore arbitrabar, quam quod mihi dabatur otii post ipsam explicandi rationem in medicas artis exercitatione consumere.* Unde etiam, postquam professoris munus abdicaverat, otiumactus, medicinae suae exercitationis aliquod specimen praebere voluit &c.. *Ac primum illud, quod mihi (inquit) ob oculos versabatur, fuit de lue Gallica pertrahatio.* Dum haec omnia considerantur, videtur mentio gonorrhoeae facta incidere in illud tempus circiter, quod *Brasavolus* statuerat.

Ve.

(q) Aphrodis. pag. 639.
venerca tota, lib. pag. 765, & seq.

(r) Ibidem pag. 1051.

(s) Astruc. de lide: Aphrodisiac. pag. 1015.

capite primo libri secundi (u) habeat sequentia:
*ad nostram aetatem, quae morbi centesimum annum
 eius &c.* Quod non respondet chronologiae *luis*
Tomisani decessit Patavii anno 1576, fere se-
 s (v), adeoque non erat inter viros, dum secu-
 ro Gallico scripserit non diu post annum 1563.
 in notis numericis subrepsisse; a qua suspicione ce-
 e parum abesse fatetur.
 anus, prima contagionis semina exstare in praesentia bu-
 , & gonorrhoeam. Notandum *carici* vocabulo hic
 dum, quam praecedunt dolores saevi osteocopi, qui hoc
 a gonorrhoea incipere solebat, longe rariores erant; sed
 : ulcuscula exedentia pudendorum; uti ipse auctor (y) di-
 Fallopii testimonium utrumque magis dubium videtur ad
 rrhoae venereae epocham (z). Credidit quidem celebra-
 ractatum de morbo Gallico scriptum esse anno 1560, aut
 i dicat, nondum quindecim annos elapsos esse, a quo obser-
 Gallica, tunc illa ephoca incideret in annum 1545). Ve-
 , notat, de natali, & emortuali die Fallopii discrepare inter se
 ominis; praeterea monet Fallopiū nihil edidisse praeter ob-
 anatomica; reliqua omnia, quae eius nomen in fronte gerunt
 & ab eius discipulis edita, prout unusquisque ex ore magistri,
 ed docentis potuerit excerpere, atque ingenio suo disponere,
 reddere. Unde licet anno 1560, vel 1561 scriptus fuisset ille
 tamen inde constaret, quo anno Fallopius haec protulisset
 lis suis, quae ad epocham gonorrhoeae pertinent.
 auctorem quemdam *Iacobum a Bethencourt*, qui librum de lue
 rimandis auctoribus Astruc (c), qui de lue venerea scripserunt,
 auctorem quemdam *Iacobum a Bethencourt*, qui librum de lue
 Parisiis 1577 descriptionem gonorrhoeae, quae ipsi omnium prima
 quae ita sonat. Consultuē me quidam iuvenis, cuius mentula se qui-
 etuo sanisum, ac virulentum vomebat succum; quod venereo contraxerat
 Ubi fuerat frustra multorum medicorum, ac chirurgorum consilio &c.
 munda dolose arrigeretur, de ulcere suspicatus sum; consului, caveret ab
 us; cum ne pblegione proritaretur, tum quod, si seminaris ulcus la-
 ossi in mentulae utroque latere dispensatis, sales inutiles penitus essent....
 uris despectuarius consuluit. Auctor scripsit triginta annis, postquam
 Europa apparuit; adeoque secundum eius testimonium citius appa-
 gonorrhoeae venerea, quam scripserunt modo citati auctores.
 un autem adeo conspicuum, adeo molestum sit hoc malum, non potuisset
 la.

Aphrodisiacae, pag. 1093.
 (x) Ibidem.
 (y) De lue venerea lib. I, cap. XIII
 pag. 746, 747, 748.

(u) Astruc. de lue vener. tom. II, pag. 766.
 (v) Ibidem. tom. I, pag. 766.
 (z) Ibidem pag. 767, & seq.
 (c) Ibidem pag. 767, & seq.

latere primos auctores, qui de lue scripserunt, & de gonorrhoea nullam fecerunt mentionem. Unde videtur concludi posse, lui iam cognitae successisse gonorrhoeam, quamvis exacte non possit determinari tempus, quo primum observata fuit; quod forte in diversis regionibus varium erat.

Sequitur iam, ut de gonorrhoea dicatur, & de variis locis, quae occupat; quae maiorem minoremve curationis difficultatem simul demonstrant perito medico. Quum in omni gonorrhoea penis affectus sit, ad meliorem intellectum illorum, quae dicenda sunt, quaedam de eius fabrica mirabili videatur praemittenda esse. Penis constat binis corporibus, cavernosis dictis, qui sunt bini tubi ligamentosi flexiles, sibi invicem lateraliter accumbentes secundum maximam suae longitudinis partem; non sunt aperti tubi hi, sed in extrema sua parte clausi, obtuse conici, apices subrotundos habent; altera illorum extrema, quae & radices corporum cavernosorum penis dicuntur, a se mutuo recedunt, mole minuuntur, & in apices binos desinunt, qui assignantur marginibus ossis ischii, & ossis pubis; ad se invicem accedunt circa symphydin ossium pubis, & sibi mutuo uniuntur. Membrana constituens hos tubos cylindricos elastica est, ligamentosa. Cavum horum tuborum repletur substantia cellulosa, valde firma, quae videtur continuatio esse ipsarum membranarum involventium: omnes cellulae inter se communicant, semper sanguine plus minusve plenae; quae cellulis lienis comparari possunt.

Ubi duo hi tubi, substantia cellulosa illa pleni, se mutuo tangunt lateraliter, fibrae transversae unius fibris transversis alterius uniuntur, sicque formatur sepimentum quoddam, in quo fibrae hinc inde a se mutuo recedunt, & parvos hiatus faciunt, per quos communicatio inter bina corpora cavernosa obtinetur; ita ut, statu adacto in unum horum, mox turgescat alterum. Sepimentum illud valde extenuatur circa extrema obtusa; quae & capita corporum spongiosorum penis vocari solent. Dum bini hi tubi cylindrici sibi mutuo lateraliter accumbunt, superius & inferius manet spatium liberum: in hoc spatio inferiore, quod superiore maius est, secundum totam longitudinem corporum cavernosorum penis sibi mutuo accumbentium, locatur *urethra*; quae una cum modo descriptis corporibus binis spongiosis penem constituit, & praecipua est gonorrhoeae sedes; adeoque bene cognosci debet, ut ille morbus rite intelligi possit (*d*).

Urethra, partem inferiorem penis occupans, locatur in sulco, quem relinquunt bina corpora cavernosa penis sibi mutuo accumbentia, & fortiter illis adhaeret, secundum totam longitudinem sulci, per quem *urethra* decurrit. Quamvis autem *urethra* duplici membrana constet, & inter has binas membranas substantia cellulosa locetur, qualis in corporibus cavernosis penis obtinetur, tamen differt ab illis, quod mole minor sit, & canalem faciat apertum ad vesicam usque, per quem urina, & semen exeunt, quum corpora cavernosa penis tubos quidem referant, sed caecos, per quos nihil transit, & qui in apice obtuso clausi sint utrique.

Unde penis virilis praeter integumenta communia constat tribus corporibus,

(*d*) Winslow expos. anat. pag. 365. & seq.

3 S VENEREA.

45

entur; binis corporibus cavernosis penis, quae
i, quod pariter cavernosum est quidem, sed
nquam pulcrius penis illa fabrica demonstrari
is corporibus cavernosis binis maioribus, & cor-
xsicceatur totus penis: rigidae enim post exci-
labuntur amplius, sed distentae manent, licet in-
scato aer libere exeat. *Celeberrimus Raysius* (c)
do mirabilem penis humani fabricam demonstra-
ressit; ubi in talcolis penis inflati & exsiccati dis-
nter, quomodo urethra in inferiore penis parte de-
avernosis penis sibi mutuo accumbentibus. Probat
rum anatomicorum testimoniis, qui ante illum scri-
penis, urethrae, & glandis fabricam ignoraverint.
quae hodie cavernosa penis communiter vo-

1.
cruore omni exhausto implere vasa penis per mate-
tam; sed repletis sic cellulis penis nihil distincti videre
sanguine e pene expresso, & aqua, siphonis beneficio,
t, vinculo injecto arctissime ligavit, dein excisavit. Sed,
glandis penis fabrica, notandum est, urethram, postquam
mitates, sive capita, corporum cavernosorum penis una
cavernoso formare glandem penis. Corpus enim illud ca-
ae binis eius membranis interpositum inter finem prostaticae,
corporum cavernosorum crassissimum, dein toto decursu
anteriora penis iterum crassescens, extrorsum aëctitur, & re-
nrae apertum in glande; dein constituit superficiem exteriori
m glandis, terminant in eminenti eius sinbria circa nexum
t. Unde glans penis est quasi producta urethrae substantia re-
ta, & capita corporum cavernosorum penis tegens illis infi-
ranaque externam superficiem glandis tegens est continuatio
que internam superficiem urethrae investit; sub qua pergens
i corpus urethrae substantiam similem per glandem ipsam prolon-
simul cum his retroflexa urethrae membrana externa tegit ca-
orum cavernosorum penis, sicque pariter impedit, ne ulla commu-
t inter bina corpora cavernosa penis, & corpus cavernosum urethrae.
natur hoc *Raysius* (d), dum inflatis corporibus cavernosis penis,
at in *Arcturum* glandis. Ea enim inflatione intumuit & induruit qui-
terior glandis pars, flaccida tamen mansit glandis pars exterior.
mirum hoc erat: inflatis enim corporibus cavernosis penis sentiebat
turgentis horum capita, quibus glans non inflata infidebat, flaccida
no; unde credidit interiora glandis turgere tantum. Hanc rem pulcre
reflex (b), dum penem solis corporibus cavernosis inflatis delineavit, di-
filla

(f) Herm. Boe (b) Ibidem

) Observat. anatomi. chirurg. tom. 100
mel. 5. 644

(f) la luo 120
pag. 93 & seq.
do citato pag. 95.

66 71

sciffa glande, & secundum longitudinem, & transversum, sed nullo modo turgente. At, dum inflabat *Ruyfchius* (i) solum corpus cavernosum urethrae, intumuit pars glandis exterior, neutiquam vero interior, quae flaccida mansit. Postea inflavit & bina corpora cavernosa penis, tuncque illo exsiccat, & dissecto curavit delineari pulcherrimas illas figuras, quae penis structuram tam nitide demonstrant; inter quas binae sunt (k), quae ostendunt, quomodo corpus spongiosum urethrae una cum binis membranis urethrae, quibus coërcetur, retrorsum flexum glandem constituit, & corporibus cavernosis penis insidet. Simul intervallum, quod est interpositum inter apicem corporis cavernosi penis & impositam glandem, crassiori linea distinxit, quam est in margine externo dissectae glandis: in hoc enim intervallum membrana ciogens corpus cavernosum penis contigua est, & crescit membranae externae urethrae; unde maior crassities. Ex his intelligitur, quare *Ruyfchius* (l) dixerit: *Reperi penis glandem nil aliud esse, quam veram continuationem tam corporis nervo spongiosi maioris & crassioris, maximam partem constituentis, quam minoris & tenuioris urethrae, maximam & praeterit inferioris eius partem ambientis sine ulla substantiae mutatione*. Ex figuris autem eius manifeste apparet glandem penis proprie loquendo esse continuationem corporis cavernosi urethrae retroflexi, & penitus separatam esse a cavernosa penis substantia. Simul patet *Graafium* (m) errasse, dum statuit spongiosam urethrae partem, sensum glandi appropinquantem, magis & magis attenuari, graciliorem reddi, tandemque in glande obliterari; contrarium enim verum. Nam corpus cavernosum urethrae in glandis extremo maximum, & crassissimum est, totamque partem glandis anteriorem conficit. (n) -

Figura glandis similis est cono, qui in apicem subrotundum finitur: convexitas eius inferior plana est; basis autem oblique posita, cuius circumferentia parum excedit corpora cavernosa penis, quibus insidet. Canalis urethrae recta pergit, non per mediam glandem, sed per partem eius inferiorem, quae magis plana est, & finitur orificio oblongo, quod fissuram refert, atque angustius est ipso urethrae cavo, quod quasi conivertit, dum in illud orificium terminatur (o).

Non tandiu immorater descriptioni harum partium, nisi crederem omnino necessarium hoc esse ad intelligendam gonorrhoeam, & plura mala, quae illam comitantur, vel sequuntur; praecipue si illa vel neglecta fuerit, vel mala arte ab imperitis tractata. Superest ergo, ut considerentur ea, quae urethrae in toto suo decursu a vesica, cui quasi continuatur, ad ultimum orificium eius in glande penis apponuntur, & dein illa, quae in cavo huius canalis occurrunt notanda ad gonorrhoeae cognitionem, & curationem intervenientia.

Urethra, ubi a collo vesicae incipit, est simplex canalis membranaceus, & nondum acquisivit corpus cavernosum: suscinetur ille canalus hoc in loco massa quadam albicante, crassa, mediocriter firma, quae castaneam nucem figura sua re-

(i) In loco modo citato pag. 75. (k) Ibidem fig. 81, 82. (l) Ibidem pag. 95. (m) Ibidem pag. 96. (n) Ibidem fig. 81, 82. (o) Winslow exposit. anat. pag. 567 & seq.

S V E N E R E A.

47

ac urethrae bulbum (de quo statim). Massae
fuit, plurali nempe numero; quia apparet
per fulcum medium decurrentem a basi huius
ad apicem, qui urethrae bulbum spectat: in
c urethrae pars, & quasi deprimitur; valide
prostatum massae.
ad digiti transversum ac medii circiter distantiam
occurrit substantia quaedam spongiosa, similis
i, sed tenuior tamen, quae deinde urethram cir-
to suo decursu comitatur. Spongiosa illa substan-
ilem urethrae, sed prius format corpus oblongum,
itur.

thrae plura occurrunt notanda: in illa enim parte ure-
substantiae immergitur, adest eminentia ovalis cras-
tenuior versus anteriora, & in apicem desinens. Vo-
aruncula, caput gallinaginis, vera montanum; & pertusa
ore binis plerumque foraminulis, quandoque unico, ra-
et orificia ductuum, per quos vesiculae seminales exer-
n urethrae. Praeterea eodem loco, utrimque ad latus
iem carunculae, adfunt quatuor, quinque, sex foraminula,
lunae disposita, quae sunt ductus excretorii prostatici;
hvae effundunt secretum ab his glandulis humorem (p).
hvae urethrae, tenuis admodum & vasculosa pertusa est
bus oblongis, maioribus, minoribus, imprimis circa glan-
foramina continuantur in canales excretorios glandularum,
cavernoso urethrae locantur: canales, vel ductus excretorii
rum decurrunt secundum membranam internam urethrae per
vernosa, & dein oblique penetrant in cavum urethrae, quod
e blando mucoso oblinunt; atque ita sensilem admodum hanc
ab urinae acrimonia defendunt, illamque lubricam, & fluxilem,
am autem oblique in urethram aperiuntur hi ductus, hinc illorum
lunarem figuram habent (q). Celeberrimus Morgagni (r) has
a dissecta urethra exhibuit. Adfunt autem inter illas, quaedam
igniores: prope initium corporis spongiosi urethrae inveniuntur
i, quae & ductus excretorios satis longos habent; magnitudinem
gulae habent nuclei cerasorum, oblongae & complantae figurae.
procedendo versus anteriora, tertia prioribus similis invenitur. Has
a Couperianus dixerunt ab insignis anatomici Couperii nomine, qui
textit, & descripsit (s), illasque comparavit magnitudini subie Gal-
compressae & ovalis figurae illas esse, dixit, coloris flavescantis, uti
tae: utrimque adiacent urethrae supra eius bulbum, & ductus excre-
tori

Wistow exposit. anat. pag. 67 &c
(1) Adversat. anat. l. tab. IV fig.
pag. 115.

Seq.

(s) Drake anthropol. lib. I ca. 8. VIII

(q) Ibidem pag. 66.

torii illarum per midii pollicis spatium decurrunt supra convexam superficiem membranae internae urethrae, dein tenuiores sunt, ubi oblique penetrant in eius cavum binis distinctis orificiis, in illo loco, ubi sub ossibus pubis in perinaeae urethrae inflectitur; tertia talis glandula in vicina locatur, minor mole prioribus, prope anum, & binis orificiis patens in cavum urethrae ad trium linearum distantiam a prioribus. Ut haec glandula appareat, debet discindi corpus cavernosum urethrae ad membranam internam urethrae usque, secundum longitudinem (*r*). In loco citato adiunt figurae, quae harum glandularum descriptionem elucidant.

His prius consideratis, facilius intelliguntur illa, quae contingere observantur in gonorrhoea, & quae varia sunt, prout in variis locis penis virus venereum haeret, ac erodendo ulcus excitat. Si ponatur glandem penis tali ulcusculo venereo post impurum concubitum affici (*u*); constat glans, uti dictum fuit, producto spongioso urethrae corpore usque ad finem huius emissarii, ubi, supra glandis binorum corporum spongiosorum penis retroflexum, et coronam flandis terminatum, huius eminentem limbum facit; componitur ergo glans eidem structura, qua corpus urethrae; unde sanguine arterioso in cellulæ effuso, perque venas redire impedito: impleri, & ad crepturam usque distendi potest; quod in acti venereo iamam ad effectum spectante tantum contingit: hinc eo tempore valide inflammatur. Semine autem emissio, glans primo flaccescit; hocque momento temporis, valde bibula, facile rapit in cellulæ suas iam inanitas, quod penetrabile applicatur ferventi illius superficie. Quum enim cellulæ corporis cavernosi urethrae sanguine per arterias effuso, & per venas redire impedito turgent quam maxime illo tempore, quod proxime feminis eiaculationem praecedit, hac peracta, mox redit sanguis effusus per venas iam liberas, & absorbentium-venularum oscula facile tradunt vacuis iam venis sanguine, quidquid in se receperant. Peculiaris venarum in pene structura faciem & promptam resorptionem suadet. Demonstravit enim primus inter anatomicos *Ruyssbius* (*v*), quod venae per penem distributae, se non omnes, saltem tot, quos unquam offendit, sinibus magnis & visibilibus foraminibus persuae cribri instar, &c. Eiusmodi venarum perforatio in causa est, quod sanguis per penem, redire citissime possit a pene regressi sive momento flaccescente. Immediatam autem inter cellulæ penis & venas commercium esse patet inde, quod inflatis corporibus: cavernosis penis, simul quoque inflantur venae per dorsum eius repentes, ut plurimum (*x*); & talem figuram inflari & exsiccatæ penis exhibuit; quae methodo potuit illa venarum foramina videre. Rapidum satis sanguinis motum esse per penem demonstravit *Ruyssbius* (*y*) alio in loco; vocabatur enim ad hominem, cui ulcus inter glandem & praeputium eroderat arteriolam sequente valida haemorrhagia, quae miserum fere exanguem reddiderat, nec variis stipticis remediis compesci potuerat. *Ruyssbius* glandem praepu-

texit,

(1) Drake anthropol. lib. I cap. XVIII pag. 137, 138.
 {^v} Observat. anat. chirurg. num. 100 pag. 97.
 {^y} Observat. 42. Ibidem pag. 41.

{^v} Observat. anat. chirurg. num.
{^y} Observat. 42. Ibidem pag. 41:

Observat. anat. chirurg. num.
42. Ibidem pag. 41.

(x) Ibidem pag. 96 & fig. 75.

(x) Ibidem pag. 96 & fig. 757.

VENEREA.

is strinxit, sicque aegrum ab hoc periculo

49

, quare in initio luis venereae tam prompte
icorum dierum spatio totum corpus inficiebat.
nereum mobile admodum videtur fuisse, & fa-
res annos coepit quasi mitescere, & qua par-
tēstare solebat (vide §. 1442), tuncque gonor-
tractetur a lue venerea universali corpus prae-
in curatione dicitur. Figitur enim tunc conta-
applicatur, & tunc non adeo cito per reliquum
multiplicat.

impuro omnium maxime contagio exponatur,
ins hac parte contagium fiat. Cur tam crebro fun-
geat materie ulcerosa, quae praecedenti paragra-
pho hanc fudet. Cur ulcera nata in spongiosa hac
sem hanc compagem, & in tabum venereum con-
siderari, decidere a reliquo veretro saepe ceterum
Denique & palam est a capite penis, ope corporis
inuatum commercium haberi usque sub collo vesti-
dem sic unumque continuatum cellulosum corpus; &
um harum inungatur semper unctuosus pingui humore,
nilis facile sit, vel inde iterum liquet, quare susceptum
inta semet luxurie alat, sustineat (z). Porro ex his
rtis, cui in toto hoc tractu adhaeret contagium, di-
la, & quaedam ex his facilius, alia difficillime curari
agendum.

concubitu, ut contaminans materies resorpta meatu-
dis arrectas oestro venereo dilatatis primo momento
, se infuset cellulis corporis spongiosis glandis, quod
as membranas urethrae usque ad collum vesicae. Facit
brica commercium, ut facile propagetur toto hoc tractu-
nili contagium. Ubi vero admissum ad tenerimam hic
branculam, exemplo creat ibi ulcusculum, quod colligit
ante dictum fuit. Ulcerosa haec nata foeditas in loco
rae subpingui scrobiculum capacem format semper; in-
mulari, retinetur, lente inde exit, at ubertim exprimitur.
in fungosa glandis fabrica sistitur, atque per superficiem eius-
aria paravit, tum spurcissimus mador hac parte transsudat
putum corruptum, tabefacit quandoque, & siderat. Haec
aeris gonorrhoeae venereae virulentae prima species (a).
oedo mador minus
Genito intra glandem
& praepucium, vel materia per glandem
pressam

in praedictione.

Parti II.

(.) Ibidem.

Id

pressam extrinsecus transudante. Ceterum ablato contagio non difficilis huius gonorrhoeae sanatio. Quandoque rubra macula in glandis superficie apparet (omnium primum suscepi contagii signum), quae aliquando evanescit brevi, & sequitur pestea excretio materiae gonorrhoeicae per ipsam glandis substantiam; quandoque stigma illud morbosum in ulcusculum degenerat prius, & ex hoc ad fungosam glandis substantiam pergit infectio. Ubi tale ulcusculum vel in praeputii interna parte, vel in glande haeret, fundit similem materiam, & satis copiosam quidem, qualis est illa, quae pressa glande exir, quando cellulosa illius fabrica fuit infecta.

Quum autem gonorrhoeae materies per ipsam urethram exillare solet frequentius, ita ut seminis fluxum vocaverint plures, dum crederent materiam hanc esse genitalem humorem, sed corruptum per contagium suis venereae; hinc, ubi per glandis substantiam prodibat illa materia, & nihil ex urethra, vocaverunt quidem gonorrhoeam; sed *spuriam*, ut nempe ab aliis speciebus distingueretur. Legitur (b) celeberrimus Montpelienfis medicum *Masson* in tribus aegris vidisse peculiarem gonorrhoeae speciem, in qua tabus venereus ex glandulis coronae glandis cingentibus emanabat, & qui morbus solitis ad alias gonorrhoeas remediis curabatur: additur celeberrimum *Barbryae*, & alios medicos Montpelienfes eundem observasse morbum antea. Quumque celeberrimus *Littre* tales glandulas (c) descripserit in hoc loco, novum argumentum pro harum glandularum existentia desumtum fuit. Eandem sententiam tuetur celeberrimus *Astruc* (d) de morbi nomine, & loco, ubi de gonorrhoea spuria, sive de venereo stillicidio e balano agit.

Illas glandulas adeste demonstratum est, quae virosi odoris impegma effundunt, quod originem dat fordibus inter praeputium & glandem colligendis. Quum autem, uti antea dictum fuit, venereum virus solet irretiri facile mucosis, lentis, & subpunguibz humoribus, quales hae glandulae sunt, satis probabile videtur has glandulas saepius infici: vetum & apertissimae videntur, ut contagium susceptum figant, & inde nascantur ulcuscula venerea, quibus totam coronam glandis obstruam vidi aliquoties. An autem gonorrhoea, spuria dicta, his glandulis affectis originem debeat semper, non videtur pro certo statui posse. *Sydenhamus* (e) testatur sequentia: ipse stillicies vidi, virulentam huiusmodi materiam per substantiam glandis perosam exsudare, non per urethram eieciam, nulloque ulcere vel glandem occupante, vel praeputium. Plurimos sic affectos se vidisse testatur & *Versellonus* (f), qui aliam saniem plorabant per substantiam glandis perosam, etiam citra ullum ulcus. Memini probe me vidisse aliquoties pressa glande in talibus aegris exivisse per totam glandis substantiam guttulas tibi venerei, licet nihil mali detegere potuerim nec in praeputio, nec in limbo coronae glandis, ubi illae glandulae ponuntur.

Altera .

(b) Academ. des sciences 1729 hist. pag. 16.

(c) De morbis vener. lib. III cap. III pag. 190.

(d) Epistola secunda responsoria pag. 414.

(e) De putendor. morbis cap. III pag. 86.

(f) Ibid. l'an 1700 hist. pag. 39 & seq.

g) observatur, quando virus venereum perstrat usque in fabricam cellulosa urethrae idem format, quod meatus in urethrae ductum materiam hac via effundit, assidue quidem. Si prematur mane post somnum lotio non-primis, ubi veretrum hac parte premitur, pressio- is distantiam a penis apice, a retro antrotrorsum, lae exprimitur. Unde patet illam non haesisse eam derivatam fuisse ex cavernoso urethrae cor- specie nil talis materiae ultra ex toto pene, andem usque prodibit. Unde concluditur hunc:

in initio gonorrhoeae, quotidie occurrens, ingentem aerei gignens, diu satis durans, praecipue in laxis- eries libere excernitur, licet diu, raro luem gene- rans. Verum id praecipue incommodi habet, quod nembranae ambagibus diu haerens, diuturna stillici- a pariat, praecipue si neglectam, vel male tracta- malum; tunc enim poterit virus propagari per poris cavernosi urethrae ad eius bulbum usque; imprimis circa finem urethrae, quae circa glandem die- ovals speciem, quae & navicularis dicitur (b). cavernosum urethrae, uti ante dictum fuit, retro- & quandoque in hoc loco eroditur foraminulum, quod rethrae: canalem per totam suam longitudinem pertundi- ninoribus; his etiam satis facile communicari suis conta- gonorrhoea sequitur. Solet hoc malum fieri ab acrimo- ri veneni veneri ab ardenti & repetito impuro concu- gonorrhoeis praegressis, a veneris usu, dum gonorrhoea magno aeri, saltatione, equitatione imprimis; quibus- rolesum sensum in pene, ac si coarctaretur urethra; maior e, sed lentiori stillicidio ob urethram eo magis coarctatam, est affecti sunt: a loco posteriori penis premendo glandem glandem haeret mali non contingit, ubi in superiori parte sedes: albus humor exit, qui exsiccatu- peioris indolis fuerit malum, viridescit, sanguinolentus humor effluat; defigat enim excolesam esse; unde difficultas curae pra- contingere illis, qui tertigine venerae color laborant. Pari etiam ordine mater-

(1) Mineralis exposit. anatom. pag. 59

liliae, in prolezione.

materiae exstillantis mutatur, dum idonea medela adhibita morbus in meliorem tendit; amurcosa & sanguinolenta sanies viridescere incipit, dein flavescere; postea albescit, & copia minuitur.

Observatum fuit saepius, eo peiorem esse gonorrhoeam, quo tardius prodcat post concubitum cum infecta muliere. Sentitur tunc molestia quasi stridura in pene, quae dum urina excernitur, non excitat dolorem quidem, sed tamen alicuius obstaculi sensum facit. Vidi secundo vel tercio die post infectionem, gonorrhoeam iam adfuisse, in aliis quandoque tantum decimo quarto, imo & serius.

Causa materialis gonorrhoeae videtur esse humor naturaliter a lacunis urethrae exiens, & urethrae internam superficiem obliniens, & lubricans. Ille humor in sanitate paucus est, cui dum intricatur lois contagium, augetur copia secretionis, & simul conciliatur rodens acrimonia. Si aucta secretionem per stimulum contagii eluatur virus, antequam locum, cui adhaeret, erodere possit, sanatur absque ulceratione malum; si virus acrius, vel copiosius fuerit, aut diutius lateat in loco, antequam prodierit gonorrhoea, erosio, & exulceratio metuenda sunt.

Optime notat (1) *Sharp*, posse talem fluxum a sola irritatione secretionem humoris naturalis augente produci absque ulcere. Sic a stimulo purgante ingens copia humorum in intestinis secernitur, & per alvum expellitur; a fumo tabaci, talis abundantia salivae exspuitur, ut quandoque totum corpus in marasum incidat. Fluor albus in seminis magnam affinitatem habet cum materia purulenta, & tamen larga copia exit, licet nullum ulcus deregatur. In viris longe maior copia materiae gonorrhoeicae exit; quam a paucis ulcusculis urethrae superficiem internam obidentibus expositari posse videatur. Ulterius hoc probatur in gonorrhoea muliebri: fluxus enim in his quandoque est admodum copiosus; & tamen sollicita investigatione nullum exulcerationis vestigium in vagina detegitur; quod tamen fieri deberet, si fluxus ille foret purus ulcerosus.

In viris interiora urethrae oculis vix patent; verum in cadaveribus illorum, qui gonorrhoea laborantes aliis morbis correpti perierunt, quandoque inventa fuerunt signa inflammationis, mucosae lacunae turgidae, & emissaria oscula ulcerata. Magna etiam copia colligitur quandoque materia in his partibus. Sic invenit *Morando* (2) in iuvene viginti annorum, qui ex lenta febre perierat, ante mortem totus marasmo exsiccatas, tumorem subnigricantem circa caput gallinaginis, ex quo collegit novem drachmas similis materiae. Dumque probare nititur adversus illos, qui aliter sentiebant, non esse semen, quod in gonorrhoea ex urethra stillat, testatur, quod pauculum illius fluxus immiserit urethrae canis cum hoc effectu, ut de pene huius animalis perpetuo stillaret flavescens sanies ad mortem usque; perit autem rabie canis ille.

Celeberrimus *Morgagni* (3), qui plures urethras viriles dissecuit, quam forte ullus

(1) Sharp critical inquiry of the present state of Surgery pag. 133 & seq.

(2) Prima decade di lettere familiari pag. 108, 109, 110.

(3) De sedibus & causis morbor. per anat. detectis tom. II pag. 194 & seq.

& tunc catarrhus adeste dicitur, qui molestissimam tussim inducit, quae investigat simulac spura cocta puriformia producat, & sequitur perfecta sanitas, absque ullo pulmonalis ulceris vestigio.

Unde celebris auctor (*) statuit hunc humorem esse eundem, qui in gonorrhoea rheuma verum suppediat, in quo virulenta veneni materies haeret: unde & tunc dolor maximus in loco, ubi glans desit; quo vero plures horum folliculorum inficiuntur, eo prior hic morbus, & contra; quamvis intellectus liquere, communicare inter se demonstraverit Cocburnius, facile propterea ex uno in alium malum.

Sic etiam intelligitur ratio, quare minus frequenter contagium huius venereae per totum corpus dispersum fuerit, postquam gonorrhoea se manifestare coepit: dum nempe haerens in urethra virus, copia maiori muci locreti invicatum abluatur, & de corpore expellitur: tuncque adest tumescitio, & dilatatio, potius horum folliculorum, & vasorum vicinorum, quam erosio. Unde celeberrimus Morgagni invenit in cadaveribus, uti modo dictum fuit rubedinem in membrana urethrae, & madorem maiorem. Hinc & intelligitur ratio, quare Batallus (p) dixerit: qui veneri morbi principia parvi facium, intantur virum in modum seminis effusio diuturno: nam paulatim, quod putidum erat conceptum, effluit cum seculo, quod sanandum corruptum, sed invidium labitur.

Quoties vero usque ad glandulas urethrae, *Couperianas* dictas, virus intravit, hasque obedit per emissaria harum in cavum meatus urinarii se exonerat materies, & tunc *tertia gonorrhoeae species* adeste dicitur.

Glandulae illae *Couperianae*, uti ad eandem hanc paragraphum descipae sunt, utrimque adiacent urethrae supra eius bulbum, & ductus excretorii illarum per dimidium pollicem decurrunt iuxta convexam superficiem membranae urethrae, dein oblique penetrant in eius cavum illo loco, ubi sub ossibus pubis in perineo urethra foctitur.

Si virus venereum has glandulas invaserit, & in his sedem fixarit, inde vix extricari poterit; sed haerens, ipsaque mora assiduo peior facta, ingentes ibidem erodet sinus; cava, fistulosos, plurimo hoc pure assiduo manantes, difficillime detersionis, hinc & sanationis. Hoc imprimis merendum est, si quaecumque de causa impediatur materiae in glandulis collectae exitus in cavum urethrae: tunc enim ulcera quandoque pessima generantur ad latera urethrae, & vicina inquinantur; unde aliquando & subcutanea penis posteriora pinguis, vel cellulosa occupantur, pessimaque mala sunt (q). Saepius hoc malum originem ducit a prima & secunda specie gonorrhoeae praegressae; imprimis si repetitis vicibus iam talibus morbis laboraverit aeger; rarius occurrit absque his. & celeberrimus Litre (r), qui magnum numerum cadaverum gonorrhoea laborantium dissecuit, tantum semel invenit has glandulas *Couperianas* affectas solas. In loco autem, ubi emissaria harum glandularum hiant

(*) Abrah. Kaan perspirat. pag. 124.

(p) Aphrodisiac. pag. 872.

(q) Acad. des scienc. Fan 1714 mem. pag. 267 &c.

(r) Ibidem in praefatione.

rubedo, quatuor lineas larga, magis tendens
in partem. Fere in medio huius rubedinis ul-
timae lineae suae diametro aequans, quod magnam
efficio rubra, dura, & tumida inveniebatur;
affecta erat.

gonorrhoeae tumore, & dolore in medio peri-
am usque extenditur. Nec multum materiae per
gonorrhoeae; quandoque vix ardorem urinae sentiunt;
dixit in vicina ductuum excretoriorum. Contingit
seu reddendae urinae copia, materiae saniosae,
se prodeat, uti etiam quando tumor in perinaeo
nempe materia in his glandulis collecta haeret,
et ob situm declivem harum glandularum.
huius gonorrhoeae dat celeberrimus Litre (1),
difficultate curari posse, imo longe facilius, quam
quod mirum videri posset. Sed haec admiratio
quod egregius ille vir triplicem tantum gonor-
glandulas nempe has, *Covperianas*, prostatas, &
Nullam enim mentionem fecit, binarum priorum.
de quibus iam dictum fuit. Accedit, quod vix
ic speciem gonorrhoeae, quam semel tantum in cada-
veratione reviviscebatur, quod olim talem aegrum cu-
ratur simul, quod tunc temporis nondum satis nove-
mas, hincque non adhibuerit omnem attentionem, qua
orbis talis ipsi occurreret. Quod si contigisset, non
ille vir sententiam mutasset de cura facili huius go-
men hoc verum est, quod infectio harum glandularum
quam si idem malum prostatas, aut vesiculas semina-
ibus tumore locis ille tantum egisse videtur.
duarum tribus locis ille tantum egisse videtur.
allurum ductus excretorios, ut vel nihil omnino, vel parcam
riae in cavum urethrae transmittant; tuac auctores vocave-
gonorrhoeam virulentam *sciam*, sive dysuriam veneream sicam
dixit ille auctor statuit vehementiores gonorrhoeas virulentas
dixit, vel suppuratas: sequi. Binas autem tali mali causas
iacam urethrae. Prioriorem causam adesse docent tumor, calor,
rimet. Nulla tenon hic mentio sit glandularum *Covperianarum*
seturum; quod mirum videtur; quoniam alio in loco (2) diserte
ia: *expansio* *compertum est gonorrhoeam* quidem, quae in
vesiculis

Edise. Feb 1771 non. part. 271.
pag. 265. (*) Ibidem pag. 267.
se multo recte, ibi ad op. pag. 185.
D

(2) Ibidem cap. IV pag. 77

vesiculis seminalibus tantum, aut prostaticis sedem habuerit, rarius in abscessum degenerare; siue quod maior firmiorque illarum moles diffinitioni, sine qua suppuratio nulla fit, magis resistat; siue quod multa, lata, brevia, emissaria, quae ex illis partibus in urethram aperiantur, liberiores viam haerenti & corrupto semini praebent, unde minori efficacia concludentes cellulae debet erodere. Contra vero gonorrhoeam, in qua glanulae Cooverperianae affectae sunt, in abscessum frequentius abire ratione contraria; siue quod minor & mollior illarum moles facilius corrumpatur, siue quod semen inibi collectum (cum longo, obliquo, angusto ductu in urethram effundatur) diutius in ipsis resistat, atque adeo ipsarum contextum promius perfundet.

Unde videtur colligi posse, quod glandulae Cooverperianae miasmate venereo infectae gonorrhoeam siccam dictam producant. Quum autem, his male affectis, mucus ab his secretus vel non excernatur in urethram, vel parcius soluto, cum dolore urina excernitur, qui maior erit, si urethrae vicina pars inflammatur, ut saepius observatur, & ichor ex his ductibus harum glandularum exstillans in rodentem acrimoniam degeneret, quae aliquando tanta est, ut has glandulas vix non integre destruat. Sic in cadavere hominis frequentes gonorrhoeas passis, quarum ultima ultra annum duraverat, Morando (7) invenit, de his glandulis tantum superesse bina inaequalia & minutissima fragmenta, quae callosam contractilissimam pellem referebant. *Celerrimus Morgagni* (8) in cadavere juvenis invenit dextrum ductum glandularum Cooverperianarum aequo tenuiorem, sinistrum vero crassiorem subilavo mucoso humore distentum: emissarium autem ductum invenit perangustum, & ob exitus difficultatem turgidum, uti & totam huius lateris glandulam tumens, quae in dextro latere gracilia & strigosa apparebat.

Sequitur quarta gonorrhoeae species (a), dum virulentus tabus usque ad prostatas productus has tabefacit, inque abundantissimum pus virulentum resolvit. Id mali ex durantiis diu, aut imprimis reperiitis saepe gonorrhoeis oritur. Cognoscitur tumoribus in perinaeo, propinquioribus ano, quam dum glandulae Cooverperianae inficiuntur; uti & interceptionibus saepe pessimis urinae reiectu copioso purulentae subputridae materiae; insanabili fere suppuracione ad partes; saepenumero ulcere maligno, nec sanabili in perinaeo nato; aliquando ulceribus pessimis, circumquaque ad loca prostaticorum prodromibus, & vicina depascentibus foedissimo spectaculo. Sed imprimis in hoc casu subito, & sine manifesta causa lotium intercipitur; unde dirisimi, sed inanes ad exonerandam vesicam tentami, neque catheteri inducendo via datur, donec ita excruciatu diu subito purulenti quid urethra dimittitur; nec ita diu post simile malum infestat deuo. Quandoque & vidi conigisse, ut urethra circa regionem prostaticae rupta, vel erosa urinam demiserit in tunicam cellulosa perinaei, scroti, & vicinarum partium; quae mora acrior facta in variis locis cum cicim etodebat; perque foramina omnia haec urina exprimebatur, dum vesica exo-

EXO-

{y} Prima decade de lettere familiari pag. 109.

{c} De sed. & causis morbor. per anat. detect. tom. II. pag. 198.

{e} Aphrodisiac. in praetatione.

satantum urinae copia per urethrae extremum
 staculum vidi in iuvene, cui terebinthinae in-
 ad adstringentibus injectionibus, in penem va-
 iam gonorrhoeae, qua per decem menses labo-
 rissimus agryta. Quando ille urinam excernere
 foraminula undique depluens conspurcabat omnia
 plus largiri posset, plura furatus fuit, & horum
 itam finivit. Honestae familiae precibus con-
 ferretur in theatrum anatomicum, sed sepelire-
 in cadavere lustrare tetri talis morbi effectus.
 umque observari confirmat prostatam in gonor-
 vel inveteratis, pessime quandoque affici. Quamvis
 se difficultas evidenter appareat, contigit tamen in
 miram cicatrium ex ulceribus antiquis inetratis,
 ienam fuisse (c); ex quibus apparet & hanc gonor-
 licet non sine magna difficultate. Videtur Sydenha-
 is in initio gonorrhoeae non affici, sed serius. Tan-
 rans glandulas prostatas effrato ulcere solet depascere,
 a eorum cadaveribus, quos hic morbus e medio sustulit,
 burn (c) tuetur, & multis argumentis probat, quod
 alae seminales, primum hospitium gonorrhoeae prae-
 vicinas undique partes vis contagii aliquando se spar-
 sque seminales in processu gonorrhoeae vitari tandem
 tur (f). Haec autem alibi (g) latius deducit.
 abominatissima gonorrhoeae species est, quae infectione
 vasculorum seminalium inter exeuntes meatus prostatas
 venenum solum per hos ductus, usque in vesiculas so-
 illarumque liquidum & vasa contaminans, profluvium
 illimum creat; dum loca interim sinuosa, atque laby-
 exulcerat. Si iam consideretur prostatas incumbere recto
 iola undique pinguedine cingitur, intelligitur totum illum
 im, qui vesiculas spermaticas, vesicam urinariam, intesti-
 nacum ambit, atque interiacet, exulceratum, putrefactum,
 slofos ad scrotum, perinaeum, anum producere, ita ut per
 fistulas, omnes hae partes consumantur, nec balneis, fo-
 tibus, emplastris, unguentis, cataplasmatibus, incisionibus, dita-
 ad prociatur, quin tandem & urina ipsa de his ulceribus

tates celeberrimi Boerhaavius ipse vidit dolens; similium & ego
 ctus testis huius quae saepius repetitis, diu inveteratas, imprimis

c. caud. morbi per m. det. edis tom. II pag. 199. & seq.
 (d) Epist. 11 responsoria pag. 414
 (f) Ibidem pag. 19, 24.
 (g) Ap. Erodisiac, in praefatione.

mala arte tractatas gonorrhoeas sequebantur. Horruſi toties, dum perditſi & temerarii iuvenes cum triſtolaribus ſcortis effroeni libidini indulgentes gonorrhoeam ridebant, leve tanquam malum, & vix morbi nomine dignum. Vidi talem, qui omni pudore depoſito, rerum geſtarum epochas determinabat ordine numerario gonorrhoearum, quas toleraverat; peſſime invehebatur in illos, qui de memoriae fidelitate dubium movere audebant, dum peierabat, hoc illudde contigiſſe tertias, quartas &c. gonorrhoeae tempore. Miſer ille diſapidatis omnibus, genitalibus, femoribus, clunibus, horrendum in modum exciſis, ſub dio repoſitus, dum nemo illum domo recipere voluit ob intolerabilem foetorem periiſt quam miſerrime.

Celſerrimus Morgagni (1), licet non dubitet, proſtata glandula infecta, contagium venire poſſe uſque ad veſiculas ſeminales, tamen directe non vidit illas aſſectas fuiſſe in cadaveribus gonorrhoea laborantium, quae diſſecuit, ſed indicium huius rei ſe obſervari, credidit in cadavere juvenis 25 annorum, qui vetuſtam virulentam gonorrhoeam cum altera recentiori commutaverat, ſex menſibus antequam morte violenta periret: deprehendit enim veſiculas ſeminales ſtrigoſas, atque exluccas; quum illa aetate turbidae, & ſucco plenae ſoleant inveniri. Simul optime monet, ſi alicui longa & dira gonorrhoea laboranti, per ſomniorum venerepium ludibria expellatur ſemen ſanguinolentum foetidum, fordidibus ac pure inquinatum, non inde pro certo ſtatueundum eſſe veſiculas ſeminales infectas eſſe: *potuerunt enim aliquando purulenta & foetida ſordes, & cruoris aliquid, a tranſeunte ſano, alioquin ſemine abripi, atque averi ex ulceribus, quae urethram, proſtatam glandulam, & ſeminalem carunculam occuparent. Ab his enim ultimis ipſi ulceribus non ſemper neceſſe eſt vitium ſum veſiculis communicari, tametsi non diſſicile communicari poſſe diximus.*

Talis eſt gonorrhoea virilis, quae prout in diverſis locis ſedem fixerit malum, varias moleſtias parit incautiſ, & quandoque triſtiſſima mala, & curatu diſſiciliſſima; uti patuit ex praediſtis. Quia imo licet ſcilicet evaſerint, & de corpore expulſum fuerit omne coctagium venereum, quandoque tamen ſi mutata manet partium fabrica poſt gonorrhoeam virulentam, praecipue ſi frequentius repetita fuerit, ut generationis opus turbatum, vel & impedimentum maneat toto vitae tempore. Singularem talem caſum deſcripſit *De La Peyronie*, cui ars chirurgica tantum debet. (A). Homo triginta annorum, cuius uxor quatuor annorum ſpatio ter pepererat, inſiciebatur gonorrhoea, quam varia coactus ſuſcipere iuſſera admodum negligebat, & quae a pluribus agetis, biennis ſpatio tractata fuit abſque ullo omnino ſueceſſu. Praecipua ſymptomata morbi erant ſuppreſſiones & ardores urinae, fluxus copioſus, nunc viridis, nunc flavus, ac ſaepiſſime ſanguinolentus. Ab equitatione fluxus ſupprimebatur; unde multum intumuit dexter teſticulus. Bona, medica adhibita ſanabatur quatuor menſium ſpatio ab hoc malo, & vivebat cum uxore ante adeo fertili per biennium, ut ſolitus fuerat; neque haec concipiebat, tamen ſollicitus de hac re conſuluit *Dr L.*

Peyronie

(1) De ſed. & cauſ. morbor. per anat. deſch. tom. II pag. 109.

(2) Mem. de l'Acad. Royale de chirurg. tom. I pag. 425, & ſequ.

VENEREA.

non expelli semen cum impetu, sed ceterum sanissimus erat. Post quinque vel sex dies, in cadavere urethra apparuit cicatrix, quae vesicam respicit; haec corrugando locum orificiorum seminis ejaculantium, ut non ed versus dextram partem colli vesicae tenderet. Iniectio tentata fuit per vasa deferentia in bus repletis, liquor iniectus propulsus per vasa in latus dextrum colli vesicae; dum in statu sano, ebullisset propelli, & libere exire. Irritatis impedimentum vix cognoscere potuisset, nisi vita cognitum fuisset, quomodo potuisset curari? eodem modo memorata docent post gonorrhoeas to-dimenta, quae liberam seminis iaculationem reddunt

perest symptoma, quod in gonorrhoea observatum fuit, attentionem, ophthalmia nomen venerea, quae nisi cito immedicabilem inducit caecitatem. *Erudicus* (1) testatur obvenisse ophthalmiam, quae venerea dici potest. Dum venere gonorrhoeam passi balsamicis, & adstringentibus; suppressa gonorrhoea subita metastasis fit ad oculum; simul per totum oculi bulbum inflammatione acerrima, ex-nam circa corneam transparentem format, quae nisi cito chirurgicam auferatur, subito in suppurationem properat, necnam perforando, turbatis iam atque infectis intra humo-sionem totalem viam parat. Solet tunc prius quidem per vulnus, quicquid gonorrhoeae prius fuerit, nihil mercurialium & panacea-nae scissiones, nihil purgationes, nihil carnosa illa, ac serina indolis aurum usum internum; nisi enim appareat, diebus, perforato sequitur, autemque effusus sine ulla virescunt recuperandi spe. Nemo hoc mi-ri considerat quanta damna, & quales erosiones faciat misera in durissimis etiam corporis partibus; quanto magis mercurio tenero vitio organo, dum per metastasin materiae morbosae actatur, gonorrhoeae materiam retentam, & resorptam ad alia loca deponi quandoque, vel inde patet, quod toties lues universi corporis universum dispersa corporis loca resorptionum virus ad-hucque sic ad perniciem corporis. Dispergatur sic ab iniectionibus ad-que, ut curesis gonorrhoeam adhibita, toties bubones sequun-tur, & testiculorum indurationes, de quibus postea dicetur, quae

(1) *Walleri physicae institutio, cap. VI. p. 198.*

quidem, viciniores sunt loco, qui primo affectus fuit. Verum observavit Storckius (m), gonorrhoea per alstringentia suppressa exulceratum fuisse umbilicum, & eandem ibi prodidisse materiem, quae antea per urethram exsistebat.

Talem ad oculos metastasin confirmant observata celeberrima Astruc (n), qui testatur, se observatione compertum habere opthalmiam gonorrhoeicam in summo etiam incremento, dicto citius remissam fuisse, vel evanuisse derepente, redintegrato gonorrhoeae fluxu, vel erumpente bubone venerco in inguinum, alioquin. Monet autem hanc metastasin a genitalibus ad oculos in illis contingere, quibus oculi natura molles sunt, aut infirmi, aut quibus ista, aut affricum, aut festucas elapsu fortuito male habens.

Interim videtur non improbabile opthalmiam veneream quandoque nasci, non per metastasin, sed a contagio immediate oculis applicato. Netum est omnibus, qui hos morbos curandos habuerunt, quod gonorrhoea laborantes saepius de die soleant ex pene exprimere collectam in urethra materiam, ut eius dotes, colorem nempe, spissitudinem, copiam explorent, & sic de curatione iudicent; nec abstinere ab hoc examine, licet moniti, frangentes has penis expressiones noxias esse, dum irritatur locus affectus. Imprimis hoc in illis obtinet, qui ab aliis audiverunt, vel saepius gonorrhoeae passi propriis experimentis didicerunt morbum miscere, dum materia eius fluens spissior fit, & alba; unde inter pollicem & indicem materiem ex pene exprimunt leviter, deinde digitis lente diductis variam eius cohaesorem solite examinant, & postea minus solliciti sunt, ut digitos levent, & abstergant. Si ergo oculos digitis fricant illi, vel nares fodiant, periculum cozaenae venereae, & talis opthalmiae incurrunt, uti facile pater.

Quod solo attractu materiae gonorrhoeicae oculi inflammari possint, rara, sed certa observatione probatur (o). Adolescens quidam dudum consueverat singulo mane oculos abtergere drina calente, ut oculorum firmaret aciem. Post contractam gonorrhoeam virulentam ab hac oculorum lotionem non abstinuit, nihil mali sibi inde metuens. Cito sequebatur opthalmia gravis, & venerea, cum acri involuntario lacrymarum fluxu, & lippitudine. Verum haec mala iisdem remediis tandem perfecte curata fuerunt, quibus ipsa gonorrhoea.

Merito notat Astruc, talem opthalmiam ab externe applicato contagio, dum interim gonorrhoea pergit, minus gravem esse, quam si suppressa gonorrhoea, virus impetuosius, & maiori copia intrat in oculos.

Quum autem tunica adnata, & conjunctiva dicitur, licet tenuis esse videatur, cellulis innumeris, certissimis, discretis, inter se perviis consistit, illarum inflammatae, infarctae, tumidae, undique ambiunt corneam pellucidam, quae tumore tali in omni ambitu cincta apparet, acsi profunde in fossa quadam haereret, dum eminens ambitus rubram carnem quasi refert, satis foedo spectaculo.

(m) Anno medico secundo pag. 121.

(n) De morbis venes. lib. III cap. III edit. 2 tom. I pag. 291.

(o) Ibidem pag. 295. & in prima edit. pag. 122.

lib. 1. cap. 6. & pat
hinc dicitur, quod
non inueniunt verum
5 diu gloriati a
dona huiusmodi. cor
de rebus, & curati,
paula ab mater. fi
dicitur aut (p) di
quae, etiam cum co
una ipia videtur. I
verbi inueniunt
necesse est aliam
diagnosin esse ex
tempore gonorrhoeae
ut certum sit
hinc certum est
habuerunt. Cui
z et amicum
venerunt. Quia
1700

1791
lib. 1. cap. 6. & pat
hinc dicitur, quod
non inueniunt verum
5 diu gloriati a
dona huiusmodi. cor
de rebus, & curati,
paula ab mater. fi
dicitur aut (p) di
quae, etiam cum co
una ipia videtur. I
verbi inueniunt
necesse est aliam
diagnosin esse ex
tempore gonorrhoeae
ut certum sit
hinc certum est
habuerunt. Cui
z et amicum
venerunt. Quia
1700

rum interna superficies bulbo oculi configua
fit, quum adnata tunica & palpebrarum in-

o externe applicato, vel a benignioris gonorrho-
duxerit, levior erit, & poterit vulgatis reme-
contra a virulenta valde gonorrhoea subito sup-
natum, coecitatis imminet periculum. Viderat
adolefcentes ex tali ophthalmia oculorum alterutro-
rum curantium industria. Nec fidendum est mer-
enim magna dosi adhibeatur, & subito praecept
cociam anticipat; citius enim oculus perit, quam
erit.

Imiae pendet imprimis ex cognitione causae, fluentis
ppressionem. Illum enim tumorem adnatae tunicae, ita
si infossa haereret, vidi aliquoties in ophthalmiis, de qui-
quod nullo modo gonorrhoeam suppositam pro causa
ecipue in eo imprimis versatur, ut per balnea, fomen-
ta remediis parata perpetuo peni & vicinis applicata
qui cessaverat, parata eodem tempore oculis applicantur
fomenta; quale v. g. est actum libargyri centupla aquae
simul adhibeantur. In hoc se illa, quae ad curam inflamma-
ata sunt. Quum enim contagium venereum acre, & ro-
inflammationis effectus (§. 388) metuenda sunt.
primis est, quod tunica adnata, si membrana coniunctiva
ta textura cellulari adhaereat tunicae albugineae suppositae,
& tendinum musculorum oculi nascitur, & quod in his cellu-
inflammatorius haereat, dum vasa tenerissima, & cellulae sanguine
, liquidiori parte orbato (vide §. 382, 2) replentur. Tunica
tenuis est, & una cum translucente tunica albuginea supposita
um oculi dictum, adnata tota vasculosa est, sic tamen, ut maxi-
pars contineat tantum humores sanguine rubro tenuiores; unde &
a tota apparet candida. Vasa haec facile dilatantur, & tunc cras-
admittunt fluida. Si sanus homo fricat oculos, mox rubet adna-
fit, si arenula, vini, aceti homo fricat oculos, mox rubet adna-
erint: validissima enim vi palpebrae tunc stringuntur, & sanguinem
in vasa illa facile cedunt premunt; unde totum album oculi ru-
ve perfunditur. Verum ipsa haec adnata adeo vasculosa tegit &
lam corneam, a qua apice scalpelli separari potest, & in hoc loco
radices tenuioribus consistit, quae una cum liquidis contentis lu-
ubi corneam tegit, infatigantur, ergo a valida inflammatione, actum est de
ciditate carnes, quae sed per totum humores crassioribus, actum est de
um, vel pro parte obducitur. Sic

(P) De morbis mer. lib. III cap. III

ium structuram in symptomatibus diversitas oc-
nitis penem undique ambit, fricatur, agitur,
ae tabum excipit, qui postea lente relabitur; hinc
em frequenter infici, & foedari postea ulceribus
glandulae sebaceae (1) dictae adsint in alis nym-
a labiis pudendi muliebris, ac circa orificium mea-
plurimae cryptae, sive lacunae, uti & in vagina,
humore madet, adsunt in omnibus hisce partibus
mucosus humor, cui virus venereum intricari pote-
aliis corporis locis mala producere.

a viro infecto proiectus cum semine in coitu tangit
orem, ubi os uteri prominulum in se excipit. Haec
glabra est, nulla hic ruga; ideo hic loci rara est in-
superficiem, & quia liquidum immixtum in vaginam
Ad tertiam circiter longitudinis vaginae partem ab illo
miobiculari eminentiae membranae internae vaginae,
maiores numerosiores occurrunt descendendo, donec va-
tiores iam, & quasi connivens in sinum muliebrem. In his
papillae nervosae, voluptatis instrumenta, adsunt & folli-

uit in vagina a concubitu impuro produci ulcera, tres qua-
transversos longa, in inferiori parte lata, in superiori arcta,
ulcera per fissuram quasi facta; talium ulcerum decursus per-
ad vaginae rugas: haec ulcera emittunt materiam saniosam,
ne rodentem, & cirrissime insipientem viros, qui cum talibus
nebuunt.

malum in vagina haeret, imprimis si mitius fuerit, solet sarpe
o haberi, qui quum satis frequenter occurrat, quandoque tales
quidem suspicantur se infectas esse; imprimis si antea albo fluore,
o laboraverint.

autem gonorrhoea muliebris a fluore albo distingui posse cogna-
iae praegressae, suspecti nempe concubitus; quam causam tame-
te gere solent. Praeterea fluor albus a levi initio per menses,
anne augetur sensim, & tarde tantum redditur acrior, flavus quan-
iride scena tandem; gonorrhoea subito oritur, incrementum continuo, &
vesti aegis augeat mali; color, qui initio albeat, quandoque in flavum,
dem t. anst satis cito, erositque vas, effluit tribus sanguinolentus;
t, ac coloris sensum in vagina percipiunt. Sed & fluor albus, si iam
sua se ferit, maiorem copiam dat materiae effluentis, quam in go-
rora obsoritur (1).
aret etiam, si in vagina haereat causa mali mulieres gonorrhoea correptas
e esse libras ab urinae difficultate, quae gonorrhoeam virilem comitatus.

(1) Perspirat
Altric.

(1) dicta Hippo-
malud. des long.

ap. XIII pag. 151.
tam. II pag. 151.

Norman.
leg.

advers. anat.

I tab. 3.

Unde

Unde statuitur gonorrhoeam in feminis toleratu faciliorem esse, ceteris paribus, quam in viris (u).

Haec gonorrhoea muliebris ab infecto solius vaginae cavo pendens posset vocari, distinctionis causa, *prima species*.

Urethrae orificium in feminis sub clitoride in nympharum intervallo ponitur, referens tuberculum, rugosum utrumque, & pertusum pluribus emissariis, ex quibus viscidus, sive mucilaginosus humor exprimi potest. Ab impuro concubitu lacunae illae mucosae inficiuntur vel solae, vel simul cum ipsa vagina. Graafius (v) hunc locum solum pro sede muliebris gonorrhoeae habuit, & ideo ad distinguendum hanc a fluore albo voluit genitalia esse inspicienda: *siquidem meatus urinarii exitum circumscilentes partes (in quibus lacunarum exitus terminantur) mucosa quadam materie obfessas, ac interdum exulceratas reperies*. Et in cadavere mulieris hoc vitio infectae vidit: uterique vaginae immixti, corpus glandosum, sive prostratus urethrae circumpositus, solum male affectus fuisse. Cognoscitur adesse haec muliebris gonorrhoeae species, dum tuberculum illud glandulosum, in cuius medio urethrae orificium ponitur, tumet, dolet, & tabum venereum plorat sive sponte, sive dum premitur. Musculus, quem Santorini (*) descripsit, & depressorem urethrae nominavit, irritatus tencigine afficitur, & promovere facit totum hoc glandulosum corpus; unde difficultas urinae reddenda; nec tamen semper ardorem sentiunt, dum urina transfluit, sed tunc tantum, quando locus affectus exulceratus ab urina expressa irritatur: sentiunt autem molestiam satis rigiditatem, ac tensionem, dum urina emittitur, & conqueruntur, ac si aliquid excideret de vulva, vel saltem exitum moliretur. Quum vero haec pars cum vicina cellulosa communicet, metus est, ne virus propagetur ad montem veneris dictum, qui membranam adiposam crassiores habet apertissimam sedem retinendo contagium, & turpia ulcera in hoc loco nata propagando. Metus pariter est, ne urethra a vicino ulcere corporis glandosi erodatur; tuncque sequitur fastidiosissimus urinae ad loca exteriora, & superiora vulvae effluxus.

Hoc malum vocari posset *secunda species* gonorrhoeae muliebris.

Urethra muliebris a vesica, seu cervice eius orta, vix transversio pollice longior, curvo incessu, paulo in superiora converso extrorsum fertur, & infra clitoridem hiat. Canalis est spongiosus urethrae virili similis, sed multo brevior; decurrit inter truncum clitoridis, ac vaginam suppositam, & utrique adhæret; in interna superficie inveniuntur similia emissariola, ex quibus viscosus humor exprimitur; unde si urethra a contagio venereo inficitur, fiet *tertia species* gonorrhoeae muliebris, quae similia pariet mala ac in historia gonorrhoeae virilis recensita sunt. Materies effluit similis, stranguria molestia est, & metus, ne, erosa urethra, in vaginam depluat urina.

In labiis sinus muliebris, utrimque ad latera, ad partem infimam tere sub sphinctere.

(u) Astruc de morb. vener. lib. III cap. I pag. 167.
(v) De mulierum organis cap. IX pag. 140, 141.
(*) Observat. anatom. cap. XI pag. 208.

LU
hinc nomen ponitur
hinc putatur acci
tunc per se sponte o
lignis (v) peria har
pianum speciem a re
vix paulo longior
linea dicitur perit
ex parte sunt
per equi tunc pa
puncturae tunc
materiae expre
natur. Quia hinc
runt: hic quoniam
natur, est, tunc
tunc vixit
dicitur: tunc
appropinquat
ex parte
hinc quoniam
in hunc locum

gna glandula, pisum maius aequans: unaquaeque
missarium habet, ex quo copia liquidi viscosi ex-
i venerei tempore exire creditur. *Celeberrimus*
glandularum orificia delineavit, & unam talem
uis partibus figura expressit. *Santorini* (z) unam
aginae extrinsecus adstant, *Gassaro Bartholino* pro-
vit. Patulis illarum orificiis miasma molestissimo
let hoc malum incipere cum pruritu molestissimo
, & dolor: augetur copia effluentis humoris, tabum
mor talis quandoque unicus, aliquando bini, & in
istincti a bubonibus, cum quibus quandoque confun-
dicta fuerunt in gonorrhoea virili de glandulis *Covupe-*
nda sunt. Nisi enim extrorsum possit adduci talis
cuetur per emillariola in vaginam tabus venereus,
, oriuntur ulcera sinuosa pessima; vagina & vicinum
eroduntur; ita ut feces alvinae per vaginam exeant:
quod quandoque impudentissima prostibula sibi invi-
di in nosocomiis, dum illarum cura habetur.
rhoeae muliebris species vocari possent.
rrhoeis locus affectus in vagina frequentissimus est; in
is orificii ambitu idem malum observatur, ut dictum fuit.
d coitus tempore gonorrhoea laborans. vir in sinum mu-
, sponte descendat versus inferiorem vaginae partem, ubi
glandularum modo descriptarum, videntur & illae infectio-
expositae.
ret gonorrhoea, & uterum, tubas Fallopianas, ovaria inficiat
, Possibile quidem videtur lue per totum corpus dispersa
i deinde: sed non constat, quantum novi gonorrhoeam ad ute-
rasse, & ibi excitasse simile malum. Verum tamen est, cele-
s invenisse in cervice uteri quasdam vesiculas, varia magnitudine,
otundas, aut ovales internam prope totam cervicis faciem conser-
bidentes (a). Delineatae habentur in utero discisso (b). Va-
sicularum voluerunt diversi auctores: quidam dixerunt
alii pro ovibus muliebribus habuerunt; alii statuerunt harum
viscidum humorem, quo obturatur os uteri gravidi. Celeberr-
semper ex his vesiculis lentum mucum exprimere potuit copio-
tem in praecedentibus dictum fuerit. facpius mucosa, viscida,
idam suo aptissima esse, ut miasma venereum irretiant, & ad lo-
corum signa, videtur hic frequenter in cervice nempe uteri,
ingere debere. *Santorini* (c), qui has vesiculas descripsit accurate, &
de.

exar. an.
II, fig. 1. I, tab. 8. & littera H.
tab. III. f. (z) Morgagni adven. anat. I, pag. 44.
fig. L. L. (c) Observat. anatom. cap. XI, §. 2, pag. 213.
com. P. A. (b) Ibi
ars II. E

delineavit (d), negavit *Hydatides esse* neque *moles feminis* *fermans* (scatebris),
aut novum muliebri cervicis datum ovarium; dein addit sequentia: Ne vero id
praeteram, quod a clariss. Morgagni barum partium, ut & ceterarum scruta-
tori accuratissimè adnotatum fuit, vix unquam quidquam visis in idem me de-
prehendisse, fuit paucissima scorta ceteris aliqui partibus corrupta difficillimè.
Leguntur quidem apud celeberrimum Morgagni (e) observationes de tubis
uteri a lue venerea exulceratis, dubium tamen videtur manere, an gonor-
rhea hucuscupè propagata fuerit, an vero ex infecta prius humorum massa
per metastasin virus ad haec loca fuerit depositum.

Gonorrhoeam toleraturo faciliorem esse in mulieribus, quam in viris, si reliqua parva fuerint, satis patet. Nam in illis potest adesse hoc malum, licet urethra nullum patiatur damnum; dum nempè fomes mali in loculis vaginæ hæret: hinc vel nulla adeit dysuria, vel longe levior, quam in viris, licet etiam mulieribus urethra affecta fuerit. Longe enim est brevior, & minus incurvatur. **Praeterea** ob easdem rationes molestis gonorrhoeae sequentibus, phymosi, paraphymosi, urethrae cicatricibus, carunculis &c. minus obnoxiae sunt mulieres.

Difficilius tamen in illis curantur haec mala; quia facile negligunt levia stillicidia, quae post male curatam gonorrhoeam superfun-¹t; eo quod pluri-
mum mulieribus familiare sit vulvam, & vaginam madescere perpetuo:
quum autem vix doleant tunc, omnem medelam spernunt. Viri e contra
longe dociliores sunt, & semper peiora metunt, quam diu vel minimum
quid insoliti de pene exit, Celebris auctor (g), ubi prognosin luis venereae
describit, in haec verba erumpit: Cetero quod gonorrhoeam mulieribus: hanc
iam dudum immedicabilem statuiamus. In laxis illis, & semper fere quid hu-
midis plorantibus partibus, aliquod leve stillicidium diu superesse poterit, li-
cet totum virus venereum iam fuerit edomitum. Verum illud stillicidium
alium erit, & mucosum, nec inficiens amplius. De hac re postea ad-
dicendum erit ad §. 1459, ubi de gonorrhoeae curatione agetur.

\$. 1448 **T**um glandulae inguinales tumentes utroque in sexu, bubones venerei, communicato per lymphatica reor-
bentia contagio.

Inguina *puerorum* dicuntur, & glandularum tumores in *inguinibus* eodem nomine designantur (vide §. 416). Aliarum glandularum tumores per reliquum corpus dispersi, similiter bubones vocati sunt. Uti tamen obtrahit postea, ut tumores sub axillis nati & in *inguinibus* hoc nomine insigniuntur. Frequenter obferuntur in lue venerea, & quom inguina olim habentur pro hepatis emunctorio;

(d) Observar. anatom. tab. III, fig. 3, lit. B.
 &c. tom. II, pag. 369.
 I, pag. 167.
 IV, pag. 227. (g) Vercell

(c) **Pe** sedibus, & causis morbor.

(g) Vercellonus de pudendor. morib., & lue vener, cap,

rgumentum, primam in lue infectionem hepatis
coris ad varia corporis loca depelli, de qua re
1445 dicta sunt. Unde Fallopius (b) dixit: *Her-*
missionem ad propria emundatoria. Si materia crassa
tenuis ad solum; aliquando ad dextrum, aliquando
utrumque laus, aliquando in media pube. Ego tres
maximas vires expultrices, & materiae infestae co-

oque inguinem bubones occupare solent; pubem ra-
igit bubonem in pube videre, & credo plures esse.
int. Ceterum Fallopi observationem in dubium vo-
Aliquando contingit bubones acquirere magnam mo-
nguine talis addit, expansa talium tumorum massa, postea
intermediam pubem occupare. Monet ipse Fallopius
a. talis insumitur, ita magnus fit tumor, ut excedat mas-
sae solidi.

at sequentia. (k): Natura huius tumoris est, ut statim inci-
qui duum est generum: aliquando colligitur materia circa glan-
stientie glandulas, vel replente cavitatem inguinum; aliquando
landulas insumitur. Certum est glandulas inguinales laxa-
sa involvi & tegi, quae multum distendi se patitur in
Unde videtur maior moles bubonis metuenda esse, si miasma
membranam cellulosa infecerit simul, quam si in sola glandula
am bubonis speciem valde turbare medicos monet, quod nun-
t. maturationem. E contra illius, qui est extra glandes, primam
itas; secundum ulceris mutatio; tertio cognoscimus ad talium
membris, & non esse aliquod corpus circumscriptum, quod
sile apparet tumoris parvitatem potius expectandam esse a-
ea, quam a tumente membrana adiposa.
bubones sedulo consideravi saepius. Aegri incipiunt conqueri de
ome in inguine; quandoque de obtuso dolore; tunc tangere potui-
herentes glandulas parum tantum auctas, distinctas adhuc inter
deam longitudinem inguis dispositas: cito satis augentur mole, &
iata coeunt massam; quae postea in tumorem saepe satis magnum
e re non solae glandulae videntur hunc tumorem constituere, sed
ta esse membrana cellulosa. Videtur praeterea hoc confirmari
prae ceteris. Magni bubones: per argenti vivi efficaciam incipiunt
icere in omni ambitu, & quandoque satis cito. Verum, dum pro-
iam disparuerunt, superest quasi nucleus durus, renitens, qui
ne ex dit, & quandoque in schirrum transit indomabilem.
antur illa, quae area ad §. 1337 dicta sunt, ubi de suppuratione mam-
agebatur, & pariter de diversitate curationis, pro ut vel in parte cellu-
lari

Aphrodisia

p. 850.

(k) Ibidem
E 2

(k) Ibidem.

lari mammarum, vel in parte glandulari, vel in utraque simul inflammatio non resolvenda adest.

Bubo aut statim apparet, antequam aliud malum in corpore ceteri natus, aut postquam ulcuscula penis ebullientium curiositate nimis prope sanata sunt, aut postquam gonorrhoea intempestive suppressa est (1). Demonstrat celeberrimus Alexander Monro (2) multis in corporis locis vasa lymphatica valvulosa. oculis fuisse fluida sorbere; simul notat plerumque glandulas conglobatas insignes, saltem quoddam ramos harum venarum in se recipere. Non mirum ergo videbitur, dum servida veneri cum foedis scortis voluntatur juvenes miasma verecure haec vasa referentia ingredi, et ad glandulas conglobatas una cum lymphatica venosa deduci, illasque inficere. Idem metuendum erit, si virus in poene ulcus fuerit, vel in urethra gonorrhoeam produxerit, nec satis attenditur, ut perperis lotionibus, fluxuve copioso eluatur ex his locis contagiosum virus, quod reorruptum circa glandulas hac haerebit facile, illasque in tumorem attollet. Probabiliter videtur admodum infici illas glandulas praefatis, quae loco primum affecto sunt viciniores, sic ab infectis pudendis per concubitum bubones fiunt; in auribus, quae lue venerea infectos infantes lactant, sicque inficiuntur, inter prima contagionis signa saepe se manifestant tumores subaxillares. In infantibus, quibus ab infectis nutriticibus communicatur contagium, saepe primo invaduntur colli glandulae conglobatae.

Uterius hoc confirmatur ex illis, quae in variolarum infectione contingere observantur. Leve vulnusculum brachio infigitur, cui applicatur filum pure variolofo imbutum. Sequuntur saepe tumores sub axillis sicut enim est venenum variolarum reformatum fuisse infectionem: signum unicum tantum brachio, non in ambobus esse. Quum autem nunc solet in unico tantum brachioles solet intumescere tantum (x).

Inde auster huius

Unde patet 'bubonem in inguine dare signum recepti *in* venas contagii, quod si totum figitur in hoc tumore, a lue liber potest *esse* hactenus aeger. Verum hoc incertum omnino est. Poterit enim pars mali *tantum* hic haerere, & reliquam massam tumorum mittit totum corpus *in*ficere. Intelligimus hinc, quate bubones a peritis semper suspecti habeantur. Unde & Sydenhamus (3), postquam de gonorrhoea egerat, subiungit sequentia: *At vero quies morbi diuturnitate, & in ditiis partibus ubi contagium sursum fertur, & semel sanguini latens imprimis, aut materia virulenta, indebito adstringentium usu in corpore retenta est, putrescent humores, vera lues exoritur, in qua tumores, five bubones saepe in inguine comparent, primum eius gradum consunt.* Contingit, & ipse hoc vidi aliquoties in aegris, ut post impurum co-cubitum cito, & absque ullo alio malo apparente in ulla corporis parte bu-bones prodeant; nec leve hoc malum est: designat enim, luis contagium mo-

(1) Alexand. Traian. Petron. de morbo Gallico lib. VII cap. V, aphrodis. pag. 135.
 (m) De venis lymphat. valvul. pag. 46, & seq.
 (n) Ibidem pag. 46.
 (o) Epistol. respons. II, pag. 416.

(^m) De venis lymphat. valvul. pag. 46, & seq.

1°) Epistol. respons. II, pag. 416.

(n) *Ibidem* pag. 48.

um non haesisse partibus, quibus immediate ap-
ceptum ulterius penetrasse; hinc, nisi bona me-
corpore, metus est, ne totum corpus contamine-
st concubitus cum scorto, non tantum bubones in-
iusti emeruisse, sed & totam cutim varis foedatam
pius, dum cancri venerei (cariem vocaverunt olim
psperunt) repellentibus, & exsiccantibus subito
de Fallopi (p) severe monet: *Si fuerit caries vere
d maligna, vel malignissima, fugite valide, & pure
ur bubones.* Bubones recentem infectionem sequi so-
reos in genitalibus mala tractatos methodo, vel gonor-
didit his celeberrimus Astruc (q) aliam causam; si de-
n proxime praegressum sponte contingunt, & signum latic
gnomicum constituunt. Verum quidem est, quod vene-
us circulantibus mistum deponi postea possit ad varia
ue nihil repugnat, quod & hoc modo bubones excitentur
ur hoc raro contingere; saltem non memini, me unquam
ui non deberet originem recenti coitui, aut canceris, vel
curatis. Notum etiam est, talibus aegris solenne esse,
iuvencutis confiteri, quam ob similes errores matura iam
erubescere.

ibo veneris ab aliis inguinum tumoribus sequentibus con-
mpuro, vel saltem suspecto concubitu; canceris veneris gon-
dentibus.

itio bubonis tangatur inguen, in profundo plures glandulae
tumentes percipiuntur, quae magis auctae in unam massam
tur, & constituunt tumorem latiore in basi, in fastigio ple-
a acuminatum. Color cutis non mutatur apparet a naturali;
it, dum bubo inflammatur, & in suppurationem tendit.

it, ab initio, inaequalis superficiei, & latae basi innititur; in hernia
p, superficies laevis est, & ad figuram sphericam proxime accedens; di-
t, erenti cedit facile, nisi fuerit incarcerata, & tunc gravia adfunt
r, febres, vomitus, passio iliaca &c.; quae bubonem nunquam

Si incarcerata non fuerit hernia, tactus cedit, pressione tumor
tus, & borborygni in abdomine obmurmurant; quae omnia in
obtinent. Imo si in bubone iam suppurato, vel adhuc suppu-
percipiatur mollities, vel obscura fluctuatione animadvertitur

in bubone latens, id omne paucum est, & profundum, medium
tumorem occupat (r). Ubi autem hernia iam in scrotum de-
rit, nullam omnino cum bubone similitudinem habet.

Dixit

De morb
V, pag. 3

Gallic. cap. 10

(1)

XI,

aphrodit. pat. lib. 2.

lib. 2. pag. 229.

Ej

(69) Lib. III, cap.

Diu quandoque immutatus bubo perstat, postquam totam suam magnitudinem adeptus est, & pro varia eius mutatione diversum nomen acquirit. Si dolere, calere, rubere incipiat, dicitur *phlegmonodes*; si suppuratio sequatur, *puodes* dici possit; si totus indurecat, & diu talis maneat, *scirrhodes* nominatur; & sic porro.

Idem etiam patet diversa prognosis pro varia tumoris conditione. Suppuratio non adeo hic metuitur, sed laudatur potius, si per totum tumorem aequabilis obtineat. Scirrhus metuitur prae reliquis, quum pessima mala inde sequi possint. De quibus omnibus postea ad §. 1461 agendum erit.

§. 1449. **E**t in viris membri inflammatio ingens, brevi in gangraenam soluta.

Penis, uti dictum fuit, tempore impuri concubitus omnium maxime exponitur contagii periculo; hinc tones omnium primo inficitur. Verum in illo loco, ubi miasma venereum adhaerere incipit, oritur macula pruriens, calens cum leni inflammatione (vide §. 1444), a qua, si exasperetur quicunque de causa, ob fenfilitatem partis affectae, pessima fequi possunt mala. Tenigo venerea, qua membrum affectum tumet, & erigitur, saepe validioris inflammationis causa est. Ob hanc causam, uti postea in curatione dicitur, iuventus hoc malo affectis imperator victus tenuis mollis; vini, & liquorum spirituosorum usus interdicitur. Monentur, ne colloquitis, librorum ledione, tabularum lasciviarum conspectu occasionem praebant erectioni penis, & venereis in somno ludibriis, quibus nihil nocentius. Si malum iam adultius sit, & ulcus venereum erodat has partes, quantum rupturae valorum periculum adest! Observatur quandoque in pessima gonorrhoea urethram graviter inflammari, vel & ulceribus exedii; unde non potest absque dolore acerbissimo distrahi, dum penis erigitur; nec potest tamen peni in erectionem nienti coëxtendi; unde rigens penis deorsum fluit, & incurvatur, quasi chorda subfensa; tuncque gonorrhoea chordata dicitur (r). Quandoque, sed raro, & in gravissima gonorrhoea tantum contingit, ut ligamentum penis, quo commissurae ossium pubis nequitur, imo alterutrum ex corporibus cavernosis, quae penem constituunt, inflammantur; tunc necesse est & penem cum dolore distendi, & distentum vel sursum flecti, vel ad alterutrum latus oblique declinare. Quandoque contingit miseris, licet omni cura veneris illecebras vitent, & quandoque seminis ejaculationem fequi cum acerbissimi doloris sensu, peni inflammato, & in hoc illudve latus distorto! Quantum periculum va-

juveni rigidus penis vehementer inflexus fuerat. Post ibi loci tumor natus,
crescereque; cute super eum, ut super corpus penis reliquum, mobili. Quum
inisset

(2) Ibidem lib. III cap. I pag. 161 , & lib. IV cap. XI pag. 400.

illis maturiori apostemati, molliora unguenta appo-
aturaretur, quod credebatur, apostema: ex quo
hac curatione ruptum iri, tumor, quod dissuase-
a. Mox sanguis erumpere, praeteraque nihil:
primum primum non posses, deinde aegre repressus
post paucos dies mortuo, incido membrum, sedem
Invenio corpus nervosum minus alitum dilatatum
nec sanguine; quemadmodum in aneurismate arteriae.
membrum, tumor minor, molliorque; quum erigebat

ationis ad gangraenam transitus in pene inflammato
ducitur ex illis, quae in capitulis de inflammatione,
nt. Periculum in his malis augetur, si acrioribus
fuerint miseri, qualia turpes agyrtae, stolidaeque
udere solent; balsama sulphuris dicta, ol. stillat: te-

cute penis & praeputii haerere tenerimam tunicam
ale affecta si fuerit, in tumorem ingentem attollitur,
uffocare possit. Ab attritu rudiori penis, ab acti quo-
r praeputium & penis glandem sic irritantur hae par-
es inde productos viderim; imprimis in talibus, quibus
ultra glandem prominet, dum simul eius orificium corru-
gis; uti in iunioribus pueris observatur: inflata tenera haec
andoque ultra glandem prominet, illam totam occultat,
i urinae impedit, cuius pars inter praeputium & glandem
nora acrior facta, has partes magis irritat; sicque omnia
umor ille sere pellucidus est, vario modo intortus, digitis
utcumque; vocatur *phymosis*. Ubi vero praeputium, pone-
um, simili tumore afficitur, tunc solet dici *paraphymosis*, &
pariter sere pellucido, penem cingit circa coronam glan-
a tumorem hunc annularem prominet tota nuda: in *phymosi-
cium* retroduci nequit, nec adduci in *paraphymosi-
tumores*, licet nil venerei mali subsit, nec difficulter curantur.
iorem, decimum quintum aetatis annum aegerum, impolla-
nescium, quum in imperforatam diu valida laetra exercuisset,
iustationem maximam, & lucidam, quam *Lutetiae crystallinae*
i infans penis dolore. Immissi per praeputii hiatus cicutae so-
di evitavit erisum; sedabatur brevi dolor, & repetito huius usu, tu-
di scissus est. Postea, remedia huius effectum saepius experitus, il-
rui habuit. A liberosa & difficili venere cum pura muliere
rea nasci, mones & celeberrimus *Afrus* (v); sed simul affirmat,
ulo immunes esse, & facile discuti, modo evitetur causa.

acade
85.

annot. in
(v) De

pag. 27.

lib. III cap. 6

E 4

(u)

Observat.

medic.

num. VII

pag. 259.

In pueris iunioribus praecipue, si praepitum angustia habuerit aperturam, urina quandoque colligitur inter praepitum & glandem; unde phymosis sequitur cum magno tali tumore pellicido; qui quandoque liberum urinae exitum impedit plurimum. Si per orificium praepitii umbilico iniiciatur aqua pura tepida, ut abluatur glandis & praepitii interna superficies, ita ut nihil acris urinosi hic maneat, causa irriante ablata, tumor ille cito satis subfide solet; praecipue si acetum libagarii ducentis partibus aquae flos sambuci dilutum applicetur perpetuo, instat formae iniectiones autem aquae tepidae aliquoties de die repeti debent; sed leni vi, & suspensa manu; tunc enim facile hoc toleratur, etiam in tenellis, quom abique ullo dolore fiat.

Vidi in octenni puco validam phymosin natam tulle, cum aditu caloris impatiens, inter dormiendum corpus inferius nudaverat: culicum pun-cturæ in femoribus, & cruribus, plura stigmata manifesta reliquerant, & unicum tale observatur in præputio: hunc locum puer, pruritui impatiens, valide fricaverat; unde post tres horas tumens valide phymosis sequeba-
tur; quæ zama eadem hac methodo feliciter curabatur.

ur; quae tamen eadem hac methodo feliciter curantur.
A similibus causis nata phymosis, vel paraphymosis molestant quidem pa-
rant, & additibus magnum saepe incutiunt metum; sed tamen feliciter,
imo facile curari solent. Ubi vero a malo venereo ortum habent, longe
maius periculum faciunt, nec adeo facile curantur. Plerumque enim a laten-
tibus ulceribus praeputii & glandis oritur ducunt, quae de horum curatione
praeputium occultantur, nec chirurgi manum admittunt: de praeputium exitum
ad §. 1465 dicitur. Mala omnia augentur, dum tumens praeputium tabo lues me-
tabi ulcerosi liberum impedit; unde non tantum a resorpto tabo lues me-
tuenda est; sed & ulcera ipsa, mora acriori reddito hoc tabo, perpetuo ma-
drent, & maiorem acquirunt malignitatem; ita ut vicina saepe miserrime ero-
dantur, antequam detumescat praeputium, & liber concilietur exitus viru-
lentiae materiae; unde omnia in peius ruunt, & gonorrhoea, si simul addita,
augetur perpetuo, copia, & virulenta. Quare Sydenhamus (x) dixit: Quod
si aegri glans praeputii undequaque conegatur, atque eiusdem ora praeflam-
matione usque adeo tumida, dura, ac salisla reddatur, ut nullo modo quae-
rui; laterem lavas quiquis gonorrhoeam remediis purgantibus, etiam fortis-
sime, & quotidie ad nauseam repetitis, aggreditur; nisi eodem tempore in-
agatur, ut pars ita affecta ad statum suum naturalem redeat: sublevis duritie
& tumore, unde gonorrhoea novus sibi somus ministratur. Mollissima autem
remedia ad hunc scopum laydat, quum certum sit ab acrioribus haec mala
exasperari, & inflammationem adeo hic metuendam augeri. Unde vel sim-
plicis aqua, vel decocto emollientissimo eluendus est tabus, qui inter praepu-
tium & glandem collectus haeret; & cura valida antiphlogistica opus erit,
ut postea ad §. 1466 dicitur.

Quandiu tumor, phymosin aut paraphymosin faciens, albus, pellucidus, digito cedens, & fere indolens est, minus periculofum est malum; sed, si valide inflammationis signa se manifestent, acer dolor urgeat, & valida adfir

(*) Epist. respons. II pag. 414.

ax adhibeatur medela, gangraenae metus est. inflammato praeputium glans undique compressa, si & glans pariter inflammetur. In paraphimosis, constringet totum penis ambitum pone glandis coadunxus & effluxus humorum vitalium; unde gangraena; & postea glans siderata decideret; sicque turpiter caesa.

inflammationibus calidioribus non infrequens est; uti etiam, in aetate contemnunt aegri, & genio indulgent strenue. Naturalem metuendum est, si intra praeputium & glandis osculo iter suscipiatur, & veloci cursu perficiatur, ubi tristem talem casum, ubi imprudens iuvenis medicum corripiebatur, dumque miser tanto magis festinaret, dum perveniret, ubi commode curari posset, gangraenae medium penem fere destruxerat: a peccato medico vita, sed tota pars gangraenosa cecidit.

testes tumidi, dolentes, saepe in ulcerationem abeunt, inflammatorio tumore ad vesiculas seminales orto.

quandoque solent testes intumescere; testes varri solent oriri. Incipit testis in uno vel altero latere mole augeri, er per totam substantiam, veluti a centro suae gravitatis extendatur: Sentiunt aegri tensionem quandam ingratam in utroque testis, ac si extrorsum urgeretur interior eius substantia: incipit testis, simul indurescit; sed non duritie scirrhusa; non prementi utcumque cedit: raro subito tumor augetur; sed in notabilem saepe molem. Dolor non est adeo magnus; imo; sed ingratus distensionis sensus; dein mole aucta testis grastrahit partes, a quibus pender; & si decubitu in lecto, vel in orio testis tumens sustineatur, dolor ille a distractione portatus cessat, vel saltem levatur plurimum. Saepius epididymis tumere solet, ubi malum levius est, & tumor lente increfcit; potest testis substantia tumere incipit. Quandoque uterque testis tumet, & a uno latere tumor maior est, quam in altero: quum autem tumorem augeatur, aequabilis fit, videtur testis substantia augeri molem materiam; quumque eodem hoc tempore in vasis humores a reventibus, & post secretionem factam reventibus, nulla diuere iplatur, videtur tumor testis potius nasci ab impedimento evasumque, qui testis fabrica a sanguine secretus in vesiculis seminalibus, qui testis debet. tesibus secretur, per vas deferens tandem ad vesiculas seminales deducitur, conclusur calore, per vas deferens tandem ad vesiculas seminales deducitur.

& per bonam curationem adhibitam iam multus fluxus erat suppressus, sed libere prodibat. simile, vas deferens a vesica immaniter distenta, hac causa ablata, totum malum cessavit breviter. Exitum vesiculæ seminalis in hoc casu pariter colligendo & servando genitali humori dicatae sunt, plures menses manent plenae absque ulla noxa. non semper sequatur, videtur inde fieri, quod firma habeat latera, subcartilaginea quasi, unde collabuntur, sed cavum circulare manet.

his causam recenset celeberrimus Astruc (a); suppressum gonorrhoeae fluxum; virusque venereum, quāquam testis substantiam delatum. Prior causa a gonorrhoea, & illam saepe comitatur: solet haec calorem accendere, & velocius tunc tumor increscit; verum etiam curatur, & plerumque sine ulla duritie superstitē; si nemini redierit, antequam maior noxa in teste orta sit. talis tumor, in suppurationem saepe abit, & rupto abscessu ulcus degenerat, difficulter curabile. Altera causa erat, ipsam testis substantiam penetraverit, absque comitante praegressa gonorrhoea; testis a tali causa tumens minus ut chronicum magis fiat malum; sed difficilior curabile, si in teste relinquens, quae quandoque in scirrhum degenerat & hydrocele, & alia adhuc peiora mala sequuntur. est, in lue inveterata praecipue virus venereum, per testes, ad testes deponi posse: nec improbabile videtur, post hanc gonorrhoeas toleratas, miasma illud morbosum testibus se, quum locis affectis satis sint vicini. Interim in illis casibus habui, semper aderat gonorrhoea; & binis vicibus, mox insequabatur acris, & copioso fluxu insignis, gonorrhoea, tumore in teste subita ac notabili. E contra, gonorrhoea si subito cessaret, vel insigniter minueretur, observavi, meos testis tumorem; omnium maxime, si signa docerent, sedem ostentat haerere; quod semper suspicandum credo, ubi ultimo tandem urina, per penem exprimitur copia materiae gonorrhoeicae. aegrum curandum, qui recenti quidem, sed virulenta adnotat gonorrhoea; cui & corpora cavernosa penis intumescere post novem dies, adhibitis animose optimis remediis, emendata erunt omnia mala, fluxus antea viridescens in album colorem transiit. Periculosissima plurimum emendata, penis tumor sublevis. Pertacius severae dietae, quum omnia in vado esse crederetur, insalutato hospite, ut libere genio indulgere posset. Post quindecim diebus, suppressus esset omnis fluxus; sed testis dexter intumescere sum.

summo cum dolore: suo damno prudentior, morigerum se fore per omnes deos iurabat: sequenti die coepit redire fluxus; qui in dies augebatur; minuebatur dolor & tumor testis, & mensis spatio integre curatus fuit.

Ab adstringentium remedium usu imprimis, si in penem talia remedia iniicerentur, testes intumuisse vidi aliquoties: omnium frequentissime, ab imprudenti usu *balsami copaybae*, *terebinthinae*, eiusque olei *Bellarii*, *balsami sulphuris* &c.

Homo triginta duorum annorum siccae & calidae temperiei, ex vicina urbe ad me advolavit, ostendens testem dextrum, tumentem, & acriter dolentem. Falsus est, quod ante quinq; septimanas virulenta gonorrhoea, una cum ulcere venereo penis laboraverat: ex consilio barbitonioris sumferat copiam *balsami sulphuris terebinthinati*; quod uti notum est, ex sulphuris floribus & oleo terebinthinaceo aethereo componitur; simul aderat fervidissimus aeris calor. Quum se cessante fere fluxu sanatum crederet, rediit ad antiquos mores, & coitum dum utebatur, iam imminente seminis eiaculatione, sensit subito dolorem acerrimum, qui versus testem dextrum vergebat; paulo post sanguinolentam minxit urinam, & testis dexter dolens intumuit; quae mala sequenti die adhuc augebantur: post biduum gonorrhoea rediit, licet parca tantum copia, & testis coepit detumescere: sed sequenti die dolor tumorque testis augebantur denuo: urina dabat copiosum sedimentum; testis: tumentis durities minuebatur; & pergebat gonorrhoea fluere, aucta sensum copia: dolor adeo levis iam erat, ut lenem testis frictionem, quam propriis digitis tentabat aeger, absque molestia ferre posset. Fluxus gonorrhoeae erat albus cum levi tantum stranguria. Decima sexta die post coeptum testis dextri tumorem, in inguine sinistro buboangebatur; qui tamen brevi post disparuit integre; & adhibitis bonis remediis, de quibus postea ad §. 1461 dicitur, integre convaluit.

Ex his apparet testis tumorem saepius nasci a suppressi gonorrhoea; praecipue, si circa prostates malum sedem fixerit; sicque a tumentibus his, & vicinis, liber transitus per orificium valis deferentis impeditur. Unde, dum redit gonorrhoea, detumescentibus his partibus tumor & dolor testis: affecti minuuntur brevi; quod non fieret, si causa mali in ipsa testis substantia haereret. Confirmatur inde, quod testium tumores venerei tunc imprimis in historia luis occurrant, postquam gonorrhoea coepit.

Quam periculosus usus sit *balsami sulphuris terebinthinati*, & similium in gonorrhoeis curandis, patet ex miro illo casu, quem ad §. 432 tom. I pag. 768 recensui. In hoc homine nulla omnino suspicio aderat luis praegressae, aut praesentis; nec unquam gonorrhoeam passus fuerat; levem patiebatur stranguriam sine ulla causa cognita nata. Olim simile malum cessisse usui balsami sulphuris reminiscebatur; unde denuo illud sumit, & quidem repetitis vicibus; irritum non tantum, sed & infortunatissimo cum successu. Ingens enim secuta fuit inflammatio genitalium in gangraenam terminata; a qua vix evasit, & binis in locis urethrae pars per gangraenam consumpta cecidit; unde postea tota vita urinam per hiatus in perinaeo relicturna dimisit. Remedia haec; acri

1450
acrius, & deo con
miseri, post integri
am, quibus eius de
interdixit, quod si
deque omnia post e
thasie parit. Sero
tere eliminatio in
si a luis, relictis
non apparet in
perinatioe luitur

§. 1450 Ue

millitibus

Ex 1450
miseri, post integri
am, quibus eius de
interdixit, quod si
deque omnia post e
thasie parit. Sero
tere eliminatio in
si a luis, relictis
non apparet in
perinatioe luitur

1450
acrius, & deo con
miseri, post integri
am, quibus eius de
interdixit, quod si
deque omnia post e
thasie parit. Sero
tere eliminatio in
si a luis, relictis
non apparet in
perinatioe luitur

in vias urinarias agunt, uti notum est; in uatriduum ab assumpto hoc sulphuris balsamo, ingratum, simulque copiam crassi mucosi fecerit ab acrioribus diureticis assumtis; & quam applicationem emplastri vesicatorii ex caninguria molestissima aderat, sequente valido do-

optimae temperiei homine tanta mala fuerint sed-
nedii usum, quanto plus metuendum erit, si per
italibus talia propinentur?

unculae, stranguriae, erosio urethrae, prosta-
, colli vesicae, vasorum feminalium; similia

1447 de gonorrhoea in utroque sexu dicta fuerunt,
c recenstorum facile colligi poterit. Stranguria enim
ae internam superficiem oblinientis, ab eiusdem inflam-
ulcerosa facile intelligitur. Dictum tunc si nul fuit,
ia gonorrhoeae specie, prostatas, vesicae collum, vasa
omnia exedi. Superest tantum, ut dicatur de caruncula,
ialo, de cuius indole, & curatione nondum unanimis
m sententia. Pro carne luxuriante plures habuerunt ca-
namus (b) describens mala, quae gonorrhoeam sequun-
r., sic habet: Nonnunquam etiam, erosa atque excoriata ure-
ioris fluxus natura, in carne nova vice iam depridat iusto
quandam & spongiosam substituit, quae mole quotidie aucta,
a, caruncularum excrecentiis ita meatum urinarium infrexit,
non detur exitus; quae quidem carunculae nihilo minus ex ul-
tis ichorem quemdam evomunt, & tum medico crucem figunt in-
tum aegro magis ipsa morte timendum malum. Facile patet a-
rianto angustari cavum urethrae, & impediri liberum urinae
e veram ischuriam, sive integram suppressionem urinae sequi
ascitur tale malum, nec tamen integre replet urethrae cana-
on exit pleno rivo, ut in sanis solet, sed tenui filo, aliquando
to, dum in quodam urethrae loco carunculae rati fungosae
vi vesicae se contrahentis, & valido nixu aegri propulsa.
meri malum, urina guttatim prodit, & sere tota ab hac obita-
supprimitur. Miseri tunc aere copioso inspirato & retento
desperabundi, conantur urinam exprimere maximo molimine,
tum medentibus spectaculum exhibent. Interim omnia haec
ta demonstrant tantum impediri liberum
ucinae exitum ab obita-
culo

ri possit pro maxime communi; ut quidam vo-

lictum fuit, in parte penis inferiori locetur, talia
difficiliter possit viderur. Celebris Antonius Be-
m laude chirurgiam docuit, & exercuit in no-
ad s. Mariam novam dicitur, dum de causa
uentus neusari solet, notat in Hecuria plurimos
carunculae, five tuberculo circa collum vesicae
esse tribuendam, quae cessat, si tale tuberculum
tunc a suppuratione, & rupti abscessus purulenta
urinae excernendae restitui: unde methodum me-
dirigebant omnes. Fatetur Benevoli, quod haec opi-
um non adeo difficulter potuerit catheterem in
retentam urinam educeret; quod ipsi videbatur vix
staculum impediret egressum urinae ex vesica.

veribus hac ischuria mortuorum inquirere in causam
dignissimus vir, quod omnia cadavera, impiis in
praeceat, mortuorum ex hoc malo inciderit; nunquam
nram talis tuberculi circa collum vesicae, nec in vi-
em his cadaveribus constanter vidit internam superfi-
ci, & omnino spoliata mucos naturali, quo detendi-
n urinae: quandoque etiam invenit in loco illo vesicae,
aliquam excoiationem maiorem minoremve, prout
erat, vel non: ita ut post diurnam urinae suppressio-
vesicae plus excoiata, imo quandoque nigricans in-
in plurimis ex his cadaveribus vidit prostaticam non pa-
amen invenit suppuratam, aut alio modo inquinatam.
us inclinat egregius ille vir hanc ischuriam non natosi
tequellam excoiationis internae membranae vesicae,
ae exit per catheterem una cum urina non esse pos-
internam superficiem vesicae, cui aliquando sangui-
is vesicae vasis venire potest. Quum autem in ca-
a tenesmo internam superficiem & irritum intestini recti exco-
didit perpetuum & irritum tenesmus reddendae uri-
li vesicae excoiatione nasci. Unde etiam post ani to-
r eadem molestia in reddenda urina, quae quandoque
turbida, viscosa, & sanguinolenta, ut in puello sic
um in vesica latere suspicarentur (6): exitus tamen
cuit.

sic intelligi, quare dysuria, five difficultas urinae fiat,
ur, cur a tali excoiatione ischuria fieret, five totalis uri-
viscilitatem auctor sentit, & illam diluere conatur (6)

va.

(6) Ibidem pag. 44.

Cap. II pag. 42 & 43.

vario modo; sed non videtur facile allatis. ibi argumentis sententiam suam probare posse. Ex casibus enim practicis, quos allegat, videtur potius concludi posse excoriationem vesicae effectum esse ischuriae praegressae, quam causam. Dum enim vesica in totali suppressione urinae distenditur immantari, & mora, urina fit acrior, mirum non est vesicam inflammari, suppurari, excoriari posse, secedente interiori membrana. Aliquot tales vidi casus, plures in historia medica habentur, qui modo dicta confirmant. Quum auctor ipse affirmet, quod in maxima parte cadaverum talium inveniunt prostatam non leviter rumentem, posset verosimilius huic obstaculo ischuria tribui. Ex dictis saltem hoc pater, non adeste toties carunculam in urethra, quoties creditur. Observavit enim Morgagni. (i) in cadavere asthmatici, signa, quod urethra olim exulcerata fuerat: *Aderant tres quatuorve chordulae albae, tendineae, in transversum ductae, non valde prominentes, nec usquam se ab interna urethrae membrana sciungentes. Erat intra has chordulas intersitium; tum medio firme inter primam & ultimam loco urethra se sano spatio, quantum duo circiter occupassent transversi digiti, caudatata, ut ibi dimidio propemodum, quam supra, aut infra. esset angustior.* Quum autem & chordulae in urethrae cavo prominenter eodem loco, specillum non poterat transire, nec a glande sursum, nec per urethram discissam, ubi prostatica definit deorsum: nullius tamen excrescentiae carnosae meminit, quae certe tanti anatomici oculos non fugisset, si adfuisset.

Haec causa dysuriae, & ischuriae a sola strictura urethrae pendens videtur satis frequens esse; imo celebris. chirurgus (k) credidit, esse omnium frequentissimam, & obtinere quandoque in parvo loco tantum urethrae, aliquando ad notabilem longitudinem; frequenter in tribus quatuorve locis diversis; & talem constrictionem sufficere producendis omnibus illis malis, quae carnosae excrescentiae urethrae tribui solent.

Contractilitatem nimiam in membranosis corporis partibus quandoque difficiles morbos producere certum est. Sharp (l) quater viderat intestinum rectum adeo contractum circa anum, ut in uno ex his aegris cavum intestini non excederet diametrum calami scriptorii; cicatrices vulnorum & ulcerum sanatorum relinquent saepe talem constrictionem per aliquot septimanas, & menses; hinc mirum non videtur, tales urethrae stricturas frequenter occurrere post gonorrhoeas, praecipue saepius repetitas. Hoc autem mirum videtur, quod quandoque multis annis post sanatam gonorrhoeam recurrat tale malum. Incipiunt cum molestia urinam reddere, quae sensum augetur, urina tenui filo exit; sequitur talis urinae suppressio; omnium maxime, si comotationibus & pergraeationibus indulerint impensius. Notum est, quantopere omnia turgant in corpore, dum venae hesterno inflantur ischio: forte leve in urethra impedimentum, quod absque noxa ferri potuisset, canalem obturat, dum vicinis vasibus subito turgentibus, irritatur contractilitas urethrae, sicque angustatur canalis amplitudo.

No.

(i) De sedibus & causis morbor. tom. II pag. 197 & 198.
enquiry &c. pag. 143 &c.

(k) Ibidem pag. 144.

(l) Sharp criticae

minuantur mo-
hra contracta: ^{lestiae, si crassiori candelula, aut}
contingere possit. ^{dolor enim ac stranguria leniun-}
di minueret. ^{unt aegri. Mirabatur Sharp (m),}
idem contingere. ^{dolorem. Verum observaverat in}
ligiti (ut ^{fieri), adeo ut illorum apices}
soler ^{dolore, qui minuebatur eadem}
cum magno ^{idonea ligatura in hoc situ reti-}
antur digiti, & ^{antur digiti, & semel}
extensionem ^{fieri debere non simul & semel}
tiam in dilatatione ^{urethrae successive crassiores}
digiti penitus in ^{rectum extensis fuerant, cessabas}
ac sibi relictis. ^{sponte iterum contrahi inciperent.}
adeo levamen. ^{sensationem tales aegri ab urethrae dila-}
possit, suppuratorem tam brevi tempore in ure-
per quam larens. ^{obstaculum in canali potuisset con-}
ui, & simul educa ^{candelula, aut stylo distenden-}
uria, patet levamen illud. ^{tribuendum esse sustenta-}
validam contractionem ^{nituntur.}
ibus. ^{similibus observatis quidam erediderunt earum-}
in canali urethrae, ^{quum tot aliae causae cognitae sint,}
mala producere, ^{quae his carunculis tribui solent.}
collegit celebris in ^{his morbis curandis Daran (n),}
(o). ^{raro contingere, solas carunculas adesse in-}
que comites ^{habere stricturam urethrae, cicatri-}
entias, corporis ^{spongiosi urethrae (quae certe ad ex-}
nent), ^{tamen fatetur, quod & carunculas viderit}
vae molis, ^{ut aciculae caput non superarent; unde}
posse canalem urethrae, ^{nisi & aliae causae simul}
minutae adeo ^{molis carunculas neglectis fuisse ab-}
rimabantur ^{ischuriae causas, quum longe maioris}
hosas. ^{exspectarent se inventuros, & ideo caruncula-}
isse: ^{verosimile quoque videtur, quod fungosa illa cor-}
apla multum ^{minuantur mole. Observatum fuit, uti}
en fuit, ^{ubi de signis calculi vesicae agebatur, vesicae}
videri quandoque ^{carnosis excrescentiis diversae molis,}
tinatione quasi ^{substantiae, a collo vesicae product-}
videtur, ^{si in canali urethrae similia contingerent.}
p excrescentias. ^{tales, etiam parvas, multum mole-}
thra virginis, ^{occupantes orificium meatus urinarii,}
cerbissimo dolore ^{excruciantes; qui non cessavit, prius}
essent. ^{Addit, quod aliquot urethras dissecuerit, in}

Sec. pag. 145.
op. pag. 30. &c.

(n)



Observat. chirurg. sur les maladies de
Critical inquiry &c. pag. 160, 161.

tas naccidas **b** pelliculas cum urina, quae refere-
 ugatas, dum **b** revi decident; quum tamen semel
 pro certo nollen **&** adfirmare.

is dysuriam **&** ischuriam post gonorrhoeam
 centis carnosiss, sed & plures alias causas ea-

Verum videmus **&** olim plures medicos ac chirur-
 e cogitasse **&** ad has delendas vulneribus & ul-

um autem **&** carnem fungosam in vulneribus & ul-
 bus reprimi **non** infeliciter nosset, imo & eroden-

catis consumi **posse**, hinc & cogitaverunt de simi-
 ae applicandis, neque semper satis solliciti fuerunt,

as monirent **contra** erodentium actionem. Sic **P**
 clinder plumbeus **&** urethrae imminatur, cuius extre-

m scabrum sit **&** asperum instar limae rotundae;
 carunculam, **&** deinde agitari, ut sic abradantur,

restentiae carnosae. Satis ruditer hoc faciendum vo-
 notabilis haemorrhagia; quam tuto deduci posset

& instrumentum scindens, quod tuto deduci posset
 eculam usque; tuncque iubet penem debere premi

ndentem, ut sic tollatur caruncula. Dedit quoque me-
 & rodentes pulve-
 mo & viride aeris, **auripigmentum**, viriolum Romanum

ue cautelam adhibuit, ut sola haec caro fungosa tan-
 tibus, & reliqui super facies urethrae immunis maneret.

anc methodum imitati sunt. Sic legitur (7), quod
 lomine, cuius urethra fere tota malignis callosisque

t, immiseris in **illam** specillum incurvatum argenteum,
 ris usum, cuius **ope** quamvis non sine ingenti dolore,

urium, ut illico **urinaem** quodammodo reddiderit miser.
 is has callositates **con-** sumere; sed incautum. Unde to-

hem excepta glan- **de-** incidit, corrosidente remedio to-
 am consumit, dein **urethram** parvis acubus argenteis

labii leporini fieri **solet** immittebat autem simul tenuem
 urationis tempore, ut liber urinae exitus conciliaretur.

us homo ille impudenter iactabat postea, se propter no-
 es, latis meretricibus **gratiorem** fuisse, quam antea.

vicur hanc curam, quae totius urethrae dissectionem requi-
 lam, quae erodentibus **per** urethram integram ad locum

is tentatur. Nunquam tutus esse poterit rodentium
 dirigere possint. Dum similia tentantur ab imprudentissi-

udacia stupidissimam **igno-** rantiam aequat, quanta sunt me-
 tuen.

page livre XIX chap. XX
 vel observat. rar. par
 F

VII pag. 498.
 2 observat. 40 pag. 410.

tuenda mala! Miserrime tales aegros sic perisisse vidit insignis chirurgus (r), qui floruit cisca finem seculi; imo & quandoque perisisse viginti quatuor horarum spatio, postquam candelula rodenti remedio obducta in urethram dimissa fuerat. Sed, quum ille auctor crederet, nunquam in urethra cavo carunculas inveniri, unicam spem talis ischuriae sanandae posuit in dilatazione successiva urethrae per candelulas sensim crassiores immisissas, & dia gestatas, dum simul his malis obnoxii sobriam vitam degerent: observatur enim frequenter haec mala recrudescere, dum comestationibus, & pergraeationibus indulgent iocantur.

Prudentiores chirurgi, licet de consumenda excresecientia carnea in urethra cogitarent, mitioribus remediis, & maiori cautela adhibitis rem aggressi sunt. Candelae coeae crassiores explorabant urethram, donec tangeretur obstaculum, quod liberum transitum per urethram impediabat; mensurabant longitudinem, quae urethram ingrediebatur; sicque exacte determinabant locum, ubi haerebat malum. Si plura talia aderant obstacula, sic poterat distingui, an primo sublato iam profundius in urethram demergi posset candelula.

Quum autem cera, ex qua candelulae illae parantur, antequam calore corporis mollescat, satis quandoque fragilis sit, & urethra per penis partem inferiorem decurrens aëri exponatur ambienti, conigit aliquando ceram frangi integro manente ellychnio; unde in hoc loco angulum faciebat candelula, & vix sine laesione educi poterat: ob hanc causam tela vetustissima, & tenuissima obvolvi candelam curaverunt chirurgi iam seculo decimo sexto (s). Hodie, uti notum est, vix candelis cereis utuntur, sed turundas ex linteo convolutae, & sparadrapum in modum emplastica medicata materia imbuta adhibent; quae frangi nequeunt, sed semper integrae educi possunt.

Extremum talis candelae inungebant eiusmodi remedio, a cuius applicatione sperabant leni erosione, vel & suppuratione consumi posse obstaculum, quod liberum urinae transitum impediabat; dum simul conabantur hoc efficere, ut remedium tale exedens non irritaret reliquam urethrae superficiem internam. Alii tubum argenteum cavum per urethram protrudebant ad obstaculum usque; & dein per hunc tubum deducebant candelulam minorem, vel turundam in apice erodente remedio imbutam. Tale unguentum describitur (t), quod acris erodentia non habet; sed potius exsiccat; *terussam, tutiam, lithargyrium, antimonii pollinem &c.*; addito etiam opio, ut sensibilitas loci affecti minueretur. Haec, & his similia sufficere possent, si luxurians caro fungosa dicta tale obstaculum constitueret tantum. Sic pergebatur per 15, 18, aut 20 dies iuxta mali magnitudinem, & prout carnis erat visibatur aperiri, ac in pus residu. Nunquam enim tutius poterit obtineri talis curatio, quam per blandam suppurationem. Quum autem videbis urinam libere & facile reddi, pauco pure turbatam, tunc oportebit primum unguentum *griseum* (quod nempe cerussam, tutiam &c. continet) a candelula tollere; sed illines iandelam rosam secundo unguento (quod ex un-

guento

(r) Saviard nouveau recueil d'observat. chirurg. tom. 74 pag. 325 &c.
(s) Astruc de morbis vener. tom. II pag. 817. (t) Ibidem.

iasis camphorato, & pomato sine speciebus,
decem dies, quousque pus non amplius effluat
iter mendum percipitur, quo tempore absti-

celictum fuisse campum versatis in arte viris,
adam hanc molestissimam ischuriam, quae toties
r, & frequenter redit in multis, qui se integre
eros credebant.
in votis habebant, quam invenire methodum,
us possent deleri haec urethrae obstacula, absque
s, & pessimis symptomatibus, quae imprudentes
it, saepe non sine vitae periculo. Efficax requi-
simul: absque omni dolore, & molestia curam
nt; debebat tamen evitari, ne tanta haec essent,
Bammatio. Quum autem toties suspicio adsit in
gium, mirum non est, argentum vivum, & varia
fuisse, ut illud deleteretur non tantum internis re-
licatione similium ad ipsum locum affectum in ure-

Petronius, qui ante bina secula de lue venerea
recipitatum rubrum ad earunculas urethrae consu-
t vulgare illud officinarum, quod ex argento vivo
acritatem decoctis paratur, sine periculo vix adhi-
recipitatum, quod in se contineat, hinc valide ro-
vel argento mistis die digesto paratur. Dein addit
tribusdam accipio) ex solo ipso argento vivo absque
posse, id profecto & omnibus anteponi debet, & mi-
hs. Neque nos deterreat, quod iidem dicant, id egere
ut, puta, decem plurimumque mensium, & summa sum-
e enim, quae minus paratur, impedire quidem potest;
gis quam alia proficit, non potest. Interim & laboriosa
alia, licet minus acria sint illis, quae per additos
anticiuntur, tamen non careant omni acrimonia; ut
sum. 4 monui
se iactabant felicissimos esse in curandis his malis, ce-
sic Trincavellii, & Alexandri Massariae testimoniis
am, natione Gallus, qui Venetiis tamquam peritissimus
tis his inclauit, & post illum eius filius. Candelulas
quarum apices obliniebat medicamento quodam ero-
nte, & ad cicatricem deducente, remedio urebatur.
Dux obtinuit, qui illud avo Francisii Roncalli me-
cavit. Constat una parte unguenti cerussae camphorati,

(*) Aphrodisiac. pag.

& binis partibus augenti de iuria Vigenis, quibus simul milis addebatur praecipitati rubri subtilissime trii talis copia, quae sufficiebat ad massam rubro colore tingendam (*). Certe prudentius fuisset limitare accurato pondere quantitatem praecipitati rubri, quam colore massae, cuius intensitas variare admodum potest.

Henricus IV Franciae & Navarrae rex per octo annos stranguria, & dysuria laborasse legitur (y), quae antiquioris gonorrhoeae pedisequa erat; & simili methodo intra quinque hebdomadas sanatus fuisse dicitur. Pulverem, cuius praeparatio secreta mansit, butyro recenti mistum ope cannulae, super urethrae carunculam levi & suspensa manu deponere vespere *Lyssem*, qui medici & chirurgi regii munere fungebatur; sequenti mane blandis remediis eluebat urethram: sic perrexit, donec consumpta foret caruncula, & postea cicatricem facientibus remediis utebatur &c. Licet autem medicus ille natu grandis, & emeticus foret, orbatuque filio, quem suorum arceporum heredem destinaverat, tamen in occulto reliquit remedia, quibus utebatur. Usque adeo magnam vim consuetudo obtinet in plerisque, ut ea, quibus assueverunt olim fructuosum fuit, pergant agere, etiam dum sibi nullus inde fructus salutaris est (z).

Alii adhibuerunt alia remedia ad carunculas urethrae sanandas; plerumque admiscebant mercurium vivum, vel crudum, vel leniora praeparata mercurialis, praecipitatum album, mercurium dulcem &c. Omnes laudaverunt sua remedia, & felicissimos inde effectus se vidisse testati sunt. Plerique solliciti texerunt arcana sua, ne revelata vilescerent sorte, & lucrum, quod inde sperabant, minueretur. Singula haec anxie rimari nimis longum foret, nec forte taediosum laborem compensaret utilitas. Sufficiet speciminis instar quaedam dicere de candelulis, quibus usus fuit *Iacobus Daron*, qui in exercitu & nosocomiis Caesaris olim stipendia meruit; postea chirurgi regis Galliae honorificum munus adeptus caruncularum urethrae curationi operam praecipue impendit, & tractatum edidit (a) de nova methodo curandi haec mala. Attente legi hunc tractatum, & inde collegi sequentia.

Turundae, sive candelulae sic dictae ex basi latiori in apicem desinunt, flexiles sunt, vel saltem calore ipsius urethrae sic mollescent, ut debitam flexibilitatem acquirant, & commode ab aegris gestari possint.

Effectus est suppuracionem excitare in urethra, & per hanc fundere, ac consumere carnes fungosas, excrescentias, verrucas; sed absque erosione: simul sub harum usu prodit fluxus materiae gonorrhoeicae, flavae, viridescentis; sique gonorrhoeam, quam suppressam statim dedisse originem his malis, redintegrat, & quasi recentem reddit: hoc imprimis inde probat, quod aegri in illo curationis stadio, si coeant cum femina, illam inficiant.

Turundae istae dicuntur habere mirabilem hunc effectum, ut non agant in partes sanas urethrae, sed tantum in illa eius loca, in quibus haerent obitacula, ure-

(*) Astruc de morbis veneris tom. II lib. VI pag. 761.
pag. 897.

(z) Ibidem pag. 898.
les maladies de l'urethre &c.

(y) Ibidem lib. VII
(a) Observat. chirurg. sur

ae sic suppur^{atione producta} consumunt. Unde
is introduc^tae nihil faciunt, quum careant vi
illum dolorem^{excitant, licet adeo prompta sit}
quatuor hor^{is post harum applicationem} pus

, scirrhasas indurationes solvi posse testatur: hoc
en inde patet, quod scirrhasam duritiem bul-
se non potuisse curare fateatur auctor.
describitur curae tempore; pauca, vel nulla re-
tur; sed tota curatio a topico hoc remedio ex-
fectum tangere possit. Ubi tamen curatio ultra
ar, tunc specifico ad virus venereum delendum
auctor.

ulas triginta dierum spatio absolvitur, quandoque
va mentes, imo & diutius in casibus difficilioribus.
curatione candelulae variae efficaciae pro diversitate
ndum erat. Quamvis autem nullum dolorem excitari
fatur tamen auctor, quod quandoque immiserit in
dynas, quae dolorem lenirent a prioribus productum.
e in initio curae candelula profunde in urethram de-
currie obstaculo in urethrae principio haerenti; quo per
m ablato profundius demergitur, donec novo obstaculo
methodo removenar, do nec tota urethrae longitudo peni-
surgenti prodeat ampli-
adhaerere observetur. Sic enim certitudo integrae cura-
que recidivae metu. Quum autem statuat auctor vim
locum, ubi haeret. ob-
superficiem sanam ure-
ula longitudinem &
delulae in illo loco, qui
s quidem in are viri
ulam sic irritari sensilem
ci naturalis, quo cavum
od prodelis diutius in
sed pro mucos naturali
sequenti argumento: affirma-
fani hominis, qui nunquam
etiam, dum educitur, pro-
omittatur, & adhuc prodire
educatur, & adhuc hominis, qui gonorrhoea laborat,
contingere debuisset citius, crassam materiam in super-
sens foret mucus natura-
maiori copia secretus. alis, per irritationem candelulae
regi hoc mucos, non Praeterea notat totum candelulae
e in affecto; quod co- vero solam illius partem, quae
laco tanter fieri, audacter affirmat.

Egre.

Egregius in arte chirurgica *Samuel Sharp* (b) solito suo candore fatetur, haec argumenta *Daran* magni esse ponderis; fulpicatur tamen haec experimenta non satis frequenter repetita fuisse in hominibus sanis, qui nunquam gonorrhoea laboraverant; quod probari videtur ex ipsis verbis *Daran* (c), qui dicit, se hanc veritatem probasse experimento, quod se repetiturum promittit toties, quoties desideratur; addit postea sibi videri parum utile illud experimentum; quam asserti veritas satis pateat ex eo, quod materia purulenta tantum adhaereat candelulae in illo loco, qui obstaculum in urethra tetigit.

Ut hoc dubium elucidaret ulterius *Sharp* (d), persuasit adolescentibus, variae aetatis a duodecimo ad vigesimum annum usque, ut paterentur sibi in urethram introduci candelulam; quae, dum postea educeretur, semper aliquam copiam materiae habebat adhaerentem, maiori quantitate in quibusdam, minori in aliis. Certus autem erat, *Sharp* nullum ex illis, in quibus hoc experimentum tentabatur, unquam laborasse gonorrhoea. Vario tempore has candelulas in urethra reliquit, sex nempe quinque, quatuor, vel & tribus horis. Non describit quidem auctor, ex quibus remediis fuerint compositae candelulae, quibus utebatur: simpliciter enim vocat *candelulas mercuriales*. Vetum concipere non poterat, tam brevi temporis spatio ab his in urethra sana pus produci potuisse; unde concludebat materiam candelulae adhaerentem non fuisse pus ulcerosum, sed mucum naturalem, per candelulae irrationem copiosius secretum. Quum autem opponi posset, candelulas *Daran* esse longe maioris efficaciae, nec producere novum pus intra paucas horas, sed latens in ulcere recto pus educere, dein locum ulcerosum depurare, & sanare depuratum, postquam omne miasma venereum per hanc suppurationem, fluxumque exeatam, ablutum penitus fuerit; ut hanc difficultatem elucidaret *Sharp*, candelulam, quam certus erat methodo *Daran* compositam fuisse, & quam fortuito acquisiverat, urethrae sanae immisit; omnino similis sequebatur effectus, ac in prioribus experimentis, dum propriis suis utebatur candelulis.

Quum autem *Daran* per totam Europam fere dispergeret emissarios, qui in maioribus urbibus candelulas eius distribuerent, non difficile erat illas comparare. Unde merito concludi potest non demonstrari ulceris praesentiam in urethra, si post applicationem candelulae, aliquid effluat ex urethra, quum & in sanissimis idem contingat.

Magnum certe beneficium praestitit generi humano optimus *Sharp*, haec experimenta tentando in sanis, & ab omni suspitione veneris contagii liberi. Notum nimis est, plurimos, qui in iuventute fortituae veneri indulerunt, perpetuo metu cruciari, ne forte insciis lateat alicubi in corpore contagii veneris fomes, qui post seros annos in nervum erumpere possit. Fovent hunc metum lucripetae homines, & facile persuadent misetia, ut vel ipsam

(b) Critical inquiry into the present state of surgery pag. 134 & seq. chirurg. sur les malad. de l'urethre &c. Discours prelimin. pag. 35, 36. loco modo citato pag. 140.

(c) Observat. (d) In

minimum quidem luis vestigium adsit, tantum
 nuntur. Postquam rumor increbuerat his can-
 o pessimas horae sequelas, sed applica-
 horas detegi posse, an lateat in membro vi-
 qui postea recedat, non pauci sue-
 buerunt, ut ab omni metu forent liberi. Ab-
 (e) candelulam suam postea educitur, omni-
 o temporis spatio, dum postea educitur, omni-
 dem acutissimo oculo vel minimum peregrinae
 ntis distingui possit. Sans que l'oeil le plus fin
 ie liqueur cirangere s'y soit attachée. Quanto ter-
 olim gonorrhoeam passus, mucosam striam inveniet?
 elulae educitae superficie mucosae ambitu, sed
 praecipue, si non in toto candelulae ambitu, sed
 talem mucosam materiam adhaerentem invenerit.
 , quae ante ad §. 1447 de urethrae fabrica dicta
 contingere posse; quum in cavum urethrae hient
 excretoriosum maiora, quae post gonorrhoeam
 ofa, maiorem muci copiam illinunt candelulae im-
 em tangunt. De hac re adhuc quaedam dicentur
 rrhoeae curatio ne agatur.
 an egisse mala fide; sed videtur nimis praecociter
 exit de pene post candelulas applicatas esse mate-
 contagium venereum certo haereat. Unde monet,
 candelarum fluxus redit, ut abstineant ab uxori-
 . Notum est post gonorrhoeam bona etiam me-
 , omniibus molestis symptomatibus, superesse hoc in-
 mprimis post bonum somnum aliquid ex pene ef-
 pressionem exeat sub forma muci subpellucidi. Hoc
 & post excessus in cibo, ac potu, imprimis auge-
 incutit aegris, ne lateat aliquid virulenti. Observa-
 sic affectos cohabitasse cum uxoribus, nec illas in-
 se vidisse sequente. Notandum etiam videtur, quod
 affectione fuerit, dum designat mucosum illum fluxum,
 usus fuerit, quem praecedenti pagina Glect dixerat. Sed
 uentem, quod suppurationis nomine uteretur ad de-
 onuerat, quod suppurationis nomine uteretur ad de-
 sem candelula in urethra haerens exciraverat.
 ac sententia virus venereum latere in ulcere urethrae;
 rethrae ipso, qui locus ulcerosus, in fungosam substan-
 tatione candelularum consumeretur, sicque per suppara-
 virus venereum, & cum pure exire. Quandoque etiam
 la.

latere credebatur miasma venereum in substantia cellulari, five fungosa urethrae dicta, ibi manere iners, & quasi dormire, donec a pergraeationibus, vel aliis causis fortuitis redderetur actuosum, locum, ubi haerebat, undequaque distenderet, sicque canalem urethrae arctaret primo, dein obturaret integre, & totalem ischuriam produceret. Candelulis autem suis hanc tribuebat potentiam, quod ulcus tale clausum aperirent, detergerent, & omni contagio venereo deleto perfecte consolidarent. In hac suppositione non poterat non timere contagium, si maritus cohabitarer cum uxore illo tempore, dum, tectum antea ulcus, nunc apertum candelularum usu, funderet contagiosum pus, & virus venereum, antea silens ac iners, nunc redderetur actuosum.

Confirmat *Daran* multis observationibus suam opinionem, quae in tractatu eius de morbis urethrae legi poterunt. Inter illas imprimis notabilis est, quam egregius chirurgus de proprio morbo scripsit, a quo usu candelularum se curatum fuisse testatur (b). Laboraverat ille in iuventute gonorrhoea, quae solitis auxiliis curata erat integre, ita ut sanus viveret postea per viginti annos; & quum toto hoc temporis intervallo nunquam se exposuisset periculo contrahendae luis venereae, ab omni malo se immunem credebat. Mirabatur hinc, dum sentiret urinam tenuiori filo exire, & difficulter, cum dolore. Sed, quum chirurgi cohortis primarii munus gereret in exercitu, equitationem evitare non poterat; a qua difficultas urinae augebatur multum: uti autem exercitum in Italiam tendentem sequi debuit, defuit tempus, ut idoneis remediis malo succurrere potuerit. Inevitabiles moris, quod gerebat, labores, & aeris in montibus Sabaudiae inclementia, quam tolerare debebat, adeo exasperaverunt malum, ut stranguria quotidie incretisceret una cum excretionem muci viscidis, quem magno cum dolore exprimere cogebatur. Successit dein ischuria, vix non lethalis in dolo munus primere cogebatur. Successit abdicare debuit, ut propriis melius succurrere posset malis. Monspelium se deserti curavit, & medicorum celebrium ope insigni adeo levamen obtinuit, ut relictis viribus de castris denuo sequendis cogitare non tantum, sed & ad hybernas stationes excurreret, ut prodesse posset illis, qui ipsius opem anxie implorabant. Dum iam in proximo statet, ut ad castra pergeret, sensit parvum tumorem in perinaeo, qui cito augebatur mole, ita ut pugnum degeneraret malum, scapello dilatamen in urethra; ne autem in fistulam degeneraret malum, scapello dilatavit ipse aeger incisionem prius factam hoc cum successu, ut sanata post post binos menses nondum finitos castra sequi poterit. Sed brevi post ischuria secuta fuit per quatuor dies durans; a qua se evadere posse desperabat aeger. Evasis tamen; sed mucum viscidum magna copia excrevere, & ingenti quidem cum molestia, debuit. Omni spe sanationis deposita ad suos rediit, & saevos dolores per sex menses passus coepit candelulis uti felici adeo successu, ut testetur, se per mensem, & ultra frui integerrima sanitate, dum hanc morbi sui historiam scribebat.

Non videtur ex hac historia sequi contagium venereum latuisse per viginti an-

(b) *Daran* sur les maladies de l'urethre pag. 96 & sequentibus.

nullam praesentiam suae indicia dedisse.
 intervallo, miasma diu haerere posse, & diffi-
 dum luis miasma diu haerere posse, & diffi-
 rum videretur. Quum: lente ibi moveantur hu-
 oleum det apertum nidum contagio retento. Sed
 ac praesentiae indicia non obscura praebet do-
 ruptela. &c.-; de quibus postea adhuc dicendum
 ile in pene, eius corporibus cavernosis, aut ure-
 er tot annos virus venereum latere posse peni-
 a loco, ubi haeret, vel in reliquo corpore in-
 rigitur, turgit sanguine effuso in cellulam corpo-
 x ipsum corpus cavernosum urethrae ante semi-
 sanguine impletur. Post eiaculationem omnis ille
 it penem, per venas redit in humorum massam,
 rgitur; unde brevi staccescit virile membrum. An
 vivum, calidum, agitatam, alluentem fomitem in-
 ferorprum non inficere corpus? An non miasma
 veneriei excitatum rosisset, inflammasset loculum
 probabilis causa determinari posset, quae veneno
 tot veterum excuteret, ut illud iam oblitum no-
 tae & tanta mala?
 esse stranguriae, & ischuriae causae; unde nulla ne-
 edo fomitem venenatum, relictum a gonorrhoea ante
 edo ex illis, quae ad §. 1440 dicta sunt, sat s con-
 non cognovisset luem veneream, & tamen apud Hip-
 symptomata, quae hodie haberentur pro signis dia-
 thrae post gonorrhoeam natae. In Casis praenotio-
 gna vesicae inflammatae dederat, & monuerat pe-
 , qui a septem annis purulenta, h. bet sequentia: Quibus
 vereturque urinae purulenta inducis, quocumque situ d. cumbant,
 seam, quod dysuriae fit pure trumpe. Vocem illam
 ius autem subito intelligendam esse docet textus imme-
 rporis aegri intelligit, ubi monet illos, si tali in situ
 i de calculosis agit, meatum urinarium non dilabatur, faciliusingere.
 atur, dictum fuit, miferos illos tentare varium corpo-
 im a vesicae orificio removeant; imo & quandoque
 culus retrolabatur, & liber urinae exitus fiat. In hoc
 aecum vocabulum occurrit; quod igitur manifeste de
 intelligendum est.
 quidem cognovisse hanc
 rarem circa vesicam

dysuriae, & ischuriae causam;
 in vicinia eius: nam paullo ante
 de

de vesica inflammata & suppurata egerat. Sed & certam diagnosin dedit, qua distingui possunt molestiae per tale tuberculum natae a cruciatibus calculosorum. An non videtur *Hippocrates* hic loqui de illa parte urethrae, quam ambit prostatica, & quae vesicae vicina est? Talis tumor in glandulosa hac parte natus, dum mole augetur, comprimendo poterit minuere, & tandem delere urethrae cavum, ita ut dysuriam praegressam sequatur perfecta ischuria; dum simul manifestus tumor tangitur in perinaeo, qui aliquando extorsum rumpitur. Tunc autem mali origo in vicina quidem vesicae, sed extra cavum urethrae haeret.

Neque tantum extra cavum urethrae, in vicina vesicae, tale obitaculum nasci, quod urinae liberum exitum impediret, observavit *Hippocrates*; sed & in ipso cavo urethrae tuberculum nasci alio loco (k) monuit. *Quibus in urethra tuberculum nascitur eo suppurato, & rupto, solutio.* Quum autem solutionis vocabulum saepius adhibeatur pro benigna resolutione inflammationis, absque suppuratione sequente (vide §. 386), disputat *Galenus* (l) in commentariis ad hunc textum, an praeter suppurationem tuberculi, & rupturam suppurati, nulla alia solutionis via superesset, licet frequentissime tale tuberculum urethrae in abscessum iret. Concludit tandem verissimum esse, a sola suppuratione, & puris exitu curam expectandam esse. Unde patet per *solutionem* hic non intelligi blandam resolutionem inflammationis, sed tantum ablationem obitaculi, quod liberum urinae transitum per urethram impediēbat. Acris enim urina lente per urethram transit, & cum magno nixu exprimitur, dum cavum urethrae nondum integre obturatum est; ubi vero dysuria iam abivit in ischuriam, perpetuus adest tenesmus, & omnibus viribus urinam exprimere conantur; unde perpetuo irritatur tuberculum inflammatum; adeoque nulla blandae resolutionis spes superest: validis iisdem nixibus abscessus urethram obturans citius rumpitur.

Alio *Hippocratis* textu (m) confirmantur illa, quae de *solutionis* vera significatione dicta sunt. Sic enim habet: *Quibus in urethra tubercula procreantur, iis suppuratis, & ruptis dolor solvitur.* Constat ergo talia mala veteribus descripta fuisse, qui luem veneream non noverant; & hodie tamen communiter contagio venereo latenti adscribi solent. *Celsus* (n), qui plures *Hippocratis* textus latinissimo sermone reddidit, dum de his malis scribit, habet sequentia maxime notanda: *Quibus in fistula urinae minati abscessus, quos quidam Graeci vocant, esse coeperunt, iis ubi pus ea parte profuixit, sanitas redditur.* Ex quibus quum pleraque ex se proveniunt, siue licet inter ea, quae ars adhibet, naturam plurimum posse. Quum ergo a causis non venereis talia mala oriri posse certum sit, non videtur evidens ratio adfuisse, cur ischuria attribuat *Gonorrhoeae* ante viginti annos perfecte sanatae, ut causae. Verum quidem est, *Celsum* hic loqui de minutis abscessibus, & in chirurgo illo, cuius historia modo descripta fuit, tumor in pe-

(k) Aphor. sect. IV num. 82 Charter. tom. IX pag. 199.
 (m) Aphorism. sect. VII num. 17 Charter. tom. LX pag. 323.
 (n) De medicina lib. II cap. VIII pag. 70.

(l) Ibidem.

uabat: *Verum* in urethra tantam tumoris ex-
 istia, in *per* inaeo quidem. *Celsus* (o) autem
 quos in *istula* urinae minutos vocabat, posse
 is locis *corp* oris, ubi spatium datur. Sic enim
tuberculum *furunculo simile, sed rotundius &*
Nam furunculus *omni dimidii magnitudinem raro*
ma etiam latius *patere consuevit; sed inflamma-*
unt.

c fieri in hoc chirurgo a diuturna equitatione
 per integros viginti annos iam sanata? Certe
 per ob perpetuam equitationem in venerem
 a & tandem penitus steriles, & effeminatos,
 ia obeant, & loquantur ut mulieres. Tuncque,
 igna viam agnoscunt, & cum mulieribus victi-
 t. Notat *Hippocrates* hac affectione tentari opu-
 , minime autem infimos, sed generosissimos, qui
 onem acquisiverunt. Pauperes minus affligit hoc
 Dein subiungit sequentia: Quin & in reliquis ho-
 bes modum. Ubi enim plurimum, & creberrime,
 mi cedmatis, *istibiadibus*, & podagris corripiuntur,
 pessime se habent.
 udi posse, diuturnam, & frequentem equitationem
 virorum partibus, & in illis varia mala producere,
 ndum succussus, & pressioem non interruptam fere
 insidentis; ut alia occasione in commentariis ad §.

etur vocabulum
 primis iuxta cox-
 partes genitales.
 citato, dum rece-
 dagrae adnumeret
 videtur, quod per
 quam articulorum.
 non semper a malo
 sis: imo, licet olim
 per sit impedimentum
 treat morbosum virus
 nunquam sperari
 hura contrahi potest
 amentra transversim
 brunt aliquando, & re-

quae non semper significare lon-
 xendi cem defluxiones, sed & diutur-
 occ upat (q). Quum autem Hippo-
 enter mala metuenda a nimia equita-
 cedmata, & impotentiam ad vene-
 per hoc vocabulum potius designave-
 cedmata, & impotentiam ad vene-
 Ex dictis constat manifeste dy-
 venereo originem ducere, sed
 Gonorrhoea quis laboraverit, &
 in urethra, non semper concludi
 in hac parte, quod nisi extri-
 queat integra sanatio. Post gonor-
 a duris, rugosis ulcerum sanato-
 in urethra posita liberam urinae
 resistantiam non superabilem pro-
 du.

XXVIII num.

9 pag.

Charter. tom. VI

pag. 2

25.

(p) In libro de aere.
 (q) Vide Foëssii Oecon.

duxerunt catheteri inducendo. Omnia haec mala tristes reliquiae venerici contagii esse possunt; licet illud integre expulsum fuerit de corpore. Num quid ulcera venerica in cute externa, foedas, & contractas cicatrices relinquant, dum integre sanata sunt, nec in vicinis locis repullulant amplius? Has interim cicatrices, quibus quaevis remedia applicari possunt quam liberime, se sanare posse nemo facile promittet. Cogitetur iam urethram in gonorrhoea ulcerosam redditam similiter affici posse. Dum autem urethrae cavum angustatur a vicinis tumoribus, licet nullum adsit in ipsa urethra malum, uti saepe fit, ubi prostatae tument a quacumque demum causa, tunc tanta debet esse in candelulis, quae in urethra haerent, efficacia, ut illarum vis medicata per ductus excretorios prostatatum se insinuet, & solvat obstacula; sicque liberum humorum circuitum per illarum substantiam obstructam restituat.

Talia vero mala solent pro carunculis haberi, & simili modo tractari. Exemplum habetur in epistola *Theodorici de Mayerne*, Jacobi primi magnae Britanniae regis Archiatri, quam scripsit *Hildano* (r), de nobili viro, qui post gonorrhoeam in urethra carunculam habere credebatur, cuius extensio circa caput gallinaginis fiebat; quod & tumidum invenit. Quum autem urinam magno conamine emittere cogeretur aeger, & stillatim tantum, conclusit *Mayerne* hoc obstaculum sensim per cathaeretica exstirpandum esse; quod & prudenter tentavit, interposito subinde molliissimum remedium usu, ut irritationem ab erodente remedio natam sopiret. Probe enim movebat *carunculas* curationem plus cunctando, quam festinando promoveri. Tantum autem profecisse se hac methodo monet, ut pateas regia seminis & urinae via, atque amplo, continuo, recto filo reddatur lotium.

Urethrae canalis ergo erat liber quidem, sed remansit ulcus oblongum, respectu partis satis magnum, quod non potuit ad cicatricem deducere; quum aeger ob publica negotia ex Anglia redire deberet; unde reliquum, quod in cura perficiendum erat, *Hildano* commisit; & dein addit: *Ut facias exercitii nostri periculum, eiusdem tantillum mitto, quod tamen sit ad quatuor ingentes carunculas penetrandas, & exacuandas satis; si tardius opus perfecerit, animum non despondeas. Tuto, & incupido operari satius, quam cito, & cum periculo. Vanus nunquam eris medicamentis effellus; quem tamen accelerabis pro libitu mercurii praecipitati rubri additione.*

Verum ex alia epistola *Hildani* (r), in qua de eodem aegro agitur, patet malum nullo modo eo usque emendatum fuisse, ut sola cicatrificatio ulceris in urethra superesset, ut credebatur *Mayerne*: nam in Helvetiam redux nobilis aeger de ardore urinae, & de eius retentione adhuc conquirebatur; quae mala, emulsis, enematis, candelulis adhibitis satis facile levabantur quidem, sed in sinistra parte perinaei coepit sentire dolorem puncturum, non quidem adeo acutum, continuum tamen. Quum autem in diieta errores com-

(r) Epist. centur. num. 100 *Hildani* opera omn. pag. 103a.
centur. V observ. 64 pag. 454.

(r) Oper. omn.

iodum excessisset, foetorem insignem in urina
e materia quaedam viscida, spermati ranarum
Venae sectione, emulsis &c., leniebatur ma-
im saccharo potato multum videbatur emun-
induciae, accessit febris continua, ardentissima
matorius, ovum anserinum aequans in perinaeo,
o, tumore, & duritie scroti, ac penis; aderant
sima symptomata, quae instantem mortem nun-
us. Tandem in medio perinaei rumpebatur ab-
abilis, & plus quam cadaverosi foetoris, totum
& ingens ulcus remansit; quod tandem Hildani
& integre consolidatum fuit absque fistula re-
sphinctere vesicae, ita ut urinam continere po-
mali vigore.

ar sequentia, quae Hildanus (?) affirmat: *Ulcus*
versus vesicam tendebat, profundum erat, & ad
longo tempore male affectas existimo, tendebat.
n & ischuriam faciens in urethrae cavo haereat,
remedia topica ad locum affectum deduci; quae
ali varia esse debent; sed & simul cavendum est,
applicata remedia, ut tantum applicentur loco af-
sanam urethrae partem. Sic per tubum argenteum
sum ad obstaculum usque quidam deduxerunt talia
vel consumere possunt carnem fungosam, sicque
conciliare. Patet illa erodentia debere eligi talia,
ne vicinae parti sanae noceant, & periculosam in-
Simul apparet effritas, ut in arte periti diversa
varia conditione oblati, quod removendum est.
bellendam verrucam, veneream saepe satis callosam,
quae conveniunt, acrior gosa est, cavum urethrae obstruat.
eo constat; ut in aspero corpore limae fere instar
uisse methodus, qua praecedentibus dictum. Pariter
illam debatur. Vidi optimo esse, foramina oblonga, quae utrim-
ischuriae causam esse, foramina, & laceraretur, dum ca-
emum apicem catheteris, replevisse molli recenti bu-
a ingrederetur haec foramina, & laceraretur, dum ca-
protruditur ad vesicam. Foramina, & laceraretur, dum ca-
alore loci statim funditur exonerandam, dum enim in ve-
churiae haeret extra butyrum, & urina libere effluit.
ulis medicatis in cavo cavum urethrae, an tunc sanari po-
urethrae haerentibus, vix videtur.
Ipse

Ipse *Darus* candido faretur (*) candelulas suas non agere, nisi in partes, quas immediate tangere possunt; adeoque nec in prostates, nec vesiculas seminales, nec vesicam ipsam. Dat simul sequentia signa diagnostica, quae docent locum, ubi malum haret. Si pus praecedat urinam, ulcus haeret in cavo urethrae, & urina propellit pus, quod in urethrae canali collectum hiebat. Si vero urinam expulsum pus sequatur, illo nixu, quo in facis ultimae urinae guttae exprimuntur, tunc pus non fuit in canali urethrae; sed ex prostatica, quae ultimo illo nixu reddendae urinae comprimitur, in urethrae canalem derivatur. Simul & obtusus dolor percipitur, si prematur perinaeum in illo loco, ubi prostata locatur. In tali malo minus sperat ab effectu remedii sui, licet credat illud agere posse in ductus excretorios illarum partium, quae in canalem urethrae eructant suos humores, imo saepe easdem has partes sic in integrum restitui. Ubi autem ulcus prostaticum antiquius iam est, aut malignioris doloris, ita ut illarum substantiam destruxerit, tunc candelulis curari non posse statuit.

Sola enim tunc spes est, ut via fiat quantocumque per exteriora pertuso loco affecto in perinaeo; quod nisi factum fuerit, exeduntur omnia vicina, & horrenda mala sequuntur; uti patet ex casu modo enarrato. Tristissima talium morum specimina a neglectis aut male tractatis gonorrhoeis orta aliquoties vidui.

Varia adhibita fuerunt remedia ad liberandam urethram ab his obstaculis, quae a plerisque habebantur pro fungosa substantia ex superficie interna urethrae excrecente; hinc applicata fuerunt talia, quae in externis corporis partibus ad similes excrecentias carnosas tollendas laudabantur: prudentiores tantum adhibuerunt talia, quae sensilem hanc partem laedere non possent, vel si quandoque aciora tentabant, omnem possibilem cautelam adhibuerunt, ut haec tantum in carunculam agere possent, non in locum vicinum sanum. Quum autem multi fuerint in ea opinione, haec mala semper superponere latens miasma venereum in loco affecto, mercurialia erodentia praetulerunt reliquis; sed plerumque mitiora tantum; v. g.: *mercurium praecipitatum album*, *mercurium dulcem*, &c.: horum omnium vis adhuc pro lubitu infringi poterat, si copia minueretur, vel pinguius emplasticis admixtis sic obvolverentur, ut mitius agerent.

Alii maluerunt curam crudo argento vivo tentare; quum illud nullum dolorem exciteret; imprimis, si in vapores per ignem resolutum agat. Sic *Chevalier* (v) testatur se aliquot curasse vapore mercurii, ope infundibuli in urethram deducto; & hanc curandi methodum candelulis praefere, quae semper plus minusve molestiae faciunt.

Egregius chirurgus *Sharp* (x) praetulit mercurium crudum reliquis praeparatis mercurialibus; iussit autem illum subactum prius, & extinctum per *balisam sulphuris* intime permisceri emplastro *diachylo*; cui addebat pauculum de *pice Burgundica*; ut augetur emplastri tenacitas: addidit & partem *antimonii*.

(*) Sur les malad. de l'urethre disc. praelim. pag. 185.
sur les maladies de s. Domingue &c. pag. 97.
pag. 174 & seq.

(v) Lettres a M. de Jean
(x) Critical inquiry &c.

gati; non adeo, ut augeter vires remedii, sed
andelulis inde parandis consistentia firmior, &
horum ingredientium erat sequens: *Diacbytt*
e Burgundica partes quatuor, argenti vivi par-
tem unam. Simul exacte describit, quomodo
isceri debeant; uti & methodum candelulas in-
e omnes cautelas, quae in usu, & applicatione
iri debent.
dictum fuit, a constrictione urethrae sola simile im-
possit, plures tentaverunt dilatare urethram specillis
llorum crassiciem, ut gradatim haec distensio fie-
ossibus balaenae &c.; dum metuebant, ne specilla
antur; quod facile fieri poterit, si tenuiora fuerint,
gantur argento vivo, antequam in urethram dimit-
um est; ut non tantum distendendo urethram, sed
Notum est, plumbum facile penetrari ab argento-
vire. Sic talia specilla plumbea friabilia redduntur,
llorum educio tentatur. Fragmentum tale relictum
ctione educi poterit. Memorabilis talis casus legi-
celebris chirurgus *Le Dran* scripsit talis casus legi-
llorum educio tentatur. Fragmentum tale relictum
ctione educi poterit. Memorabilis talis casus legi-
pars specilli plumbei fracti in vesicam delapsa fuerat,
um dimidio, ponderis sex drachmarum. Medicos &
soluerat plurimis in locis, qui unanimiter statuebant,
ri posse; ad quam subeundam exhortabantur, simulac
veret. Antea, ubi de *calculo* agebatur, pluribus pro-
odcumque insolubile in vesica haerens posse dare ba-
eria calculosa semper praesens in urina etiam sanissima
immetiae molis; unde sequebatur non cunctandum
sensit *Le Dran*, & suscepit plumbum in vesica relictum
ac argentum vivum; tentavit varia experimenta, etiam
sicque vidit posse in *fluorem* redigi plumbum haerens
laesione. Quod plus est, in hominis vesicam plumbi
e in aegri domo decumbenti huic homini plumbum in-
ic, ut diffuseret. Quo experimento securus aeger curam
ran octidui spatio perfecit; per iniectiones in vesicam
um fluxile, ut exire potuerit; & dein illud in solidam
gro tradidit. Scripsit hanc epistolam octiduo post curam
auctor solvens illud remedium, quo curam hanc perfe-
legenti nascitur, statim argentum vivum adhibitum fuisse,
iceretur. Confirmatur autem ex eo, quod auctor affir-
non agere in *calculo* vesicae, sed magni usus esse posse
in

in solvendis globis plumbeis, qui chirurgi dexteritate educi non potuerint; verum consolidato vulnere in quadam parte corporis relictis fuerint, & alio quando molestiam pariunt.

Circa idem tempus literas accepi ab eruditissimo medico R. *Sanchez*, qui Parisiis literato in otio honoratam vitam transigit; postquam deposito munere Archiatri, quod apud Russorum imperatricem magna cum laude gessit, musis, & amicis redditus est. In illis literis testatur, quod Londino acciperet, egregium *Sharp*, cuius toties mentionem feci, detexisse unciam argenti vivi cum dimidia drachma bismuthi in amalgama redactum, & vesicae iniectionum solvisse plumbum in eius cavo haerens.

Apparet ex omnibus his ingenti remedium varietate obstacula haec in urethra nata fuisse tentata, & quidem vario cum eventu. Nec finis facile in his erit, dum unusquisque sua prae reliquis extollit. Iudicium autem de his formari nequit, nisi describantur medicamenta. Hoc candide fecit *Sharp*, uti dictum fuit, & a fide dignis viris audiui, simili cum successu has candelulas adhibitas fuisse, ac illas, quas sollicitè textit *Daran*, & quas dividuare conatus fuit anonymus auctor Anglus (*a*), qui inter ingreditentia numerat soleas calceorum combustas, aliaque plura. Fides sit penes auctorem.

Celebris chirurgus *Goulard* (*b*) usus fuit extracto saturni, ut vocat; quod est solutio lithargyri saturatissima in aceto vini. Huius liquoris unciam dimidiam miscet librae cerae solutae leni igne, dein huic miscelae linteum intingit, & postea inde candelulas format. Si his non cedant obstacula duriora, auget quantitatem extracti saturni, donec optatus sequatur successus. Pluribus observatis confirmat utilitatem huius remedii.

§. 1452. **H**inc fertur in membra, cum dolore nocturno medio artus occupante, ut & flexurarum rigiditate.

Ex illis, quae in praecedentibus dicta sunt, patet huius miasmata quandoque ipso infectionis momento in sanguinem refoveri, & circulantibus humoribus mistum, per omnes corporis partes moveri, posteaque ad diversa loca deponi, hinc & pro diversitate loci, ad quem deponitur varia mala producere.

Frequentius vero illud miasma solet in genitalibus partibus, pinguibus, aut mucosis humoribus inviscatum, sedem figere, & quum illud venenum potestatem habeat sanissimi etiam corporis humores ad locum affectum affluentes sibi assimilandi; ita ut contagiosi fiant similiter, patet, quare ex parvo ulcusculo venereo totum corpus successu temporis possit infici: quod in malo hoc inveterato fieri observatur; uti pluribus ad §. 1445 demonstratum fuit.

Illam mala, quae in superficie externa corporis a lue fieri solent §. 1444. 1445.

(*a*) Theor. and practice of surgical pharmacy London 1761, 8, pag. 224, & seq. (*b*) Remarques, & observat. pratiq. sur les malad. vener. &c. pag. 317, & seq.

unt, &c. descripta; simulque paruit, in ipsis
difficillimos morbos quandoque produci. Se-
de morbis partium genitalium, a lue ortis, ia-

de illis malis, quae observantur, dum terra
& tendines, membranas, ligamenta, ossa ipsa
rara contingere toties solet.

tunicam cellulosa latissime per totum corpus.

omnibus musculis interponi non tantum, sed &
tem muscularium fasciculos interferi, imo & lue

ad ossa ipsa, & ossium medullia, unde trituli-

ia sequentibus apparebit.

sium solent adultam luem comitari, recentem ra-

osteae ad §. 1467 dicitur, pro signis confirmatae

iam curam requirit. Illo vero tempore, quando

increbuit, etiam in morbi initio his doloribus ex-

egitur apud Gasparum Torellam (c), qui anno 1497

venerae scripsit, de Nicolo minore Valentino, iu-

venire: nam sequenti die apparuit ulcus in virga, cum

eadem die, qua rem habebat cum muliere puden-

fectus fuerit. Infectione coepit apparere in virga, uti

vidente versus inguina ad modum radii cum sorditie,

dies, ulcere semicurato, correptus fuit intensissimis do-

atularum, brachiorum, tibiarum, & costarum; & pra-

is, cum maximis vigiliis, a quibus molestabatur non nisi

num. Post decem dies apparuerunt multae pustulae

collo; nec malum ab eruptione pustularum levare vide-

, & pustulae manebant, nec augebantur, nec minue-

um spatio. Accesserunt & nodositates in membris.

norum (d), triginta diebus ab infectione virgae subito

m, totum corpus infectum fuit maculis latis rubris sine

nique diebus suis correptus, doloribus intensis capitis, colli,

e vero coeperunt cortices ad modum fursuris emittere. Po-

nt dolores per totum corpus, infestantes eum in nocte, &

aegro (e) morbus coeperat a doloribus, tandem post

tota die laborioso exercitio, in nocte, hora, qua mole-

s, a capite usque ad pedes correptus fuit pustulis grossis,

cum dolorum levamine.

symptomatum congerie

a afficere, nec ad eo cit

luis miasma humoribus mistum

ad eo cit in parte quadam figi, sed vagari

per

(d) Ibidem pag. 547.

(e) Ibidem pag. 550.

G,

per diversas partes, quarum functiones laedit, & locum mutaret. Saepius occurrit hodie, maculis, pustulisque in cute subito apparentibus, levamen dolorum sequi; & contra. Verum, ubi semel in ossibus ipsis fixum haeret, tunc dolores non tolluntur per materiae metastasin ad alia loca; sed penitenter haerent. Hoc autem a primis morbi incunabulis ad haec tempora usque constanter obtinuit, ut molestissimi illi dolores noctu ingravescant, interdum vero minuantur insigniter, imo quandoque & integre cessent.

Graphice luis progressum descripsit Sydenhamus (§), & dolores illos vages a fixis distinguit. Dolores tum caput, tum artus in articulum interficiunt, humeros scilicet, brachia, & talos crudeliter laniant, nullo ordine invadentes, & per intervalla, licet nocturno aegrum levis calore persusum rarissime destitunt, nec nisi sub auroram libenter evanescent. Sed simul notat, si crustulis porrigine, varis, cutis deturpetur in leprae fere modum, tunc levari dolores; ita ut, quanto magis cutis foedatur, tanto minus aegri discrucientur. At levamen hoc dolorum durabile non est. Nam universa symptomata percrevit in crudelescent, dolor prae reliquis, qui tandem eo usque exacerbat, ut se nequeat miser in lecto continere, sed protinus exsiliens, huc illuc in cubiculo cursat, irrequiescit ferme, donec illucescat. Fixum enim tunc in ossibus haeret malum, quae in dura tubera, & nodos attolluntur, cariola fiunt, & deis ulcera phagaedenica pessima in parte affecta producant &c.

§. 1453. **U**nde in cartilaginibus nasi maxime, & palato erosio.

Notum est, ossum articulatorum extrema tam excipientia, quam excepta cartilagine in crustari, mucosis, pinguibus humoribus illiniri, unde conciliatur articulis facilis mobilitas. Illud smegma articulare aptum nidum dare poterit miasmati venereo, & pessima mala producere. In cadaveribus hunc morbum passorum tales ossum degenerationes circa articulationes observare fuerunt aliquoties; quas & ipse vidi.

Omnium maxime tales cartilaginum erosiones a lue occurrunt in naso, & palato; quae postea insanabiles deformitates relinquunt. Accedit, quod luis venenum difficilior ex his locis extricari queat; uti omnibus in cura huius morbi versatis notum est.

Sed de his malis antea ad §. 1443 dictum fuit.

§. 1454. **M**ox media ossa occupans caries producit; praecipue in cranio.

Quando in ossibus cranii mediis, vel in media parte crassissima ossum maiorum, quae artus constituunt, oriuntur dolores enormes, ac si compages tabularum ho-

(§) Epist. II, responsor. pag. 416.

DE VENEREA.

101

ilitura esset, atque hi post occasum solis inchoati donec media nocte intolerabiles evaserint, coëgerunt deferere, versus auroram sponte quiescentem in pinguetudine ossium ipsa iam haerere (g).

cranii medullae officio fungatur, hinc toties terrunt. Observatur enim in lue venerea caput quas corporis partes, dum luis miasma, quamptum, per universam humorum massam dispersas depositum illas lenta tabe peredit.

signa, quibus dolores arthritici a venereis distincti, parvoque tempore exoritur, idque ex destitutione cubuit. Dolores vero luis venereae sensim procedunt, emento, quod pars male affecta paulatim congesta, aut circa hunc consistit, fixaque est. Dolores sedios artus obsident; in quibus & plerumque sopiti in fronte, & capite, in clavibus, in medio humeri, & in parte prioris tibiae; nonnunquam & in aliis

ibus venereis obtinet, quod non augeantur ad altalida pressione partium dolentium, aliquid levaminis arthriticis tactum radiorem imprimis minime ferat. n est, antequam ossa in tophos duros eleventur: illi nt.

superpositae partes in apostemata assurgunt pes-

iam difficulter curentur mala, quae ab osse prius affecto lacione externa os affectum fuerit, post vulnera sup- quidem cura procedit; sed succedit tamen; quum per- les, quorum unio procedit; soluta est, via facile pateat cor- erum dum post pariter soluta est, via facile pateat cor- na ulcera degenerant, merito metuitur, ossium medulla atrequam partes nocturnos, illos dolores, superpositae rie, licet incumbet, merito metuitur. Visum fuit ossa, iam oris frangeretur, merito metuitur. Visum fuit ossa, iam eam intolerabilem, merito metuitur. Visum fuit ossa, iam nient mala. Videtur illa, quae antea ad p. 1445 dicta) de lue venerea, in operibus eius, quae anno 1503 in-

praefatione.

1) Ibidem pag. 614.

(i) Ibidem

incōpit colligere, & anno 1513 edidit. Quam autem summi pontificis Iulii secundi chirurgus fuerit, vidit procul dubio luem, dum primo in Europa apparuit. Incipiebat morbus a pultulis genitalium in utroque sexu, quae deinde per totum corpus dispersebantur. Interdum cum diutis pustulis, vel saltem post earum ortum inde ad mensem cum dimidio, vel circa, patiens laborabat doloribus clamosis interdum circa frontem, interdum in spatulis, & humeris, & brachiis, & aliquando in tibiis, coxis, & anchiis. A quibus doloribus aliquando multum post tempus, videlicet post annum, & ultra, quaedam oriebantur scirrhusi, ad instar ossium, a quibus aegrotantes clamosis doloribus vexabantur, praesens tempore notis, & sedabantur in die & nocte. Dolorum autem illorum finis semper fuit os corrumpere; prout in spina ventosa accidit. Transacto vero anno cum dimidio, vel circa, quaedam suberositates exituales materie grossae, & phlegmaticae plenae, ad modum non parvae castaneae, alibi coloris substantiae durae, ad instar sordidae, aut nervi semiputrescitis generabantur, quarum manifestatio a natura sanum, absque auxilio alicuius medicinae, plerumque facillime efficiebatur. Quae de re post earum crepaturam seu apertione omne genus ulcerum videbatur &c. Deinde varias ulcerum malorum species enumerando latius hanc rem docuit, & probat, omne dolorum genus, omnes cutis foeditates, omneque ulcerum diversitates in hoc morbo concurrere, additque: Ultimo loco vidimus, febriculam oriri, quae tot praenominatis malis hominem quasi ad heciliam, aut ad ultimam eius diem conducebat.

§. 1456. **Q**uin & in tophos duos elevat, dolentes obscure, sensim acutius, tumque & superposita corruptentes.

Lues venerea, uti patuit, ossa inficit saepius, imo & vera carie destruit: quandoque lentius in ossa agit, & illa in duos tumores elevat sensim, qui satis diu persistant, antequam caries sequatur: rudius etiam affecti, viz: dolent, vel obscure tantum, & dolor ille lente augeri solet, accedente nempe, vel & aucta ossis tumescit corruptione, a qua deinde impositae partes molles corrumuntur, sequentibus omnibus malis, quae paragrapho praecedenti enumerata sunt.

Solent tamen hos tophos praecedere dolores illi osteocopi, nocte exacerbati, molestissimi. Tumores illi, ad media ossium loca nati, molles quandoque, & lenti sunt, & tenaces utcumque prementi digito cedunt, & gummi, vel gammata vocantur; quia gummi, ex arborum cortice stillans, concretum iam, & aëre exsiccatum, nondum tamen omnino induratum, & fragile, satis apte referunt. Si durioris consistens fuerint, & prementi digito vix cedant amplius, dicuntur *tophi*; ubi vero induruerint ossi penitus, tunc solent vocari *exprosses*, si tota ossis substantia tumeat in hoc loco, vel & *hyperostoses*, si tumor talis durus ossi quasi infideat tantum. Vidit talem tophum mediam tibiā obfidentem *Ten Rhyne* (k), in nauta triginta quinque annorum, qui lue infectus mo-

(k) Dissert. de arthrit. part. 2, pag. 64.

lores creantur uno
liuque aëris iniuriis expositum saepe tolerare
uticos labores strenue perageret, loro aspero,
upit. Chirurgus discidit locum; & cauterio,
rafo. malum destruere conabatur ingenti cum
entius dein locum lustrans invenit foramen par-
vix admittebat: exsoidit trepano laminam osseam;
ossis tibiae usque, viditque medullam in fungo-
se admodum sensilem: tentabat dein similem me-
fracturis adhiberi solet, & instituta cura luis ve-

rat, topbos tales affecto prius osse elevari, &
nis esse.

libusdam haerent quandoque, ubi summas molestias
notabile vidi. Vir triginta trium annorum, dum in
ro concubitu cum muliere calidissimis remediis curare tea-
no copulac, aliisque calidissimis remediis curare tea-
osis, tumor varicosus circa testes, & postquam per
gonorrhoea manserat, coepit minui; sed mox natus
anguine, quem inciderunt scalpello in Indis, & cu-
rhagades, sive fissurae cutis in manibus, ac pedi-
x, dum post quadriennium a prima infectione in pa-
tempore coeperunt rhagades minui sensim, quo ma-
quaret, brevi sanatae, dum ad suos rediit. Dirata-
quis vestigia tam in faucibus, quam in diversis cor-
a mala, quibus affligebatur, topus magnus, integu-
mutans haerebat sub musculo temporali sinistro; si-
e latebat sub temporali dextro; unde miser os didu-
solis iusculis vitam sustinebat; donec tot, & tantis
ops, tandemque periit.

facile constat de signis, quibus morbus hicce co-
scitur.

mus dicta sunt, ni fallor, habentur signa, quae luem
corpore docent; uti & illi effectus, qui a diversis
no morbo affectis pendent. Simul conatus fui sollicite no-
re, quid metuendum sit. Pro vario enim corporis habi-
tate contagii, prout recentius fuerit malum, vel iam
stuerit, prout has illasve corporis partes occupaverit,
t, diversa sequentur mala, cura facilius erit, aut difficilior.
luis diagnosi, & prognosi actum fuerit, sequitur, ut de

quae viderim in hoc morbo tractando, quae tuta, & vera
in

noverim, laudabo illos, per quos profecerim, indicabo rationes, quae me permoverunt, ut quaedam praefeream aliis. Paratissimum me sentio, ut meliora sequar, simulac mihi innotuerint: donec haec fortuna mihi contigerit, utar meis.

§. 1458. **G**onorrhoea curatur balneo, fotu, iniectione, purgatione mercuriali saepe repetita, emulsionibus, balsamicis, abstinencia ab omni cibo, potuque lauto, & ad venerem stimulante, victu contra, potuque tenui.

Generalis indicatio in curandis malis a luis contagio suscepto ortis consistit imprimis in eo, ut contagiosum miasma removeatur quantocyus de loco, cui haeret, & expellatur de corpore, ne ulterius noceat parti, quam occupat, nec propagetur ad vicina non tantum, verum etiam ad loca admodum remota.

Varios effectus a lue metuendos esse pro diversitate loci affecti, & materiae contagiosae pro maiori, vel minori calore excitante, uti & pro diversa temperie corporis infecti, pluribus ad §. 1444 dictum fuit.

Solet autem miasma venereum in loco, cui adhaeret, se manifestare leni inflammatione, pustula subalba, squamosa, rodente, mucosa, quae vulgaris remediis perficiat resistit, & postea stillat foedam saniem, mucosam, lentam, subviridem, rodentem, tuncque in latum magis, quam in profundum proferpit malum.

Si in veretro infectus locus haerit, vocatur *cancer* ob difficultatem curationis. Si interiora oblderit, citius, vel serius ex urethra depluit similis sanies; & tunc vocatur *gonorrhoea*; quae in plures species distingui solet pro diversitate loci, quem in toto decursu urethrae occupat, & partium adiacentium, aut humores suos eructantium in cavum canalem urethrae, quae luis contagio infectae sunt. Ut haec mala exacte cognosci possint, requiritur absolute anatomica cognitio harum partium, ex qua intelligi possint diversa, & taediosissima mala, quae gonorrhoeam venereum comitantur quandoque, aut sequuntur. De his omnibus dictum fuit §. 1447, & sequentibus. Sequitur ut de cura gonorrhoeae agatur.

Balneo, fotu. Praecipua cura consistit in eo, ut expurgetur miasma inficiens, & concilietur liber, facilisque exitus materiae effluenti. Hinc prudentes medici conantur per balnea, & fomenta hoc obtinere, ut perpetuo madescant, & tepescant partes, sicque susceptum virus foras alliciat, ut effluat totum cum pure facto.

Materiam balneo, & fomento dant emollientes herbae, & farinae, additis simul lenibus antisepticis. Talis formula in *materia medica* ad hunc numerum habetur ex emollientibus *malvae* foliis, & antisepticis, *ruta*, *scordio*, *alliaria* compositum; cui & saponis Veneti pauculum, & parum spiritus vini additur. Ad lubitum poterit emollientium copia augeri, uti & antisepticorum, prout remedium magis, minusve detergens desideratur: ex similibus & cataplasmata, qui-

ur, parari poterunt; quibus toties pauculum oler
s cita harum pulricularum exsiccatio. Quam ma-
s praepurium, & glandem colligatur sanies, &
infectio, glandis, & interni praeputii erosio,
tuenda sunt. Sollicita hinc fiat ablutio, & dein
volvatur cataplasmate emolliente, materiam ex-
c. leniter antiseptico. Haec ablutio, & mundatio
bent.

ris esse talibus, qui munera publica gerunt, aut sui
ndationibus saepius de die vacare possint, absque eo
ris mali; quod, ut non innotescat, anxie desiderant.
is: interdiu veretrum immergerent vasculo aquae, &
ntitate pleno, in quibus pauculum saponis Veneti dif-
gat, nec irriter tamen sensiles has partes. Reducto
di applicetur post emundationem lactam molle em-
meliloti, aut his similia. Quamvis autem balneis,
s primae partes debeantur, tamen & urgente ne-
co adhiberi poterunt (k).

postribula magnam impunitatis spem ponunt in ab-
m post absolutum opus facta.
& frequens ablutio, & mundatio imprimis utilia sunt,
onorrhoeae specie (vide §. 1447), ubi sanies pressa
iam quasi exsudet, & sub praeputio colligitur; uti
oeae sedes non distat multum ab orificio urethrae.
s distat magis, fomenta haec, & balnea non directe
ectum; licet profint abluendo, gonorrhoeae saniem,
& inter praeputium, & glandem colligitur. Hinc
ui his morbis curandis operam dabant, insigniter prode-
uae sub forma balnei, fomenti, cataplasmatibus prode-
vicerentur saepius in urethram; ut ex loco affecto sic
molesti lenirentur dolores, & stranguria emendaretur.
ves totam urethrae longitudinem abluere, ac mundare pos-
conditione mali varia adhiberi remedia sperabant, se-
um, tamquam malum topicum solis injectionibus. Ta-
medici (k), qui aquam calceis vivae, saccharum saturni,
zum guaiaci &c. inicienda voluit in urethram, & per
noxae curam promittebat. Longe me abesse ab hac me-
n periculosam credo, dum talia remedia constringendo
fluxum sistendo fallacem sanationis spem faciunt tantum,
nem. Nec sensilis adeo urethra fert acria impune; sed
que dolores patitur; corrugatur tota, donec occalescat, re-
po.

(k) Morando Morando prima decade di Jentere &c.

petito similibium usu; unde postea difficillima mala sequuntur, praeter illa, quae a retento miasmate venereo sunt metuenda.

Prudentiores medici mollibus tantum, & leniter detergentibus iniectionibus usi fuerunt, ut mundaretur locus affectus in urethrae canali; qualis formula in *materia medica* ad hunc numerum habetur. Si ingens ardor in urethra percipitur, ex *seminibus cydoniorum*, in aqua rosarum infusus, paratur tenuis mucilago, quae repide injecta prodest demulcendo, & inviscando rodens acie.

Sed & hoc notandum est circa iniectiones in curatione gonorrhoeae adhibendas. Eo difficilior cura praevидetur, quo locus affectus in urethra magis distat ab eius extremo, & versus prostates ac vesicam tendit. Per iniectiones autem retropellitur sanies gonorrhoeae, in canali urethrae collecta, & contagium remotioribus locis applicatur, quod periculosum est. Verum quidem est, quod urethra per inferiorem partem penis decurrens facile comprimi possit, siquē impediri, ne liquor injectus versus posteriora veniat; tumque tota urethrae pars inter locum digitis pressum, & urethrae aperturam tuto eluatur, & mundetur. Ast si minima hic negligentia in eligendo compressionis loco, vel si quacumque de causa non integre comprimatur urethra, pars injecti liquoris superabit illud obstaculum, & virosam saniem propellet ulterius.

Antea ad §. 1447, ubi penis fabrica mirabilis describitur, notatum fuit, membranam internam urethrae pertundi copiosis foraminulis oblongis, sive poris maioribus, minoribus, quos dant canales excretorii glandularum, quae in corpore cavernoso urethrae locantur: canales illi iuxta membranam internam urethrae per eiusdem corpus cavernosum decurrunt, & dein oblique penetrant in urethrae cavum, quod secreto humore blando obliniunt, & contra acrimoniam urinae muniunt. Canaliculi horum orificia obliquo ductu in urethram hiant, & ideo semilunarem figuram habent. Licet ergo iniectiones non protruderent saniem versus posteriora, dum digitis comprimitur urethra, possunt tamen urgere virus in has lacunas, & sic in corpus cavernosum urethrae propagare malum.

Si omnia haec considerentur, videtur tutissima esse, & facillima illa depuratio, quae fit per urinam ipsam, quae tota longitudo urethrae ablucendo depuratur; haec valida satis vi eicitur, dum vesica contracta agit post superatam sphincteris resistentiam. Directio autem iactus urinae talis est, ut averrat saniem in urethra haerentem, sed nullo modo illam urgeat in canales illos, qui per urethrae cavum distribuuntur, & quorum aliqui satis patulis orificiis hiant.

Verum quidem est, quod urina etiam sana acrimoniam habeat, quae molestia sit locis illis excoriatis, & ulcerosis; ast in artis potestate est, urinam adeo tenuem, & blandam reddere, ut nullo modo urethram irritare possit. Ideo iniungitur aegris, ut plus potant, quam sitis requirit. Aqua pura, infusa lenia aquosa, decocta ex herbis emollientibus parata, glycyrrhizae infusum, lactis serum, hydrolaga, emulsa, cerevisia tenuis, & mollis simul, &c., amplam potui communi materiam praebere poterunt; ex quibus eligantur illa, quae aegri palato magis ardeant.

Quum

Quum quic
quo nro in vesica
magna aqua, ma
in tale vasa por
la eliam tunc
non minores
sunt damus; f
in tal loco
maior, vel i
minore hnt
pura, dicitur
Si medietas
sunt hnt, i
applicatur, q
applicatur in
dilatatur vi it
dilatatur, acro
potione vasa
sunt vasa

in urina
magna, le
dilatatur
ne care
sunt q
dilatatur
vasa

in urina
magna, le
dilatatur
ne care
sunt q
dilatatur
vasa

unus longior conducant in hoc morbo, & urina
semper acrior fiat, simul accumulabitur in cavo
fomni longioris tempore; at damna inde metuen-
si aeger libras duas tenuis potus sumat, aptequam
post tres, vel quatuor horas sponte evigilabit,
actò largum haustum potus mollis hauriat, & ubi
tenuis manebit, & nullo modo acris reddetur,
urethra mundabitur a collecta sanie; atque ita
ultum molesta stranguria, quae gonorrhoeam toties
iudo omnis utilitas, quae ab iniectionibus sperari
ie metu ullius damni
molles sunt, & leniter tantum abstergunt, parum
quid cogitandum, dum acriora remedia ab agyrtis
loque venereis ulcusculis in loco cuse recto solent
§. 1463 dicitur. Si liquida fuerint haec remedia,
nam urethrae superficiem pessime afficiunt, & summos
arum autem a solis topicis remediis expectari possit,
incommodum expectandum a candelulis cereis, quae
habent admixta; de qua re videantur illa, quae ad
licet molli cera consent, nisi perita manu introdu-
levia producere poterunt. Homo pertaesus diuturni
nilium accepit in urethram dimittere candelulam ce-
& satis tenuem; quum facile succederet haec intro-
tetrahit; ita ut notabilis pars talis candelulae in vesti-
et molli loci calore flexilior reddita nodum fecit.
educere candelulam, transitum impediēbat nodus; vi-
veniente valida haemorrhagia, penis, & scroto tumore
ntia. Periti chirurgi ope tamen evasit ex hoc disci-
n leve erat (*).

ita saepe repetita. Methodum curandi gonorrhoeas per
epo repetita plurimi celebres medici adhibuerunt cum
daverunt tamquam unicam. Sic Aueronius Musa Bra-
eum plures alii censuerunt. Quum autem argenti vivi
erea curanda adeo celebris esset, ideo purgatio mercuri
ri a multis. Interim certum est, alia purgantia suffe-
ellandum hoc malum. Sic Sydenhamus (m), dum de
vic: Curationis omnis cardo in remediis cathartici verti-
sque usu comperimus, quorum auxilio vel educitur humor
stat diverso succorum corporis naturalium, qui aliter hosti in
Estetur simul, quod quaevis cathartica saepe, & diu exhi-
sanare possint: elegit tamen validiora, quae bilem, maxi-
me

de chirurg. corre-
ptio, II, pag. 42

III, pag. 610.

(1) Aphrodisiac. pag. 684.

me vero quae ichorem ferofum, fortiter e sanguine expurgant, & subducunt.

Antea pluribus probatum fuit contagium luis venereae intricari lentis, & pinguibus corporis humoribus, illisque uniri. Proderunt ergo illa remedia, quae omne lentum, ac pingue solvunt, & solum educunt de corpore. Spes magna est susceptum miasma, quod illis unitum fuerat, hoc nexu liberum exire posse de corpore. Validorum enim purgantium usu repetito obesus homo emaciari poterit integre. Antea ad §. 761, ubi de purgantium usu in cura februm intermittens agebatur, monitum fuit a purgantibus medicamento bonos humores corrumpi, dein corruptos excerni: quod *Helmontius*, uti ibidem dicitur, dum a scabie curabatur, suo damno expertus est; repetito purgantium usu emaciabatur adeo, ut tremere genua, vox rauca fieret, & omnes labascerent vires. Unde conclusit, quod vividam corporis substantiam liquassent purgantia, & in putrilagine resolvissent. Talem virtutem habent imprimis illa purgantia, quae a medicis *hydragoga* vocant solent. Testatur *Sydenhamus* (n), quod sola *ialappae* radice pauperibus aliquoties subvenerit, quorum tenuitati, & rebus angustis domi consulendum erat.

In materia medica ad hunc numerum habentur tres formulae remedium purgantium, quarum binae priores largam satis mercurii dulcis dosin continent; quod tamen non absolute, aut semper requiri videtur. Ipse celeberrimus *Boërhaavius* (o) mercurialia praeparata non laudavit ad gonorrhoeam sanandam, sed *ialappam*, *hermodactylos*, *scammonium*, *seram* imprimis. Haec verbro usurpata potestatem habent dissolvendi sanguinem in aquam, hanc depellendi deorsum, & evacuandi per intestina; haec agunt valide semper, & in vinnac vasa, vesicam, urethram. Hinc & laudatissimus horum usus in locis hinc malo natis, *Africa*, & *America*; quin & probatissimus quoque apud optimos fere nostrorum in arte magistrorum. Eandem methodum laudavit, ubi in uno loco externo recens labes unice haeret, & ulcusculum producit; deinde addidit: Nunquam probabo temerarios ausus illorum, qui consulenti super hoc malo inventuti illico suadent usum argenti vivi; quod semper corpori nocet; nec necessarium saepe habetur (p). Diserte autem monet *Sydenhamus* (q) vel ipsam salivationem mercurialem non sanare gonorrhoeam, dum luem tollit, quae comitem gonorrhoeam habet. Unde statuit sequentia: Quoties lues, & gonorrhoea una stabulantur, vel ante salivationem, vel ea iam peracta, gonorrhoeae curatio tentanda est; quod & tutius fit, me iudice, & facilius etiam post finitam salivationem, quum luem habens comitem, gonorrhoea aegrius demetur, quae vero a praegressa salivatione quadantenus subacta fuit, minori negotio expugnari solet. Idem affirmat *Boërhaavius* (r), nisi quod in illa specie gonorrhoeae, quae in glandulis *Couperianis* nidulatur, curanda dixerit: Quare etiam subinde hic recurrendum erit ad gravissima remedia pituitosi. Quam

(n) Epist. responsor. II, pag. 419.

(p) Ibidem.
aphrodisiaci.

(q) Epist. II respons. pag. 432.

(o) In praefatione ad aphrodisiacum.

(r) In praefatione

nunquam carentur, tamen posterior haec species, *lulans*, in qua vasa arteriosa, & cordis impetus *mercurii* vim longe promittit: excipit. Notandum urethram haerere: licet illarum emissaria in miasma susceptum sic erodantur, ut in sinus molestissima degenerent; unde & luis universa quod praecavendum salivatio tentari solebat. et confirmant, remedia mercurialia, quae luem solent, parum, imo nihil prodesse in curandis bres chirurgi Angli, qui militum venereis morcuram habuerunt in castris, in gonorrhoea cum corrosivum ia spiritu frumenti solum (de quodendum erit) luem sanasse quidem, etiam satis com em gonorrhoeam virulentam, quae, si nullis aliis remediis mercurialibus sanari poterit (1). posuit Sydenhamus (2) in usu decoctionum, quae iaiaco &c. praeparantur, & a multis, ut specifica nedia laudantur. Ab his enim universum aegri effecta, iam pridem nimis incallescens, ulterius adbus im etiam gonorrhoea, quae paulo ante evanuerat, quod mo in conspectum prodit. onorrhoeae curam inchoandam suadet celeberrimus illam pro morbo inflammatorio, omnesque inflamendos esse, imo & blandam resolutionem hic obtineri, nec fere unquam, nisi in levioribus gonorrhoeis, utis sanguinis missionibus, & exactae diaetae acquiesatum; si leve fuerit, tanta sanguinis iactura non indigentibus abluatur facile leve contagium, nondum peraffecta; imo, ut sincere dicam, nullam sanguinis missionem enim, uti §. 386 dictum fuit, requiritur: quae nonnumquam sperari poterit in loco, cui adhaeret on-rantum cutim, sed & solida ossa corrumpere, & erosiones curationis in eo consistit, ut exeat per fluxum rissimum praeterea contingit, aegros medelam quaerere, ex pene extitit; adeoque de cura per resolutionem ur, nec operae pretium erit in omni gonorrhoea sanam si ardor, erethismus cum gravissima dysuria adsint, (v), *baud*. signis, parciusve urinam esse tendendam, monia, vel dysenteria. Verum solo decocto radicum alba potato magna copia, & fomentis mollissimis applica-

nd. impirys vol. 168.

(1)

II, pag. 83.

Lib. III, cap. I, §. IV, &

(2) Epistol. responsor. pag. 165, & 169.

catis, graves tales molestias saepius lenire, & superare potui, quae minuebantur itatim ac fluxus largiori copia prodire inciperet. Plus enim hic expectandum est ab acris irritantibus obvolutione per mollissima remedia, & laxatione viarum, ut tuto exire possit, quam si tota curatio ad sanandam inflammationem dirigatur. Lues enim venerea non adeo in inflammationem prona est ex sua indole, uti apparet, si contagii effectus in loco oculis conspicuo considerentur: prima enim signa sunt *pruritus, calor, lenis inflammatio*; quam brevi sequitur *pustula subalba, squamosa, erodens*, de quibus videantur illa, quae ad §. 1444 habentur. Contrigit quidem aliquando membrum inflari virile in calidis juvenibus laeta diaeta, & vino copioso utentibus, dum aestivis sub caloribus immodica venere abutuntur, & se totos exhaustiunt: ut & aliquando recens nuptis, dum operatis amplexibus fructuri vi adhibita viam novis gaudiis parant, quod similem membri inflationem cum rubore, & dolore patiuntur. Idem malum toties experiuntur illi, qui ad curam gonorrhoeae acerbis diureticis, balsamis nativis, vel & artificialibus copiose utuntur: in similibus casibus subita sanguinis missio locum habet, uti §. 1460 dicitur. Hoc tantum monere volui gonorrhoeam veneream non indigere sanguinis missione ad curationem, neque illam inchoandam esse semper a venae sectione sub spe felicitioris, & citioris sanationis.

Sydenhamus (*), qui, ut notum est, in morbis inflammatoriis curandis abundantiam sanguinis missione utebatur, in cura gonorrhoeae, praecipue in initio, illam nullo modo admisit, quum non speraret inde benignam morbi incipientis solutionem. Sic enim habet: *In temperamento admodum sanguineo, & affectu pertinaciori post mensem catharsi datum, aut citius, ut plurimum sanguinis unc. viii, vel ix e brachio dextro detrahendas suadeo. Ut maturius tribretur venae sectio, auctor non sum, ne hac opportuno contagium penitus infervat.*

Purgantia per alvum praecipue conducunt ad gonorrhoeae curam, & saepius repetenda laudantur. In aegris, quibus facile alvus movetur, decoctum *tamarindorum cum foliis senae* sufficit saepius, si quotidie potaretur, donec symptomata, ardor nempe urinae, stranguria, stricturae sensus in urethra leniantur, materiae effluentis copia minuat, & color in melius muretor. In initio enim rubellum quandoque colorem fluxus habet, vel & profunde viridem; dein flavescens: augeri tunc solet spissitudo, & succedit postea albus color. Maiores tunc intervallo dantur cathartica, ne largis, & diuturnis deiectionibus vires exhauriantur, nimisque tabescat corpus. Illis, qui duriori stimulo indigent ad catharsin, validiora propinantur remedia. Ita *Sydenhamus* (y), qui fatetur, se pauperes sola radice *jalappae* curasse, dabat communiter calidiora purgantia, quae *alvum, colocynthidem, resinam jalappae* continebant, & addito *opobalsamo* in massam redigebantur; cuius grana quadraginta exhibebat omni mane hora quarta, vel quinta per dies 12, 14, vel etiam plures, donec urinae ardor, & materiae seminiformis color flavus admodum immo-

(*) Epist. respons. II pag. 422.

(y) Ibidem pag. 414.

ritica alterois diebus adhuc per duas septimanas;
bis in septimana sumantur pilulae, donec bu-
prorsus evanescat; quod ut plurimum nonnisi post

dam esse rationem aetatis, virium, ac tempe-
gantia, & adeo frequenter repetuntur. Obesa
t, macilenta, & exsucca minime, in quibus le-
frequenter debent repeti. Diebus a catharsi li-
m copiam bibere debent tales, & molli vieta
rte curabuntur; sed longe tutius. Summo certe
urgationes quoque, ut interdum necessariae sunt, su-
im adferunt. Assuescit enim non ali corpus, & ob

, praesertim acriora, dum intestinum rectum fre-
nendi irritant, & vix non excoriant, vicinum col-
int, & stranguriam excitent, vel augeant illam, quae
Optime notavit celebris in hoc morbo curando
n in usu purgantium minuta fuerat fluoris quantitas, &
geretur in horum usu ulterius, non emendetur amplius
cedat dysuria, & priapismus, & materiae effluentis qua-
nt. Unde cogebatur lenioribus postea curam absolve-
tingebat in hominibus sicci, calidi, biliosi tempera-
s, phlegmaticae temperiei homines has evacuationes
nt. Quantum noceant penis erectiones in gonorrhoea
r; & simulac post frequentiores validorum catharti-
s oritur, leniora, & maiori intervallo data conducere

imprudentes iuvenes, dum turpe celare vole-
onem anxie desiderabant, drasticis usos fuisse purgantibus
lies. Novi contigisse, ut erosa intestinorum tunica unus
spente per anum sanguine, subito defecerit. Alios vidi
lidos languisse per menses, antequam vires aliquantum
nt. Quot sunt metuenda mala, dum vix sanati se novis
repetitis gonorrhoeis pessime mulctantur, & vel proprio,
rum consilio similem curationem repetunt. Emerita enim,
libidinis prostibula se turpi experientia iactant esse ver-
orbo curando -
lenioribus purgantibus, & tamen satis evacuantibus gonor-
az, contingit tamen aliquando curationem rardius proce-
difficilius purgantur: tunc aucta dosi, & in forma liquida
edit Sydenhamus (6), quae ex tamarindis, foliis senae, rbeo,
man-

manna, syrupo ex spina cervina &c. parabantur. Quibus si non succederet cura, pro dosi dedit drachmam mediam *pilularum ex duobus cum grani viginti mercurii dulcis, &c quidem bis in septimana.* Constant illae *pilulae ex duobus aequali copia colocynthis, & scamonei*; unde merito drasticum remedium dicitur. Praecipuam autem spem in hoc posuisse videtur, *si tarbis minerale ad gr. viij, tantum bis, vel ter daretur* (idque interposito debui temporis spatio, ne forte oboriatur pyralisimus); quod quidem remedium in tradenda difficiiori gonorrhoea facile primas fert. Eandem methodum laudavit Turner (c), si gonorrhoea admodum virulenta foret, simulque adessent cancri venerei in genitalibus.

Ex omnibus dictis patet, versatissimos in curandis his malis viros praecipuam curae spem posuisse in reperito catharticorum usu; mitiora dedisse primum; quibus si non emendaretur malum, validiora, imo & drastica adhibuisse; praecipue in repetitis, vel admodum virulentis gonorrhoeis, quales solent esse illae, quae longiori tempore post suspectum concubium se manifestant tantum. Simul patuit, non semper necesse esse, ut adhibeantur remedia mercurialia, nec salivationi obedire gonorrhoeam.

Purgandi haec methodus multis displicere solet, & taedium non leve facere, de quo celeberrimus Boerhaavius habet sequentia (d): Neque crediderim immeritam usque methodum huius propositae praeripuisse: novi quippe alias pleaeque tentavi, cum hac comparavi. Fateor, incommoda est aulcis in celebritate versantibus, vel muneribus publicis gerentibus; sed tuta saepe ardua sunt, & molesta. Novi promissa agyriarum, se curaturos vel in regali natantes luxu, haud licuit esse tam beato. Quin & dolui saepe, dum sic trahatos illustraviros vidi per annos vitam agere reliquii veteris mali obnoxiam.

Laudabatur a quibusdam aquarum mineralium potatio ad gonorrhoeam, vel saltem leves eius reliquias extirpandas, imo iam in receptum morem hoc abiivisse, indignabatur Sydenhamus (e): statuit enim solam catharsim hic instar omnium esse, & severe inculcavit, ut aegri sibi temperarent ab aquis mineralibus; certo namque sibi constare, ait, ab his morbi reliquias e corpore eliminandas, vi adstringente, & plus satis sanativa, artius constringi, & quasi clavo figi trabali; unde, quod saepius observavi, siroti tumores enascebantur, quoribus in morbi principio, vel statu, prioraque adhuc symptomata, ut carunculae, si quando sub exitu eius potarentur. Videtur de aquis martialibus hoc intellexisse optimus vir. Qantur enim aquae minerales, quae vel parum omnino, vel nihil de martiali principio continent, & quae potatae per alvum purgant satis. An non hae possent conducere sub finem morbi, quum non debilitent purgando, & circa finem curae leniora tantum cathartica soleant dari? Celeberrimus Hofmannus (f) Selteranarum potum laudat ob vim mucum viscidum inci-

(c) Siphylis pag. 71.
Spons. pag. 423.
pag. 420.

(d) Aphrodisiac. in praefatione.

(f) Med. rat. system. tom. IV, part. 2, sect. 2, cap. 7.

(e) Epist. II res.

na. in gonorrhoea inveterata. Et in morbis vesicae
na. per aliquot exempla mirabilem thermarum Ca-
nctionem in membrum crebriorem deprehendissim,
fructum de meliori commendare. Thermae autem
 ant fatis.
na. qua per dies quindecim iuvenis rusticus labora-
 a phymosi, dysuria summa, doloribus peracutis,
 ribus referta erat corona balani, admodum etiam
 us Baregianis, intus extusque adhibitis, perfecte

it aegri temperies, debilitas, repetitis gonorrhoeae
 exhaustum corpus, nimia venere deletus vigor impe-
 repetita purgantia cura tentari possit, tunc medici
 vere debent. Laborabat homo iam a quatuor annis
 ires omnes amiserat, noctes agebat infomes ob se-
 uae omni vespere increfcebat. Omnia tentata fuerunt
 es imminabat. Facile patet, in corpore exhausto tabe-
 mplius tentari evacuationes. Datum fuit *exhaustum ci-*
 insulum sorum sambuci cum lacte paratum, & intra
 emendatum fuit, auctae sunt vires, appetitus & somnus
 nense his solis miserrimus aeger convaluit robustus, &

o potu communi possunt haec potari ad libitum, quum
 m acrimoniam leniant, urinam diluant, & minus acrem
 res angusta domi est, his substituantur lactis serum, de-
 addita quarta parte lactis, aut his similia. Dantur &
 a medicata ex seminibus quatuor frigidis maioribus & mi-
 emulso colato miscetur *nistrum*, *Syrupus diacod.* &c., qualis
 ria medica ad hunc numerum habetur. Solebant haec dari

am purgantia assumpta operationem suam peregerant.
 Dum in urinae transitu haeret malum, & cum urina solet sae-
 r, hinc balsamica remedia fuerunt data a pluribus, quae &
 laudantur, & vulneribus ulceribusque curandis adhiberi solent.

a, pura, fragrantia, qualia sunt *balsamum de Meica*, *Peruvia-*
nus, *Solutanum de copayba*, *terebinthina* &c., magnam sa-
 ndis gonorrhoeis habuerunt. Laudaverunt & chemici olea stil-
 lantia nativis parata; qualia sunt oleum terebenthinae de balsa-
 &c., quae quidem admodum penetrabilia sunt, sed semper acro-
 hora ipsa balsamis, ex quibus parantur; adeoque nonnisi prudenti
 se poterunt. Nunquam frequentius testes intumescunt, quam post
 nitium usum, praesertim, si absque catharticis sumtis in morbo
 m exhibeantur; uti

ruebis agitis in more est.

stim. novi medic. conspect.
 non. Storck libell. 2 de cloru

m. V. pars II.

Storck, diet. pag. 277 in notis
 cap. III pag. 250.

Videmus tamen optimos medicos purgantibus remediis datis coepisse rationem gonorrhoeae, & emendato iam malo dediſſe *balsama nativa*. Sydenhamus (i) quidem siccoribus purgantibus addebat aliquot guttulos opobalsami, ut ex his massa ductilis fieret, unde formarentur pilulae. Sed prius iam aliquoties purgaverat aegros, antequam omni nocte daret xxv guttulos opobalsami sacchari frustulo exceptas (k). Eandem methodum secutus fuit Turner (l) celebris in his morbis curandis medicus: prius enim rite, & sufficienter purgato aegro, & in melius mutato colore floris, curam absol-vebat, dando unciam balsami copaybae in pastam albam redacti, addito saccharo albo, vel cum conserva fructuum cynosbati in electuarii formam redigebat: utriusque formulae quantitatem nucis moschatae dabat mane, & vesperi. Quandoque purgantia leniora admiscebat huic balsamo, & quidem optima cum effectu. Sic & in materia medica ad hunc numerum praescribitur massa, quae constat ex uncia terebinthinae, & uncia media rhei barbari, addito pulvere glycyrrhizae, donec fiat massa, unde formentur pilulae gravorum quatuor, quarum unam capias aeger omni hora. Ubi notandum imprimis hoc est balsama illa dari limitata dosi, ne nimis calefaciant, & irritent. Turner (m) praefert balsamum copaybae, quia minori constat pretio, quam opobalsamum; & quia non conciliat urinae adeo illum odorem violarum martiarum, ac quidem terebinthina; unde saepe tota familia intelligit, de qualis morbi cura agatur, quod minime conducit.

Hac cum limitatione balsama illa nativa dari tuto possunt, ubi iam per usum purgantium emendatus est morbus; calidioribus illis artificialibus, quae a sulphure nomen habent, abstinui semper: nimis enim inflammant, imprimis si oleis essentialibus acerbis parentur, ut balsamum sulphuris terebinthinatum, anisatum, juniperatum, succinatum &c. Imo & inter usum balsamorum nativorum copia mollium decoctorum commendari solet, ut urina lenis maneat, ne irritetur locus affectus, quem alluit.

Hic considerans non potui intelligere rationem, quare celeberrimi medici laudaverint acerrima diuretica in curatione gonorrhoeae, imo ipsas cantharides. Legitur (n) medicum quemdam Lugduni Batavorum gonorrhoeam virulentam solis cantharidibus feliciter curasse, quas vino rhenano macerabat virulentam alio liquore temperatam propinans; sed quum initio non sine summo cruciatu & ulceratione vesicae curam absolveret, miscuit tandem cum oleo amygdalarum dulcium, syrupo Fernelii, succo iappi barbari, & intra triduum beneficio copiosae urinae malum suaviter sustulit. Scripserat hoc ad avunculum suum Thomam Bartholinum Lugduni Batavorum degens Matthias Iacobus Mattheides nepos, cui post mensem respondit Bartholinus sequentia (o): infusum cantharidum alibi quoque in bistoriis laudavi, gonorrhoeae virulentae, & ischuriae remedium; cuius felicem successum non semel ipse sum expertus. Notandum vero,

- (i) Epist. II responfor. pag. 419. (k) Ibidem pag. 411.
 (l) Siphylis pag. 75. (m) Ibidem.
 (n) Thom. Barthol. epist. med. centur. IV, pag. 289.
 (o) Ibidem pag. 292.

as esse sumendas. Ubi vesicis exulceranda cutis, benignior facultas latet, quae servanda sunt in in-
aturo. Legitimo modo missum infusum, nunquam,
uciatum, vel exulcerationem vesicae provocavit, ut
is opus fuerit. Magni in arte nominis auctor re-
t & tincturae cantharidum usum in hoc morbo;
am gonorrhoeae virulentae, sed ad superandum
n stillicidium, quod post gonorrhoeas quandoque su-
eum de corpore expulsum fuerit; de qua re se-
a erit. Iubebat infundi cantharidum drachmas duas
us vini rectificati: addebatur rbeum, gummi guai-
aculum coechinellae. Colatum hoc infusum prudenti-
ane & hora decubitus, dilutum haultulo aquae re-
ta ad quinquaginta usque (quantum scilicet sine
erri poterat). Facile patet, reliqua medicamenta,
compositione adduntur: refracta adeo dosi, vix
praestare posse; adeoque totum huius remedii effe-
mistis pendere.

olestissimam stranguriam producere, utinam sanguino-
s, & imprimis eius collum inflammare ex historia
cipue si per os assumpta fuerint haec insecta. Simi-
es, ab externa applicatione observari fuerunt aliquan-
sta, satis citam mortem fecerunt. Sexagenarius homo
priis diffidens viribus, ut languentem excitaret vene-
am daturum se statuerat, sumisit cantharidum pulveri-
re post sensit dolorem in hypogastrio, & summam
sequenti mane medicus vocatus invenit miserum frigi-
scido sudore madentem; pulsu vix perceptibili; extro-
vis, lividis; abdomine tumente, tenso: post paucas ho-
re peritonaeum ex rubro livescebat in hypogastrio; ve-
sistentia coloris profunde rubri in fundo, & imprimis
versicie tota livida gangraenosa (7).

omnibus in confesso est, nil magis obesse curationi go-
nerem. Unde prudentes medici omni modo cavent, ne
enuem diaetam imperant aegris, ab omnibus potibus spi-
iubent; paucam carnem albae coctae concedunt tantum,
dum monent.
Alexander Traianus Petronius (1) severe
Sale, a salsis, a mitu nimio, ab aromatibus, denique ab
omnibus

sept. medic. pa
at. anam. pag
n. obferat. pag
lico lib. VII ca

cap. XXXIV pag. 141.
W, apodistiac. pag. 1322, 1323.

omnibus calefacientibus, & mordicantibus, & ab omni veneris non solum usu, sed etiam imaginatione &c. Et profecto potissima diuturnitatis causa haec ipsa est, quae quoad persistit, purges corpus, semper, optima vietus ratione regat, nihil proficit. Unde profuit quibuldam locum mutare, ut fieret eius oblitio, quod coitum irriparat: sic etiam alii, quia in exilium missi, alii quia in carcerem detrusi, aut graviore animi cogitatione affecti sunt, & antiquissima gonorrhoea se vindicaverunt. Ita ut mirum non sit, si viris, vel postquam illa cepit nunquam coeuntibus, diuturna tamen illa contingat.

Hinc evidens est, quam noxius sit cantharidum usus in gonorrhoea curanda, quum vel unica penis erectio curam adeo retardare possit, ut celeberrimus Boërhavius (1) monuerit sequentia: Vidi hinc saepe vanos fuisse hie in morbo vel probatissimos sanandi modos, si quacumque demum de causa, quae hercle multiplex hic nimis, homo arrigit, imo sanatas iam iam gonorrhoeas, unico incitatae libidinis impetu, retruduisse aditum, novamque denuo sanationem de integro exegisse. Quidquid ergo prurientem imaginem titillat, in cibo, condimento, potu, medicamento, vel per conversationem cum amabili sexa, iocularum aspectum, sermones, lectionem, cane peius & angue fugiendum. Aque potus, vel firi lactis, cerealia, boraci fructus conducunt.

Omnia valida exercitia corporis vitanda sunt: malum enim augent curfus, digladiatio, saltatio pendulas partes genitales quassant, agitant: omnium maxime nocet equitatio, imprimis si velox, & diuturna fuerit. Nunquam tristorem casum me vidisse memini, quam in nobili iuvene, qui a publico prostibulo nocte infectus, mane iter auspicatus est; dumque post quatuor dies gonorrhoea se manifestaret, noctu diuque pernici vectus equo festinavit, ut ad suos redux curari posset.

§. 1459. **P**ersistendum in curatione, donec nihil amplius insoliti ex pene exstillet, vel in urina se manifestet.

Molesta satis est gonorrhoeae cura, quia, ut dictum fuit, repetitam catharsin requirit; hinc operae pretium quam maxime est novisse curationis limites, quando tuto aeger sibi relinqui possit absque recidivae periculo. Quum tutissimam viam sequi hic medici soleant, plerumque curam parum protrahere solent, saltem quoad exactam vivendi normam. Saepe etiam aegri vix se integre curatos credunt, & novas malunt subire molestias, quam de salute integra vel minimum dubitare.

Quandiu aliquid notabile ex pene exstillet, gonorrhoea merito adhuc periculis creditur; licet fluxus dotes emendatae fuerint, difficultas urinae & ardor imminuta multum. Unde Sydenhamus (u) sollicite monuit, non confidendum esse curae, quando eiusmodi icbor, qui ardore urinae & flavo materiae exstillantibus colore disparentibus, mane praesertim, in summitate colis digitis com-

(1) Ibidem in praefatione.

(u) Epist. II. respons. pag. 419.

In initio gonorrhoeae fluxus a levi copia increfcit quotidie; ardor urinae, & ftanguria admodum molefta funt, ichor effluens viridis, aliquando cum ftiris fanguineis intermixtis, tenuis, quandoque flavus color viridi interfpergitur; aliquando flavum viridi intime mifcetur, & ochroleucum dictum colorem producit; quandoque & flavo colore tinfta materia fluit, quae fenfim, magis magisque emendato malo, in albedinem vergit; fimul tunc minuitur materiae copia, fpiffitudo augetur. Notavit celebris auctor (v) in quibufdam colorem flavum materiae effluentis manere ad finem ufque, fequente tamen integra curatione. Solet autem malignitas gonorrhoeae fequi horum colorum ordinem fucceffivum, ut plurimum; ut peffima habeatur viridis cum fanguine admifto mitiffima albicans, &, dum idonea medela adhibetur, emendationis gradus recenfitis coloribus respondent. Unicum hoc excipitur, ut monitum fuit, colorem flavum quandoque ad finem ufque manere; quod aliquoties obfervavi.

Antea ad §. 1447, ubi de gonorrhoea dictum, patuit per ductus excretorios in cavum urethrae excerni humorem mucofum, blandum, qui cavum internum urethrae oblnit, & ab acrimonia urinae tranfeuntis defendit. Ille humor naturalis eft, parcaque copia exit per patulum extremae urethrae orificium in faniffimis quoque hominibus, & leves quandoque maculas in indurfo facit, licet nulla etiam fufpicio toleratae olim gonorrhoeae adfuerit unquam.

Quavis occasione data, ubi certiffimus eram de integerrima puritate corporis mafculini, in hanc rem inquirere conatus fum, & talia ftigmata maculofa in linteis inveni. Pariter ante patuit, hunc humorem naturalem infici a mialmate venereo poft impurum concubitum recepto, augeri eius fecretionem, exulcerari aliquando, & erodi hos ductus excretorios; unde expulfo iam de corpore omni contagio, poterit liquor naturalis omni infectione purus exire, & quidem maiori copia, quam ante morbum solebat. Ab eadem caufa in urina obfervantur filamenta, flocculi, anguillulae quafi, omnium frequentiffime in illis, qui repetitas gonorrhoeas tolerarunt. In talibus hominibus poft bonum fomnum, fi leniter prematur penis, exit aliquid mucofi fufpeltucidi fere inftar albuminis ovi, Angli medici *Gleets* vocare folent, quod nihil infcientis in fe haber, & quandoque per plures annos durare folet, hoc unico

mole-

molestum, quod mali cuiusdam latentis adhuc, nec satis ex corpore expulsi, tristem & perpetuam miseris suspicionem faciat.

Nec facile est hunc metum tollere illis, qui iuvenilibus annis vixerunt imprudentius. Novi, qui decies repetita salivatione in tabem immedicabilem incidit, dum latens metueret malum. Fovent turpes agyrtæ hos scrupulos, & scelerati lucri causa argentum vivum larga copia exhibent miseris ad extirpandum scilicet radicibus malum, cuius nequidem adest vestigium. Quivis agyrta novum iactat arcanum; aliam argenti vivi administrationi methodum habet, nemini mortalium cognitam; mercurium, ubicumque latet in corpore, extricare & expellere novit de corpore; aliasque plures similes ineptias venditat, quibus creduli aegri fidem facile adhibent, & miserrime decipiuntur.

Si ergo orificia ductuum, mucosum humorem in urethram eruantium, dilatata manserint, post gonorrhoeam sanatam, vel erosa hiaverint, perget effluxus perpetuus viscidus talis liquidi, maiori minorive quantitate abque ullo latente contagii venerei metu. Imo talis effluxus poterit esse immedicabilis.

Opportunitatem habuit *James Drake* (*) videndi hanc rem in cadavere proprii famuli, qui per aliquot annos pertinacem talem fluxum materiae viscidæ toleraverat, dein peripneumonia mortuus. Inveniebatur caruncula, quæ in ductu excretorio glandulæ *Covperianæ* sinistræ locari solet, ulcere olim erosa fuisse, ita ut binorum ductuum orificia in unum abiverint: figuram addidit, quam ipse *Covperus* delineavit. Sequi hinc debuit peritus fere effluxus viscidæ materiae, quæ ab his glandulis paratur (*glares vocant*); quod idem contingere debet necessario omnibus, quibus simile infortunium accidit; five in his glandulis *Covperianis* dictis, quæ conspicuam satis molem habent; five in aliis ductibus excretoriis minoribus, per urethrae cavum dispersis.

Inde etiam intelligitur diversitas copiae illius fluxus; prout nempe maiores vel minores tales fluxus maiori minore numero simili modo affecti fuerint.

Quidam tales ductus, maiori minorque numero, simili modo affectum habent, unde tabem crediderunt, semen esse, quod sic perpetuo stillicidio efflueret; humor est a dorsale, & summam debilitatem, metuebant; *sed macofus* Solet illi a semine omnino diversus.

Soler ille fluxus, licet abſit venereum contagium, tamen incommodus eſt, quod plerique latentis adhuc alicuius mali metum faciat perpetuum & imprius autem illis, qui frequentius gonorrhoeam virulentam paſſi ſunt; unde anxie quaerunt remedia, ut ab hoc metu liberentur ſaltem, dum fluxus ille ſiccatur. Ex dictis patet, ut ab hoc metu liberentur ſaltem, dum fluxus ille laudari ſolent, quae ſaltem nocere nunquam poterunt, & quandoque aliquantum profunt, dum ſimul cavent, ne tales aegri ad periculofa remedia confugiant, &c.

Primum ab agrytis decipiuntur.

Primum, quod suadere soleo, est, ut a perpetua fere genitalium contracta-
tione

(*) Anthropolog. nov. tom. I pag. 140.

Fluxus ; **possiunt** ; **gnam** ; **bosam** ; **facile** ; **suben** ; **impen** ; **vero** ; **per i** ; **tur** ; **turni** ; **P** ; **cop** ; **vill** ; **gr** ; **p** ; **osuerunt** prae reliquis.

ant : solent enim curiose inquirere , an augeatur , vel minuat
el colorem mutet ; penem premunt experturi , an quid exprimere
sicque secretionem & excretionem illius mucosi augment potius . Ma
em in adstringentibus ponunt : laxitatem enim harum partium mor
accusare solent . Si innocua imprimis interno usu adhibenda perunt ,
oterunt concedi . Si innocua imprimis interno usu adhibenda perunt ,
conservam rosarum rubrorum , cantharum lapides , succinum , ma
e laudaverunt ; in quibus adhibendis faciles nos esse oportet . In illis
quae topice sunt applicanda urethrae , magna cautela opus est . Si enim
ectiones validiora adstringentia applicentur , alumen , vitriolum , saccha
turni , constrictiones urethrae , calli , dysuria , ischuria toties sequun
quae postea difficillime curabiles sunt .
ures casus collegit *Turner* (*Y*) , qui docent , tali fluxu , licet satis
oso , sed viscido , instar albuminis ovi , laborantes , matrimonium ini
nec infecisse uxores , & sanas generasse proles . Simul patuit inte
m curam difficulter successisse . Varia quidem tentavit . Spadanorum ,
his similium , fontium usus , uti & balsami copaybae usus moderatus
osuerunt prae reliquis .

S. 1460. Inflatio membri virilis tollitur cataplasmate anodyno , disci
tiente , emolliente , fotu simili , venae sectione larga ,
& dictis (§. 1458) .

Antea ad §. 1447 de mirabili structura penis dictum , & quomodo in tan
tam molem possit erigi , dein iterum flaccessere ; turgentibus nempe corpori
bus cavernosis penis solius , vel & corpore cavernoso , quod urethram am
bit , glandisque penis externam substantiam constituit ; uti tunc pluribus di
ctum fuit . Ad §. 1449 parit , quomodo saeva inflammatio penem occu
pare queat ; unde mira membri deformatio , & distortio in hoc illudve la
tus , incurvatio sursum , aut deorsum , dysuria , dolor acerbis sequi possunt ,
& alia gravissima mala .
Si sic affectus penis caleat , doleat , nullo modo cunctandum est ; sed cito
valida cura antiphlogistica adhibenda , vel brevi gangraena sequetur , quam
curari difficilem esse , antea ad §. 432 monitum fuit . Unde statim larga san
guinis missio instituenda est ; repetenda si opus fuerit ; ut cita fiat penis sub
sidentia . In praecipiti casu turgentem admodum venam , quae per dorsum
penis decurrit , pertudi lanceola ; dum simul & ex brachio sanguis mitteba
tur . Simul dabam decoctum purgans ex tamarindis , foliis senae , agaric
sale polybrepto &c . omni hora ad uncias duas ; donec alvus copiose inciperet
artificialem diarrhoeam eodem remediis , sicque tumens penis subsidere inciperet
aliquot dies ; coepit fluxus materiae viridis gonorrhoeae ex pene stillare , &
quidem

(*r*) Syphilis pag. 445 & seq.

molestum, quod mali cuiusdam latentis adhuc, nec satis ex corpore expulsi, tristem & perpetuam miseris suspicionem faciat.

Nec facile est hunc metum tollere illis, qui iuvenilibus annis vixerunt imprudenter. Novi, qui decies repetita falivatione in tabem immedicabilem incidit, dum latens metueret malum. Fovent turpes agyrtæ hos scrupulos, & scelesti lucri causa argentum vivum larga copia exhibent miseris ad extirpandum scilicet radicibus malum, cuius nequidem adeo est vestigium. Quivis agyrta novum iactat arcanum; aliam argenti vivi administrandi methodum habet, nemini mortalium cognitam; mercurium, ubicunque latet in corpore, extricare & expellere novit de corpore; aliasque plures similes ineptias venditat, quibus creduli aegri fidem facile adhibent, & miserrime decipiuntur.

Si ergo orificia ductuum, mucosum humorem in urethram eructantium, dilatata manserint, post gonorrhoeam sanatam, vel erosa hauerint, perget effluxus perpetuus visceris talis liquidi, maiori minorive quantitate abique ullo latens contagii venerei metu. Imo talis effluxus poterit esse im-

Opportunitatem habuit *James Drake* (*) videndi hanc rem in cadavere proprii famuli, qui per aliquot annos pertinacem talem fluxum materiae viscidæ toleraverat, dein peripneumonia mortuus. Inveniebatur caruncula, quæ in ductu excretorio glandulæ *Covperianæ* finitiræ locari solet, ulcere olim erosâ fuisse, ita ut binorum ductuum orificia in unum abdiverint: figuram addidit, quam ipse *Covperus* delineavit. Sequi hinc debuit perpetuus fere effluxus viscidæ materiae, quæ ab his glandulis paratur (*glees* vocant); quod idem contingere debebit necessario omnibus, quibus simile infortunium accidit; sive in his glandulis *Covperianis* dictis, quæ conspicuam satîs molem habent; sive in aliis ductibus excretoriis minoribus, per urethrae cavum dispersis.

Inde etiam intelligitur diversitas copiae illius fluxus; prout nempe maiores vel minores tales ductus, maiori minorive numero, simili modo affecti fuerint.

Quidam tales ductus, maiori minorive numero, simili modo affecti fuerint. unde tabem crediderunt, semen esse, quod sic perpetuo stillicidio efflueret; humor est a dorsalem, & summam debilitatem, metuebant; sed mucosus. Solet ille a femine omnino diversus.

Solent illi fluxus, licet ab sit venereum contagium, tamen incommodus esse, quod plerisque latentis adhuc alicuius mali metum faciat perpetuum; imprimis autem illis, qui frequentius gonorrhoeam virulentam passi sunt; unde anxie quaerunt remedia, ut ab hoc metu liberentur saltem, dum fluxus ille siccat. Ex dictis patet, non semper curari posse; interim quaedam laudari solent, quae saltem nocere nunquam poterunt, & quandoque aliquantulum profunt, dum simul cavent, ne tales aegri ad periculosa remedia confugiant, & ab agyrtis decipiantur.

Primum, quod suadere soleo, est, ut a perpetua fere genitalium contractione

(*) Anthropolog. nov. tom. I pag. 140.

tionem causant: solent enim curiose inquirere, an augeatur, vel minuat
possint; vel colorem mutet; penem premunt experturi, an quid exprimere
quam sicque secretionem & excretionem illius mucosi augent potius. Ma
bosam em in adstringentibus & excretionem illius mucosi augent potius. Ma
facile occurrere solent. Si innocua imprimis interno usu adhibenda petunt,
fuerint poterunt concedi. Si innocua imprimis interno usu adhibenda petunt,
impen conservam rosarum rubros, canthorum lapides, succinum, ma
vero, e laudaverunt; in quibus adhibendis faciles nos esse oportet. In illis
per i quae topice sunt applicanda urethrae, magna cautela opus est. Si enim
tur ediciones validiora applicanda urethrae, alumen, vitriolum, saccha
P curmi, constrictiones urethrae applicentur, uti & balsami copaybae usus moderatus
cop ures casus collegit Turneri (9), qui docent, tali fluxu, licet satis
vili olo, sed viscido, instar albuminis ovi, laborantes, matrimonium ini
gr nec infecisse uxores, & sanas generasse proles. Simul patuit inte
P m curam difficultate successisse. Varia quidem tentavit. Spadanorum, uti
P osuerunt prae reliquis.

1460. Inflatio membri virilis tollitur cataplasmate anodyno, discen
& dictis (S. 1458). tiente, emolliente, fotu simili, venae sectione larga,

Antea ad §. 1447 de mirabili structura penis dictum, & quomodo in tan
tam molem possit erigi, dein iterum flaccescere; turgentibus nempe corpori
bus cavernosis penis solius, vel & corpore cavernoso, quod urethram am
bit, glandisque penis externam substantiam constituit; uti tunc pluribus di
ctum fuit. Ad §. 1449 patuit, quomodo saeva inflammatio penem occu
pare queat; unde mira membri deformatio, & distortio in hoc illudve la
tus, incurvatio sursum, aut deorsum, dysuria, dolor acerbis sequi possunt,
& alia gravissima mala.
Si sic affectus penis caleat, doleat, nullo modo cunctandum est; sed cito
valida cura antiphlogistica adhibenda, vel brevi gangraena sequetur, quam
curatu difficilem esse, antea ad §. 432 monitum fuit. Unde statim larga san
guinis missio instituenda est; repetenda si opus fuerit; ut cito fiat penis sub
sidentia. In praecipiti casu turgentem admodum venam, quae per dorsum
penis decurrit, pertudi lanceola; dum simul & ex brachio sanguis mitteba
tur. Simul dabam decoctum purgans ex samarindis, foliis senae, agarice,
sale polybreffo &c. omni hora ad quae tumens penis subsidere inciperet:
nec, sere ad animi deliquium usque, sed minori copia dato, sustinui per
artificialem diarrhoeam eodem remedio, viridis gonorrhoeae ex pene stillare, &
aliquot dies; coepit fluxus materiae quidem

(9) Syphilis pag. 445 & seq.

quidem copia magna; sicque ab imminente siderationis periculo, & penis mutilatione evasit aeger. Mollissimis fomentis, additis & antisepticis tegebatur penis, & vicina; de nocte ex similibus cataplasma paratum applicabatur perpetuo (formula in materia medica ad hunc numerum habetur), quod ex lacte ebutyrato acido paratum omni putredini resistebat efficaciter. Addebatur & aliquid de spiritu vini, vel alio liquido aromatico spirituoso, ne nimis flaccescerent partes affectae ab assidua fomentatione. Spirituosa enim nocent, nisi admodum diluerentur; unde huic cataplasmati vix trigesima pars spiritus vini theriacalis admiscebatur. Vidi iuveni, cui imprudens & ignarus barbitonsor incipientem scilicet gonorrhoeam curaturus applicauerat spiritum vini larga copia, penem intumuisse horrendo modo; dum alter praevidens curacionem antiphlogisticam adhiberet animos, ex pene languis ad libram & ultra prorupit; unde tumor subsedit, & sequenti die fœdatus fluxus amurcosus sanguinolentus prodiit; a quo malo tamen integre curatus fuit trium mensium spatio.

Præputium pendulum, & laxum nullis fibris muscularibus prædicitum cuticula constat, & cute remi; adest & membrana cellulosa tenuis, admodum dilatabilis, quae nunquam pinguedinem colligit, nisi in castratis: textura tota vasculosa, & nervosa est. Miri tumores in membrana cellulosa præputii fiunt pellucidi inflati quasi, qui glandem totam tegunt, & ultra illam prominent, tuncque talis tumor *phymosis* dicitur, quando tumens præputium reduci nequit, nec glans detegi; ubi vero præputium, pone glandem retractum, simili tumore pellucido inflatum tumet, annulo turgente penem cingit circa coronam glandis, quae tota nuda prominet ultra hunc anulum, tunc præputium adduci nequit, ut glandem tegat; vocatur tunc *paraphimosis*, de quibus antea ad §. 1449 pluribus dictum fuit.

In hoc casu dicitur penis inflari, licet tumor non in corporibus eius cavernosis, nec in corpore cavernoso urethrae, sed tantum in praeputio haereat. Talis tumor saepe adest absque ulla inflammatione, adeoque non semper curam antiphlogisticam requirit. Verum quidem est, tales tumores, dum phymosi liberum, premendo glandem inflammare posse; imprimis in praeparie in phymosi exitum urinae, & fluxus gonorrhoeae impedire; praeciparent, quum nec glans nudari possit, nec interior superficies tumentis, & mirò modo intortì praeputii confici; adeo semper metus adest. Hoc tamen notandum videtur, si nec calor, nec alia inflammationem comitantia signa apprehendantur in parte affecta, tales tumores non indicare validam curam antiphlogisticam.

Simul pariet homines circumcisos, vel recutitos, quibus praeputium pone coronam glandis perpetuo retroductum haeret, phymosin nunquam pati, & raro paraphymosin.

Phymosis saepe fit, dum ulcus venereum penis glandem, vel internam superficiem praeputii erodit, & quandoque tantus tumor nascitur, & praeputium tumens adeo intorquetur, ut urinae liberum impediatur exitum, dum simul tabus

præputium & glandem retinetur, mora acrior redditur, eas alluit, profunde exedit; unde pessima mala metuenda parari possit tabo retento. Omnium optimum est, siphonum inter tumens præputium & glandem introducto aquam frequentius de die, sed egelidam; sicque omnem eluere forgentia enim, etiam leniora, adeo augment dolorem, ut ferri collissimis simul fomentis, & cataplasmatibus perpetuo obvolvitur omnis caveatur inflammatio. Hoc si obtineatur, aliquid plus de additur, ne tenera hic cellulosa contabescat a perpetuis fomentis, & in tabum gangraenofum diffuset, dum incipit collabi. omnia haec artis

omnia haec artis sanguinolenta diffuata, dum incipit collabi.
 ubi laborante, in ipsa cute penis prodierunt plusquam quinquaginta ul-
 tra, quae ingentem puris venerci copiam fundebant, dum maior adhuc
 vitas similis materiae ex spatio inter praeputium & glandem medio pro-
 di- r: gravitas mali mutilationis metum incusserat; quum tamen integre
 s essent, & ingens periculum reddidisset morigerum aegrum, ex tanto
 crimine evasis incolumis.
 Praecipitur autem

Praecipitur quidem ab auctoribus, si urina parce, & cum dolore exeat, pro parte sub praeputium regurgiget, ut cannula plumbea, vel argentea urethrae intrudatur (eo scopo, ut urina facilius exeat), & sic armetur funiculis cannula, ut in loco maneat; aliquoties tamen removenda, ut urethrae status exploretur, & fordes, quae adhaerescunt, eluantur (x). Sed, qui hos morbos frequentius viderunt, probe norunt, adeo tumere in valida phymosi praeputium, & tam miro modo intortum esse, ut cannulam urethrae immittere vix possibile sit, antequam partes affectae detumescere coeperint, & simul hoc tentari non posse absque doloris augmento omniumque malorum exacerbatione. Purgantibus antiphlogisticis largas evacuationes tentavi praemissa venae sectione, etiam repetita, si valida inflammatio hoc posceret; sique obrinui, ut tumores illi subsiderent, urinae rediret libertas, & ulceribus detergendis, fordibusque eluendis commoda daretur occasio; solis tamen lenioribus usus fui tantum metuens, ne aeger si adhibitis recrudesceret malum. Prudentius consilium est (a), ut aeger si morbus urgentior fuerit, in lecto decumbat, situ corporis supino, & quietus otiose iaceat, tum ut remedia commodius possint admoventi & contrariari; tum potissimum, ut coles ad ventrem deligari possit, quod in omni curatione eius necessarium est, Celso (b) monente, qui hos morbos vidit, & descripsit, sed non ortos a contagio venereo, de quibus hic agitur. Si ex inflammatione coles innumis, & rursus induci nequit, multa calida aqua fovendus, & abstinere a cibo debet, & potione aquae fomento, & tenuissimo victu aquae, ac si non parca, leviter summa scalpello incidenda.

(a) Affrue de morbo venereo. (b) Lib VI. pag. 260.

{^a) Affrue de morib. vener. lib. III.
{^b) Lib VI, cap. XVIII.

cap. VIII, pag. 261.

(a) Ibidem pag. 260.

erit. Nam, quum sanies profluxerit, extenuabitur is locus, & facilius curatur.

Licet autem phymosis, & paraphymosis, uti aste dictum fuit, absque contagio venereo nascatur frequenter in innocuis infantibus, & pueris, tamen & saepe ulcerationem comitem habet, sive a retenta urina inter aretius praeputium & glandem, sive a laesione externa per frictionem, contusionem &c. Celsus (c) enim dein addit sequentia: si autem hoc modo ~~villa~~ erit, sive nunquam repugnaueris, ulcera vel in cutis ulteriores partes, vel in glande, vel trave cam in cole reperientur. Dein varia ad haec ulcera sananda recenset remedia.

Si idoneis adhibitis remediis non cedat inflammatio, & a tumente praeputio compressio ac suffocatio glandis suppositae metuenda sit, forfice, vel scalpello hodi praeputium ad alterutrum, vel utrumque glandis lacus iusserunt auctores (d), ut solvatur haec strictura. Celeberrimus Astruc rem hanc levioris momenti habet; hinc vel forfice, vel scalpello pro cuiusvis arbitrio tentari posse voluit. Scalpellum tamen videtur forfici praeferendum, qui inter scindendum semper plus minusve contundit. Locum autem inflammatum, & adeo sensibilem discindere summum dolorem excitat, nec statim evanidum post sectionem factam; imo merito metuendum est, ne inflammatio augeatur immaniter, quod factum novi. Cum periculo enim, & sine profectu discindi locum inflammatum, alibi ad §. 405 demonstratum fuit. Sincere fateor, me nunquam consuluisse praeputii fissuram, dum validum tumore inflammatorio occupabatur, imo impedivisse, dum potui. Animosè adhibita cura antiphlogistica semper obtinere potui, ut subsideret tumor, & cura succederet. Ubi autem praeputium tumet valde, & non inflammatum est, vel leviter tantum, acetum lithargyrii, ducentis aquae participet, ut a tumoris instar cum successu adhibui. Si talis casus continet, tunc profundae incisioni praeferenda esset Celsi methodus, de qua statim dictum fuit, qui summa tantum concidi voluit, ut sanie profluente attenuetur locus.

Celeberrimus Alexander Monro (e) collegit curationes quasdam medicas, quae praeter expectationem contigerunt, & inter illos habetur sequens.

Homo sanus mediae aetatis contusionem extremi penis passus fuerat: praeputii pars, quae froenum glandis constituit, in largum crystallinum tumorem surgebat. Topice applicabantur somenta aromatica, & suffumigia; purgantia dabantur absque tumoris decremento. Setaceum tenue traducebatur per tumorem hoc scopo, ut via pararetur liquido aquoso distendenti, & blanda conciliaretur suppuratio. Eventus spem concepam fecellit. Acutus enim dolor, & violenta inflammatio sequebantur, ita ut setaceum educi debuerit, & applicari cataplasma emolliens. & lacte & pane paratum. Sequenti die tumor multum erat imminutus; altero die integre disparuit, nec rediit amplius. Si

(c) Lib. VI cap. XVIII pag. 393.

(d) Medic. Essays and observat. vol. V. part. 2. n. 47 pag. 494.

(e) Astruc de morb. ven. lib. III cap. VIII pag. 167.

imentis praeputii per setaceum facta acutum produx-
dam inflammationem, videntur adhuc peiora metuenda
one similis tumoris.

git, ut tumores penis inflammatorii copiosis sanguinis
pro parte resolverentur tantum, & durum quid scirrho-
primis autem hoc contingit, si, deservescere iam malo,
partium harum proprie, & per fomenta ac cataplasmata
tuo applicata auctae, prospicere volentes, spirituosam libera-
dens homo, absque medici consilio spiritu vini camphorato
praeputium. Ubi recens adhuc malum est, emendari pote-
andoque integre superari, si nocte foveatur sex partibus vini
parte aceti, addendo singulis libris talis fomenti drachmam
ici. Mane post lenem frictionem tegatur pars *emplastro de mu-*
vel meliloto. Casus tales non sunt oppido rari. Celebris *De La Poy-*
observavit tales indurationes in corporibus cavernosis penis,
bant efficaciae argenti vivi, sed, deleta omni contagio venero,
bant feliciter fontibus Baregianis, externo imprimis usu adhibi-
tu (la douche); harum aquarum defectum lixivium cinerum ligni
lere creditur (f).

Bubo veneris tollitur; dissipando per emplastra singula-
ria; suppurando, si haec non profunt; & aperta de-
co.

ca ad §. 1448 de bubone venerico dictum fuit, & data fuerunt signa,
s possit distingui ab aliis tumoribus, qui occupant inguina, & quando
in aliis morbis occurrunt.

Observatur aliquando, bubones solventibus remediis cedere haud diffi-
er, frequentius tamen haerent diu, satis lente in suppurationem vergunt,
de maturantur, & in ulcera satis difficilis curae degenerant, quae non
ve taedium parant. Aliquando in scirrhum indurantur, ad optima etiam
media rebellem.

Dissipatio bubonis, si obtineri queat, a pluribus desideratur; quum autem
contagium venericum in bubone adsit, hinc & multi meruerunt certam luem
venericam, si, dissipando tumorem, contagium sanguini admisceretur.

Antonius Musa Brasavolus (g), qui in lue curanda magnum olim habuit
nomen, ambigit, numquid immaturus aperiri debeat eiusmodi abscessus, an ulti-
ma concordia sit expectanda? ego semper immaturum potius incidi voluerim, non
tamen penitus immaturum; ne ob doctorem inflammationem exoriat: imo, si inciso
etiam fieret, antequam pus adesset, cerneret. Nam malum non est, ut aliquis
ad sit

{f} Mem. l' Acad. de chirurg. tom.
{g} Aphrodisiac. pag. 684.

adfit dolor, ob quem materia ad locum trahatur, & decurrat; postea apertum servetur, quantum fieri poterit ulcus. Plures deinde in eadem opinione fuerunt non tantum, sed duos, inflammatos bubones disciderunt, cum summo aegri cruciatu, secundum totam tumoris longitudinem, ut quantocyus viam pararent, per quam exire posset contagium susceptum. *Brasavolus* tamen cavere iussit, ne penitus immaturus bubo incidere; licet noluerit, ultimam concoctionem duri tumoris expectandam esse.

Ubi de cura inflammationis, quae in glandulosis carnibus nascitur, agit *Galenus* (b), citam talium tumorum aperturam damnat. *Quin* si pus ali- quod notabile in suppurante parte sit contentum, non expedit (quod *novum illi* fuerit) protinus incidere, imo dissectionem moliri medicamentis ad id valentibus, quorum usus ex afflictu sit coniciendus. Quum enim phlegmones quidquam in parte re- stas, acia medicamenta potius irritant, quam discutunt. Quum vero, quod ex phlegmone reliquitur, scirrhusum effectum videtur, fidenter iam valentibus medicamentis uteris. lubet mane & vespere sollicite inspicendum esse lo- cum affectum, ut pro re nata imponantur mollientia, si locus tumescit aut rubicundior sit, aut magis doleat, & contra adhibeantur validiora, si scirrhusos phlegmonae sint. Sin aliquando puris copia medicamenta superet, nec ea videantur tibi solum discutere posse, secare, quod sit abscessus, eo possi- mum loco oportet, quo est editissimum; quippe tenuissimam etiam allic inve- nies cutim.

Novi quidem, qui aliam opinionem tuerent, urgere posse, quod *Galenus* luem venereum non cognoverit; adeoque illa de curandis bubonibus monita nullam in tractandis bubonibus venereis auctoritatem habeant, quum in hoc casu imprimis requiratur, ut susceptum contagium, in bubone fixum haec- casu imprimis requiratur, ut susceptum contagium, in bubone fixum haec- casu imprimis requiratur, ut susceptum contagium, in bubone fixum haec- casu imprimis requiratur, ut susceptum contagium, in bubone fixum haec-

cyus incidendus sit. Verum illud inficiens haeret in parte dura bubonis, aequae ac in illa, quae iam incipit maturescere, aut & in paucis pure, quod iam factum est, & quod diutius relictum, solvisset sensim durum illud am- biens, ac in pus mutasset. Quando autem cito discinduntur bubones, aer accedens maturationem reddit difficiliorem, & dura haec longe diutius haerent, neque raro in scirrhum degenerant.

Acrius in illos, qui erudos bubones incidunt, invehitur *Fallopianus* (i); maturos vero incidi iubet per totam longitudinem secundum inguinis ductum; laudat tamen magis causticum; quia per illud auferimus quantitatem cordi, & fit laevis ulcus, nec remanent cavernae; sinus nempe, & fistulae curatu quam maxime difficiles. Ob eandem rationem noluit bubonem iam maturum ma- nere clausum, donec sponte aperiatur integumenta a sanie erosa pluribus & parvis aperturis; unde pariter fistulae metuendae sunt. *Similia* & *Botallus* (k) consuluit.

Gravissima enim mala a bubonibus, & fistulis inde natis metuenda sunt, si

(h) *Method. med. lib. XIII cap. V Charter. tom. X pag. 298.*

(i) *De morbo Gallico cap. XCI. Aphrodis. pag. 821.*

(k) *Aphrodisiac. pag. 873, 74.*

ant, ita ut integre discindi nequeant. Pus enim quam fit, & gangraenam facit versus abdomen proropen-
arteria cruralis a tali pure erosa subito lethalem haer-
Binos milites sic periisse testatur celebris Goulard (1).
rimi viri Boërhaave, Astruc, & alii plures incipientes
entaverint, & , ni hoc succederet, ad suppurationem de-
duros, inflammatos bubones disciderint nunquam, tan-
stigia sequens, propriis observatis illorum curandi metho-
ssum.

nes nec mole nimis magnos dissipare tentavi emplastris
gummi, ferulacea dicta, galbanum, ammoniacum, sagape-
lia continent, quorum plura in officinis prostant, quae ab
l simul iunctis nomen obtinuerunt, & vires insignes. Ad
n laudatur *emplastrum de ranis* dictum in officinis; praeci-
argens vivum additur, & quidem varia quantitate; unde
argens vocatur cum mercurio duplicato, triplicato &c. Mo-
i est ab hoc emplastro non raro salivationem excitari, si
ne hic agendum est, ut hic argenti vivi admista fuerit; quod, quum non semper re-
lerumque non resolvuntur facile, & ubi suppuratio requiritur,

l maturationem deducuntur; hinc videmus omnes fere adhibuisse
cuti fortiter adhaerent, sed & efficacem satis aromaticam, ac-
vim habent; ubi quum cum fructu aliis tumoribus pertinaci-
ntur: utramque virtutem possident gummi ferulacea, & pix su-
stat autem prius pilos inguinum reseccare, ne magnam molestiam
um haec emplastra renovari debent. Binae talium emplastrorum
in materia medica ad hunc numerum deferuntur; in quibus notan-
quod flores *sulphuris* larga copia addantur, & in uno *saccharum*
constituitur; totius massae circiter in altero, quod picem futuri-
acetici tantum, totius sit idem *saccharum plumbi*, quod ut notum
stipicam repellentem in *saccharo saturni* adesse, communis erat opinio;

lim multi damnaverunt has formulas; sed Goulard (m) magno cum
i adhibuit saturatissimam *plumbi* solutionem in aceto, quam *extrahum*
ii vocat ad curandos bubones venereos. Diluebat illud ducentis par-
aquae purae, & fomenti *instar* adhibebat (vocabat hanc miscelam
n *vegeto-minerali*), vel in eodem coquebat micam panis ad cata-
na parabat; & ex *saturni extrahum* ceratum. Talia applicabat buboni-
, & resolvebantur, licet magnae forent molis, & fluctuatio manifesta
geretur, transudante puris copia per integrae manentis cutis poros, quae
totum

(1) Remarques & observat. sur
(*) Ibidem cap. III pag. 99, 101 &

les

malad. vener. § 71 pag. 106.

notum apparatus humectabat quotidie (*). Idoneis testibus huius asserti veritatem firmat.

Si speratae resolutioni pertinacius resistat bubo, nec mole minuatur, imo potius augeatur, de suppuratione promovenda cogitandum est. Quenam requirantur, ut maturatio in abscessum obtineatur, dictum fuit ad §. 403, ubi de hac re agebatur. Eliguntur autem ad bubonem maturandum, quae potenter emolliunt, & stimulo moderate calefaciente solvunt impaeta. Ad hunc numerum in *materia medica* habetur formula cataplasmatum suppurationis, cui basin dant ficus molles maturae, in aqua concoquendae diu, donec in pulpam mureantur, cui additur mel, & *gummi galbani* solum in vitello ovi prius, ut aequabilissime per totam cataplasmatum massam possit distribui. Optimum est, si talis pulvis nudae cuti imponatur, & tegatur deinde vesica sicca discissa, cuius superficies cataplasmati contigua futura inungitur, & stricatur oleo amygdalino, ut mollescat. Sic impeditur, ne cataplasmatum humiditas, & galbani fragrantia a calore corporis dissipentur facile extorserunt; sed fit, ut perpetuo in bubonem agant. Ita longe citius obtinebitur maturatio, simulque cavebitur, ne indusum, & lecti lintes, tam facile conspurcentur. Mane, & vespere renovatur tale cataplasma.

Facile patet ad normam huius cataplasmatum plura similia mutatis ingredientibus, posse componi, quae eandem habent efficaciam. Ubi maturatus bubo est, sectione paratur via contento puri, ut liberrime possit effluere non tantum, sed & facilis detur occasio applicandi remedia varia fundo bubonis, qui saepe sordibus invenitur, & acriora etiam detergentia postulat, ut depurari, & dein sanari possit.

Haec est ratio, quare bubo emollitus secundum longitudinem totam discindatur potius, quam minori apertura pertundatur tantum. Hoc facto premendo digitis vicina loca inquiritur sedulo, an quid sinuosi, aut fistulosi in ambitu ulceris occurrat, ut & haec discindantur, si tuto fieri possit, sique sanatio acceleretur, quae alioquin in longum protractatur.

Fortia depurantia, imo & erodentia prudeniter applicari solent fundo ulceris, ut levis quandoque eschara nascatur, quae aucta suppuratione facile separatur, & fundum puriorem relinquit. Si quaedam loca iam pura sint, molli digestivo teguntur, dum reliquis, quae adhuc fordescent, insperguntur acriora. Talis pulvis in *materia medica* ad hunc numerum describitur, qui ex uncis duabus foliorum scordii pulverisatis, drachmis duabus vitrioli albi, & aloë drachma componitur. Alii applicaverunt acriora tione de praecipitatis mercurialibus. Celebris Graebius edidit dissetta, & huic eddidit notas, quam Academia regia chirurgica coronavit; culter suppurationes, escharotico applicato ex mercurio sublimato, brevissimo tempore in tabum purulentum liquefcere docuit experientia. Multa tamen hic prudentia opus, ut rite administrari possit illud remedium, etiam externo usu;

(*) Ibidem pag. 118, 119.

(o) pag. 100.

limum, qui in aquae fundo colligitur, apponendo quotidie, ut coagulata limpha sensim liqueat, & tandem resolvatur &c.; cauto tamen opus est, ac si bubo inde rarefcere, calefcere, dolere incipiat, ihermarum usu statim abstinat, ne scirrhus in carcinoma degeneret. Baregianas thermas reliquis praefert, quarum defectum, uti alia occasione monui, celebres chirurgi Galli lixivio cinerum ligni novi suppleri posse censent. Probabile videtur & alias thermas non sine fructu tentari posse. Olim praxin exercens in locis, in quorum vicinia nullae erant thermae, arte illas imitari conatus sum, dum limaturae ferri, & sulphuri simul tritis, aquam affudi, quam ad altitudinem duodecim pedum delabi curavi in partes corporis affectas. Nec infeliciter cessit.

Alia occasione ad §. 1228 monui ex observatis *Rayschii* (1), discisso bubone venereo, ante perfectam maturitatem vas lymphaticum dissectum fuisse, unde magna copia lymphae effluebat quotidie. Peritissimus ille anatomicus splenis infra locum affectum impositis, & per fibulam arte compressis compescuit lymphae per vasa ascendentia lymphatica motum, & curavit feliciter molestum illud stillicidium.

§. 1462. **T**estis tumidus fovendus similibus (1460.) = si urget, educendus sanguis ex brachio; emplastro quoque scroto applicato levandus; donec redierit in statum plane naturalem.

Antea ad §. 1450 de tumore testis in lue venerea, vel saltem a contagio venereo nato pluribus dictum fuit: paruit tunc, ad talem testis tumorem producendum non semper requiri, ut miasma venereum in ipsam testis substantiam usque penetraverit, sed sufficere, si liber exitus humoris, testium mirabili fabrica parati, a quacunque demum causa fuerit impeditus. Notatum fuit simul omnium frequentissime sequi testis tumorem a gonorrhoea suppressa, aut parcius solito fluente, uti etiam post usum imprudentem acrim calidorum diureticorum. Unde, & dum redit fluxus materiae gonorrhoeae, cavent aegri ab usu diureticorum irritantium; qualia sunt, balsama sulphuris, oleum terebinthinae aetherum &c.. Feliciter subsidere solet testis tumor breviter, & integre curari, si recentis malo debita adhibeatur medela; secus vero inflammatio, & omnes eius sequelae metendae sunt.

Si ergo testis tumere incipiat, tumor augeatur cito, caleat ad tactum, cutis scroto tendatur & rubescat, febris adsit, illico larga sanguinis missione succurrendum erit; quae & repeti debet, donec symptomata minuantur multum. Purgans tunc datur antiphlogisticum satis actuosum, cuius formulae diversae in *matéria medica* ad sectionem 396 num. 2 habentur, ubi de cura inflammationis agitur; scroto somentis mollissimis obvolvitur, in quibus additur ad singulas libras drachma salis ammoniaci, & una vel altera aceti uncia. *Sydenhamus* (2), licet etiam non adeo recens esset testis tumor, simili methodo uteba-

(1) Observat. anatôm. chirurg. n. 41 pag. 40.

(2) Epist. II responsoria pag. 425.

Neque mihi religio est, quocumque butus mali tempore sanguinis un-
 det, si tamen, vel decem e brachio isto detrahere, quod testiculo tumefactio respon-
 sionis magnitudo, & vehementia doloris id mihi suadeant. Omni-
 do tentanda est resolutio testis tumidi, ut praecevantur alii inflama-
 exitus saepe x emollientibus hic periculosi, & semper curatu difficiles. Unde &
 que a cunctis doloribus, testium tumorem toties comitantes, topica applicatio-
 ne leniuntur. Cataplasma ex oxycrato, & farina fabarum applica-
 bat niori cathartica & refrigerantibus remediis, ac tenuiori diaeta ute-
 batur. Simul, ut morbum debellaret. Emulsus dilutus nitrosis copiose pota-
 tis accaveretur tencigo venerea hic metuenda.
 P. Indus tumidi testis distrahatur funiculum spermaticum, sicque dolorem,
 sustinetur, fomenta producit. Decubitus in lecto hinc requiritur: sic enim testis
 fertur. Ubi per haec commodè applicantur, & pro lubitu facile renovari po-
 sunt. Ubi per haec commodè applicantur, & pro lubitu facile renovari po-
 scini debet testis, ut aegri de lecto surgere possint tuto. Simul tunc
 otum regitur molli emplastro mucilaginum, diapompholygos &c. (vide ma-
 re iam medicam ad hunc numerum). Multi utuntur emplastro de ranis cum
 mercurio ad eundem scopum, vel & unguento mercuriali tumentem testem
 fricant, dum post inflammationem iam multum imminutam scirrhusa indu-
 atio meruitur. Frictionem autem mercurialem tamdiu quandoque adhibent;
 donec sequatur lenis salivatio, quae profuit (v). Alii purgantibus mercu-
 rialibus validis usi fuerunt, praecipue turbit minerali; nec infelicitur, si
 nempe adhuc recens fuerit malum, & per sanguinis missionem, methodum-
 que antiphlogisticam fuerit suppressum.
 Si gonorrhoeae suppressio fuerit tumorem praecesserit, subita resolutio spe-
 randa est, simulac redierit fluxus satis copiosus per urethram; qui ergo
 dum scirrhusa in teste durities re ante ad §. 1458 dictum fuit.
 xternum & internum usum cicutae post testis inflammationem manebat.
 er iniectionem adstringentem suppressa profuisse novi. A gonorrhoea subito
 nnum in scroto tumor durus oriebatur viro quadraginta septem
 si tamen ambo erant immunes, & scirrhusos pugno virili maior. Testi-
 or frustra tentatus emplastris, & fomentis, remediis mercurialibus fortissimis,
 et salivatione. Extractum cicutae datum fuit, aucta successivo dosi; sed
 vigesimo die integrum cicutae extractum datum fuit, aucta successivo dosi; sed
 e, nulla observabatur in tumore cicutae drachmam coeperit sumere ac-
 nidiam sumisit eiusdem remedii mutatio. Trigesimo die drachmam &
 so die aeger iam sumebat quotidie purgans mercurio dulci mistum. Quadra-
 nor minuebatur. In hac dosi extraëti cicutae drachmas duas, &
 ni decimo quarto die lene purgans mercurialis; tunc tumor fuit penitus
 disso.

Hoffm. med. ration. & systemat. tom. V pars II.

diffolutus, & homo integre sanus. Potaverat autem curae tempore copiosum decoctum radicum bardanae (*).

§. 1463. **P**ustulae, & cancri dicti mercurialibus erodendi ad vivum usque, tum sensim lenioribus sanantur iisdem.

Quomodo cognosci haec, & ab aliis malis similibus distingui possint, antea pluribus ad §. 1444 dictum.

Facile intelligitur, in tractandis his malis magna cautela opus esse: constitit enim ex illis, quae ad §. 1445 dicta sunt, miasma venereum in cute externa haerens, quod pustulam, aut cancrum venereum produxit, posse ex loco affecto dispergi per totum corpus, & pessima mala facere.

Crediderunt quidam posse tolli totum malum, si simul & semel pustula talis suspecta, vel cancer dictus venereus, destrueretur integre; quod validis escharoticis remediis tentabatur, hac spe, ut ipsum miasma susceptum una cum integumentis corporis, quibus adhaeret, in escharam mortuam converteretur.

Succedebat talis cura olim in similibus malis, quae non a contagio venereo, sed ab aliis causis nata fuerant in genitalibus utriusque sexus. *Laufmann*, celebris olim chirurgus, qui circa annum 1296 scripsit, ducentis circiter annis ante luem veneream in Europa cognitam (*) utebatur ad ulcera penis curanda collyrio, quod ab ipso nomen habet. Constabat illud remedium ex libra vini albi, drachma viridis aeris, & drachmis duabus auripigmenti; quod dabat acre satis remedium topicum. Alii auctores, qui similia mala in genitalibus a contagio venereo nata tractabant, tentaverunt simili modo extinguere illud contagium in illo loco, ubi per pustulam, aut ulcusculum se manifestabat.

Sic *Ioannes de Vigo* (y) de cura luis venereae agens monet curam perfici administratione localium: Imprimis veniendo ad originem morbi, videlicet ad pustulas, quae solent accidere in virga; dico, quod ex quo istae pustulae (ut superius dictum fuit) non eveniunt, nisi a causa primitiva sine aliqua temporis intermissione proinus medicamine acuto, malignitatem earum interficiente, sunt delendae, ut exinde eorumdem malitia per totum corpus non extendatur.

Verum nunquam absolute certi esse possumus, an contagium susceptum haereat in sola hac pustula, vel ulcusculo: potuit enim facile pars contagii, per venas bibulas resorpti, humorum massam iam infecisse, dum altera pars, in vasis, aut folliculis cutaneis irretita, topicum malum producit.

Ex haecenus dictis enim patuit miasma venereum saepius inficere totum sanguinem, licet nullibi vitium in cute appareat; & post aliquod tempus tantum maculas, pustulas in cute apparere, saepe cum magno levamine dolorum, quibus miseri torquentur, per metastasin deposito ad cutim malo. Li.

(*) Anton. Storck de cicuts tom. II pag. 169, 170.
de la medecine pag. 790.

(y) Aphrodisiac. pag. 452.

(x) Le Clerc histoire

foret, ubi reliquum corpus adhuc illibatum est corro-
denti remedio una cum parte integumentorum,
posse, nullo modo haec felicitas exspectari poterit,
cum humoribus corporis per vasa fluens, postea per
positum pustulas & ulcera venerea produxit. Patuit

§. 144 dicta sunt, quasdam pustulas, & cancrum
licatione contagii nasci; alias a malo per metastasim
acque topicis nunquam tuto confidere licet.
etiam Ioannes de Vigo (x), dum modo citatis statim
ecus faciendum esset, si praedictae pustulae ortum acco-
genti; quia (nisi facta universali purgatione) localia au-
gationem regulariter operando non essent applicanda.
aepe infelicitate cessasse huic auctori erosio cancrorum
n usque per corrodentia: fatetur enim aliquando de-
sionem; quia interdum haec pustulae sanabantur, & iterum
bant cum malignitate carnis; unde operae pretium fuit
im renovare.

tentatur, eschara fit in loco affecto, sub qua latet saepe
quod venis resorptum totum corpus inficit, & in plu-
manifestatur brevi. Memini hoc contigisse sanissimo
npurum coitum contraxerat ulcusculum venereum in cute
hirurgus lapide infernali tetigit locum affectum iactans
urationem per destructionem topici mali. Verum longe
cura: post quadriduum enim tota facies foedis disperse-
brevi post & per reliquam corporis superficiem dolorem
loribus nocturnis artuum torquebatur: in faucibus severam
unde miser aeger pessima quaevis sibi metuens severam
& subivit, ut radicitus curaretur. Similia & Vigo (a): ha-
nem talium pustularum venerearum infortunia: fatetur enim,
methodo malignitatem ulceris, & pustularum interficiendo
, vel pustulosum ad digestionem materiei benignae, & mundifi-
um purgatione multarum materierum perduxisset, tamen post
pustulae scabiosae, & ulceroes, & interdum verrucosae per
argebantur. Unde balnea, linimenta, aliaque adhibere debuit;
ido huiusmodi morbus obedientiam minime praestare solet. pra-
res auferendos, idcirco, quum antedicta curatione iste morbus
ibus, & pustulis removeri non posset, tunc ad ulciora remedia
est; praesertim ad unctiones, & cerota, in quibus ingreditur ar-

antibus patet magna
contagii veneri
sli totum contagium

cautela opus esse, dum tentatur extinctio,
suscepti per erodentia topice applicata illi
adhaerere creditur. Bosallus (b). candida
fa-

fatetur, quod iunior, & aliorum vestigia sequens acris erodentia adhibe-
rit; aetate vero maturior, & artis exercitio cautior factus mutavit sen-
tentiam. Didicit enim haec applicata illis *dumtaxat fuisse praesidio*, qui re-
center morbum contraxerant; sic ut totum, vel pene, quod infectum erat, illo
extingueretur; sed hos vel etiam sanat integre simplex aquae situs, vel repe-
tita (si aliquantulis sit durities) praecipitati aspersio, in nullum discrimen aegrum
inducunt. In praecedentibus autem saepius monitum fuit omnium tutissime
recentia mala venerea tolli, si per fomenta, & leniora rodentia, sic dispo-
natur locus, ut miasma morbosum una cum pure exeat. Ab administratione
enim eorum, quae vehementer carnem subditam extinguunt, ulcus faciem ma-
net octo dierum spatio, quod tantum adest, ut prodesse possit, ut obsit potius
non leviter. Nam, quantum fieri potest, colluvies a parte afflicta e vestigio est
eximenda; nec quia illud aliis imprimitur, ob id plus iuvat: non enim omne
infectum enecat; sic, quod reliquum est, occlusa per causticum illi via circumfi-
sam ulteri carnem valentius inficit &c.

Non incongruum erit quaedam hic addere de *Verrucis venereis*, quae saepe
genitalia in utroque sexu obsident, & non leves molestias pariunt. Notum
est, quandoque praeputii internam superficiem, & imprimis penis glandem
totam, talibus verrucis hirtam reddi. Adest enim hic numerosa series pa-
pillarum sentientium nervosarum, quae a corona glandis usque ad urethrae
orificium ordinatis stratis superficiei fabricae spongiosae incumbit, atque
exteriorem ita glandis ambitum tegit, ut extremi hic nervi voluptatis &
doloris instrumenta propria, sub tenerrima glandis membrana extrema coër-
citi sibi mutuo incumbentes iaceant. Si ergo tenuissimam transgressum
membranam externam glandis virus venereum hinc ipsam excedit, nu-
dantur hae papillae (c), & quandoque intolerabilem dolorem excitant. Si
nunc cellulosa tenuis fabrica consumitur tabo venereo, solutae ab hoc sexu
papillae excrescunt, faciuntque verrucas venereas, quae aliquando echini
instituta glandem deformant, & omnem fere praeputii motum impediunt. Si-
miles verrucae in pudendis mulieribus, ac circa anum observantur.

Aliquando & in ipso urethrae canali tales verrucas venereas natas vidi, im-
primis prope urethrae finem. In nymphis, & vagina muliebri hae verrucae
proritum vix tolerabilem quandoque faciunt, & scalptrae in malignam indol-
em degenerant, magnaeque molis fiunt; tunc cristae ficus mariticae vocari
solent. Vidit Batallus (*), dum iunior adhuc esset, Hispanum glandem univer-
sam, atque praeputium magnis verrucis obsitam habentem, quae ad tantum molem
percreverant, ut totam glandem obtegerent, praeputium in summum extendentes
cum maximo dolore; quem scire fuit necessum per longitudinem usque ad glandis
radicem; sic enim omnia patebant, & dolor quiescit; multae autem verrucae erant,
quae parvi digiti magnitudinem excederent. Vidit Henricus ab Heers (d) ab
impuro concubitu natas in ima glande, interque illas unam, quae nucis iuglandis
magnitudinem excedebat, & sexaginta quinque capitella, sive verrucas minores
ostentabat.

No-

(c) Aphrodisiac. in praefatione.
medicar. libro unico pag. 84.

(*) Aphrodisiac. pag. 872.

(d) Observat.

Nos
huc
vel
lib
tur,
pro
reputat.
Cui
fandi
mores
Fandit
vel
fuit
dignus
Vid
de
quod
quod

Norunt medici, verrucas semper caute tractandas esse; praecipue, si lata basi cuti quasi inhaereant: ubi a tenui filo quasi pendulae haerent, ligatura, vel sectione tolluntur satis tuto. Ubi autem a miasmate venereo enascuntur, peiorem habent indolem, & quandoque difficillime eradicari possunt, repullulantque saepe maiori numero.

Crudeli quandoque cura tentatae sunt, dum maiores novacula vel forfice rescindebantur, & dein locus, ex quo enatae fuerant, tangebatur aqua forti, minores vero aqua forti tactae erodebantur. Tali methodo usus fuit *Borallus* (*). Findebat praeputium, ut omnes verrucae in conspectum venirent; & tunc illas vel secando, vel erodendo curabat. Simul tamen commendabat usum remedium, quae domando, vel eradicando contagio venereo adhiberi solent.

Vidi aliquoties resectas tales verrucas venereas brevi post repullulasse & numerosiores, & peioris indolis. Vidi post salivationem toleratam nullo modo deletas fuisse, sed immaniter excrecentes totam texisse glandem penis: lapide infernali prudenter adhibito ceciderunt omnes, & integra rediit sanitas. Iuvenis post impurum concubitus plures habuit caneros in glande, & praeputium, qui satis profunde erodebant vicina, & magnum aegro incutiebat metum; unde statim ad salivationem confugit. Sanabantur cito cancri venerei; sed mox numerosae propullulabant in glande penis verrucae; quae postea satis tuto lapidis infernalis attractu sanatae sunt.

Hoc autem pluribus observationibus similibus didici, tutiorem longe esse escharoticorum usum, si vel purgantibus mercurialibus satis validis, vel aliis similibus enervata fuerit contagii venerei malignitas, vel integre deleta; & si prius emollientissimo decocto foveantur verrucae, antequam acriora applicentur post adhibita erodentia, ut cito cadant escharae. Postea vidi lactus, alios in morbis venereiis curandis celebres viros eiusdem esse opinionis. Sic *William Fordius* (f) recenset casum hominis, qui infelicititer curatus a gonorrhoea glandis coronam canceris venereiis & verrucis obstram habebat undique: Meraco decocto zarzaeparillae potato emendabantur cancri venerei quidem; sed non cedebant integre; donec sex uncias unguenti mercurialis per repetitas frictiones consumisset. Supererant tamen post canceros sanatos verrucae, quas statim deleivit communi caustico. Et ideo commendat huius remedium usum, ubi post delerum per medicamenta antivenerea contagium verrucae rebelles manent. Lapidis infernalis usus hoc commodi habet, quod loco determinato possit applicari, absque eo quod diffuset ad vicina, quae non debeant erodi; & simul cito, & fere sine dolore destruat partem, quam tangit: emolliens fomentum citam separationem promovet escharae mortuae; & si quid super sit de verruca, novo attractu lapidis infernalis tollitur.

Interim magna semper cautela praeputii sectione, vel escharoticis, ut prurire, dolere, rubescere

Opus est, dum tales verrucae penis, & praeputii sectione, vel escharoticis, vel & ligaturis auferendae sunt. Si enim incipiant prurire, dolere, rubescere, vel livescere; quod longe peius est; si inflam-

(*) In loco modo citato.

mentur verrucae, imprimis maioris, margines abstiniui semper ab acribus, & solo emolliente decocto curavi foveri perpetuo, dum simul darem valida putgantia mercurialia; ubi imprimis profuit *turbis minerale*, uti alia occasione ad §. 1372, ubi de vermium expulsiōe agebatur, notavi. Sic intra paucos dies vidi cecidisse verrucas absque ligatura, vel erodentibus adhibitis.

Celeberrimus *Alexander Monro* (g) agens de curationibus fortunatis, quae quandoque praeter spem contingunt, recenset unum, alterumve casum felicitis successus emollientium remedium in genitalium morbis, qui alia methodo exasperabantur multum. Iuvenis extremo praeputii margini infidebat parva verruca, quam novacula reseculit. Non diu post praeputii interior superficies coepit obsideri plurimis excrecentiis pallido-rubris, angulo pedunculo praeditis, a quo pendeabant. Dum reducebatur praeputium, in glande videbantur crissae maiores. Unguenta mercurialia, adstringentia, elcharotica, & plura alia incassum tentata fuerant, imo & per sex septimanas salivationem passus erat absque ullo emolumento.

Tentavit celeberrimus *Monro* ligaturam in una tantum verruca circumducendo filum sericeum angustiori cervici. Dum nodus constringebatur, acutum dolorem percipiebat aeger, sed cito evanidum, & bidui spatio cecidit ligata verruca, locufque, quem occupaverat, apparuit laevis, & sanus. Iuniori chirurgo, qui huic ligaturae adfuerat, mandatum fuit, ut & reliquas simili tractaret modo. Sequenti die in alia verruca fuit tentata ligatura; verum, quum meticulousus esset chirurgus, & aeger minus obediens, ligaturae nodus non fuit satis contractus, ut intercepti potuerit omne commercium inter vasa viva, & verrucam. Tota die aeger validum dolorem patiebatur, & sequenti die aderat fortis inflammatio, quae copiosam requirebat sanguinis missionem. Simul applicabantur loco affecto fomenta, & cataplasmata ex emollientibus parata; quibus intra biduum inflammatio minuebatur, & omnes illae excrecentiae insigniter minuebantur. Penitus autem sedata inflammatione, omnes verrucae fiebant rugosae, & usu emollientium non interrupto per octiduum, omnes verrucae evanuerunt, ita ut nullum maneret vestigium, quo indicarentur loca, ex quibus emerferant. Inflammationi natae felicitatem curae tribuere voluit celeberrimus *Monro* potius quam applicationi emollientium. Sed ante iam *Boërhavius* (h) emollientium usum omnibus inculcare conatus fuit: Si imprudens rerum chirurgus nudatam sceni sua membranula superficiei vivam papillosam glandis acribus irritaverit, contigit saepe, ut totum penis corpus dirisissimum in modum inflammaretur,urgeret, priapismo exquisitissimos dolores patiente laboraret. Unde & ad hoc mali genus emollientia, laxantia, hamediania, anodyna, extorsum allicientia, securissima praesidia sunt, quae vel sero applicare cogentis, ubi turbas per rodentia excitatas compescere debbis. Laëte, & albaea praestiti hic, quae argentum vivum nequiverat. Unguento albaea, aut nutrito perfecti quod Aegyptiaco, & mercurialibus negabatur.

Postea

(g) Medical. essays and observat. vol. V, part. 2, pag. 495, 496.
in praefatione.

(h) Aphrodisiac.

facultatis Parisinae medicum (i) cum successu ad-
mati corrosivi in spiritu vini Gallici factam, quadrupla-
tam; viginti autem grana sublimati corrosivi soluta
spiritus vini, adeoque, octo libris aquae additis, grana
i continebantur in singulis libris huius miscelae, quae
ione non potuit nocere verrucis venereis; nimis irri-
abantur hoc remedio anus, & perinaeum; quae loca
his, quae pallidi coloris erant, ac mollioris consisten-
ex illis crassitie aequabant minimi digiti apicem. Post
to patebat harum lotionum utilitas, post decem dies
paruerunt, sed non ceciderunt, maculae rufi coloris su-
illis cutis locis, quae maioris molis verrucae occupave-
es illis, quae in reliqua corporis cute manebant post. sa-
ereas per totam corporis superficiem dispersas. Simul: &
ebatur mercurius sublimatus corrosivus, tali nempe copia.
atio quinque partes grani de sublimato corrosivo ingereret.
iqua luis symptomata deleterent solo interno huius remedii
amen manebant pertinaciter, donec externa lotioni eiusdem
ipla copia aquae diluti, deleterentur.
verrucarum venerearum curatio externa lotioni debeatur.
potest. Gerebat enim in labio dextro pudendi duas verrucas,
nunquam attigerat aegra, sollicita tantum de illis, quae in
ano aderant; quibus iam disparentibus, binae illae in labio pu-
erant pertinaciter. Dum monita lavaret illas eodem remedio,
erum spatio evanuerunt.

Semper autem utendum iisdem fere internis, ac (1458)

praescriptis.

enim in loco infecto contagium, quod delere una cum parte,
ret, per acria erodentia tentatum fuit a multis, antequam infice-
i corpus. Prudentiores per fomenta emollientissima laxabant locum
i, dein per leniora irritantia conabantur suppurationem excitare in
ecto, ut sic miasma venereum expelleretur per eandem viam, per
gressum fuerat. Sic, uti dictum fuit in gonorrhoeae curatione, co-
promovere effluxum per urethram, ut eliminetur contagium, dum eo
empore omnis cura adhibetur, ut diffusetur de corpore, vel iners red-
i, si quid de contagio resorptum cum humoribus per vasa fuit, ne il-
d alia loca corporis depositum nova producat mala.

omodo autem, & per quae remedia hic scopus obtineri possit, pluri-
dictum fuit ad §. 1458, dum de cura gonorrhoeae agebatur. §. 1465.

M. Le Digne de Privas, neuro-
cuse sublimati corrosivi pag. 11.

pour servir à l'histoire de l'usage interne du merc.

§. 1465. **I**n mulieribus fluor venereus curatur iisdem (1458).

Antea ad §. 1447 pluribus dictum fuit de gonorrhoea muliebri, & quomodo illa differat a gonorrhoea virili, uti etiam quomodo distingui possit fluor venereus a fluore albo mulierum. Simul tunc notatum fuit, quod gonorrhoea muliebris in diversas species dividi possit; prout diversa loca sinus muliebris occupat; a qua re etiam maior, vel minor curationis difficultas sequitur. Quum autem omnia, quae ad diagnosin, & prognosin spectant, ibi explicata fuerint, superest, ut de curatione dicatur.

Generalis indicatio eadem est, quae in cura gonorrhoeae virilis laudata fuit, ut nempe eluatur per hunc fluorem omne contagium, quod ab impuro concubitu susceptum loca muliebria infecit. Hinc ab omnibus adstringentibus remediis abstinendum sedulo, sed potius augendus fluor, ut exeat una cum illo contagium, ne resorptum inficiat reliquum totum corpus.

Omnia ergo, quae laudata fuerunt ad §. 1458, etiam in cura gonorrhoeae muliebri conducunt. Notandum tamen est, feminas non ferre validas adeo purgationes, nec tam frequenter repetitas, ac quidem virilis sexus tolerare potest, praecipue si laxo corpore praeditae fuerint, & systemate nervoso facile irritabili. *Tamarindi, manna, filisia senae, cassia &c.* sufficiunt in talibus, ut solvantur humores, ne haereat facile miasma susceptum. Purgantia mercurialia rarius adhibentur, & leniora tantum minori dosi ne nimiae turbae excitentur in mobilibus illis corporibus.

Monitum fuit in cura gonorrhoeae virilis, valida corporis exercitia nocere, imo quandoque malum reddere incurabile; in sexu muliebri motus corporis non nocet; sed potius prodest, quum faciliorem exitum floris venerei per vaginam promoveat. Structura partium genitalium in sexu muliebri docet huius rei rationem.

§. 1466. **S**ed praecipue foribus detergentibus validis, & mercurialibus.

In gonorrhoea virili malum in urethra haeret, ubi applicatio remedium topica difficilior est, & minori copia tantum adhiberi potest per iniectiones, vel candelulas, simulque magna cautela opus est, ne irritetur interior pars urethrae a remediis applicatis, imprimis si acriora fuerint. Minus metuendum est in vagina muliebri, si haec ulceribus copia floris venerei stillantibus scateat. Spongiae enim remediis detergentibus madidae applicari poterunt, & vagina satis facile haec fert, licet satis actiuosa sint. Unde in materia medica ad hunc numerum tale decoctum detergens habetur, quo putenda muliebria lavantur frequenter de die, si in aliis externis pudendorum, & nymphis malum haeserit; imo &, si altius locentur in vagina ulcera venerea, spongia hoc somento plena irrigari poterunt, & abstergi. Cum mer-

cu-

§. 1461

curat
dicitur
habere
lucrum
mell
vultu
horum
iam
venit
quae
O
re
habet
sunt

or requiritur ; imprimis si acriora fuerint , & for-
ous indigeant . Unde ad eundem numerum formula
granis mercurii sublimati corrosivi constat , quae di-
s aquae stillaticiae rutae . His dein adduntur 64 partes
rodens vis sublimati corrosivi per hanc miscelam ob-
rri possit , & tamen satis depuret sordida ulcera . Ab
fluor venereus primo ; dein gradatim decrescit , & pura
itur . Pro diverso ulcerum statu , & mutata indole floris
ve actiosa fomenta adhibentur . De qua re videantur illa ,
gonorrhoeae virilis ad §. 1458 dicta sunt .

edia tunc imprimis locum habent , quando floris venē-
i , aut nymphis pudendi muliebris , aut in cavo vaginae
iam revocari debet , quod ad §. 1447 dictum fuerit , tunc
siem gonorrhoeae muliebris , cui non semper comes urinae
n gonorrhoea virili adest .

nonitum fuit , quod urethrae orificium in feminis sub clio-
um intervallo ponatur , referens tuberculum rugosum , quod
olis pertusum est , ex quibus viscidus humor exprimi potest :
ubitu lacunae illae mucosae inficiuntur , quandoque vel foliae ,
ipsa vagina . Ubi illud tuberculum glandulosum , in cuius me-
rificium aperitur , tumet , dolet , & tabum venereum plorat ,
ve dum premitur , tunc dicitur adesse *secunda species gonorrhoeae*
usculus a *Santorini* depressor urethrae vocatus tentigine affici-
anere facit hoc corpus glandulosum , unde difficultas urinae na-
tione enim molestam rigiditatem , & tensionem , dum urina emit-
dunt aliquid excidere de vulva , vel saltem exitum moliri . Ubi
corpus glandulosum ulcere venereo depascitur , tunc ab urina
arens dolor excitatur .

aret , huic loco , si a contagio venereo affectus fuerit , non debere
remedia acriora illa , quae a vulvae cavo , & exterioribus partibus
muliebris facile feruntur . Augerent enim haec stimulo suo tentiginem
; periculum foret , ne urethrae orificium comprimeretur a tumore
; , sique sequeretur periculosa urinae suppressio . Sola ergo mollis-
hoc casu requiruntur , ut extorrum alliciatur inficiens materia , &
ur molesta partium tensio ; decoctum ex foliis *malvae* , *alibae* , ver-
um aqua , & lacte paratum ; serum *lactis* cum seminibus *lini* confusus
um ; quibus addi possunt folia *papaveris borstensis* , aut *hyssopami* , si
et dolor , & tensio valida adit . Ex his fomenta , & cataplasmata pa-
applicentur perpetuo , donec tensae partes subsidere incipiant , tuncque
leniorum depurationem conducet , qualia sunt *mel* , *aloe* , & his similia .
ad & urethris muliebris affici poterit ; quamvis videatur hoc rarius fieri ;
que foret recta species *gonorrhoeae muliebris* . Quam autem canalis ille simi-
structurae sit quam in viris , sed multo brevior ; hinc omnia , quae de cura
gonorrhoeae virilis dicta fuerint , hic pariter conducent . Si negligatur mor-
bus ,

bus, quandoque, erosa urethra, sequetur turpis urinae in vaginam effusio, quae aliquando incurabilis manet.

Praeterea, utrimque ad latera, ad partem infimam fere pudendi muliebris, ponitur magna glandula, pisum maius aequans fere. Singulae hae glandulae per emissarium satis conspicuum eructant humorem viscidum, satis copiosum. Videantur de his illa, quae ad §. 1447 dicta sunt. Quum autem illud, quod vir gonorrhoea laborans, coitus tempore, in sinum muliebrem ei acculatur, sponte descendat versus inferiorem vaginae partem, ubi harum glandularum emissaria hiant, patet ratio, quare satis facile a miasmate venereo possint infici; tuncque *quarta species gonorrhoeae muliebris* adesse dicitur.

Nisi infectae hae glandulae, & tumentes, virus contentum eructaverint per emissaria sua in vaginam libere, retinebitur materia, & totum corpus inficiet. Simul etiam in pessima ulcera degenerabit; per quae vicina omnia erodemur, non tantum vulva, sed & intestinum rectum, tuncque feces alvinae, foedo certe spectaculo per vulvam exeunt. Omnia enim, quae dicta fuerunt de *glandulis Cowperianis* similiter affectis in gonorrhoea virili, etiam hic locum habent, & similis requiritur curatio. Cataplasmata mollissima, additis *bulbis ceporum sub cineribus assatarum*, & *gummi ammoniac*, cum vitello ovi optime subacto, applicantur perpetuo tumetibus his glandulis, ut versus exteriora determinetur virulenta materies, ne iotrosum vergens, pessima producat mala.

§. 1467. **U**bi vero pustulae ubique dispersae, dolores artuum, nocturni labores, bubones magni, torturae ossium, saepe tolerata gonorrhoea, docent adesse luem, salivatio mercurialis requiritur.

Hactenus consideravimus illa mala, quae a suscepto contagio venereo nascuntur in corpore; prout diversis corporis locis applicatum fuit, vel humoribus circulantibus mistum prius, dein ad has, illasve partes depositum, varios morbos produxit; hinc diversa his malis fuerunt data nomina, & singulorum diagnosi, prognosi, & curatio fuerunt descriptae, in quibus omnibus magna occurrit diversitas, licet idem fuerit contagium, pro varietate partium corporis, ad quas delatum fuerit. Agendum nunc de methodo curandi, quae adhiberi debet dum *lues venerea* stricte, & proprie dicenda adest.

Optime certe *Fernelius* (k) de lue venerea monuit sequentia: *Quum ex dubiis signis de lue ambigitur, eius origo est alius investiganda, a qua parte initium habuerit. Etenim, quoniam, nonnisi attactu contrahi potest, necesse est, labes aliqua in ea primum parte contraxerit, per quam insertum est virus. Haec enim prima se proferit in partibus obscenis, si coenibit, in summa cute, si acubiliu contraxit est; in nutritum mammis, si inquinatus erat infans; in infantis ore, & faucibus, si nutritrix infecta. Emergunt autem in obscenis partibus:*

(k) Aphrodisiac. pag. 614.

sistentes, fastidium curae demulcere conabantur, & easdem ad quatuor temperamentorum varietates artificiose adaptabant. Sic saltem saevae suae consulere volebant, dum pertinax morbus non cedebat, ut possent aegros convincere, quod omnia artis cognita molimina adhibuissent, nihilque intentum reliquissent, quod prodesse posset. Curationes autem suas auspicabantur plerumque a sanguinis missione, postquam per enemata, & leniora purgantia, quae eccoprotica dici solent, primas vias liberabant ab omnibus fordibus, ut facilior ingressus foret reliquis, quae lui debellandae idonea credebantur. Passim hoc videri potest apud illos auctores, qui primis morbi nat temporibus scripserunt, & ad nauseam usque repetiverunt talia. Haec vocabatur curatio per alterantia, & purgantia. Hac methodo parum proficiente, de aliis cogitatum fuit, quae efficaciora credebantur,

Quum lues venerea in initio cutim defoedaret pustulis, ac ulceribus mali moris, & novissent medici, qui in primi morbi temporibus vixerunt, unguenta mercurialia ad impetiginem, herpetem, scabiem, aliasque cutis defoedationes cum successu adhiberi, ex analogia luem tentaverunt curare isdem unguentis ex argento vivo paratis. Notum est, medicos Graecos proscriptisse argenti vivi usum, tamquam noxium, imo deleterium (1).

Arabes autem primi ausi fuerunt mercurium adhibere tum ad necanda infecta cutanea, tum ad scabiem, herpetem, aliasque cutis defoedationes. Famolum erat olim unguentum *Saracenicum* dictum, quod continebat *staphydem agriam*, certum satis infectis cutaneis venenum. Si enim haec semina contrita capillis inspergantur, pediculos necant. Quum autem unguentum illud nonam partem contineret circiter argenti vivi, debuit salivationem movere in plurimis, licet tantum semel in septimana aeger se ungeret hoc unguento.

Monet celeberrimus *Astruc* (m), quod *Theodoricus* medicus celebris circa annum 1280, & *Guido de Cauliac* anno 1363, hoc unguento *Saracenico* usi fuerint in pernicioso pediculorum, & salivationem inde natam viderint. Prior enim monuit: Hoc linimentum educere superfluitates per os, balneando (balnando), & per subascellas resudando. Additque *Guido*: *Argentum vivum nocere membris principalibus, & dentibus, atque gingivis*. Bini illi auctores creduntur esse primi, qui salivationem observaverint ab applicatione externa argenti vivi excitatam. Notandum autem est, binos horum auctores floruisse diu, antequam lues venerea cognita erat.

Quum ergo argentum vivum a plurimis haberetur pro remedio periculossimo, & tamen viderent prodesse eius usum in hoc morbo, prudentiores coeperunt uti unguentis, quae parcam tantum continebant argenti vivi copiam, haecque sensim aucta fuit. Optimum certe erat, & laudabile consilium in usu remedii non satis explorati pederentim pergere, ut tuto experiri possent novi remedii in morbo efficaciam.

Verum agyrtae rudes, qui toties in humano corio ludunt, & impune quidem

(1) Vide de his *Astruc* de morbis veneris lib. II, cap. VII, pag. 118, & seq.
(m) Ibidem pag. 119.

At magnis laudibus exaltabant arcana sua remedia, cognita, quae magno labore, nec minoribus impensis ant; persuadebant facile credulo vulgo (nomen hoc sua arte delere posse illud noxium, quod in argento non omnes, sicque luem veneream sua opera cito, et etiam inveteratissima foret. Dum temerarii illi homines copiam argenti vivi magnam miscebant unguentis suis, argiter, & diu, multis tanta fuit subito orta salivatione, fauces tumor, ut suffocarentur subito. Pauci, qui virum nimia salivatione exhausti perirent. Pauci, qui virum nta mala vita superfluitate emerferant, *mailentis, luridi, ibutientes, ore obligato capistrati, post miseras diuturnas, omnialescebant* (n).
 ecerunt: ut vix non omnes argenti vivi usum in lue venereae & angue vitarent, donec prudentes medici doge tentari posse hanc methodum, si debitis cum cautelis

qui optime de lue venerea scripsit, & in curando hoc acquisivit nomen, post tentata leniora remedia, si non succingentia mercurialia, ac suffumigia adhibuit, & felici quidem haec duo remedium genera a quibusdam medicis, qui non ene discurrunt, neque experimentis discursum confirmant, sed ab nimibus decepti remedia reprobant, accusantur, & tamquam perantur, illi tamen nullum auxilium adferunt talibus, praeter exhibita, & nihil proficientia, sicque aegros in deterius, & indevere sinunt. Sed audiant, & sciant, quod in magnis morbis non ortibus medicinis, ad fortiores, & ultimas medicinas confugere, si oporteat, oporteat (o).

et, quod argentum vivum pro efficacissimo quidem remedio habue- simul agnoverit, requiri prudentem cautelam in eius administratione. minor motus soleat esse, si externae corporis superficiei applicetur, hinc videtur praevaluisse usus applicandi argentum vivum cuti per, & emplastra mercurialia; dum simul sic & commode medela appli- rat topicis malis a lue venerea ortis, bubonibus, ulceribus, ossium is &c. Idem obtinebat, dum cinnabaris ex argento resoluta, corporis oblimando, unitis inter se, igni inaspera, in vapores resoluta, corporis Solebant enim nudos aegros in cubiculo ca- , effusula lignea inclusos, sic, ut solum caput emineret, exponere tali sus- o, cuius vapor & poterat determinari ad certam corporis partem, quae arii modi, quibus suffumigium illud cinnabaris habentur apud Alexandrum Traianum Petronium affecta credebatur. (p) in libro sexto de morbo Gallico. Pro dosi cinnabaris monet non

) Ibidem pag. 121.
 pag. 120, & sup.

(o) Aphrodisiac. pag. 90.

(p) Ibidem

non debeat in singulis suffumigiis excedere unciam, nec minor esse semiuncia. Simul notat, quosdam semel intra 24 horas suffumigium illud adhibere, quosdam bis, sed rarius; multos etiam longius intervallum interponere singulis fumigationibus. Sed longe tutiores inunctiones mercuriales credit, & tandem concludit: *Suffumigia, nisi morbo iam inveterato, & ferme iam desperata salute, viribus tamen constantibus, nunquam administrari debere.*

Certum enim est, incensa cinnabari, mercurium in minutissimas moleculas divisum, igne agitatum, undique applicari cuti calidae, & sudanti; facile igitur per vasa cutanea absorbentia recipi, & sanguini misceri; sicque subito effectus argenti vivi in corpore sequi; licet modica tantum quantitas cinnabaris adhibita fuerit.

Docet hoc sequens casus (g): Proceræ admodum staturæ femina sexaginta trium annorum integro quadriennio lue venerea laboravit. Pulsus intermittebat omni tertio, vel quarto ictu. Omnis fere generis excrecentiæ venereæ pudenda occupabant; ita ut sine dolore nec incedere posset, nec sedere. Cephalæa, alique dolores nocturni adeo molesti aderant, ut frequenter penitus insomnes duceret noctes. Morbi diuturnitas, repetitæ venæ sectiones, valida remedia adhibita omnem torositatem corporis absumserant adeo, ut sceletro similis esset misera.

Quum desperatus videretur morbus, & aegra anxie opem quaereret, tentatum fuit, quid facerent suffumigia cinnabarina; sed prudenter tamen.

Mane hora nona cinnabaris artificialis grana triginta incendebantur, ita ut naribus & ore fumum reciperet aegra; quæ hoc facile ferebat, & avide fumum cinnabaris inspirabat; unde levis tussis sequebatur. Bene tecto corpore sudare coepit, & expuere; ita ut hora duodecima libra media sputorum iam prodiiisset: aderat tussicula, & foetor incipientem salivationem comitari solitus totum replebat cubiculum. Pulsus erat plenior, & celerior, sed simul admodum irregularis, & intermittens: hora tertia pomeridiana tantus foetor cubiculi irregularis, ac solet esse, dum tres, quatuorve libras intra nuchthemum expuunt salivantes. Coepit vis mercurii per alvum ruere, quam ter deposuit cum validis torminibus: pulsus celer erat, depressus, tremulus, intermittens. Datis statim decem guttis laudani liquidi, dilutis in iulapio cardiaco adstringente, in lectum deponebatur aegra, vestita adhuc, & stragulis tegebatur ad provocandos sudores; qui nona vespertina iam aderant largi una cum pulsu celeri, pleno, forti, vigesimo primo, aut vigesimo secundo ictu intermittente tantum. De nocte, postquam vestibus depositis, frigidiori aëri se exposuerat, redierunt tormina, & alvi fluxus, quæ omnia sedabantur repetito usu laudani liquidi, & redibat sudor.

Sequenti die omni decima, vel duodecima hora redibant tormina, anxietas, & pulsus intermissio: verum sedabantur statim, dato laudano liquido, & redibat sudor.

Ma-

(g) Medical. essays and observat. tom. IV, artic. VIII, pag. 471

tebatur opiatum, & vigesies alvum deposuit cum
uac dato opiato cessabant, redeunte sudore.
git ut secundam: manebat foetor, salivationis mer-

ora septima sumisit purgans; hoc quum non movisset
am fuit stimulant, quod prioris vim augetet; sumisit
licet iam ter alvum deposuisset; unde secuta fuit
alida, ut sexta vespertina morri proxima videretur.
omnia sedata fuerunt, & totam noctem pacatam trans-

& reliqua inveteratae luis symptomata ablata erant omni-
quod mirum videtur, septem milliaria Anglica pedestri
duo alia curru vecta in aere humido, & frigido.

saepius rediit per sex septimanas. Postea sumisit pilulas ex
& salomela superbibendo decoctum lignorum. Ab horum
sequebatur, dum calida tempestas aderat; sed omnia luis
nata evanuerant. Simulac frigida tempestas autumnali rem-
nata diarrhoea, quae tandem cessabat penitus administratam. Coe-
scimus post suffumigationem cinnabarinam emendabatur hoc
ira intumescente; datis duabus purgationibus emendabatur hoc
edivit denuo; quod neglexit, magis increvit tumor, penit.
s finem aprilis, decimi tertii mensis post suffumigationem, penit.
hoc casu patet, pauca grana argenti vivi, in halitum tenuissimum
is, ore, & naribus inspirati, sudorem excitasse, ac salivationem sta-
tis ita ut post tres horas iam totum cubiculum repleretur foe-
tis salivationis. Unde licet concludere, parvam etiam quantitatem
ficere ad sanandam confirmatam, & annosam luem. An vero tutum sit,
sumigii cinnabari nullum dubium superest. In hac semina vis argenti vivi
do luem curare, alia quaestio est. In hac semina vis argenti vivi
ruebat statim, & hypercatharsin periculosa excitabat cum tor-
alidis, opio dato, & sudoribus copiosis, cessantem quidem, sed
n saepius, ac diu. Dum penitus cessabat tandem, hydropicus cru-
ior successit; contabuit totum corpus, & mors finem malorum fecit.
area, dein cinnabaris comburitur, sulphuris vapor suffocans exit, qui
copia inspiratus subitam mortem facit, vel, si hoc periculum effu-
immediabile asthma relinquit, & saepius phthisi pulmonali originem
iam confideretur, quod, uti paullo ante dictum fuit, non minus
uncia media, nec plus quam uncia cinnabaris adhibeatur pro singulis
nigationibus repetendis quotidie, quandoque & bis de die, facile intel-
r, quantae strages con- ger int olim, dum agyrtae, balneatores, emer-
dudum in palatris veneris anus, & quivis alii de fece plebis hanc
scilicet curam tentare aude- bant.
videtur suis conflare, poro- ac
ore attenditur, sed quae
us agere cinnabaris suffumigium, dum naribus.
cum periculo suffocationis hoc fiet. Praeci- pue,

pue, si maior quantitas cinnabaris addita fuerit. Antonius Musa Brasavolus (r) monet sequentia: Scitote nonnullos medicos illos suffumigasse, capite etiam a compeo non exerto, quod periculosissimum est. Nam quempiam vidi, qui ex fumo caput potente in apoplexiam incidit, & statim mortuus in terram corruit. Idcirco laudo, & iubeo, ut exerto capite suffumigentur, imo papilio circa solum stringatur, tum ne fumus exeat, tum ne naris feriat. Licet autem statuit hunc hominem apoplecticum perisse, longe verosimilius videtur, quod suffocatus subito fuerit. Nam inter apoplexiam, & mortem aliquod temporis spatium intercedit semper, nec posset morbus praesens distingui, nisi hoc esset.

Quamvis Nicolaus Massa (s) suffumigationes has maxime efficaces laudet in pessima lue, non dissimulat tamen gravissima mala, quae ab illis metuenda sunt; hinc medentes monet: Quod iste modus non sit sine timore nocuenti membrorum principalium; immo saepe recidant, & ad malas aegritudines complicatas cum ista deveniunt, quae sunt asthma, tussis, hydropisis, & marasmus; quare non est administrandus, nisi in inveteratis, & in virtute fortis, cum aegritudine mala. Adeo potentem resolvendi vim ab his suffumigiis observaverat, ut in duobus, qui saepius inunctiones mercuriales passi fuerant sine salivatione sequente, post suffumigia adhibita viderit non tantum omnia apostemata resolvi, sed etiam nervorum molliem, & paralytum secutam; quod tamen non magni faciebat, quum lue venerea tanta post aliquot menses etiam a paralyti restituti fuerint.

Monet autem optime sequentia: Scias etiam, quod omnes virtutes multigenis possumus suffumigio tribuere, praemissa securitate, ut supra; & ratio est haec, quum basis sit virtus argenti vivi operans; quapropter dico, quod digerit, & praeparat ad omnia, sicut unguiones.

Ex his, & pluribus aliis, quae spatim apud auctores leguntur de suffumigiorum utilitate ad curandam luem veneream, patet evidenter, quod ab argento vivo, in minutissimas moleculas diviso, per ignem moto, formae vaporis per vasa cutanea recepto, tota haec efficacia derivetur: nisi enim his fumigationibus addantur talia, quae argentum vivum in se continent, nullus effectus in curanda lue observatur, licet aromata selectissima, resinae fragrantissimae, & plura alia adhibeantur. Volverunt enim medici, qui ex argento vivo parata remedia in universum detestabantur, quaevis tentare potius, putantes, sudore per halitum calidum aromaticum ex nuda cute prorumpente, expelli foedum virus. Quidam & haec praemittebant suffumigiis cinnabarinis, miriora tentantes prius, & innoxia, antequam efficaciora, & simul minus tuta posceret morbi veneri pertinacia.

Sic Fallopius (t) bina suffumigiorum genera describit, nempe suffumigia, parata ex materia benigna, quae nihil argenti vivi continebant, sed mera tantum aromata; & suffumigia maligna, ubi cinnabari artificiali addebatur sandaracha.

(r) Aphrodisiac. pag. 687.
806, 808, 809.

(s) Ibidem pag. 100, 101.

(t) Ibidem pag.

tum suspecta certe merito remedia. Videtur enim e virus non possit destrui, nisi per aliud venenum. *zamus rem ad summam, sciatis, quod tota res consistat materia consimilis naturae cum eo, ut est arsenicum, officinalis, & praecipitatum; condiuntur ista cum aro-*entur. At quum omnes noverint, in argento vivo a qua luis venereae cura sperari potest, temerarium est, augere periculum, & exponere miseros pessimis applicationem, etiam externam, sequi solent. Quod Fallopius (u) nunquam malignis his suffutibus usus utuagesimo secundo ponit sequentem titulum: *De modo in corpus materia valida, sed non venenosa.* Et deinceps enumerans illa, quae sequuntur illas suffumigationes in suffutibus symptomata quaedam, aliquando alvi solutio, alati, aliquando labefactio omnium dentium, quae solent nutritione ex hydrargyro. Verum omnia haec sunt effecta mercurialis: arsenici enim vapor longe alia producerentur illa, quae celeberrimus Astruc (v) ex variis excoctis instituit. collegit, patebit evidenter suffumigiorum curanda lue venerea non posse praeferrri ullo modo aliis argenti vivum tentatis; hinc hodie satis evuluit, & rasi ab aegyptis. Subinde tamen adhuc cinnabaris suffumigium in topica determinatione fumus ille tangat quasdam partes; in inguine durum, qui suppurantibus remediis pertinaciter venerea narium periculosa. Vidi hoc aliquoties tentatum fuisse dentibus, refracta admodum dosi. Commendabatur, uti dico curanda lue per cinnabaris suffumigia, ut in singulis dosibus sinus, quam uncia media cinnabaris, nec tamen dosis excederentiam integram. Tale suffumigium adhibebatur quotidie; imo s de die. Prudentiores, qui hoc tentabant, grana quindecim debant, & post triduum repetebant per biduum abstinentes ab cibo. Decem grana pro dosi adhibebant tantum, ubi per os vel ha debebat vapor, ne noxam inde contraheret pulmo. Eandem luis cinnabarinis sententiam dixit Fracastorius, qui tam bene luem mo carmine descripsit (x), dicens:

At vero & parum durum est medicamen, & acre:
Parum etiam fallax, quo faucibus angit in ipsis
Spiritus, elusantque animam vix continet aegram.
Quo circa solum ad corpus nemo audeat uti,
Iudice me, certis fortasse erit utile membris,
Quae papulae infernae, ibironique ulcera pascunt.

Videm pag. 80.
in secunda editio.
Tom. V. par. II.

Quum
De morb. vener. lib. II cap. IX pag. 178 & seq.
(Aphrodisiac. pag. 191.)
K

Quum tamen lues venerea se potissimum manifestaret malis cutaneis, puz. lis, maculis, ulceribus, vidissentque medici insignem efficaciam argenti vivi. in curandis cutis defœdationibus, mirum non est, quod novi morbi curam quaesiverint vix non omnes in usu mercurii, dum usitata morbos curandi methodus vix levaret morbum, curaret nunquam.

Verum, quia mercurius a veteribus medicis damnabatur, diversa in adhibitione eius fuit medentium sententia. Quum enim eius efficaciam viderent in domanda lue sive externe applicaretur, sive in corpus ingereretur, plurimi maluerunt externo eius usu aggredi hunc morbum. Revera satis similes effectus præstat mercurius, quacumque via sanguinem ingreditur, & cum illo per vasa moveatur. Solvuntur humores, soluti exeunt de corpore viis diversis, emaciatur totum corpus, & nisi cum prudentia adhibeatur hoc remedium, quandoque miseri pereunt exhausti penitus.

Omnium maximus mercurii effectus est salivatio mercurialis dicta, quæ aequè externam quam internam argenti vivi applicationem sequitur; uti omnibus notum est. Magna nempe copia salivæ, foetidæ, acris totum os internum sæpe erodentis ore exit continuo fere fluxu. Simulac incipit salivatio, magna mutatio conspicitur in ulceribus veneris, quorum color, & pus in melius mutantur, dolores nocturni osteocopi minuuntur, pustulae foedæque in cute maculae sensim disparent. Fingit *Fracastorius*, miserum juvenem dira lue infectum supplicem, fuisse preces, & nympha duce, ac comite ad intima telluris viscera pervenisse, ibique vidisse *Iacus, Iac undantes, liquidoque fluentes argento*. Deinde nympha aegrum:

Argenti ter fonte salubri

Perfundis, ter virginis dat flumina palmis

Membra super, juvenem toto ter corpore lustras,

Mirantem exuvias turpes, & labe maligna

Exutos artus, pestemque sub amne reliquam (y).

Dum laetabantur aegri malum adeo pertinax cedere salivationi, magno animo tolerabant eius molestias, quæ certe non sunt leves.

Postquam autem ille juvenis argenti vivi balneo sanatus e tenebris ad lumen optatum rediisset,

Accepit nova fama fidem, populosque per omnes

Prodiit baud fallax medicamen, coeptaque primum

Miseri argento fluitanti axungia porcae.

Porro varia enumerat, quæ unguentis mercurialibus addi solent, & monet, totum corpus inungendum esse, exceptis capite & præcordiis; simul iubet, ut stragulis multis tegatur corpus ad sudorem eliciendum; dein addit:

Hæc

(y) Aphrodisiac. pag. 193.

*fatis est iterasse diebus ;
aliquid tuleris res ipsa, ferendum est.
certa salus stans limine in ipso
facta mali excrementa videbis.
mundo fluitare per ora,
pedes tibi mirabere flumen,
a erodens ulcuscula . . .*

esse, foetorem sputorum salivationis tempore pro-
lis miasma, humoresque per illud corruptos hac via.
Confirmabantur in ea opinione, quum viderent labia,
quam ipsam exedi, & quandoque satis profunde, ab-
sae totum os internum alluit. Cerrum est quosdam
e credere, per salivam hanc educi de corpore omne-
s excitarent ingentem salivationem, non sine suffocatio-
contraherent eo usque, donec aegri exhausti deficerent.
& numerosis experimentis probatum, sanissimos homines,
vel minima luis suspicio fuit, dum interno vel externe
imprudenter argentum vivum, incidere in salivationem,
um olidissimam, aequae magnae copia, ac illi, qui pessima
curam tolerant. Georgius Dordonus, Placentinus medicus,
impugnaret, & probarer, etiam in sanis salivationem sequi
m argenti vivi attractionem, monet, sibi multoties in com-
edicamenta tantam humiditatem ab ore refudasse, ut sibi sum-
(z).

quidam, acerbis sialagogis salivae fluxum provocare, absque
mercurialibus exhibitis, ut luem sanarent; nec unquam suc-
quiretur argentum vivum ad luem sanandam; & salivatio eius
denotat certo vim medicatam argenti vivi in actum deduci;
n sequitur per salivationem expelli de corpore tabum venereum;
nim nequit quandoque luc venerea infectos fuisse sanatos, licet
mercurii etiam repetitum nulla sequeretur salivatio. Securos
et esse tales aegros: celeberrimus Astruc (a), illisque gratulatur,
datum, si, rara satis felicitate, absque taedio & periculo salivatio-
ne adeo tutius commodiusque a venero morbo convalescere. Quum
ales aegri metuere semper soleant, ne lateat adhuc in corpore fac-
tagium, sopitum quidem, sed non exterminatum penitus, hinc bo-
bis confirmandos, & erigendos tales aegros voluit, veritos; ne de-
salivationis, curatio quoque desitura sit; ac si seminum morbosum profu-
non possit, nisi foras exterminetur. Ut ergo omnem scrupulum adimat
is, addit sequentia: Sane, quum morbus ille contrahatur absque ulla bu-
more.

(a) Astruc de variis venereis aeg-
(a) De morbo venereo lib. IV

nore conspicuo, qui intro subeat, nequaquam mirum videri debet, si perfellamurationem recipere possit, sine manifesta ullius humoris evacuatione. Adde porro defectum salivationis plerumque suppleri alia fusione, diuresi, sudatione, vel saltem insensibili perspiratione; quae singulae evacuationes deficiente salivationis vicariae esse solent (b). Dum attenta mente lustrarem omnia, quae in ulceribus venericis contingerent, postquam argentum vivum adhiberetur fuerat ad excitandam salivationem; vidi manifeste fundum horum ulcerum depurari, sordes deponere, molestos dolores otium, nocturno tempore saevientes, mitigare; antequam salivatio inciperet. Coepi tunc serio cogitare, quum omnia haec signa docerent argenium vivum iam agere efficaciter in morbum, an non possibile foret curare luem sine salivatione; modo continuaretur ille rerum status, quo mercurius agere incipit. Simul incidebat haec opinio, an non posset idem effectus obtineri, licet longe minor copia argenti vivi adhiberetur, quam est illa, quae requiritur ad salivationem excitandam. Vidimus ante illam argenti vivi copiam, quae in gravis tringina cinabaribus adest, suffecisse ad salivationem excitandam, totumque corpus miris modis turbandum, dum halitus forma inspiraretur.

Difficultatem movebat, fateor, quod summi in arte viri statuerent actionem mirabilem mercurii pondere a summa illius divisibilitate, eiusque pondere. Argenium vivum enim, quacumque via immixtum sanguini vitali, quum sit sanguine ipso decies & ter ponderosius agatur vi cordis, & arteriarum contractione, tanto maiore impetu in compagem sanguinis, ut eam penitus destruat, globos rubros resolvat, serosas flavas immixtas sphaerulas, reliquasque etiam partes eiusdem in minutissimas frangat, & ita in laticem subtilem, putridum, visci excrementum convertat. Sed & notum est, elementa argenti vivi incredibiliter exigua agnoscii, utique globis serosis sanguinis longe maiora; sane, dum poros cutis intacta virtute ingreditur, cognoscitur, quod elementis maioribus sanguinis & age sit penetrabilius. Dum vero in meatus densissimi corporum, auri, tam facile se insinuat, ipsa forse aqua magis, divisa in tenuitatem parvulus constare, colligitur; licet, attractione ingenta suarum partium, ad certum gradum tenacitatis se colligat. Tandem & maxime immutabile hoc ipsum fossile Quibus sane cunctis rite expensis, apparet vita vii, qua ad expugnandum hoc malum solus efficitur, sufficiens solus, mercurius habetur (c).

Ingeniosa, simplex, ex proprietatibus argenti vivi certis & cognitis deducta haec explicatio placuit vix non omnibus; hinc ipsis sollicitissimi Boerhaavii verbis describere malui, ne ullo modo sensus immutaretur. Sed liceat mihi proponere illas difficultates, quae secerunt, ut crederem, argenti vivi efficaciam in corpore humano non posse explicari ex eius pondere, & divisibilitate, solis.

An-

(b) De morbis vener. lib. IV cap. VIII §. 1 pag. 368. aphrodisiaci.

(c) In praefatione

Pitarum statuit solam gravitatem argenti vivi sufficere, ut explicetur mirabiles eius effectus; imo audacter addidit aurum, in formam sanguinis permiscendam redactum, habiturum vires ponderi proportionales, & omnia medicamenta tantum superaturum virtute, quantum pondere superaverit.

Sed: an ex argenti vivi pondere poterit explicari, quare soluti eius vi humores per salivales ductus potius ruant, quam per alia corporis loca? Praeterea praeparata mercurialia officinarum, parva quantitate data, omnes edunt effectus, quos longe maior quantitas argenti vivi facere potest. Praecipitatum rubro ulus fuit agryta, quod in pilulam formabat, & unica tali pilula data summopere turbabatur totum corpus, ac vehementissime exagitantur; imo debitori homini data talis pilula illum e vivis sustulit, eadem die ante prandium (d). An verosimile videtur argentum vivum excitare tantas turbas per excessum ponderis sui, dum a praecipitato albo, vel mercurio dulci, quae longe mitiora sunt, salivatio mercurialis excitatur? an potest in corpore humano argentum vivum inde extricari; ut nativa ipsi forma redeat, quum per artem non possit obtineri, nisi magis ignis vi, & additis illis, quae acidum argento vivo unicum trahunt potentissime, ut pauca tantum gena mercurii ad pristinam formam redeant, a quibus tantus effectus sperari nequit?

Dici quidem solet, quod mercurii moleculas sphaericae, spiculis salinis infixis horridae, pondere metallico, unito concentratissimo acido, plus dividant omnia concreta, quibus occurrunt, quam argentum vivum solum efficere possit. Sed, dum mercurius in spiritu nitri solutus, affusa muria salis marini praecipitatur, dein saepe aqua abluitur, pulvisculus in fundo vasis subsidens, fere insipidus, & blandus est; attamen viginti grana, imo & minor copia quandoque divisis dosibus data sufficiunt, ut salivatio excutetur.

Sed alia vis: later in argento vivo, quod adeo blandum, & molle videtur. Absque ullo enim alio addito, illud solo trita mechanico in vase purissimo vitreo, dat pulverem mollem, nigrum, tenuissimum, saporis acris metallici, cupri saporem utcumque referentis. Sexaginta & una destillationibus purissimum redditum argentum vivum dedit maiorem copiam similis pulveris. Sed & argentum vivum in cucurbitis vitreis conicis, fundo plano instructis, phiala chemica inversa clausa, calori 180° graduum per plures menses expositum, dedit similem omni dote pulverem. Simplici destillatione in retorta vitrea purissima ex argento vivo nascebatur pulvis ruber splendens, valde friabilis, saporis acerrimi metallici, nauseosus, penetrabilis, vix ex ore delendi, corpus humanum diu ac valide turbans, & ad excretionem disponens. Tamen omnes illi pulveres, adeo acres, adeo turbantes totum corpus absque addita ulla alia re ex mercurio puro produciuntur, vel succu-

(d) Aphrodisiac, pag. 719.

ussu mechanico, vel digestionem in tali calore, qui duplo maior calore corporis sani. Et quod mirum est, pulveres illi in vitrea retorta destillati valido igne totum fere mutabantur in argentum vivum, manentibus tantum paucis granis fixioris materiae in fundo retortae.

An ergo argenti vivi efficacia a communibus omnium corporum proprietatibus pendet? An non potius singulari eius naturae per experimenta sola cognoscendae haec attribui debet? An ullo unquam experimento consistit aurum argento vivo ponderosius similes effectus produxisse in corpore ob maiorem nempe specificam gravitatem? Quis unquam vidit ab auro salivationem nasci? Dum aurum solum in aqua regia per assiduum salem tartari praecipitatur, saepiusque abluitur aqua calida, calx auri remanet, quae acquisivit vim talem, ut a calore paullo maiore cum ingenti fragore dispendatur. Argentum vivum simili modo tractatum dar calcem, quae absque ulla dispendione magnum calorem ferre potest, dum denuo in pristinam suam formam redit.

Praeterea notandum est metallica corpora vix agere posse in corpus humanum, nisi fuerint prius soluta in mensuris suis, & sic fluida reddita. Argentum vivum, quum ex sua natura fluidum sit, potest absque miscela vasa nostra ingredi, & humoribus circulantibus misceri; quumque malleabilitas ipsi defuit, multi crediderunt improprie dici metallum, & voluerunt potius vocare aquam metallicam. Reliqua autem metalla, dum solvantur in mensuris, producent novum quid ex metallo & menstruo simul iunctis compositum, in quo deprehenduntur vires medicatae, quae nec in menstruo solvente, nec in metallo soluto praexistiterunt; sed ex unione horum, natae sunt novae, quae nec praevideri potuerunt ex legibus communibus omnium corporum, nec per illas explicari.

Haec latius deducere non est huius loci. Legi meretur circa hanc rem capitulum de mensuris chemicis (*), in quo utilissima habentur, tam de mensurorum actione, quam de novis viribus medicatis, quae ex unione diversorum corporum inter se nascuntur.

Sufficit medico novisse, quid agat argentum vivum humano corpori applicatum, licet modum, quo agat, ignoraverit. Eandem difficultatem inveni in determinandis modis, quibus alia remedia agunt in corpus humanum. Plures legi auctores, qui de viribus medicamentorum scripserunt; plura, & optima quidem inde didici de remediorum usu, & applicatione varia; sed nunquam potui liquido intelligere, quare *rhubarbarum* purget alvum, quare *opium* somnum faciat. Sinceram propriae ignorantiae confessionem nemo bonus aegre feret.

His ergo in medio relictis considerari meretur, qua via, & qua methodo argentum vivum corpori humano tuto applicari possit, ut efficaciter luem veneream curet.

Notum est summos in arte viros, diversam circa methodum curandi luem per argentum vivum habuisse sententiam. Quidam laudaverunt externam mercurii applicationem; alii ingerebant in corpus aegrorum crudum argentum vi-

(*) Herm. Boërh. chemiae tom. I.

DE S V E N E R E A.

351

ita arte praeparata remedia. Mirum non est mul-
ti vivi abhorruisse; nam a veteribus medicis da-
leleterium; uti antea §. 135, 4 dictum est. Damna-
ritate erodens interiora. *Plinius* vocavit vomica-
m omnium venenum; unde & *minii* (cinnabaris),
excoquitur, usum in medicina temerarium statuit.
nec vivo egit, falsus se non habere eius ullam ex-
perimentis, si epotum fuerit, neque an id faciat,
autum autem recentiores medici *Graeci* *Galenum* vix
fuerint, hinc & ab illis argenti vivi usus in medici-
scriptus est. Arabes laudaverunt externum eius usum
curandos.

es venerea in Europa increbuit, argenti vivi usus ten-
morbum insolito remedio aggredierentur medici. Ne-
tum, sed & interno adhibuerunt. Credit celeberrimus
m *Petrus Andream Matthiolum* interno usu mercurii
uram luis venereae tentasse. *Ioannes de Vigo*, & *Nico-*
it illud remedium eius efficaciam in curandis ulceribus
pulisculis inspergebatur. Sed pluribus in eodem remedi-
n verosimile esse, quod solo usu externo descripsit praepara-
Matthiolum autem (§), postquam exacte descripsit, dein
i rubri, iubet illud ablui aqua plantaginis & acetosae, dein
, hyacinthi lapillis, & cardiacis quibosdam grana quinque
dabat cum viginti granis electuarii conciliatoris, ut forma-
potia quinque, quae hora ante diluculum sumebantur; & atrabi-
ntis aeger se in lecto continere per quinque horas. Brevi
allici dolores hoc cataplasmo elidentur; pluita etiam, & aurabi-
non alui desitione, evanescunt. Adeo autem confidebat ad
visculi, ut & in aliis morbis gravissimis hoc remedium ad-
, vel septem exhibuerit, & cum successu quidem, a famulo
erunt mercurium crudum in forma pilularum, & constabant ar-
emediis. Tales erant pilulae *Barbarossae*, ita dictae a famulo
gerii, & rei maritimae apud Turcas praefecto; constabant ar-
com *rhabarbato*, & *diagridio*: addebatur vigesima pars farinae
nbra grisea, & *mosibus*; quae simul sumta aequabatur vespri
dus; unde haec massa validam fragrantiam spirare debuit. For-
de cum succo limonium massam, de qua quotidie dabatur: autem pi-
m pilula, quae magnitudine aequabat *cicerem*. Tali harum pilu-
inebant quatuor grana argenti vivi (b). Plures alias in co, quod
molae legi possunt (i), quae conveniunt inter se in diu, donec
argenti vivi cum succo limonium confusam

morbi vener. lib. II. cap. VII. pag. 126.

Alfons de morbis veteris lib.
1. tom. II. pag. 672, 673.

K - 4

II cap. VII. pag. 127.

eliter fuerit exstinctum, ut amplius internosci non possit. In variis his ^{autem} s diversa occurrunt purgantia; minor copia ambrae, & moschi; unica deest, quae nulla habet admixta purgantia.

Monet alibi (k) celeberrimus Astruc, similes pilulas adhuc hodie pro paacea omnium vix non morborum circumferri, & laudari caniquam speciem arcanaum ad curandam luem veneream sub titulo pilularum.

Belloste, qui hoc seculo vixit, magnam famam in arte chirurgica acquisivit, & imprimis edito suo tractatu, *le chirurgien à hôpital*, saepius im-presso postquam prima vice Parisiis prodierat 1695. Huic libello subiunxit iterum, qui anno 1724 prodit Parisiis, sub titulo *suite du chirurgien à hôpital &c.*, in cuius prima dissertatione totus versatur, ut commendet pilulas quasdam mercuriales, quas venales habebat; illarumque compositionem sollicitè tegit; ut nempe meliorem redderet inopem familiae suae conditionem, quam iniquitate temporum, sicutis omnibus excessum esse queritur, & quam sperat sustentatum iri pilulas suas venditando. Eadem enim semper est arcanorum origo, & unicuique scopus lucri spes. Non distretur tamen pilulas suas constare argento vivo crudo, additis simul catharticis, quae alvum blande movent; unde patet pilulas Belloste non differre virtute sua a pilulis Barbarossae dictis; saporem, odorem in similibus compositionibus mutare facile est; haec vel illa purgantia addere, sive drastica, sive leniora, copiam argenti vivi augere, minuire quisque potest pro lubitu. Unde ad arcana remedia excudenda quivis artis pharmaceuticae tyro sufficit; hinc vasta illorum seges facile intelligitur, quae in maioribus urbibus fere quotannis repullulat. Simulac advena venit, cui pappiis aetas lusuibus apta vi-
detur mox

Porrigitur surpi charta pudenda manu,

quae hyperbolicas vires huius illiusve arcani ad luem veneream curandam impositis verbis exponit.

Quum autem aegyptiae quandoque vanam creduli vulgi. Ipem eluderent inercialia interna, efficacia quidem, sed periculosa simul, nisi eum magna cautela sub directione medici periti & prudentis administrarentur; unde multo contigerunt strages; hinc praeparata mercurialia, chemica arte confecta, orrorem incusserunt pluribus; & celobres in arte viri maluerunt externo securii usu luis venereae curationem aggredi; quum hanc methodum longe utiorem crederent, illamque ideo miris laudibus extollerent.

Multa argumentis utitur celeberrimus Astruc (l), ut probet, praeparata ex argento vivo spiculis salium acidorum hispida nocere ventriculo, intestinis, visceribus, pulmoni, & reliquis partibus corporis mollioribus, adeoque illorum usum nunquam plane innocuum esse. Sed quis unquam vidit in praepa-

(k) Ibidem lib. IX pag. 1091, 1092, 1093.
cap. IX pag. 147, 148.

(l) De morbis veneris lib. II

spicula? Abstinentium tamen ideo iussit a praeci-
 omnibus; quum vomitiones & cathartes immodicas
 vertant, amo saepe rodant.
 in acidis solvitur, & affusione aliorum salium
 cum acidis contraxerat, instar pulveris ad fundum
 qua saepius ablutus in officinis servatur. An ve-
 raeparato mercuriali omnia illa spicula superesse, a
 Dum cum acido, acri, oleo vitrioli argentum vi-
 quitur ad siccitatem usque in fundo vasis manet massa
 do & mercurio constata. Adeo autem debilis unio est
 ivo, ut affusa aqua purissima, statim illud cadat ad fun-
 pulveris flavi, quem turbis mineralibus vocant in offici-
 icite ablutus, & in quibusdam locis spiritu vini accenso
 in veretur ab omni acido adhaerente. Attamen satis ef-
 in verrucis venericis curandis; uti antea ad §. 1463 dictum
 icula illa eminentia salina undique eminentia superant?
 modo haec praeparata mercurialia, quatenus noxia, sed &
 nda esse, tamquam parum efficacia ad domandam luem,
 isunduntur in sanguinem, adeoque debilem vim exercent in
 in virus cum sanguine confusum. Simul notat, quod atomi
 mercurialium, dum tandem in sanguinis massam perveniunt,
 cidis alte adactis confixi sint, aegre, tarde, parce ad nativam
 am redeant, adeoque parvam tantum efficaciam habere possint
 am virus luis venerae. Pro certo autem ponit celeberrimus
 quod tota mercurii vis ab ea forma dependeat, qua divisibilis
 as indefinite parvas, quarum singulae globosam figuram affectant
 me in praecedentibus evidenter demonstrasse, quod mirabilis
 vi efficacia nullo modo pendeat a gravitate specifica, & figura
 quam in minimas moleculas divisus mercurius semper retinet. Sola
 tionem, sola digestionem mercurius figuram sphaericam amittit, &
 in pulverem acris metallici saporis, qui in parva dosi expostus denovo
 bat valide, & diu; idemque ille pulvis igni maiori expostus denovo
 in argentum vivum, non acre, & quod eandem, imo maiorem, sibi
 n habet, quam antea.
 ile assentior, quod praeparata mercurialia nunquam reviviscunt in
 ne humano: hoc enim nunquam possibile esse credidi; quum constet rem per
 & toties repetita experimenta, tam magnum calorem ad hanc rem re-
 t, qui nunquam in corpore humano vivente adesse possit. Sed ideo concludi
 uit, eadem haec praeparata non habere efficaciam requisitam ad d. bellan-
 n luem venericam. Directis enim experimentis probari potest, per illorum
 um obtineri posse illud, quod ab inunctione mercurii aspernari potest. Sa-

Salivatio post inunctiones mercuriales sequens speratur ab omnibus, qui externam applicationem argenti vivi laudant, internum mercurii crudi & praeparatorum mercurialium usum damnant. Celeberrimus Astruc (n) pro generali axiomate practico ponit sequentia: *Comperitum est experientia mercurium exstirpandas luis venereae parem esse, quodles legitimum ptyalismum movet &c.* Errant igitur, qui putant salivationem in curanda lue cane pcias & angue vitandam esse, ideoque in eo toti sunt, ut parvissimas rarissimasque frictions adhibeant. Sic enim operam ludunt suam, suosque deludunt aegrotantes. Nec multo levius peccant, qui motam, vel immincentem salivationem intempestivis coërcens purgationibus, vel reprimunt; atque adeo mercuriam, dum opiato inflat operi, evocant, & amovent; sic enim id unum videntur agere, ut opere rose nihil agant.

Prudenter monet egregius iste vir, salivationem illam post unguenta mercurialia adhibita natam prudenti moderamine indigere, ne subitanea, tumultuaria, immodica ingruat; quod nunquam periculo caret; sed placida, moderata, remissa, facile tractabilis, quae ori inflammationem nullam, vel levem, quae ulcera pauca, & superficialia inserat, quae unam, aut alteram, vel ad summum tres libras salivae intra viginti quatuor horas suggerat.

Si nondum apparerent salivationis imminetis indicia, aut torperet salivatio iam nata, dum copiosiore morbi symptomata poscere viderentur, frictions vel augeri debebant numero, vel breviori intervallo repeti, vel maior copia argenti vivi misceri unguento, ut debita copia salivae prodiret.

Verum omnia haec requisita ad salivationem mercurialem excitandam, & moderandam, ubi iam nata est, certius obtineri poterunt, imo & tutius, dum a praeparatis mercurialibus interne sumtis excitatur salivatio, quam dum per frictions mercuriales haec facta fuerit.

Nemo dubitat salivationem excitari posse per praeparata mercurialia interne sumta. Dum haec divisim dosibus exhibentur, facile patet, quod omnino in potestate medici sit illam chius, vel serius provocare, prout morbus requirit. Si exorbitet, abstinere statim; si segnius procedat, novam praeparati mercurialis dosin propinat; si debito cum moderamine procedat, illam sustinet; datis aliquot dosibus longiori temporis intervallo, ne salivatio minuiatur nimium, vel citius cesset, quam requiritur.

Praeterea constat observatis numerosis in quibusdam corporibus mercurium cito, & vehementer agere; in aliis longe tardius, & remissius. Hinc prudens medicus facile pro re nata determinabit, quid agendum sit: semper enim novit, quam copiam mercurii in corpus ingesserit, quod nunquam per inunctiones mercuriales exacte determinare poterit. Novit quidem copiam argenti vivi, quae in unguento mercuriali est; novit pondus unguenti, quod in singulis frictionibus cuti applicabitur; sed ignorat semper, qua copia argenti vivi ingrediatur per vasa cutanea; linteamina imbuuntur, vel post primam frictionem unguento mercuriali, & tempore intercalari inter friciones curim calidam tangunt perpetuo, quum non soleant removeri toto cu-

(n) De morbis vener. lib. IV. cap. IX. pag. 382.

tata, & subministranda pura, ucca, calida, postquam cutis nimis impu-
 lioxio deterfa, & nitida fuerit; fed hac lotionē abftergetur minime illud,
 quod inter squamulas epidermidis de unguento haeret, vel faltem quam
 difficillime, & miferi non fine magno taedio ferunt follicitas illas abluio-
 nes, & linteorum renovaciones illo tempore, dum feverae falvationis gra-
 ves moleftias patiuntur.

Praeterea locus, in quo decumbit aeger, qui inunctionibus mercurialibus
 curatur, aërem continet, atomis mercurialibus plenum, quem infpirat conti-
 nuo, qui totam corporis fuperficiem alluit. Et ab hac caufa poterit fuftri-
 neri, quandoque, & augeri falvatio, quam medicus imminutam vellet.

Notabile huius rei exemplum habetur apud *Hildanum* (o). Curabat virum
 iuvenem luc venerea graviffime laborantem, cuius uxor triginta circiter
 annorum ab eo pariter infecta fuerat. Licet hyems asperiffima foret, non au-
 fus fuit differre mariti curam, fed illum multoties inunxit mercuriali un-
 guento; ob morbi iam inveterati magnitudinem fuafit mulieri, ut marito fuo
 adfaret, neque ex hypocausto difcederet; ne ab iniuria aëris magis magif-
 que laederetur, & morbus fieret contumacior. Hypocaustum anguftum erat,
 & humile. *A fido vapore unguentis ita alterata, & ad falvationem induffa fuif-
 mulier, ut fere eodem modo ipfi atque marito pituita ad os deflueret, oculicera-
 tio quin etiam eris fuperveniret &c. Tandem adeo nulla fuif falvatio, ut in
 proprium tubiculum a marito feparatum collocauda fuerit. Haec una cum
 viro fuo a dira ifta luc pleniffime convalefuit, cufi inunda non fuiffet.*

Hinc intelligitur, quam male agatur cum aegris, qui plures fimul in eod-
 em conclavi tractantur per inunctiones mercuriales; quod toties in nofo-
 comiis ad lucum curandam deftinatis locum habet, ubi inunctionum metho-
 dus praevaluit.

Imo falvationis periculum imminet etiam faniffimis hominibus, qui dum
 inferviunt miferis, noctes & dies in tali aëre haerere debent.

Iuffit celeberrimus *Aftruc* (p), ut frictiones fiant, non ab aegro ipfo, fed
 a miniftris potius, qui ad opus hoc habiliores, & alacriores funt; nec vol-
 uit, ut manibus chirothecis monitis iatraliptae munere fungantur, fed
 nudis, ut calor maior frictioni accedat. Fatetur quidem talem emiffum
 venire in difcrimen falvationis, fi pluribus eodem die fricandis vacaverit;
 teftatur tamen nullum periculum adelfe, fi uni tantum ferviatur, & finita
 frictione manus probe abluat. Sed nemo prudens hoc minifterium in fe
 fufcipiet; & quis poffit promittere, quod nihil a falvatione metuendum ha-
 beat? Volis manuum imponitur unguentum mercuriale, & forti frictione
 adigitur in vafa cutanea aegri, in quo falvatio excitanda eft; hinc aqua-
 liter

(o) Obfervat. chirurg. cent. V obferv. 98 pag. 495.
 veneris cap. IX pag. 149.

(p) Lib. 2 de morbis

iter ingredi poterit per vasa cutanea ministri, quae numerosa, & satis multa sunt in volis manuum, nisi duris laboribus, hae partes occalluerint.

Pluribus contingit, ut volae manuum perpetuo fere sudore madeant: morbis, ubi blando sudore crassa salutarem futuram sperant medici, primus vestigia in volis manuum percipi notum est. Haec ergo pars corporis & exhalationi & reorptioni aptissima est. Unde plerumque obtiner, ut beantur aegri, qui salivatione indigent, se ipsos perficere, ne alter faciat in discrimen salivationis veniat; vel dum in nosocomiis plures simul a curantur eodem tempore, alter alterum unguento mercuriali perficit (1) praesente chirurgo, qui curam dirigit.

Sic saltem cavetur, ut nullus argenti vivi efficaciam experiatur, qui indiget; quatenus nempe per frictiones applicatur. Verum, dum plures randi in eodem loco decumbunt, semper metuendum est, ne atomi mercuriales per aërem dispersi corpus ingrediantur, inscio illo, ac invito, curam suscipit. Dum salivatio iam adest talis, qualis sperabatur, prudenter omnes cessant quidem ab inunctionibus, vel saltem illas adhibent parca manu, vel ceperunt longiori intervallo, ut nempe sustineatur salivatio p sens, non augeatur; attamen, quum in hoc casu pergat mercurius ingredi, pus, licet suspendantur inunctiones, patet facile, plura nasci posse infortuna.

Nec vanum hunc esse metum patet observatis (r). Mirabatur *celi Goulard*, illos, qui praeparabantur ad subeundas inunctiones mercuria coepisse salivationem pati, dum ob penuriam loci, in eodem conclavi rabantur cum illis, quibus mercurius iam inunctus fuerat. Faretur autem hoc loco decumbere debuit, ubi cura luis venereae per inunctiones mercuriales instituebatur in pluribus aegris. Misisset intumescere caput; salivatio copiosa, valde secuta fuit, & ulcera oris interni, sequente gangraena, periit, quum nulla arte eius progressus impediri posset. In arte chirurgica adeo celebris. *Peitit*, dum de exostosis venereis agit (s), commendat salivationem per frictiones mercuriales excitatam, & condemnat usum inunctionum praeparatorum mercurialium, tamquam inefficacem, & semper periculosum. Nec tamen diffusetur, quod inunctionis mercurialis tempore non determinari dosi argenti vivi requisita ad curam luis, secundum mentorem diversitatem, quum in locis, ubi per inunctiones curandi debiles & delicati, praeter argentum vivum per inunctiones receptum accipiunt de illo, qui per aëra volitat, sicque nimiam mercurii concipit, capitis tumorem immanem pereunt (u). Quare suadet, ut hydropicos subeuntes aegri in separatis cubiculis locentur, vel saltem parvorum numerus sit in vasto conclavi, & fenestrae subinde aperiantur.

(1) Goulard sur les maladi. vener. pag. 12.

(r) Ibidem pag. 55.

(s)

pag. 51.

(u) Traité des maladies des os. tom. II pag. 496.

(u) Goulard sur les maladi. vener. pag. 56.

UES V E N E R E A.

157

omnis tempore fenestras aperire, imprimis frigida est; uti omnes noverunt. aegri in separatis cubiculis habitarent, minuere, sed non tolleretur integre. Notum est, partem & cute aegrorum, qui inuncti sunt, vel qui mercurio sumserunt; hinc tales aegri haerebunt in propriis scurialibus graviora, & si in parvis cubiculis reueretur noxa. Singulos autem aegros inunctione mense in loco concludi locare solos impossibile est in nolo-

o, quod grave est, evitatur, si per mercurialia praeciterur salivatio. Certissimi sic esse possumus de quantitate corpori ingeritur; possunt haec praeparata dari diversa modo ventriculum aut intestina laedant, nec vomitionem producant; & tamen salivatio sequatur; possunt efficacia tamen eligi; potest coepta iam salivatio suffragari, si opus videatur. Praeterea argentum vivum non minus homines: in quibusdam enim a parva copia mercurii symptomata, quae imminem salivationem indicant, ut passim quantitas requiritur. Quod imprimis fieri solet frequenter saepius argenti vivi efficacia opus habuerunt; uti passim curam huius morbi descripserunt, observatum suum peritosis sit prudentia, & attentione ad curandam peritosis sit prudentia, & attentione ad curandam peritosis sit prudentia. Verum, dum miseri tales aegri saepius evitant mercurio ausu, modo morbi pudorem, incidunt in aggras, qui illis maxime tractant, & plurimos miserrime perdunt remanere ausu. nim vivum, quidcumque de blanda eius indole corpus ingre-
mano, si vel externae applicatum maiori copia corpus ingre-
facillimum. Plures videntur fuisse in illa opinione, tunc felici-
procedere, & certius, quando copiosas inunctiones, tunc felici-
antequam salivationis signa appareant: sperant enim a copia
imprimis luem debellari posse: imo pro axiomate dicuntur, no-
rimetis comprobato statutum fuit, tanto certius cura sanari luem,
us argentum vivum in corpore haereat, tam elaboratur nimis cito
salivationem partim, quia per hanc viam elaboratur nimis cito
qui cum humoribus per vasa fluit; partim, quia aegri non
spendi debent salivationis tempore, vel saltem minori copia, &
intervallo possunt applicari tantum; sicque aeger curandi ratio vo-
copiam argenti vivi in se recipere. Haec Galliae archiatro primario
methodus per exsiccationem; quae a regis Galliae archiatro primario
laudata fuit, in Universitate Montpelienensi si delicta est. Car-

Certum tamen est illos, qui in vapores solum argentum vivum magna copia in corpus recipiunt, miserimos reddi, omnes vires perdere, paralyticos fieri, tremulos, elumbes, ad omnia inhabiles vivere, & si mala haec iam inveterata fuerint, vix in sanitatem restitui possent. Familiares tales morbi occurrunt apud illos artifices, qui metallis deaurandis occupantur multum; uti & apud alios, qui argentum vivum, quocumque modo, diu & imprudenter tractant. Illi, qui ex mineris argentum vivum excoquant, misere vivunt, & in vigore aetatis pereunt saepissime.

Unde concludi potest minime tutum esse: replere corpus argento vivo illud enim praeter enarrata mala ab humoribus, cum quibus fuit separatum ad varia corporis loca deponitur quandoque, & novas molestias creat. *Antonius Musa Brasavolus* (x) non semel in sepulchris argentum vivum in mortuorum capitibus reperit. Alium vidit, qui ter tantum in brachiis crucibusque inunctus fuerat, argentum vivum evomuisse. Similia apud *Boncompium* (y) legi poterunt. *Schenkius* (z) refert in cadavere meretriculae subito mortuae inventum fuisse argentum vivum in ventriculis cerebri: fatis magna copia. *Fallopium* (a) testatur, se vidisse homines inunctos per triennium aut, & venientibus gummatibus in iibis, detecto osse, vidisse ibi collectum argentum vivum. Hac ratione, inquit, ego non probo medicamentum: utor aliquando, quando non potui via regia assequi intentum. Dum ossa a lue venerea cariosa ferro excidebat *Fernicius* (b), guttulas argenti vivi tremulas non raro invenit. Plura alia possent adferri testimonia; sed haec sufficere puto, ut probetur argentum vivum unctione corpus ingressum, per vasa cum humoribus motum, posse coire in maiorem molem, & ad varia corporis loca deponi; saepe non sine noxa, & periculo.

Celeberrimus vir *Targioni Tozzetti* (c) codicem manuscriptum vidit ab auctore incerto exaratum, qui medica & anatomica continet plura scitu dignissima. decimo sexto seculo scripta, ab anno nempe 1567 ad 1584. In hoc codice leguntur sequentia: Qui laboraverunt venere a lue & illius fuerunt, hi, dum sciat corpus in anatome faciendā, magna sit haemorrhagia, etiam invito plerumque scitōre: similiter illis viventibus aneurisma accidit: utrumque accidit, quoniam hi habent venarum membranas admodum tenues, & subprime in quam plurimis observavit; & verum esse comperi.

Non crederem, fateor, vasorum tunicas debilitari per frictiones sic, ut ab hac causa nascerentur aneurismata; sed, quum argentum vivum tenuissime divisum in unguentis mercurialibus per vasa motum coire possit in maiorem molem, & sub nativa sua forma per vasa nostra moveri, ac dein in varias corporis partes deponi, non videtur inanis metus esse, ne fluidum illud metallicum, toties gravius sanguine, tota cordis sinistri vi in arcu aor-

(x) Aphrodisiac. pag. 694.

(y) Observat. medic. lib. VI observ. XII pag. 811.

(z) cap. LXXVI aphrodisiac. pag. 809

(a) Patholog. lib. VII. cap. VII pag.

(b) Prima raccolta di osservazioni mediche pag. 91.

(c) Sepulchret. tom. III pag. 452.

(d) De morbo G.

U E S V E N E R E A .

159

is pulsum tonicarum locum, in quem impingit, in sanguis eadem vi cordis pulsus. Sed notum esse, rosis observatis constet, locum talem aortae, vel a distensione brevi formare saccum aneurismaticum mole, qui tandem ruptus mortem subito inferat. in minutissimas moleculas divisum non facile lobulos, quamdiu per arterias movetur, vasa nemine quae celer, nec interruptus est humorum motus. or motus interruptus per valvulas, & imprimis in os sanguis venosus magna copia, & minori impetu sinus venosi, auriculae & cava cordis, ibi coire lobulos, qui momento post vi cordis sinistri in curvatur tanto maiori impetu, quanto pondus specificum at gravitatem excedit, unde aneurismatis metus. git primo, qui inter Christianos pilulis Barbaessae usus epente mortuus super pontem Avenionis, quum ipse ibi praelia? Nihil certe est periculosius aneurismate laboratus, & celer corporis motus. Verum tamen est, quod Astruc (d), unicam harum pilularum vespere aegris datam quatuor grana mercurii crudi habebat, adeoque mortem in pilularum usui adscribi non posse. Quum autem haec mirabilem fecisset operationem, proculdubio vel maiori ori tempore fuerunt adhibitae, sicque argenti vivi copia ista fuit, quae tandem haec mala producere potuit. quae de externa applicatione argenti vivi ad curandam luem us dicta sunt, fecerunt, ut nunquam meo consilio adhibita ta est eius inconstantia, ut nunquam omnino exakte administrat us eius usum nocere times, parum proficere, quum eo, quod in nimio eius usu nocere times, parum proficere, quum eo, quod m ab eo, quod non est rectum, in illo discernere (e). Praeterea ratis mercurialibus, quae tuta noveram salivationem excitare. us eram de quantitate mercurii, quam aegris ingererebam, nequum habebam ab argento vivo diutius, quam par est, in corpore, & ad varias partes deposito.

Quae ut fiat, aliquor diebus prius impleatur aeger pilula sana, salivationem mercurii cura luit venereae, donec alia curandi methodo postea coeperim. Ex-

methodo usus sui semper ad excitandam salivationem mercurii cura luit venereae, donec alia curandi methodo postea coeperim.

methodo usus sui semper ad excitandam salivationem mercurii cura luit venereae, donec alia curandi methodo postea coeperim.

pag. 127.

pag. 1292.

Trallian. p. 110. c. 14.

Examinabam prius aegros, an vires forent satis firmæ ad tolerandas salivationis molestias; quæ certe leves non sunt. Si exsucca, arida forent corpora, si pulmo lævis videretur, hæmoptoeici fuissent antea, febricula continua vesperti exacerbata laborarent, salivationis curam semper distuli, & tans prius bono victu balneis, rusticatione emendare præsentem corporis conditionem. Quidam ex his morarum pertæsi indulgentiorum consilii petiverunt; sed vix non omnes perierunt inter salivationis decursum: pauci qui supererant, miseram, & brevem vitam duxerunt. Plures tales cal leguntur apud observatores (f). Nisi hac methodo crescant vires, & a qua corpori torositas redierit, credo salivationem in tabidiss & emaciatis talibus corporibus tentari non posse absque periculo. Monendi sunt aegri requiri ad hanc curam perficiendam otium liberissimum sex septimanarum

Integra septimana ante usum mercurii utantur victu molli, humectant antiseptico, ex oryza, hordeo, avena, oleribus mollibus, lacti vel iusc incoctis, pomis coctis, carne alba, pauca quantitate elixa potius, quam a Potus sit aqua pura, addita tertia parte lactis recentis. Cerevisia mol tenuis, non inebrians facile conceditur illis, qui huic potui assueverunt Vinum, spirituosæ omnia, aromata pariter exfulare debent.

Quum enim per actionem mercurii humores solvantur, & magnum form salivatio producat, molli tali victu, & antiseptico munientur contra putredinis noxas, quantum fieri poterit.

Leni purgante eccoprotico, vel & clysmatibus evacuantur intestina relicta stercora molestiam creent salivationis tempore; quando strictior esse solet. Quotidie in hac septimana balneum adhibetur, ut tota cutis & nitida sit, quia salivationis tempore linteamina non mutabuntur.

Si plethoricum corpus fuerit, secatur vena; sin minus, hæc omittit. Toto hoc octiduo impletur corpus decocto molli, penetrabili, ex radicibus chinæ, sarzaeparillæ, graminis &c. Pro minus opulenti decoctum rabardanæ, altheæ cum glycyrrhizæ eundem producat effectum. In medicina ad hunc numerum formula talis decocti habetur -

His factis, induat aeger vestes, quas per sex septimanas non deponet cupha lanea caput tegat & foveat; periculosum enim est salivationis tere, si frigidior aer caput alluat.

Hæc præparatio sufficiet, antequam aeger salivationem subibat. Optæ diuturnas. Præparationes ad psoralismum per cathartica, digerentis nea &c. damnavit Sydenhamus (g). Consideravit enim argentum vivum quam venenum, quo opus est ad salivationem excitandam; quod faciliterari poterit a corpore vegeto, & valente, quam per missiones sanguini renuem diætam debilitato. Haud dubie satius esse duxeris æquus retinemat, nihil agere, quam ita satagendo nocere. Quid quod experientia nullis evacuationibus, aut alio modo infirmatos salivationis impetum molius sustinere, quam eos, quorum quasi ante prælium incisæ sunt nervi.

(f) Turner Siphylis pag. 327.

(g) In epistola II respons. pag. 426.

JES VENEREA.

161

r quolibet bihorio dosi apta mercurii dulcis.

iram subibit, versari perpetuo debet in aëre ca-
primatur mercurius in thermometro Fahrenheitiano
secundus congelationis punctum indicat) infra se-
ascenderit mercurius usque ad septuagesimum gradum,
tuagesimum transcendere vix unquam debet: pauci
gradum maiorem absque molestia, & anxietate ferre
us impediri solet. Quamvis enim calidior aëris tem-
ivationis tempore, attendendum tamen est ad faciliem
tolerantiam, quae varia invenitur in diversis homi-

mercurius dari statim ac cessat menstrua evacuatio.
sumum tempus non incidat in sequentem fluxum men-

elegi talia, quae satis commode feruntur a corpore,
alvi fluxum provocant. A praecipitato rubro, & sur-
stinui semper, quia corpus valide turbare solent. Vidi
a fuisse, & in robustis hominibus citam, ac copiosam
m, sed saepe satis periculosa, quam ad debitum mo-
on adeo facile erat. Accedit, quod ab his assumtis
es alvi evacuationes. sequantur saepius; quandoque non

praecipit. albo, vel mercurio dulci, ter sublimato. Novi
melam; qui est mercurius dulcis, septies sublimationibus
mercurialem, quae quindecies repetitis sublimationibus
do, me observasse operosus has praeparationes tuto qui-
; sed simul repetito toties hoc labore augeri pretium,
; uti malui talibus, quae efficaciora erant, & quae in do-
ritu exhibere poteram absque ullo periculo.
alvi usus fuit.

ter. praecipit. albi gran. xxx.
chari alb. puriss. drach. i.
nihil trita in mortario vitreo, in xxv partes aequales divisa
bibe.

ter. dulc. ter sublimati gran. lxxxi,
sive drach. i ff.
occhari albi puriss. drach. ii.
simul trita in mortario vitreo, in xxiv
abibe.

part. II.

E

UES VENEREA.

163

na signa incipientis salivationis se manifestant, efficaciam mercurii, vel saltem dosin minuire, do-
impetuose procedere inceptam curam.
oc fieri poterit, dum interno usu mercurii tentatur
nunctionem argentum vivum sanguini miscetur, uti
ertus enim sum de quantitate mercurii, quam interne
certus esse possum de quantitate argenti vivi, quod
t, & quod quandoque subito agere incipit.
otest, an salivatio incepta subito augebitur, abstin-
losi; si lente, & moderate pergit, sustinetur, dato su-
pulisculo mercuriali. Si vehementior pyralismus se-
rius est; de qua re postea dicetur.
re, & mollis potus requiritur, quem componere solent
is, hordeo mundato, glycyrrhiza, & colaturae additur
iri recentis. Plures aliae his similes ptisanæ parari pote-
magis placet.

expuitur ad lib. iii, vel iv, quolibet nuchtherero;
fficit.

quantitatem liquidi, quod expuitur, variam esse pro varia
lo corporis robore. Plerumque, librae tres, vel quatuor
im si expuantur, sufficere creditur; vidi aliquot, qui quin-
oras expuebant sine magna virium iactura. Si quatuor librae, & eo
triginta dierum spatio exhibunt centum viginti libras, & eo
tutius salivatio protrahitur, vel maior copia expuitur quoti-
corporis humores per hanc viam exire, & non tantum novo-
ministrantur, ingredi, manifeste patet inde, quod ut salivationem
ti, & exhausti ab hac curatione resurgant, ita copiosius mox
est iacturam factam supplere, quam in loco calido haerentes
que satis fudent, nec exiguam copiam urinae excernere soleant.
od non raro salivationis tempore contingant alvi evacuationes,
que debilitantes.

dicam, per salivationem, & per curam decoctorum, de qua postea
olvuntur humores luis veneno inquinati, soluti expelluntur de cor-
subministrantur nova, pura, in locum perditorum, sicque illibata
ire sanitas. Quum autem curae huius tempore, percat de cor-
am restituatur, patet requiri prudens moderamen, ut salubris ille
vineatur, nec succumbat aeger curae, postquam tanta miseria agatur,
iterum nova patet ratio, cur tam infeliciter succedat.
yras, imo ipsa plebis sex talibus curis se
is methodus fuit laudata ad longaevitatem, ut
mutationes sere radicales humorum per resolve-

crectiones succedentes; ut sunt receptae curationes per virtutem argenti vivi, aut per decocta attenuantia, exsiccantia, sudorifera. Haec saepe disponunt corpus quam optime ad expulsum veterascens, & institutionem novae vitalis materiae (b). Optime tamen additur: Unde prudens ars per has ad vitam longam ducit. Pauci numerabuntur, credo, qui incertam longaevitae spem redimere hoc pretio vellent.

§. 1472. Si minor, excitandus fluxus erit stimulo eodem.

Augetur numerus dosium, vel quantitas mercurii in singulis dosibus. Multum iuvare solet ad augendam salivationem, si caput, & collum pannis linceis tegantur. Non nimis tamen hic festinandum est; malui semper in eadem quantitate mercurii subsistere diutius, quam subito augere: quandoque enim sequitur ingens salivatio, praeter spem, quam moderari medicus poterit difficiliter, postquam copiam mercurii ingessit.

§. 1473. Si maior, quam vires ferre queant, sistendus erit leni clysmate vel purgante, vel sudorifero.

Aliquando contingit, praecipue si mercurius imprudenti quantitate, aut nimis repetita dosi, datus est, vel per inunctiones plus argenti vivi corpus ingressum fuit, ac credebatur, quod incipiat mercurius simul, & semel quasi in nervum erumpere; tunc subito intumescunt caput, labia, lingua, totum os internum, &, dum vasa harum partium satis pervia sunt, sequitur ingens, ac perpetuus pyralismus, qui, si eodem pede pergeret, totum corpus brevi sic exhauriret, ut subito omnes caderent vires, instaret animi deliquium; imo mors metuenda foret. Monentur aegri semper, hisce praeciperet pyralismi quantitatem; nutrimentum datur tale, quod tenue est, sine sua concoctione requirens, satis nutriens, vix ullam viscerum actionem procul carnem viculinam, aut lacte paratus; hac spe, ut sustineri possint vires ad tolerandum validae salivationis impetus.

Si haec non sufficiant, minuendus est pyralismus, determinatione facta ad alia loca, quantum fieri poterit. Qui internis remediis usi sunt, facile ab his abstinere tantum; qui unguentis mercurialibus remtentarunt, illico detrahunt tibialia, femoralia, indusium, lecti lintheamina, quae omnia ab illito mercurio sordent, totamque cutim sollicitè depurant, ne pergat argentum vivum, his sordibus inhaerens corpus ingredi, & salivationem augere, quae iam nimia est.

Si.

*) H. Boëthaeve in lit. medic. §. 106a.

L U E S V E N E R E A.

nartica, ut partem huius saburrae per alvum derurbent,
oribus aliquam partem requiem, quae diu, noctuque
one diffluunt, & hac ratione miseris omnem somnum

165

ic circumspectione opus est. Patebit enim ex illis, quae
apham dicentur, minime oporandum esse, ut vis mercurii
Teneatur haec res leni clysmate purgante; qualis fore
ad hunc numerum legitur. Notum est, clysmata,
sae purgando per alvum agere debent, non vero simpli-
ter, componi ex quadrupla copia ingredientium, quae per
ut purgatio per alvum obtineatur. Quibus positis patet
clysma leni dicatur.

ormula ad eundem hunc numerum interne sumendi, quae
diagrydii (quod est scammonium fumo sulphuris cicuratum,
m), & sex drachmas Syrupi rosarum solutivi cum sena ha-
nil, adeoque lenem tantum vim purgantem continet.
ora cathartica suadere auderem, multo minus talia, a quibus
ster. Celeberrimus Astruc (1) mitiora purgantia consulit tan-
addidit: Imo si grave periculum imminet, cum aqua benedi-
u vino emetico ad unam unam, & dimidiam. Si quis vol-
ominem in media salivatione haerentem, ore interno toto ul-
s contineri potente amplius, lingua dolente, tumida, ad latera
rae minuta forte prius horrebit, certum sum, si cogitet,
tripiendum. Non praetervidit hanc difficultatem celebris auctor,
deatur, si ob praecellensm. Eritur a tonsillarum tumore vomito dif-
ta v adeoque vomitioni grana, aliquot lartari sibiati solubilis, v. g.
a quo fortior vomitioni promovenda, & partibus hauribus potanda praebere;
e tartarus emeticus sursum sadura impar, deorsum ire perges sibiati
roducere, licet pro dilutus, assumtus facpius solet nauseam, &
i vel unicus vomitus vomitum parte per alvum agat. Notum est,
re se habeant fauces, lingua, hic excitare, dum corpus turbare inci-
e sano, dum omnes illae partes integritate, si consideretur,
no molimine sit, dum contenta ventriculi, flexiles, mobiles sunt, non
metuendum erit, dum lingua, ventriculi cum impetu palatinum tu-
ocutionis periculo; nisi statim expellendorum in tracheam delabatur
quam acerbis dolor aderit, dum per validissimam tussim haec excuti pos-
n licet agitantur? Quantus metus haemorrhoides, quae tempore sali-
va

pag. 364, 365.
L 3

vationis infrequens non est, dum omnes illae partes semixelae *conquassantur* vomitu, vel tussu. Unde, ni fallor, evidens est, vomitionem *vitandam* esse semper salivationis tempore.

Quum ergo multa cautela opus esset, ut salivatio nimia minueretur per alvi evacuationem, tentatum fuit, per sudorifera impetum, & copiam humorum. avertere a capite, ac faucibus. Dum enim sudore universa cutis perfunditur, spes est, minus urgendas partes illas, quae salivam secernunt, & exceraunt, atque hoc modo salivationem nimiam minui posse.

In *materia medica* ad hunc numerum commendantur *diascordii Sylvii* grana xxiv pro sudorifero. Quum haec compositio in Germaniae officinis pharmaceuticis non semper obvia sit, pauca de hac monere debeo.

Diascordium, a *sordio* herba dictum, quae praecipuum huius electuarii ingrediens est a *Hieronymo Fracastorio* lib. 3. *de morbis contagiosis* cap. 7 describitur, & magnis encomiis extollitur in morbis contagiosis, ac praecipue in peste. Dabat nempe haustum, qui drachmam continebat illius electuarii, uncias duas succi *liniulae*, sive *trifolii aestosi*, unciam *succi citri*, & unciam *acti*: addebat *specierum cordial. de gemmis* scrupulos duos. Omnes autem huius haustus medicati vires in peste curanda videntur imprimis tribuisse *electuario diascordii*, cuius tres quartae partes melle constant; unde grana quindecim reliquorum ingredientium simul sumtorum in hoc haustu aderant. Sedecim, ni fallor, ingredientia hoc electuarium constituiebant; unde singulorum exigua portio in hoc haustu aderat, & ideo quidam efficaciam huius remedii maluerunt tribuere succidis porius, quam drachmae diascordii. Adest quidem & opium in hoc electuario, sed non magna copia. Attamen varia in diversis locis. In quibusdam pharmacopoeis drachma *diascordii* habet tertiam partem grani opii; in Viennensi tantum quartam partem. Haec compositio fere ubique in officinis pharmaceuticis inveniri solet, sed non exacte talis, qualem *Fracastorius* descripsit.

Franciscus de le Boë Sylvius (*) composuit aliud *diascordium* a priore diversum. Multa enim abstulit inde, & nova addidit; *radices angelicae*, *folia cardui benedicti*, *crocum*, *acaciam*, *radicem imperatoriae*, *nucem mscabam*. Maxima differentia in eo consistit, quod nullum omnino addiderit mel; quod in similibus compositionibus molem adeo auget, non vires remedii. Digeri enim iussit ingredientia omnia in vini spiritu, quem deinde leni igne per alembicum abstraherebat; manebat tunc in fundo vas *extractum*, quod nec corrumpitur, nec sium contrahit, sicque dedit specimen, quomodo in officinis similia remedia componi possent, quae in parva mole egregiae vires habent. Facile patet, augeri opii admixti proportionem ad reliqua ingredientia, dum nullum mel tali compositioni additur. Non potest exacte in *diascordium Sylvii* limitari proportio opii ad reliqua, quum haec variet, prout hoc *extractum* magis minusve spiritum est. *Sylvius* ipse grana quindecim determinat pro dosi sufficienti, ut instat remedii sudoriferi agat. In *materia medica*, dictum fuit.

(*) *Prax. medic. lib. I, cap. XLVIII.*

iatuor praescribuntur. Vidi ad triginta grana & ultra illo damno.
 strata vis, & penetrabilis: croci efficacia commendant
 Pulcre proderit si post purgans datum in hoc casu
 operatione natus comescat, & sopiat, simulque nimiam
 tibus oris interni, unde pyralismus augeri solet, mitiget,
 sudore excitato derivationem humorum aliorum pro-

uit vis mercurii ad alvum, opus erit opiato, & dia-
 horetico.

ti vivi, siue externe inuncti, siue interne sumti est solutio
 ris, & solutorum evacuatio per os, saliva olida copiosa ex-
 doque contingit, ut vis tota mercurii ad alvum ruat, quod
 im est. In quibusdam salivatio ne quidem incipit, sed statim
 itur. Ut hoc caveatur post singulas doses praeparari mer-
 is propinatur cochleare medicamenti opiat; uti ad §. 1469
 & repetitur saepius, si de ventris torminibus conqueratur aeger;
 am mercurii dosin unquam, nisi haec tormina prius sedata es-
 ninuebam quantitatem mercurii, & longioribus intervallis tan-
 m, si observarem, intestina facile irritari.
 n, antequam salivatio incipiat, os prius doleat, suspicabar, quod
 ens, inflammatoria, exulcerans, causa partibus oris interni appli-
 haec loca alliciat putridorum humorum colluviem. Idem hinc
 videbatur a ventris torminibus, quae assumptum mercurium se-
 & si totum os internum salivationis tempore exulceretur undi-
 a mala fient, si a simili confluxu humorum salivatio per intestina fie-
 certe vocari salivatio haec intestinalis, quia eundem effectum prae-
 lidici in casu sequenti. Consilium petebat a me mulier 34 annorum
 tenera, quae diuturnos in faucibus dolores perpeffos voce rauca con-
 r. Inveni in palato pendulo foramen erosum, quod digiti minimi
 apicebat. Postquam corpus hoc exsuccum per aliquot dies impleve-
 octo avenae, addita tertia parte lactis, dolor faucium minuebatur;
 rius acidae apparebant humidae, & tentabam salivationem excitare,
 ercurio dulci; sed refracta dosi tantum. Molestus cum torminibus
 iderat alvi fluxus, & levis salivationis vestigium tantum apparebat,
 nebat lingua, nec labia, ita ut saepius de die ulcus palati lustrare occu-
 verim. Opiatis comescebam alvi fluxum. Vidi manifeste marginer
 madescere, fundi quasi foraminis amplitudinem minui, recrescere per-
 & ad consolidationem tendere ulcus. Perrexi tamen caute in usu mer-
 dulcis, qui mihi videbatur agere. Subito post prorupit salivatio. Ac-
 vomitus, & dysenteria, quae bpiò comescui, salivationem, os fovea-
 do.

do perpetuo sustinui, sicque perfecte curatam vidi, & per plures annos sana, ac vegeta vixit.

Simulac ergo observavi, vim mercurii versus alvum ruere, dedi opiatas, & quidem repetitis vicibus, donec dolores abdominis, & fluxus alvi sisterentur. Talis formula in *materia medica* habetur, ubi omni quadrante horae medium granum opii adhibetur tamdiu, donec sedentur haec mala. In eundem effectum commendatur *sberiaea Andromathi* super alutam *extensa*, & emplastri instar abdomini applicata. Quum autem in diarrhoea curanda laudetur semper liberrima per cutim perspiratio (secundum effatum *Hippocratis* (1) *cuis raritas, alvi densitas*), hinc & sudorifera opiatas mista in hoc casu laudantur. Tale remedium in *materia medica* habetur compositum ex *diascordio Sylvii*, de quo praecedenti paragrapho dixi.

§. 1475. **U**bi os, gingivae, fauces nimis tument, dolentve, utendum molli, blando, liquido, gargarismate, vel colutione, vel (1473).

Contingit quandoque, imprimis, si salivatio per inunctiones mercuriales tentata fuerit, praeter opinionem simul, & semel os, gingivas, fauces, linguam tumere immaniter, inflammari cum dolore acerrimo; ita ut a tumore subito partium non leve suffocationis discrimen adfit. Ubi mercurialibus interne datis salivatio producit, raro hoc contingit; quia, simulac in gingivis levem modo pruritus sentiunt aegri, & dentes quasi elevari incipiunt, prudens medicus vel abstinere statim praesentem, post quem salivatio sequetur brevi. Dictum enim fuit ante, facilius longe ad iustum modum reduci posse efficaciam argenti vivi, dum interne adhibetur, quam dum externe inungitur.

Si in tali casu valida salivatio statim sequatur, solent plerumque tumores subsidere partes, & periculum suffocationis a nimio tumore minuitur. Metuere tamen soleat artis periti, dum a parca quantitate argenti vivi salivatio cito surgit: usus enim docuit, curam luis tunc minus certam esse, & mali symptomata redire saepius de novo. Idem observatum fuit post validam inflammationem partium oris interni una cum larga salivatione (m). Unde patet, quare omnes prudentes tentaverint semper, ita adhibere mercurium, ut salivatio sequeretur, sed moderata, uti ad §. 1471 dictum fuit, semper habita ratione aetatis, sexus, & virium. Dum autem aeger in his angustiis haeret, succurrendum illico est, quod fit, si totum os internum perpetuo toveatur emollientium herbarum decocto calido: tumentes enim, & inflammatae partes oris interni a motu ad gargarizationem requisito acerbissime dolent, simulque me-

(1) Epidem. VI. Charter. tom. IX, pag. 433.
servat. tom. III, pag. 327.

(m) Medical essays and ob-

: gargarismatis pars in asperam materiam delapsa aegrum
n aegro : summas molestias pareret, si valida tussi ex tra-
mine, quod illapsum erat; valide nempe concussis inter
inflammatis, & dolentibus.

umerantur ad §. 1426 in *materia medica*: quarum deco-
vire poterit non tantum, sed & potari, & forma clysm-
laxant enim, aperiunt, emolliunt, ut nempe salivatio lar-

tur levamen, sanguis mittendus est, & tentandum, an hu-
ac copia versus alvum deduci possit; de qua re dictum
t subsideant partes superiores nimis tumidae. Metuendum
intestina male afficiantur ab acri, putrida hac colluvie, sed
asu mius malum eligendum esse nemo dubitat. Si itaque
ut cathartica deglutiri nequeant, quadrupla horum dose
i debet.

iac mala non adscribi debent medentibus, sed aegris ipsis.
ue habebam juvenem artis medicae non ignarum. Dederam
nercurii praecipitati albi, iamque prima incipientis salivatio-
rebant: abstinere cupiebam, ut semper per aliquot horas sal-
ori mercurii exhibitione, ut viderem salivationis successum prius.
ilit aeger, & me incio ex pharmacopolio iussit adferri grana
th mineralis, quae statim deglutivit omnis morae pertaesus,
cupiens cito sanari, vel mori. Hoc facto aperuit cubiculi
igida, & humida tempestate hyemali, mortem minitatus custo-
rat, dum volebat impedire insanum facinus. Post trihorium vo-
at, ut succurrerem misero, vix non moribundo. Caput totum tu-
aniter, oculi turgidi, prominentes, sanguinei, lingua ex ore pro-
ens, livida, labia tumida, inversa, pariter livida, anxietas sum-
iam videram spectaculum magis horrendum. Advolans ex vicinia
sanguinem misit ad animi deliquium usque; curavi iniici clysm-
orte; quod incredibilem copiam humorum eduxit, & subsiderunt
nentes brevi, ita ut libere respirare, & oblatum potum deglutire
sequenti die salivatio copiosa aderat; quae sequentibus pergebat
iter, donec sanaretur. Per aliquot menses tamen languit, antequam
ires recuperare potuerit.

6. Pergendum, donec symptomata evanuerint, vul-
go per xxxvi dies.

artibus hae *venerea* affectis, quae oculis patent, evidenter observamus
i vivi efficaciam: pustulae enim elevatae subsident, exsiccantur, ca-
vel & quandoque superando tolluntur; ulcerum fundus sordidus depu-
, rubet; color vicine cutis purpureus, lividus mutatur in colorem sen-
naturalis; dolor nocturni minuuntur, topi, & gummata *venerea* mol-
le.

lescunt, ac minuuntur pariter, quandoque idem in exostosis venericis observatur, praecipue si recens enatae fuerint: in annosis enim haec feliciter raro obtinet, & illae diutius persistunt; tenera ossa narium, & palati cadunt saepius; lamellae cranii a lue erosae separantur a reliquis adhuc sanis. Verum omnibus his tempus requiritur, ut cura absolvatur. Quandoque etiam dantur tales casus, ubi argenti vivi efficacia nequidem sufficit. *Argentum enim vivum sola vi vitae aërum hoc malum sanat, motu expellit.* Ideo & eius medicata potestas haud valet corrigere venericum tabum, quando ille figitur in locis, ad quae actio cordis, & arteriarum vix pertingit. Hinc caviem diploëi cranii non sanat; sed in cellulas eius offas consumit pingui vacuas ineri effusus stagnat. Inde & ossum medullam inquinatam hoc malo vix repurgat. Gonorrhoeas in sola cellulosa penis fabrica haerentes, per quas vix ullus circumcuntium humorum impetus, nunquam sanat; licet lucem simul dominantem perficit eo tempore tollat. Officula tene rima solis tenuibus scilicet membranis servare nequit, ne excidant. Sed mala venerica, quae latitant in locis, per quae arteriae rubrae, flavae, ferrosae, pellucidae, ceteraeque, per quas liquida cum idonea velocitate ruunt, argenti quae vivum in se admittere possunt, atque illud fortiter urgeret vitali potestate, perficere sanari queunt mercurii virtute. Quae profecto observata proderunt medico, ne diffidas in his, ne vanus sit in illis (n). Unde evidenter patet, quo sensu intelligenda sit haec regula; pergendum, donec omnia symptomata evanuerint. Si enim aliqua maneant in locis, ad quae argenti vivi efficacia non pervenit, si ossa infecta, cariola nondum separata fuerint a sanis, & sub hoc pretextu pergeret salivare aeger, succumberet certe, antequam sanaretur. Haec infortunia toties contigerunt, dum agyrtae arcanorum iactatores, mulierculae &c. salivationis curam tentare ausi sunt.

Quodnam ergo indicium habet medicus, ex quo cognoscit, cessandum esse a salivatione? Antea pluribus probatum fuit, venericum miasma lentis, mucosis, & imprimis pinguibus humoribus misceri facilius, illisque intrinseci tenaciori nexu. Per argenti vivi actionem solvuntur omnia pingua corporis, attenuantur lenta viscosa omnia, & per varias vias exeunt de corpore una cum luis miasmate, quod illis adhaeret. Ubi ergo corpus aegri totum emaciatum est, ubi ulcera venerica depurata minuuntur, & sub bono iam pure consolidantur, vel saltem manifeste in consolidationem tendunt, tunc videtur salivatio fecisse omne illud, quod ab hac curatione expectari potest, & ideo tunc prudentes medici illam sensim decrescere sinunt, donec cesset.

Nec sane actioni mercurii in trañanda hac inveterata ageritudine satis esse, nisi prius, ne gutta quidem intasa, universos corporis humores, qui ullo modo pingues sunt, in aquam redegeris, expuleris de corpore, & sequae simul immittum his tabum venericum ablueris quam perfidissime de corpore affecto. Aliiter, si quid restitit, statim ac movi ex alimentis succi, qui semper tunc renascuntur, magis quam olim pingues, perficere vasa repleverint, illico novus recrudescit morbus. Unde deducitur, rite non curari malum, nisi palliescat inslar mortui aeger, nisi emaciat.

(n) Herm. Boërhaave in praefat. aphrodis.

alimentis inter curandum quam minime pinguis nutriatur, iatur ipsa curatio, donec antiqui humores omnino de corpore: ideo uniuscuiusque est fortunato dirigere argentum vivum

o). me potest salivationis limes, & simul patet ratio, quare soleant triginta sex dies pro salivationis decursu. Dictum fuit si tres, vel quatuor librae expuantur quovis nuchthemero. nis igitur 144 librae exibunt de corpore, si quatuor librae, & dum ad finem vergit, non tantum expui, sed in vigore & maior copia expuitur. Si iam simul computentur illa, re per alvum, urinam, & imprimis per sudores exeunt de enim salivationis tempore degunt in aëre calido, probe testat, veteres humores migrasse de corpore, & cum illis vena cura fortunato cesserit; simulque patet necessitas subministrandi salivationis decursu victum liquidum, tenuem, minime pinguedine alienum. Decoctum hordei, avenae, oryzae, panis, adarte lactis, cremores ex iisdem cum iusculis carnis albae, omne ablato, addito pauco succo arantiorum, fere sola usui venientes partes oris interni tumentes, dolentes exesae non ferant alia copia, sed saepius repetita dantur, ut sustineantur vires.

Tum subinde leni dosi mercuriali utendum per alios xxxvi dies, ut leuissimae sputationis maneat vesti-

videri posset, quod post salivationem toleratam, & absolutam, adhuc ius mercurii per alios triginta sex dies, cum hoc licet moderamine, ntum dosis, & longiori intervallo exhibeatur. Scopus non est ivationem excitare, sed retinere corporis humores adeo solutos, superesset adhuc de miasmate venereo sive fluens cum humoribus, rens cuidam parti, illud inde potu copioso elui posset, sicque inteo morbo liberari aeger. Simul toto hoc tempore a pinguis, a omnibus spirituosos abstineat; cura quoque habenda est, ne subito hausta haec corpora repleantur nutrimentis etiam optimis. Latent iosa in nutrimentis, quae macilentissima creduntur. Vacca potat aquam & pascitur solo gramine, quod succo aquoso minime pingui turget; ven de die ex hoc animali sano emulgentur plures librae lactis, quod pinguis butyri largitur. Hinc metuunt lautiorum victum post salivationem prudentes medici, & severam dietam imperant aegris, qui si omnium harum molestiarum minus morigeri saepe inveniuntur; sed r suo periculo, dum simul medicis ingens taedium creant.

Vi.

detra. Bochari in P. iacet, aphrodis.

Vidi aliquoties tales calamitates, & inter alios curandum habui *iuvēnem*, qui ante sex septimanas cum muliere, quam lue infectam noſſet, rem habuerat. Sequenti die cancrum venereum habebat in parte interiore *præputii*; poſtea bubones oriebantur una cum intolerabili capitis dolore nocturno, qui ceſſabat erumpentibus maculis rubris, copioſis in fronte; dein coepit conqueri de dolore naſi; paulo poſt dolebant fauces. Peſſima mala metuens ſuaſi ſalvationem; undecim grana præcipitati albi diviſis doſibus data ſuffecerunt ad ſalvationem excitandam, & ſuſtinendam: toto curæ tempore.

Monueram ſedulo, ut præſcriptam ipſi diætæ normam ſervaret recidivæ metu. Petulanter riſte monentem, & monſtravit lagenas vini Burgundici, quas heſterna coena evacuaverat cum amicis, reſiduumque pernionis, quem lapidiſſimum fuiſſe iactabat. Poſt ſex ſeptimanas turpes in fronte maculae redierunt; uti & faucium dolor, ac exulceratio. Decoctorum ex *radice bardanae*, *ſchinae*, *ſarzaeparillae* copioſo uſu, interpoſitis ſubinde purgantibus hydragogis mercurialibus, una cum diætâ ſeverâ, hæc luis recidivâ curata fuit.

In alio caſu ſimili ſecunda ſalvatione opus fuit, ut tollerentur omnia luis ſymptomata, quæ rediverant ſerociora, quam ante. Verum ille monita poſt ſecundam ſalvationem ad amuſſum ſervaverat, quem poſt duodecim annos ab ultima curatione, ſalutavi ſanum, formoſa coniuge, & prole robuſta, ac ſana beatum.

Si enim antiqui mali poſt ſalvationem quid adhuc remanſerit in corpore, ſilet morbus. quidem. & fallaces dat inducias, quamdiu vis vitæ magna non eſt, nec humores pingues ſunt, ſed poſtea turpiter recrudescunt omnia.

Certiſſima pariter ſanatae luis fiducia eſt, ſi omnia ulcera cicatrice firma claudantur, & poſt largiorem vitam nihil de priſtino malo repullulet.

Ex omnibus, quæ hæcenus de ſalvatione dicta ſunt, patet, illam raro vitæ periculum inducere, ſi peritus, & prudens ſit, qui curam dirigit, faciliſque aeger morem gerat præceptis medici; imprimis ſi remediis mercurialibus interne datis ſalvatio excitetur; quorum efficaciam moderari, minuere, augere melius poſſumus. Neminem vidi mortuum a ſalvatione, cuius curam geſſi; unicus fuit in ſummo diſcrimine, quod ipſius temeritati unice tribui debebat; uti ante patuit.

Omnes tamen medici facile dabant, ſalvationis curam taediis, & moleſtiis graviſſimis plenam eſſe. Celeberrimus Boërhaavius (p), qui ſalvationem commendabat tamquam efficax ad luem curandam remedium, monet, poſt ſalvationem finitam adhuc magnam reconvaſcentis aegri curam habendam eſſe. Niſi enim curatum iam hominem per menſem unum, alterumve a pinguius arueris pabulis, atque a putreſcentibus facile cobibueris, dolebis fruſtra, ſe diſcruiſſe miſerum crudeli diſtriſſimi remedii tortura; quum ſere ſemper aliquid hæreat, unde ſepultus reſurgat morbus, novaſque vires capiat.

Dolores ingentes linguæ eroſæ, quæ aliquando profundis rimis ſinditur, hæc.

(p) In præſatione aphrodiſiac.

artibus oris interni erosio, quae saepius contingunt, ubi
 (q), & quandoque tanta copia, ut ferro candenti
 leglutitio difficilis vix non impedita, sputi noctu diuque
 non omnem somnum miseris impediens, dentium ante sa-
 unde in flore aetatis turpiter edentuli ex morbo resur-
 oris interni quandoque inter se concrecentes dum sa-
 ea maxillas diducere nequeant, lingua lateraliter aliquando
 cis internis accrescens, tot miseris excruciatu aegri curae
 mortem optant, ut tantis calamitatibus eripiantur.

est, faevissima haec mala tunc imprimis contingere, quum
 imperiti; uti nimis saepe in curanda lue contingit; inte-
 salivationem esse molestissimum curandi genus. Consuli
 auctores, qui methodum salivationem administrandi per to-
 um descripserunt.

us, & magis miserabile spectaculum excogitari potest, quam
 iis, ad curandam luem destinatis, numerosos aegros, in
 plis locatos, media in salivatione versantes. Si quid incau-
 a libidinis illecebris tutam reddere posset, hoc certe foret

mirabitur, medicos semper optasse, ut luem veneream absque
 vatione curare possent. *Iohannes Almenar* (r), Hispanus medicus,
 rimus *Astruc* (s) non sine ratione inter antiquissimos scriptores
 illico numerandum censet, unctionibus mercurialibus usus fuit qui-
 vationem inde securam impedire conatus est. Sic autem habet:
 ne saniei febris, & dolores sunt magis, quam *salva sanie*, & ideo
 singulare, eo tunc administrare solitum, ut, antequam humor per
 r, deorsum evacuetur; & sic nocumentum in ore evitatur, ut ego
 certus sum; aut si pustulas, aut plagas ulcerosas habuerit, ibi at-
 nonantur, ut humor inde evacuetur, & ab ore divertatur. Hinc ap-
 methodum sine salivatione curandi luem veneream iam primis tem-
 porbi cogniti in Europa adhibitam fuisse; quam postea laudaverunt
 i, *Anatus Lusitanus* dictus, *Leonardus Botallus Astenfis* &c. Postea
 hodus dicta fuit *Monspeliensium*. Unguenta mercurialia illinebant, vel
 ultis argentum vivum in se continentibus tegebant varia corporis lo-
 i dederunt praeparata mercurialia varia interne. Simulac anima olera-
 at, & dentes quasi assurgere, dabant statim purgans, ut evitaretur in-
 livatio; sicque consueverunt per alvum educere illa, quae ceteroquin
 fluxissent; pergebant in usu purgantium, donec os aegri non amplius
 i, nec foeteret, nec caleret. Dein de novo applicabant argentum vi-
 vum, donec apparerent signa instantis salivationis; quam denuo prae-
 abant datis purgantibus. Hic methodo procedebant, alternatim exci-
 tant.

*Turner Spiths pag.
 vices, tom. I, c. 11.*

tando, & sufflaminando salivationem, donec luis symptomata evanescerent. Vocabatur a quibusdam methodus sanandi luem per *exfinitionem*; quia salivatio incipiens, datis purgantibus, quasi exstinguebatur.

Sed est & alia methodus sanandi luem per inunctiones sine salivatione excitata, & absque purgantibus datis ad salivationem impediendam. Celebrissimus *Chevalier* (*), se hac methodo in America usum fuisse, testatur, & salivationem damnat omnino, tamquam inutilem, imo noxiam; ideoque semper sollicite evitandam esse vult. Vocat hanc methodum *frictionem per exfinitionem*. Consistit in eo, ut parciore copia argenti vivi illinatur singulis vicibus, quam fieri solet, dum frictiones mercuriales adhibentur hac intentione, ut salivatio exciteretur. Utilitatem talium frictionum inde deducit, quod sic maior quantitas argenti vivi corpus aegri ingreditur, nihilque de illo exeat ex corpore per alvi fluxum, vel per salivationem. Monet enim, quotidie os internum aegrorum sollicite inspiciendum esse; si vel minima indicia salivationis instantis observentur, illico a frictione abstinendum iubet; & nisi prius omnia signa imminens salivationis disparuerint omnino, frictionem non esse repetendam monet. Ut autem citius haec signa futurae salivationis evanescant, laudat decoctum plantaginis, in cuius singulis libris duodecim grana aluminis soluta fuerint; ut os hoc colluatur.

Præcipuum curae felicitatem deducit ab eo, quod hoc modo maior copia argenti vivi permisceatur humoribus humanis, & longiori tempore cum illis moveatur per vasa; unde sequitur omnium humorum maior solutio, quam ad curationem sufficere credit. Axioma enim practicum statuit sequens: *Redde sanguinem & lympham fluidiora, & destruxisti virus.*

Botallus teneros infantes, lue infectos, simili fere methodo tractabat (**). Quum enim ab illis difficulter sumantur remedia, parcius igitur in eis agendum est, imo quam parciissime, levissimeque statim desinendo ab illis, dum leviusculum quidquam ori apparere inceperit. Verum quidem est, quod iubeat, alvum lubricam reddere, purgando nutrices, *polypodii* vel *senae folia* epulis incoquendo. At *Botallus* fatetur candide, se didicisse, illitionibus mercurialibus curare infantes, a muliere, quae sic proprium filium curaverat, non dum biennem, qui a foeda nutrice infectus, matrem subinde sugendo polluerat, quae nil mali suspicata, maritum infecerat infamia: *Botalli*, fratricis eius, pariter medici, consilio, parentes illitionibus mercurialibus a lue curati sunt; infanti nihil applicatum fuit. Sed supererat forte quid de unguento mercuriali; quod mater clam fervaverat, & medico ac marito insciis, hilarem, sanum, in matris gremio ludentem, inquirebat, unde tanta contigisset mutatio; nec fassa est mater: maritus enim aderat, qui illam temerariae audaciae accusasset. Post aliquod tempus, dum solam inveniret *Botallus*, anxie perferutatus est, quid puero, antea miserrimo, nunc sano contigisset. Mater sub silentii sigillo illi revelavit frequentia: *Artus*, ais, ser illi leviter,

(*) Lettres à M. de Jean sur les maladies de s. Domingue &c. pag. 69 &c.

(**) Aphrodisiac, pag. 887, 888.

is, gingivae ubi rubescere conplexi, ab illitionibus quiesci, non multum, neque diu; cumque a coniuge omni industria us facti, culpae me criminis; verum, divino nutu, non cessit, quam nobis ipsis; sic ut omnes firmiter domi va-

runt in hac opinione, luem veneream, antiquam nimis, non posse radicitus extirpari, nisi per salivationem,

rua (v), salivationem, quam tamen laudat, & utilem exterminandum morbum absolute necessariam non esse, intra corpus debita quantitate mercurii constiterit. Unde *medicis* cynosurae instar esse, unde possint certius colligere *mercurii* copia admissa sit, tum quantam vim mercurius admittit *uinem*; atque adeo, unde sciant, remedia efficaciam pro nata *inveniente*, tutius moderari. Sed certe durum videtur gravissimis salivationis molestiis, ut medicus melius communi mercurii in corpus admissam, eiusque actionem. Haec determinari poterunt. Si enim interne exhibetur, exactissimum pondere quantitatem ingestam; de effectu iudicare communi luis decremento observato. An autem per salivationem maxime naturalem viam, expellatur feliciter foedum luis experimento constat. Fatetur Astruc (x), per alias vias exequi monet, quod si salivatio desit, opus sit, evacuationes alias, quasi vicarias, natura quidem, per sudorem, vel urinam, artem, ut virus qua data porta possit effluere. Praeterea certo notum & molestias salivationis non produci a lue, sed ab artem sola inunctione corpori applicato. Sanissimi homines, mercurialibus perfricant alios, toties molestissimam salivationem; uti nimis notum est.

suspiciari primo, salivationem non requiri ad luis venereae cum levissimam tantum. Adstipulabitur huic opinioni celeberrimus y), qui sic temperandam voluit esse salivationem, ut pauca tantum ulcera, & lenis tantum salivatio. Imo tarda, & parca merore ulcerum, de industria salivationem declinandam voluit, aut si apertissime cathartici; in quibusdam saltem casibus, ubi salivatio non videretur absque vitae periculo sustinere posse aeger, ut omnes, qui lue venereae curandae operam navarunt, non tantum vivum posse coërceri, dum actuosum esse incipit; praecutionem methodo adhibitum fuerit. Antea ad §. 1473, 1474 impone semper mercurii vim ad alvum ruere, quum iustus metus ris salivae, quae totum os internum exedit, copia, per intestina tran-

ord. venere. lib. II cap. IX pag. 149.

(x) Ibidem,

(y) Ibidem

transiens, similia in his mala excitet. Præterea, non omnes homines eodem modo afficiuntur ab argento vivo; dum parva quantitas in quibusdam validam salivationem excitat cito, & sustinet diu, quæ in aliis nullum adhuc activitatis suæ indicium dedisset; quod denuo novam difficultatem parit.

Attentus vidi aliquoties de die aegros, quos a luc curabam; contuli cum illis, quæ olim observaveram; sicque credidi, me vidisse prima signa in ulceribus venericis, dum argentum vivum corpori ingestum incipiebat fieri actuosum, licet adhuc nullum signum incipientis salivationis observarem. Videbam enim ulcerum fundum humescere, fordes vacillare, vicinæ cutis colorem emendari. Conabar tunc hunc statum præferentem conservare diutius, non urgendo salivationem repetitis mercurii dosibus, sed procrastinando potius; nulla tamen dabam purgantia: incipiebant dolores nocturni mitescere; bubones minuebantur mole.

Hoc successu incitatus coepi cogitare de alio remedio mercuriali, quod quidem magnæ foret efficaciæ, sed tamen posset dilui pro lubitu, adeoque vel in minutissima dosi tentari.

Quum autem explicatio virtutis argenti vivi per solum pondus, & divisibilitatem minus arrideret, aliamque efficaciam mercurio inesse crederem, uti pluribus ad §. 1467 deducere conatus fui, ideo magis incitabar ad quædam hic tentanda.

Multa olim tentaveram in morbis difficilibus curandis circa solutiones metallorum: ab illis enim, fateor, multum sperabam. Vegetabilium & animalium partes vix non omnes citius vel serius subiguntur per vires vasorum & vulcerum, ita ut nostris liquidis assimilentur omnino. Metalla manent immutata fere semper, donec de corpore expellantur: quamdiu manent in corpore, dotes suas retinent. Ferrum, v. g., communissimum & saluberrimum metallum, semper fere in animalibus & vegetabilibus invenitur, per corporis vasa cum liquidis nostris transit, nec tamen muratur; hinc vel in ipso mellis exultu carbone reperitur, & in rubra sanguinis parte, & in calculo; uti alia occasione dictum fuit.

Verum ferrum, & alia metalla, tunc facillime feruntur a corpore, aguntque, efficaciter tamen, quando maxime diluta sunt, & ventriculum ac intestina nullo modo irritant, sed se subducunt absque ullis turbis excitatis, vel in intimos recessus corporis. Sic ferrum propinatur nobis, a natura, in acidulis ferratis dictis, solum menstruo, forte nondum bene cognito, nec hæcenus facile imitabili.

Quædam alia in diversis metallis tentavi per propria menstrua in vitriolum conversis, deinde larga copia aquæ dilutis. An non sic vere potabilia reddi possunt metalla?

Metallorum vitriola constant aqua diluente, acido solvente, & metallo soluto. Quamdiu hæc tria intime permixta manent, vitriolum est pellucidum, quod in quavis aquæ copia dilui potest ad lubitum; & si vel in centenis aquæ libris unicum granum vitrioli diluatur, in singula gutta totius massæ hæret proportionalis particula metallica, uti chemicis experimentis ad oculum demonstratur.

cando tollas aquam, perit tota vitrioli pelluciditas; si maiori
n solvens exprimatur, rosul metallum supereft non am-
i aqua, ochram vocant.

itur haec tria, aqua, acidum, metallum in vitriola, nascun-
quae non fuerant in singulis, sed ex unione omnium na-
m argenti ex se insipidi saporem amarissimum acquirit, &
amella cuprea immittitur aquae purae, quae vigefimam par-
genti in se habet solutam, reddit totum argentum aequae infi-
e: omnis enim amaror evanuit.

omnia animo volvebam, incidit in mentem, tentare vitriolum
dilutissimum. Argenti vivi insignem efficaciam in curanda
mnes agnoscimus; sed spem hanc animo fovebam, forte effi-
remedio mercuriali luem curari posse sine salivatione, quod
votis erat.

quidem argentum vivum facile solvi in aqua forti, & spiritu
regia, & spiritus salis marini solvit difficiliter. Sed sciebam (e),
vivi pars una cum duplo salis marini purissimi decrepitate teritur
ex cucurbita vitrea igne fatis forti per quinque vel sex horas
neque frige facta frangitur cucurbita, deprehendi mercurium subli-
solidum, siccam vera vitrioli forma: Est enim verum vitriolum
vivi solidum, siccam in aere ipso satis constans (a). Basis huius vitrioli
vivi purissimum; altera pars est spiritus salis marini omnium
imus, qui ulla arte haberi potest hic forma solida existens. Praeterea
vivi in spiritu nitri solum, si imponitur retortae, & abstrahi-
ritus nitri omnis ad siccitatem usque, urgendo in fine per duas tresve
igne arenae maximo, tunc in fundo retortae invenitur argentum
sub forma massae solidae coccineo fulgore splendentis; & vocatur
spiritatum rubrum in officinis, quod insignem fixitatem acquisivit; dum
nitra spiritus marini salis cum soluto argento vivo concrefcit in massam
volatilem, qui mercurius sublimatus dicitur, & quia omnes partes ani-
um, quas attingit, erodit quam citissime, & in escharam mortuam con-
cit, hinc appellatur corrosivus, & merito.

Non deterrebat me cognita huius remedii acrimonia: poteram enim illud
solum diluere pro lubitu, sicque haec tentamina vel a millesima parti-
grani incipere si vellem. Animum certe addebant illa, quae apud opti-
morum praeceptorum leguntur (b): Sapor huius vitrioli terribilis, austereus. Gra-
num unum aquae uncia dilutum dat remedium cosmeticum prudenter usur-
pantibus. Venenum omnium insectorum cutaneorum simpliciter letera. Si drachma
calis mislurae syrupo violaceo mitificata potatur bis, serve in d.e., mira praec-
stat in multis morbis incurabilibus. At prudenter, a prudente medico! Absit
ne, si methodum nescit!

Nec

(1) H. Potchare h. m. 2 e. tom. II pag. 481. Processu 195.

(2) ibide. Processu 198

Pag. 477, 488.

(b) Indem.

Nec statim lui venereae curandae adhibui hoc remedium; primo a vigesima grani unius parte in libra aquae purae diluta coepi; sic dividendo hanc dosim, ut nycthemeri spatio absumeretur tota a muliere quinquagenaria paupere, quae annosum ulcus gerebat in crure dextro, quod volam manus amplitudine excedebat, foedamque saniem copiosam plorabat quotidie, & lancinante dolore molestum erat; nulla tamen omnino suspitione labis venereae: ulcus curavi tegi *emplastro diapompholygor* in officinis dicto. Sensim auxi dosim, donec quartam partem grani sumeret intra diem naturalem; sed dum augebam sublimati quantitatem, augebam & copiam aquae. Simulac observabam, sordidum hoc ulcus mundari, saniem ipissescere, & minus foetere, mansi in eadem dosi per plures dies: ubi advertebam stare malum, nec progredi curam: addidi denovo vigesimam grani partem; sicque tandem viginti quatuor horarum spatio medium granum binis ad minus aquae libris dilutum sumsit. Bonum, & mollem victum subministravi aegrae, vix non omnium indigae, & praeter infusum florum sanibuci, quod ad lubitum portabat, addita tertia parte lactis, nullum purgans, nullum aliud remedium dedi, ut certus essem curam soli remedio dato adscribendam esse. Post trimestre spatium ulcus sanatum, & firma cicatrice clausum vidi. Sanitas erat emendatior, quod & meliori victui, ac curis animi mordacibus ablatis tribui potest, quum sanata potuerit postea honesto officio sibi necessaria comparare.

Aliquot similibus casibus confirmatus in usu huius remedii, coepi illud adhibere lui venereae curandae, & magnam inde spem concepi. Hoc tamen contingebat sinistri in quibusdam, quod molestam asperitatem in faucibus perciperent, quandoque satis diu post deglutitum remedium. Quum metuerem inde aliquid damni, multum minuebam quantitatem remedii; sed & decrefcebat efficacia simili proportionem.

Vidi postea, quod a largiori dosi sublimati corrosivi in aqua soluti, vomitus ortus fuerit primis binis dosibus, & deinde semper nausea, ac aegritudo cum sensu ardoris a ventriculo ad fauces usque, sed absque vomitu: sequebantur porro tormina alvi evacuationem, & borborygmi. Sed notandum est, quod dum septem grana mercurii sublimati corrosivi soluta fuere in uncis octo aquae fontanae, & huius solutionis mane ac vespere dabatur cochlear, ita ut totam hanc quantitatem octidui spatio sumeret aegra, salivatio secuta fuerit, & brevi tempore felix curatio plurimum, ac pessimum morum ulcerum (o).

Quum a minima dosi coeperim in mea aegra, & nunquam dederim plus quam medium granum intra nycthemerum, illudque longe maiori copia aquae diluim; cura fuit lentior, sed & nullo stipata incommodo.

Illo autem tempore, dum varia tentabam, ut possem dare aegris talem quantitatem sublimati corrosivi, & sic dilutam, ut nec ardorem ullum in faucibus, aut oesophago faceret, nec ventriculum, vel intestina irritaret, & tamen cura-

(c) Medical observat. and inquiries tom. II pag. 229.

ter, literas accepi ab eruditissimo viro, quem magni semper
Ribeira Sanchez, Rufforum imperatricis tunc Archiatro, in
 , quod veteranus chirurgus daret mane ac vespere in despera-
 malis venercis unciam sequentis remedii: *mercurii sublimati*
grammam, *spiritus fermentati ex bordeo, vel secale parati, semel re-*
centum & viginti. Augebat, vel minuebat dosin pro ratione
 Quantum; sicque curabat hos morbos certissime absque ullo se-
 Additur salivationem sequi pro ratione.

ne delectabat huius remedii communicatio: disciebam inde, quum
 inciis contineretur medium granum sublimati corrosivi, posse illius
 granum dari spatio diei naturalis absque noxa. Quum autem moris
 dieis, accendere alcohol vini supra turbith minerale, & praecipita-
 um, ut haec mitiora sic reddita, rutilius interno usui servire possent,
 simile quid fieri posse, dum sublimatus corrosivus digereretur,
 etur in tam larga copia spiritus frumenti rectificati. Adhibui hoc
 m; sed statim dabam superbibendam libram decocti *rad. albae*,
 rius decocti emollientis, addendo aliquam glycyrrhizas partem ob
 gratiam; quandoque tertia, vel quarta parte lactis addita. Aliquan-
 plici decocto hordei, vel avenae addebam quartam partem lactis in
 similem. Hoc modo facile ferebant remedium aegri, & de nulla re
 bantur.

Adhibuerunt alii spiritum vini, loco spiritus frumenti, & quantum novi
 m cum effectu.

constanter usus fui hoc remedio in hac proportionem, quam *D. Sanchez*
 indicaverat; medii nempe grani sublimati corrosivi ad unciam spiritus;
 de miratus sum, quod invenirem apud eruditissimum medicum Parisi-
 m (*d*) in literis *Sanchez ad Gmelin* datis, laudari aliam proportionem,
 mpe, ut quatuor grana sublimati corrosivi solvantur in quadraginta octo
 acis spiritus vini; sic duodecima tantum grani pars in singulis uncis ha-
 eretur. Dubitabam, an forte numeris in epistola scripta fuissent 24 grana,
 & casu excidisset primus character, adeo error hic contigisset. Consuli er-
 ratorum catalogum, & non inveni.

Notandum est, quod in literis *D. Sanchez* legeretur salivationem sequi huius
 remedii usum: dum septem grana mercurii sublimati corrosivi, in aqua son-
 tana soluti absolvebantur octidui spatio, quarta die iam aderat salivatio, ita
 ut cres quatuorve librae quotidie expuerentur (*e*). Notatur quidem, quod
 os internum minus tumeret, nec halitus oris adeo foeteret, ac fieri solet, dum
 data *calomela* salivatio excitatur. Sed quum in votis haberem, luem cura-
 re absque salivatione, minorem remedii quantitatem exhibui, nempe co-
 cheleat, sive unciam mediam mane & vespere, ut illam evitarem. Si in homi-
 nibus robustis, aut in lue venerea magis inveterata lentius procederet cura,
 mane

(d) Le Deque de Pr
 (e) Medical dictionary
 ste sur l'usage interne du sublimé corrosif pag. 33.
 and inquiries tom. II pag. 230.

mane & vesperi dabam drachmas sex, id est cochlear cum dimidio; si nec his votis responderet evenus, dabam duo cochlearia mane, & toridem vesperi. In iuniori aetate minuebam remedium quantitatem.

Quum per plura experimenta iam certus essem de utilitate huius remedii, & facile praeviderem, plures forte elapsuros annos, antequam quantum commentariorum tomum abolverem, volui communicare pluribus huius remedii usum, ut citius innotesceret illius utilitas. Hinc medicis pluribus, & quidem in diversissimis regionibus, cum quibus mihi commercium literarium intercedebat, & illis, qui me de aliis morbis consulebant, indicavi simpliciter commentariis reservans deductionem rationum, quae me impulerunt, ut *sublimato* *cerroso* uter, cum honore laudaturus illos, per quos profeceram.

Haec est ratio, quare plures medici crediderint mihi deberi usum huius remedii, quum pauci antea ausi fuerint uti hoc remedio, quod pessimum fore ubique famam habebat.

Nosocomium ad s. Marcum vocatum a piis fundatoribus constitutum erat in Viennensi suburbio, ut pauperes lue venerea affecti curarentur.

Bis in anno haec cura instituebatur per salivationem satis validam; ut nempe radicitus curarentur. Miseri aegri magno numero collecti toto salivationis tempore supini decumbere non poterant; si enim in tale situ obdormire vel inciperent, mox peribant convulsi. Aliis haemoproë, vomitus, dysenteria accedebant non sine ingenti molestia, & periculo.

Iam a multo tempore utebantur in hoc nosocomio remedio quodam mercuriali, quod tegebatur sollicite; cuius administratio committebatur homini artis medicae omnino ignaro, qui arcano hoc superbiebat, quo mortuo obtrinit tandem, ut miserorum cura susciperetur a medico: hoc munus per plures annos gessit egregius vir *Maximilianus Locher*, qui dum munus auspicaretur, horrendam hanc calamitatem detestatus me consuluit, certam & mitiorem foedi morbi medelam anxie desiderans. Suasi solutionem sublimati corrosivi in spiritu frumenti semel rectificato, ea proportionione, & exhibendi methodo, uti dictum fuit. Primum periculum fecit 1 maii 1754 in centum viginti octo aegris, qui iam parati ad salivationem in lectulis decumbebant, sanatos mihi monstravit omnes absque ulla salivatione.

Exulavit postea semper ex hoc nosocomio salivationis methodus; & octo annorum spatio a 1754 ad 1762 usque curavit 4880 lue venerea laborantes eodem remedio, postea sic perrexit eodem tramite ad mortem usque, qua nobis ereptus fuit anno 1768 longiori vita dignissimus. Manet tamen sub digno eius successore eadem curandi norma (§).

Testatur autem sequentia: nullus ex vi remedii *mortuus*, vel *gravis*, & *periculosum* *symptoma* expertus est. Praeterea hoc inde nosocomio commodo contingit, ut non gravetur aegrotantium numero bis in anno, vere aetate & autumno, sed omni mense, omni die lue venerea affectis, quotidie adventantibus medela fieri possit.

Nisi

(§) Vide de his libellum Maximil. Locher observat. pract. circa luen veneream &c. a pag. 1 — 6.

viis, vel plethora adfit, nulla praeparatio requirimiffo, aut purgans adhibetur.
 umtum remedium retinentur aegri in hypocausto, datur ex iufculis, farinaceis, tenuioribus, carne num, pingua, falita exulant: conceditur levioris

decoctum hordēi, vel avenae, vel aliud ex emollientio lacte in aegris ficcioris temperamenti: monentur, ut enim felicius cura succedit.

umto bis terve de die purgantur, reftituuntur citiffime. her subinde curae tempore purgans interposuit. bferavit remedium agere per alvum; in aliis per urinam; orem.

unquam vidit falivationem ortam; & tantum in illis, qui ita mercurialia fumferant. Ad prima falivationis figna ceflavit; copiam dabat decocti emollientis; fic folebat fpontere quo facto redibat ad remedium ufum, in quo pergebatur, ut luis fymptoma. fupereffet. Plurimi fanabantur fpatio fex; in illis autem, in quibus malum profundas egerat radices, s mollioribus ulcera profunda produxerat, binis vel tribus men-

rat.
 it viros citius fanari, quam feminas; in quibus morbus fa tateare folet, & hinc faepe difficiliter medelam admittit. Praetere menftruorum folent mulieres omne remediorum genus refpuere multum fatis pertinaciter; unde cura protrahatur. Multis bervationibus certus fum, menftruam evacuationem non turbari s remedium.

is fum non nocere ufum etiam facis diuturnum huius remedii. nim nobili iuveni, cui poft ophthalmiam peflime tractatam utraque, uti & utraque lens cryftallina, opaca manferat per octodecim mane & vefperi cochlear; ceftabam tantum, fi ophthalmia recurre; qua brevi fanata pergebam denuo; opratum habuit fuccellumio (8). Scripferam haec eruditiffimo apud Londinenfes medico, *Silv* tertio martii 1758; vidi eundem hoc anno 1769 faniffimum. In rata admodum huius ufus fui faepius; nec ullam inveni noxam.

Quum multis lucrui minuendum videretur non leviter, fi falvatio obfoleeret, infufurabant omnibus, ingens facinus efle, dum homines in vitae difcrimen deducebantur dato veneno citius feruifve nocituro quam certiffime. Calidum fubducebant, & inveniebant triginta dierum fpatio fani ab aegri quindecim grana fublimati corrofi; quae quantitas vel tribus fanis & robustis viris fecundis fufficeret. Uode concludebant, decimam partem vitae deffruim edela. Mirum hoc argumentandi genus in quibusdam.

(1) Le Règne de France

Sur l'usage interne du sublime corrosif pag. 11.

dum scriptis impressis legi; vidi & in disputationibus medicis publice ventilari. Tentatum quoque fuit negare factorum veritatem.

Trecenti milites ad nosocomium s. Marci fuerant missi, ut a lue venerea curarentur; sex ex illis repudiare voluit medicus *Lecher*, tanquam incurabiles, quum saepius luem passi haberent vix non omnia ossa maiora corporis cariosa: sed precibus ac lacrymis desiderabant, ut ultimum hoc tentamen illis non negaretur; hinc cum reliquis admissi sunt.

Miseri illi vix levamen ullum senserunt; reliqui exiverunt sani.

Dabatur mihi brevi post rescriptum ex consilio Bellico, quo accusabatur nosocomii medicus, quod trecentos illos milites dimisisset ex nosocomio nullo modo curatos, imo longe peius se habentes, quam dum nosocomium ingressi fuerant.

Protocollum nosocomii statim mihi attulit medicus; inveni nomina militum, cohortes, legiones &c., diem introitus, & exitus ex nosocomio, omnia sollicite notata. Bona fortuna omnes milites, qui in nosocomio curam subiverant, aderant adhuc in praesidio Viennensi. Medicus iure urgebat severum rei examen; nec minus ego. Sub vario praetextu negebantur morae, & interea calumniator abiit, excessit, erupit, evasit. Postea tranquille perrexit optimus *Lecher* curare lue venerea affectos solito more.

Quibus displicebat haec methodus, semper plenam libertatem habuerunt alia uti pro lubitu. Aegri, qui credebant, se nunquam sanari tuto posse, nisi salivationis torturam subirent, inveniebant semper quosdam paratissimos, ut illorum voluntati morem gererent libentissime.

Gavissus sum, si quis convictus sequeretur illa, quae credebam meliora; sed semper sollicite cavi, ne quis coactus hoc faceret. Illos, qui turpis lucri causa manebant pertinaces, contemsi tantum, & suo reliqui fato. Agyrtas nocivam hominum fecem severe cohibui, vel expuli quantocyus, ne fallerent imprudentes, dum temerariis ausis impune grassantur in genus humanum. Haeslenus non excessi quantitate duarum unciarum, sive quatuor cochlearium de die in lue magis inveterata; frequentissime unicum cochlear mane & vespere sufficit; lentius forte succedebat curatio; sed nec ullum incommodum ab aegris percipiebatur; poterantque sic tegere foedi morbi curationem, si vellent, ut nulla oriretur de hac re suspicio; dum simul plorimi ex illis poterant vacare solitis laboribus, & aestivis praecipue mensibus libera aura frui. Aëre humido, frigido, & hyemali tempore, consulti semper, ut domi se continerent, dum hoc remedio uterentur. Non pauci tamen fuerunt immorigeri; de quorum fortuna actum erat, si in suspensionem foedi morbi venissent; quavis tempestate anni, in publicum prodibant; ditiores curru vehabantur recti pellicea veste, quam deponebant, calefacta conclavia ingressuri; publica frequentabant spectacula, in quibus moris est fere pellicea veste tegi; unde & hoc absque ulla suspitione facere poterant. Hoc modo plures curae tempore aulam spectacula, amicos frequentasse novi, sine noxa.

Tenuioris sortis homines hybernis mensibus in nosocomium recipiebantur; praesertim illi, qui sub dio labores suos peragere debebant, ut victum com-

liquis dabatur petentibus dosi remèdii, & decocti
a 24 horas fumerent.

valido tempore licuit semper in apicum prodire,
s, quosdam potuisse solitos militares labores peragere,
bantur ad luem curandam (b).

Pringle commendavit hoc remedium chirurgis ca-
tentarent in militibus lue venerea affectis (i), quod &
am plures tales aegri aderant, & simul deerat opportunitas
liberi solitam. Viginti tales casus describuntur, & mone-
uisse similes. Ex triginta militibus hac methodo curatis
cidivam passus est.

non fuit: methodum hanc luem curandi praeferrì debere saliva-
m curae, ob securitatem & lenitatem, ob corporis habitum post
Omnes enim norunt, quam debiles exhausti, & pessime mul-
tione resurgant quandoque miseri, ita ut postea nunquam pri-
vigorem recuperent; praecipue, si minus prudentem & peritum
ectorem nacti fuerint.

in Anglia, paucis alvum leniter solvi, & tantum in curae
unquam enim pergebat haec alvi evacuatio ultra tertiam, vel
n: agebat remedium per diuresin imprimis, & de nocte exci-
s. Pauci levem molestiam circa cardiacam sentiebant a dosi ma-
ue haec molestia crescebat in eadem proportionem, dum agebatur
dii. Nulla praemittebatur praeparatio, nullum purgans remedium.
arent, symptoma aliquod inflammatorium adesset, aut phymosi
t, vena secabatur; ceterum non. Bubones sanabantur feliciter
llo apparatu chirurgico. Nec praeter lapidem infernalem ad ven-
nereas, fòrda ulcera, fungosas excrescentias, aliis externis reme-
is fuit.

nae autem venereae, dum persistunt curae tempore, si laventur solu-
sublimati, quae interne sumitur, diluta quadruplo aquae purae evane-
cuius rei notabile exemplum legitur (k). Femina 23 annorum deli-
a quinto graviditatis mense totum corpus a capite ad pedes restum-
bat scabie venerea, cum dolore, & tumore glandularum inguinalium.
fuit ipsi solutio sublimati corrosivi in spiritu vini, ita ut quinque octa-
partes grani intra 24 horas fumeret; primis autem quatuor curae diebus
tum mediam partem huius quantitatìs fumerat. Post quindecim dies, fere
tum hoc malum disparuit. Quarebatur tamen, se multum incommodi
b haemorrhoidibus pari: examine instituto parvi, non esse haemorrhoides,
ed anum, & perinaeum obstita esse verrucis venereis subalbi coloris, molli-
constitutiae, quarum quaedam minimi digiti apicem aequabant, quaedam in
apice tendere videbantur ad suppuracionem.

Sua

(i) Ibidem pag. 66.

(k) M. de. observ. 17.

(l) Le Begue de Presle.

Inquiries tom. I pag. 365, tom. II pag. 73: &c.
sur l'usage interne du sublimé corrosif. pag. 215.

Suasum fuit illi, ut pergeret in usu interno solutionis sublimati; simul lavaret verrucas eadem solutione quadruplo aquae diluta. Intra decem dies omnes verrucae disparuerunt, sed non ceciderunt: maiores reliquerunt maculas fufcas in cute. Quum nihil amplius mali sentiret, a remedio cessare cupiebat: fatebatur nihilominus, unum alterumve superesse tuberculum, & re examinata patuit, binas verrucas prioribus similes in sidere pudendi labio dextro; fassaque est, quod illas nunquam lavasset. Monita, & his eandem lotionem adhibuit; quae post paucos dies disparuerunt simili modo, ac priores.

Unde apparet, idem illud remedium externe applicatum prodesse; vidi tophos, nodos, exostoses sub interno usu solo diutius resistentes, omnino solvi, dum aquae dilutum quadruplo, idem remedium topice applicaretur. *Petrus Andreas Matthiolus* (1) dissolvebat uncias binas sublimati corrosivi in sex circiter aquarum stillatiarum libris, hocque remedio *egelido* omni corporis compages lavabat, brachiaque cum iibiis a genu & a cubito donec dolores cum ceteris evanescerent. Verum salivatio sequebatur. Addit erim: dictis lotionis e cubiculo pedem male affectus non efferat, sed cavat omnia, perinde acsi inungeretur. Huic etiam quae praemisimus accidere solent; oris exulteratio scilicet, defectus animae, ventris deductio, somni difficultas. Sed ex dictis patet, non requiri immanem hanc sublimati copiam, sed minimam sufficere, ut externo usu proficit.

Haecenus semper mansi in eadem proportionem, medii nempe grani sublimati corrosivi ad unciam spiritus, sed vidi (m), prudenter, & sensim quantitatem sublimati auctam fuisse, donec sexdecim grana in quatuordecim uncias, sive viginti octo cochlearibus spiritus solverentur; quumque talis mixturae cochleare daretur mane & vespere, plus quam granum sublimati dabatur quotidie: pulvere quidem successit hoc; sed, dum tentabatur ulterius augmentum, vomitus sequebatur; unde redeundum fuit ad priorem proportionem, sexdecim granorum nempe ad quatuordecim uncias spiritus. Notatur tamen, quod sic utentes hoc remedio salivabant, sed absque ullo incommodo.

Licet minime absonum videatur augere remedii efficaciam, semper viravi, ne primae viae inde afficerentur, & cavi salivationem, quam si submetus pyralismi cessaret. Malui in casu difficiliore augere quantitatem mixturae exhibendae, quam mutare proportionem sublimati ad spiritum, in quo a maiori spiritus copia irritabantur fauces, poterit singula dosis dilui deco-remedium, aqua diluendum curavi, grato quodam syrupo addito effeci, ut minui, ita ut quandoque tantum octavam partem grani dederim nycthe-

{ 1 } Aphorismae, pag. 257.

{ m } Medic. observat. and. inquit, tom. I pag. 403, 404.

quidam cere, & deinceps remedium: sed de cunctis istis *spualionem* frequenter etiam per horam unam aut alteram exibat; sed *arger* finita operatione, res *facti* prosequitur *neglecta custodia*. Egregius *Turner* tentavit hanc methodum; sed brevi repudiavit (o); ubi aliae formulae audacissimae pariter habentur, & quas nemo prudens adhibebit unquam. Quantis periculis se exponunt miseri, dum arcanorum iadatoribus salutem committunt, qui immedicabiliter sanitatem destruunt, dum luem se curare iactant! Dolens vidi toties, dysenteriae diuturnis exhaustos defecisse, tandem plures haemoptysi, & sequente phthisi constabuisse post temerarias tales curas; quosdam superfuisset quidem diutius, at nunquam recuperasse vigorem sanitatis, sed semper languidos calamitosam vitam duxisse, donec in ipso virilis aetatis vigore deficerent.

Dum periculosa talia remedia guttarum dantur, longe difficilius determinari poterit quantitas: pro diversa enim proportionem aperturae phialae ad collum eius maiores minoresve guttulae excidunt.

Licet autem solutio mercurii sublimati in spiritu copioso poterit ferri fracta dosi, etiam in teneris infantibus, aliquando tamen, quamvis raro contingit, ut nec adulti hoc remedium ferre poterint. Testatur se hoc observasse consuetissimus mihi *Stork* archiater (p), qui tot a foedo hoc morbo liberavit in *mesecio Pasmaniano* huius remedii usu, etiam post frustra tentatam salivationem.

Illi enim, qui pectus siccum habent, qui tussi vexantur, quorum systema nervosum admodum mobile est, qui haemorrhagiis subiecti sunt, citra detrimentum hoc remedium non ferunt, licet etiam copiam decoctorum mollium superbibant.

Fateatur quandoque contigisse, ut mala venerea huic remedio per plures menses adhibito non cederent. Solvit tunc grana XII mercurii dulcis in aqua, edulcoravit unciis bis syrupi, & quater de die unciam talis remedii dedit cum bono & celeri effectu. Aliis nec hoc remedium profuit; sed saturatum decoctum radicis bardanae, in cuius libris quatuor duo grana mercurii praecipitati rubri soluta fuerant, optime iuvit; & hoc remedio, pertinacissimos furunculosis venereis, qui aliis remediis nequaquam cesserant, sanavit.

Sic bona fide dixi illa, quae de usu sublimati corrosivi in curanda lue venerea novi, nihil hic dissimulans. Scopus mihi fuit, evitare periculum &

200-

(*) *Turner*. syphilis on the vener. disease. pag. 59.

(o) *Ibidem* pag. 100, & seq.

(p) *Ann. medic.* 2. pag. 213, & seq.

molestias salivationis, & tam parca uti argenti vivi copia in cura luis, quam fieri poterat: metuebam enim semper a copia mercurii ingesti, quoniam indomabile corpus sit, & naturae humanae inimicum, uti antea pluribus probatum fuit.

Non mirabar multos suspectam habuisse facilitatem curationis, quae ante laboriosa adeo erat, & credidisse, quod nunquam possit sic eradicari morbus, nisi levior fuerit; hinc metuendam esse recidivam semper. Sed certe post salivationem etiam repetitam rediisse luem, nemo negabit. Fateatur hoc ipse celeberrimus Astruc (9); sed simul excusat rem: Probo quare sum, inquit, hydrargyrosin sine praevia praeparatione dosi nimia, breviori temporis intervallo adhibitam, frustra sapienter adhibitam fuisse: at vero pernego, virus ullum nunquam esse, quod radicatus non extirpetur, si mercurius praemissa debita praeparatione, parca manu, legitimis intervallis, tempore satis diuturno illinatur. Ante enim dictum fuit, quod praecipuam curae felicitatem poneret in eo, ut maior copia mercurii corpus ingrederetur. Quod autem recidiva luis post salivationem omni cum cura institutam viderit, satis evincitur ex illis, quae mox subiungit: cave tamen credas extirpato semel summo omnia iam in vado esse. Si nulla quidem partibus corporis solidis laesi illata fueris, prius res planissime confecta eris sine ulla recidivae periculo. Secus vero, si quae superfine solidarum partium vitia, ante inusta, nupote quae non raro eo usque latent deducta sunt, vel partes adeo nobiles obdenti, ut nullam iam curationem, sed palliationem tantum admittant; imo plerumque palliationem non satis diuturnam. Certe, quam toties offa a lue venerea inficiantur, & foeda canina haeret contagium.

Longe aliter videtur antea sensisse celeberrimus Astruc (r), ubi argenti vivi vires extollens, & decocti guaiaci efficaciam deprimens, scripsit sequentia: est, sed quod tamen de vasis duriorum exosiosum, gummatum, nodorum. &c. sunt, vi nulla alia debiliore unquam in posterum referenda sunt, & quae proinde more nunquam resolutibiles haberi debent, humorque iisdem impadiis pro bu-fide fateor, me nunquam securum fuisse, si tale quid in ossibus superesse vi navabant, integram sanationem promississe in simili casu, sed semper recidiva in cura morbi venerei fuisse, ut hanc caverent (s). Celebris olim rite administratam copiosam per triginta dies, dum omnia mala penitus rata viderentur, repullulasse luem, ita ut novam salivationem posceret. F

CAU'

- (9) De morbis vener. edit. 2. tom. II. pag. 995.
 (r) De morbis vener. lib. II. cap. IX in prima edit. pag. 147.
 (s) Medic. essays tom. I. pag. 57. tom. III. pag. 328.
 On the venereal disease pag. 148.

ne nimis absolutam morbi certo curati prognosin
 propriæ periculo.
 sublimati corrosivi iam descripta & hoc emolumentum
 absque incommodo diutius protrahi; imo & repeti, si
 latentis adhuc alicubi miasmatis veneri oriretur. Videtur
 mortem repetitæ salivationi prætulere pertinaciter.

¶ Neque ullum aliud remedium tum ad sanitatem requiritur.

Impe, quod per argenti vivi actionem penitus de corpore
 omne miasma venerum; tunc enim nihil superesset, quam
 salivationem toleratam corpus blando, & bono nutrimento
 cautelis antea recensitis.
 itea ad §. 1476 monitum fuit, dari casus luis venereæ, ubi ar-
 efficacia nequidem sufficit, quocumque etiam modo applicetur.
 Qui solius mercurii efficaciæ confidunt, & reliqua artis auxilia
 repetunt eius usum, donec aegri repetitis salivationibus exhausti
 vel incurabile malum pronunciant.
 pretium est expendere, quænam in arte salutari supersint adhuc
 quibus succurri possit miseris.
 verimus Freind (u), dum de luis venereæ prima origine agit, no-
 tentia ex Leone, qui Africae historiam scripsit, non ita diu postquam
 morbus ex America in Europam delatus fuit: in Barbaria hoc mor-
 veneræ) insecti percussit plerumque, & curantur raro. In Numidia,
 bria vix notus est morbus. Unde Barbari luc insecti in Numidia,
 earum regionem tendunt, & sola aeris temperie, dum morantur ibi,
 am recuperant salutem, & sani in patriam redeunt, nec medici auxi-
 nec medicamentis usi. Propriis oculis se plures sic sanatos vidisse affir-
 In calido admodum aëre versatos fuisse hos homines certum est; nec
 mo victu illos usos fuisse, admodum credibile; dum simul & laboribus
 tum sibi quaerere debebant. Puro, & campestri in aëre labores vali-
 in pulcro de Siphylide carmine laudat Fracastorius (v), venationes,
 montium ascensus, imo & rusticanos duros labores commendat:
 Vidi ego sæpe malum, qui iam sudoribus omnes
 Finisset, solvique lucem liquisset in altis.
 Sed nec turpe putat, dextram summittere aratro,
 Et longum erabere incurvo sub vomere sulcum:
 Neve hibernæ solvitur, & duras profindere glebas.

(*) Hæter. of phis
 Apud: p. 189.

*Et valida aëriam quercum exturbare bipennis;
Atque imis altam eruere a radicibus ornus.*

Dum autem valido labore sic corpus exercetur, sollicite monet; in victu omnia pingua vitanda esse:

— — *cibi pinguis anas, tibi crudior anser.
Vitetur, potiusque vigil capitolia serues.
Viteturque gravi coturnix tarda sagina.
Tu teneros lactes, tu pandas abdomina porcae,
Porcae heu terga fuge, & lumbis ne vescere apinis.
Venatu quamvis toties confeceris apros.*

Macilentam diætam, & labores validos laudaverunt & alii probatissimi auctores, qui de cura luis venereae scripserunt. Sic *Gonsalvus Fernandes* (*), qui vixit, dum lues ex America in Europam devesca fuit, & postea ipse in Hispaniolam, ac Americae continentem missus est, ut fustionibus auri & argenti praeesset, quo nec locupletior, nec oculatior testis adhiberi potest, dum de ligno guaiacano agit, scribit sequentia: *Apud Indos haud est adeo saevum malum, nec tantum asserere discrimen, sicut in Hispania, & frigidioribus climatibus, sed parvo negotio huius arboris ope incolae curantur: curatio multam inediam, & praeterea aquae potum, in qua lignum hoc decoctum fuerit, exposcunt. Et absque inedia ipsa nihil prodesset, sed obesse consuevit.*

Per inediam non intelligit omnimodam a cibis abstinentiam, sed tamen valde victus rationem: *A carnibus abstinet, & piscibus, sed passulis vescitur, & sicis edulcis; iisque paucis (quae scilicet ad sustentandum tantum corpus sufficiant), & aliquo panis assae (biscoctum vulgus vocat) frustulo.*

Validi laboris efficaciam in lue venerea curandam testatur *Antonius Musa Brasavolus* (†), dicens: *Denique sunt nonnulli, qui ex vehemensissimo motu quotidie frequentato a Gallicis doloribus evasere; ut contigit Dono Batano campanario, qui servissimis doloribus cruciabatur; sed choras trabendo magnae campanae episcopi Ferrariensis ab eisdem doloribus evasit.* — *Audivi aliquoties quotidie duris fatigantur laboribus, & macilentissima tantum diæta sustentantur, sanari a lue venerea absque ullis remediis adhibitis. Idem confirmat Fallopius (‡), qui defendens virtutem medicatam ligni guaiaci in lecuranda contra illos, qui affirmabant, decocta aliorum lignorum similis effectum praestitura, scribit: *Ego vidi aliquos curatos ligno fagi, qui constantur. Sed iste non est usus medicus: Nisi enim dura cogat necessitas foedo morbo liberentur.**

(*) Ibidem pag. 357.

(†) Ibidem pag. 68a.

(‡) Ibidem pag. 790.

in casum, qui me docuit, quid constans aegri animacilento, ac validorum laborum tolerantia efficea inveterata, & vix non desperata.

bat a me consilium, qui in calidissimissimo statu verationem mercurialem subiverat semper postea repulpuae sanata credebatur. Ter tentata fuerat cura per c meliori successu. Gerebat in sterno, ac claviculis nilem unicum; cutis in variis locis maculis foeda erat, ossium patiebatur. Omnium rerum inops quum esset, volebat, aut curam eius gerere; universa familia deFatebatur se non semel cogitasse, ut violentia morte saereret.

um erexi lenimen malorum promittens, dum integram n audebam in morbo adeo inveterato. Fidem dabat, se s, & posse etiam durissima, modo aliqua sanationis spes satis robusta esset nativa corporis compages, & adesset ica veste indutum hominem elocavi agricolae, ut absque mercede famulum ageret solo victu contentus, & vili panem enim alebatur dauci, & pastinacae radicibus, foreribus, pomis, pyris, hordeo, avena in sola aqua coctis, is erat lactis ebutyrati serum acidulum, tenuissimum. Mensis pit hoc vitae genus, & duos ruris labores constantissime tensis octobris initium, quando me accessit sanus. Toto hoc bus, piscibus, ovis, lacte, butyro, caseo abstinuit severissim post aliquot annos in foecundo coniugio viventem, & e prole beatum.

exemplum, quod docet, venereum contagium elui potuisse ris, quibus pertinaciter haerebat, & expelli de corpore per laboribus in calido aere excitatos, dum simul diæta maci abatur, & copiosus liquidi solventis potus sudori aptum vehic t. Rari tamen sunt, qui possent rariores, qui vellent constanti curandi methodum tolerare.

argenti vivi efficacia in curanda lue deficit, ad usum deoeti argere solent medici, quod magnam famam obtinuit; praecipue, tricus de Hutten, eques Germanus, hoc remedio se curatum p s fuit (a), licet curam salivationis undecies absque successu to penitus inveteratus esset morbus. Scribit enim: tanto periculo, discrimine cum hoc morbo nonum iam annum luctor, non segnius in lia, quibus obissi morbo putabatur aggressus. Nam & balneis cu & berbarum potu, ac potionibus, & erosione ulcerum. Ad quem usum r arsenicorum, atramentum, calchantum viride aeris, aut aqua, quae abatur; insula cum eloris acerbitate, ut credi possent nimis vivendi cupidi.

cupidi, qui non mori maluerint, quam se vitam profert. Natus fuit, antequam lues venerea adhuc in Europa apparuerat, anno nempe 1488, & quatuordecim annis 1523 obierit, laboravit lue venerea, dum morbus primo innoverat: quo tempore longe peius furebat malum, & ruditer ad imperitis tractabatur cura, nec minus infelicitate; uti ipse testatur, quod post innotuit. *Testimonium* quisque levabatur, recidivis ut plurimum aegris, quoniam *paucis* ad diuturnius eius iuvamentum (b). Quam misere autem foedis ulceribus, excoriationibus, doloribus torqueretur, ipse describit (c); ita ut esset aspectu ac odore foedus, & omnibus gravis. A tot tantisque malis se omnino liberatum fuisse usu decocti guaiaci testatur; hinc illud adeo laudat, & commendat omnibus; simulque normam illud parandi, eoque utendi cum cura describit quae apud auctorem legi merentur.

Scriptum tamen fuit *Huttenum* ex recidiva lue venerea miseram vitam obiisse, & ante diem 35 vel 36 aetatis anno (d). Sed sane mirum videbitur hominem, undecies salivationem mercurialem passum, vix annis cum lue venerea pessima confectum, profugum, exsulem, gum citius vitam finivisse. Nec certum est, illum ex recidiva lue perquam liberius vivens novo malo causam dare potuerit; forte iam cautus; quom se metuendae luis certum remedium scire firmiter crederet. Si auctor, ut fertur, fuerit *Huttenus*, libelli, cui titulus *epistolae obsecrationum*, in quo barbaries illius temporis false perstringitur, non a moribus multum laudari posse.

De methodo autem parandi, & exhibendi decoctum guaiaci dictum antea ad §. 129 in capitulo de morbis ossium, & in materia medica: hunc numerum formula talis decocti habetur. Indicatio est, totum replere decocto guaiaci. Hinc quater de die dantur unciae decocti guaiaci meracissimi; pro varia aetate, temperie, & viribus maior minorve copia exhibetur. Proderit semper potare, quantum ferre poterit; utique in singulis vicibus ut nimirum uncias sorbeat octies, tanto restius (e). Aeger loco calidissimo includendus est, ut tamen ad sudandum pronus sit.

Ab omni cibo, potuque abstinendum, in quo vel minimum panis, Unico, macilenno, biscocto pane, visisque passis, & nulla alia. Nullo omnino reficiendus potu, nisi sincero, at paullo leviori decocto. Plerumque solet ille potus parari ex residua scobe ligusticae ex hoc ligno vis tota medicata, & illud decoctum secundarius muni servire poterit cum larga copia aquae coquatur, & pro commode.

Dum medici coeperunt uti ligni guaiaci decocto, illud par-

(b) Ibidem. (c) Ibidem pag. 304.
(d) Astruc de lue vener. edit. 2 pag. 690.
(e) H. Boërhavæ in praefat. aphrodisiaci.

inc caro vendebatur pretio. Nicolaus Massa (f) libram undecim scutatis aureis constituisse; hinc ibus parcerent, idem lignum saepius decoxisse oram vim medicatam exhaussisse, antequam inuenerat. Efficacem tamen fuisse talem decoctorum potio per plurimos annos morbum Gallicum passus, bus plurimis, decocto potato unius librae huius lit; plus quam duodecies coctionem repetendo; quam-octum aliquem saporem & odorem retinebat primaeum meracissima erat. Hutenus (g) testatur, quod ligni opus habuerit, quum alii octo, nonnulli decem um autem Hutenus ante Antonium Massam vixerit, tio guaiaci lignum redimere debuit. Saltem in praefate curatione morbi Gallici per lignum guaiacum com pecuniae in curando hoc morbo elocaverit. n levi pretio lignum guaiaci comparari possit, non serparando decocto meracissimo servivit, ut paretur de, sive levius; sed adhibetur recens lignum minori quant sufficit pro singulis libris decocti secundarii, quod pot.

temper in decoctis his parandis macerare guaiaci lignum in aqua, quae decoctioni serviet: tunc enim decoctum vives virtute medicata huius ligni.

iaci, meracum imprimis, satis acuti saporis est, ita ut saurandoque leviter exasperet, quod incommodum brevi tamen pore evanescit sponte. Caveri hoc, vel saltem insigniter miquiritiae radix addatur decocto, tali quantitate, ut medium iaiaci aequet. Additur autem liquiritiae radix, quae & radus cantum finita coctione, & infunditur decocto per dimidium one enim, praesertim longiore, dulcis liquiritiae sapor mutas gratus redditur.

ergo aliquot dierum decursu potata fuerunt larga copia a, tunc aegri corpus plenum est hoc liquore ligni, cuius penetraia, & acuta balsamica virtus talis est, ut omnem fere pituitam sue diluat, tenax attenuet, putridum a fracedine ulteriori condimentis, cohibeat. Tum medicatus ille liquor fecit, materavit malos resstas dein, ut velocissime melius perque omnia vasa tractus celema quaeque abluat, detergat, repurget, atque ita pinguis corporis corpore quam accuratissime eliminat, sique continuata hac expurgati (i).

us ille scopus obtinebitur, si vapori calido penetrabili spiritus vini exponatur nudum corpus aegri, ut excitentur sudores; per quos diffu-

Asperitiae, &
H. Boethius.

71.
Meracissima

Meracissima

Idem pag. 183.
pharmac.

(h) Ibidem pag. 177: 278.

similibus. Hoc fiebat duplici modo: vel enim in cistella lignea ad hunc usum facta sedebat aeger erectus, capite libero extra cistellam prominente, accenso sub craticula spiritu vini, ut eius vapor undique totum corpus allueret; solet tunc mox sequi profusus sudor, qui ubi per dimidiatur horae sic duravit, eductus ex cistella aeger in vicinum lectum, sicum, calesactum deponitur, ut adhuc sudare pergat per horulam; plus, minusve prout vires ferunt. Quum autem periculosum foret, si frigidiusculus ac allaberetur ad corpus aestuans, & sudoribus diffuens, multi praetulerunt si aegro nudo, & in lecto iacenti applicaretur spiritus vini accensi vapor per tubum longiorem sub stragula deductus; quod satis commode fieri test. Sic enim translatio aegri sudantis ex cistella in lectum evitatur, & minus periculum animi deliquit est, dum in situ horizontali decumbit, qui si erectus sederet. Si quae ossis pars malo venereo infecta fuerit, palaneis, metaco decocto guaiaci madidis obvolvitur sudationis tempore mulque spiritus vini accensi vapor per tubum sic dirigatur, ut in hanc rem agat imprimis, quae omnia in lecto iacente aegro commodius ministrari poterunt. *Hae arce intima ossum, & reconditissimarum partium dia purgantur penitus; etiam quo mercurii virtus cum efficacia baud agebat. Etenim videre memini, iuvenem penitissime ad ossa usque in hac tractatum methodo, tanto impetu eiecisse sudores, ut in vigore operis subviridis a guaiaco sudor elevares separaresque ulcerum escharas, va iam, & inferne labefactatas (k).*

Expressio sudoris, quae fit accensi spiritus vini ope, ultra dimidiatur vix debet protrahi. Exstincto iam spiritu, & remoto tubo deducente teritur; imprimis si unciae octo, vel decem iuris macilente vitulina adsit medicus, qui curam dirigat, ut ministrantium temeritatem quid improvisum contingerit. Dein corpus pannis laneis calidis deinde cum cautelis, simul continuandum semper in potu decocti per raci, uti & dilutioris pro potu ordinario. Per quatuordecim dies de die, mane nempe & vespri sudatio adhibetur; tum de quatuordecim diebus, semel in die, mane nempe sudet a facto cura haec absoluta est, & sensim aucta ciborum non pia vitulinae macilente aeger; curae enim tempore praeter Massa (l) cura felici tempore stricta dieta servatur quantia: Notandum est, quod infecti ultima infectione morbi sanantur, nisi fortissimis & ultimis remediis; ut est potus dicti tenuissimo viâ; scilicet cum abstinence a carnibus, & vino;

[k] Ibidem.

(l) Aphrodisiac. pag. 71.

biscottum panem ad uncias tres, & passularum un-
virtus toleret. Sed & Massa (m) dabit decoctum
uas enim libras ligni guaiaci in pulverem triti mi-
sexdecim libris; macerabat per unum, alterumve
ad consumptionem medietatis. Talis decocti calidi
ex ad uncias duodecim, & totidem vesperi; inter-
aegros bibere de decocto secundario, quantum poterant
loco, medicum semper attendere debere ad aegri-
tes: Sunt enim homines non tolerantes famem stomachi,
ita; quare esto prudens, & istis dabis plus de pane, &
puta, uncias sex panis, & quatuor carnis. Videtur autem
bas, vitulinam, hoedinam, pullorum: quandoque & avi-
ad semper parca copia tantum.
ius (n), qui in Germania medicinam exercuit, & docuit,
ris, qui decocto guaiaci utebantur ad curandam luem ve-
res. Panis enim bene fermentati, & cocti, modice saliti,
quinque, ad summum sex dedit, & pullum gallinaceum
. In coena non plus quam in prandio fumendum esse mo-
di. Notat autem, Germanos vehementius appetere, & me-
res; hinc pluri, ac copiosiori alimento indigere, adeoque libe-
guaiaci cibandos esse; ceteroquin, tenui exquisito illo victu,
s, accedentibus vigiliis, & immensis doloribus, vires mirifice
bus, in hecticis febres & marasmodum incidere.
nim omnes mutationes subitae periculosae dicantur, & sint, hoc im-
um erit, si quis lautiori dietae assuetus dudum subito ad tenuem
n victum transeat. Unde non sine ratione suadet Huttenus, ut per
a guaiaci curandis paulatim subtrahatur cibus, primo quarta pars eius,
mere consueverat; dein tertia, paulo post dimidium, ut esurire distat;
im detor aqua valde dilutum (o). Unde apparet, quam male agatur
egris, dum rudibus, & imperitis hominibus operosa haec cura committi-
varia enim aegrorum tolerantia sudorum copia determinanda est, an se-
vel bis de die sudor tolerantia sudorum copia determinanda est, an se-
ceditur, viribus sustinendis sufficiat. Plura alia huius curae tempore contin-
he possunt, quae praefens medici auxilium, & consilium desiderant; v. g.
animi deliquit, in augendo, vel minuendo aetuarii calore &c. Hute-
ara hypocaustum plus ac quae aestuant consilium, ac illi, salutis, quam sic adeptu-
es se sperabant, studio, patiens. Quam per tras consisterent, donec, defecis per-
taliter, vehementiam cor-dibus, mori non sentirent, misere iugulavit. Bonum
ther-

(o) Aethiopiae. pag. 61.
 pag. 124.
 Im. V. par. 11.

(1) Ga.
 Ibidem.

(2) Ibidem pag. 599 - 600.

(o) Ibidem

thermometrum in cubiculo aegri suspensum docebit facile medicum, imo & adstantes, si nimis exaestuaret, vel deficiat calor loci.

Quum autem tam valida per sudores hic fiat evacuatio, & subita quidem, peritus medicus non tentabit hanc curationem in debilibus, & exsuccis corporibus. Male ad guaiaci decoctum confugiunt tales, qui repetitas salivationes passi exhausti sunt toti, & marasmo vix non confecti. Nisi enim adhuc illa addit viscerum integritas, ut bono victu renutrirī possint, & repleri vasa collapsa, sicque augeri exsucco corporis torositas aliquantum, deficiunt inter medios sudores.

Unde aliquoties per duos, tresve menses, & diutius salubri victu cogebat reficere tales aegros, antequam curam per decoctum guaiaci tentare auderem. Si non reficeretur corpus post bonum victum diu administratum, alia potius tentanda consulat, de quibus postea adhuc quaedam dicenda erunt. Interim certum est, in tali casu firmam curae spem non amplius superesse; quum per morbi inveterati virulentiam, saepiusque per imprudentes curationes, sic enervatum fuerit viscerum, & vasorum robur, sic minuta humorum copia, sic depravata illorum indoles, ut corpus non amplius ex ingestis optimis supeptis cibis, & potibus possit conficere bonum chylum, & sanguinem talem, unde restituantur illa, quae perierunt. Solent tunc saepe miseri immedicabili phthisi consumi, vel lento marasmo tabescere.

Inde etiam intelligitur ratio, cur prudentes medici non provocent sudores per vaporem accensi spiritus vini, antequam per octiduum corpora aegrorum impleverint decocto guaiaci copiose potato, ita ut quandoque timere incipiant. Penetrabilis enim ille vapor accensi spiritus vini, dum accensa pars inflammabilis corporis humidum undique alluit, tantam copiam sudoris elicit, ut, nisi prius copiosus humor in vasis fuerit, homines a subita tali vasorum depletione in animi deliquium inciderent, imo in mortis periculum.

Quum ergo & haec methodus non omni difficultate careat, & ob severam dietam, sudoresque profusos minus arderet plurimis, coeperunt condiori methodo. Sic celeberrimus Astruc (q) refert, Alexandrum Massariam thermates; nempe copiose illud bibendo ad decem, & plures libras per intervalla deambulando. Hanc methodum a nemine praeter Manarium exaltam dedisse summam cum facilitate, & felicitate. Sed tamen qui illos nomines

Certum tamen est, Antonium Massam (r), qui circa idem tempus scripsit, pauci sunt homines, qui inediunt, vel cibi, & potus praescriptam abstinentiam dentur illis carnes optimae, & vinum mediocre ista decoctione dilutum. Exercentur plus.

(q) De morbis venereis edit. 2a, tom. II, pag. 844.
pag. 70, 71.

(r) Aphorismarum.

*Sola permissioe decoctionis ligni Indici tam prima, quam
indio, & coena copiose, seu liberaliter, comedentes etiam
excuntes ad propria munia. Sed qui hac via sanati sunt,
sed per aliquos menses usi sunt hac regula. Notandum etiam
tima infectione morbi Gallici non sanentur nisi ultimis, &
&c.*

blectamento vidi in magno, & utilissimo opere celeberrimi
vius: eruditionem, perspicaciam, & immensos labores omnes
, & sera stupebit posteritas, ex cuius operibus tot, & tanta
tatus agnosco, methodum hanc decoctum guaiaci bibendi,
re instar. Celeberrimo Valsalvae in mentem venerat, ad curam
hoc decocto uti, non aliter, ac thermalibus aquis uti solemus.
duas tresve libras animadvertendo, an facile & per vesicam,
ima, aut cutim, us aliquando, redderetur. Nam si non facile, aut
as exinet vias, desisteat. Sin facile, & tantum per:urinae vias pro-
die pondus, & sic magis viasque in dies augebat; donec perveniret
us dies vetusta ulcera sanari, gummata deprimi conspexerit. Ipse
eadem se usum methodo testatur cum felici successu, ita ut persana-
it mulierem, quae iam per biennium ulcera venerea gerebat magnum
altero genū, tria, vel quatuor in palato, parva quidem, sed per
nen alimenta gravi incommodo ex ore in nares transirent. In viro,
lue hypogastrium, & femora late, ac sede exulcerata erant, eiusdem
li similem successum observavit. Unde probat, errasse illos, qui pro-
clerem aquarum thermalium magna copia potatarum excretionem pec-
m. fixerant quasdam vias, per quas illae minime cum sanguine cir-
luctae in vesicam descenderent. Nisi enim guaiaci decoctum in sangui-
receptum, & cum illo per vasa motum omnes partes corporis adiisset,
Poruissent ulcera venerea: in diversis adeo, & a se mutuo dissitis cor-
is locis tam cito, & feliciter percurari.
Facile intelligitur, decoctum illud guaiaci, dum thermalium aquarum in-
ad decoem libras potatur, non posse esse meracum adeo, ac illud, quod:
ationi: luis per sudores validos inservit; quod adeo saturatum est, ut sau-
irriter multum, imo quandoque leviter inflammet; imprimis in curao
tio: postea enim, aegri assuescunt, & illud facilius tolerant. Caveri potest
iam, si sub finem coctionis, addatur liquiritiae radix; ut alibi dixi: uti:
ius molli succo obductae fauces longe minus exasperantur.
Duplici ergo modo adhiberi poterit decoctum guaiaci: vel enim hoc de-
cocto impletum corpus, valido sudore, calore loci, & vapore spiritus vini ac-
quasi expresso, us. cum severa, & macilenta. diacta. exhaustur, orbatum:
omni.

(c) De febribus, & c.

morbo

per anatomen indagatis tom. II, pag. 370., 371.

omni pingui. Totum enim huius botae artificium consistit in eo, ut rursus omnia pingua resolvantur, corpusque ita emacietur, nihil ut dei retineat, unde hanc expectationis curam vocant. (1); tuncque spes est, una cum pingui, cui inhaeret, expelli de corpore luis venereum. Alter modus est, si decoctum guaiaci magis dilutum poterit magnea copia, instar aquarum thermalium hac spe, ut transeat per urinam, sicque eluat ex corpore contagium luis. Quum iam huius methodi vestigia manifesta inveniantur apud auctores, qui circa initia luis venerae in Europa de cura huius morbi scripserunt, testimoniis omni exceptione maioribus, summorum virorum Valsalvae, Morgagni, confirmetur utilitas huius methodi, operae pretium videtur, ut ab aliis tentetur. Longe enim minus molesta est, quam curam expectationis quae & severam adeo diastem, vix non omnibus displicentem, simul retinet; neque inde procul dubio corpus adeo debilitabitur.

Ad praecedentem paragraphum dictum fuit, post usum decocti guaiacae curam luis de die augeri urinae copiam, de nocte sequi sudores, quibus & alvum aliquoties solvi; unde videtur variis viis miasma venereum elui de corpore. Valsalva tamen abstinit ab usu decocti guaiaci more thermicarum aquarum dati, nisi per solas urinae vias ageret. Forte levis fador, vel evacuationes per alvum non adeo nocerent, si simul maxima decocti potati pars per urinam evacuetur. Verum haec tantum coniectura, quum adeo celer, adeo salubris effectus hanc methodum coronaverit, diuresi insistendum esse potius, dum haec methodos tentatur. Dedicatissimus Boerhaave (2) circa usum argenti vivi, & decocti guaiacae lue venerea sequens monitum: Quum ad summa haec plurimum pyralismus, & haec decoctorum methodus solas adhiberi, se servantis consistit, pyralismo feliciter sudoris expulsionem succedere; sed guaiaci liquore humores corporis penitissime prius dissolvi fiant, ut curationem desideratur, cum salivatio postea mercurio excitanda praefici boni quid praestitit; quin imo vel maxima datus copia, aut per frictum illud aliquoties videram, argentum vivum in attenuatos penitus huius fide agere, sed sine offensa dilabi, atque iterum exire, vix turbato curandam; imo a quibusdam miris encomiis depraedicatum; ita ut remedium; sed haud tantam inde expectarunt efficaciam. Nardus de dixit: De forma eius similacem asperam, iam a Dioscoride descripta. Quatuor zarzaeparillae species recensuit, & figuris expressis quae credidit, similacis asperae radículas iisdem viribus pollere, quae canis his plantis tot laudibus extollebantur. Mus est hominum is,

(1) Aphrodisiac. in praefatione.
(2) Rerum medicar. novae Hispaniae thesaur. lib. VIII, pag. 288. &

(2) Aphrodisiac. in praefat.

de fenassi, quod longius decoctum in maximo habet radicis vim sudoriferam; per quam dolores articuli partium fedantur, rebellesque, & insanabiles profligat haec planta prope stipitem radicem satis crassam, & imae radiculae tenuiores, sarmentosae, non crassiores egunt undique, & sub terra horizontaliter protrepunt. viculum convolutas vendunt officinis mercatores, & his rei tantum. Vidi tamen aliquoties crassam illam radicem, & istae radiculae emergunt; quam ideo quidam matrem ant. Verum illa non utuntur officinae; sed inter rariora rum plerumque tenuiores radiculae adferantur tantum, ortae, quae in magnam longitudinem evolvi possunt. externae fuscum colorem habent, intrus albae, & facillime cundum totam suam longitudinem, quod pharmacopoei facere in illas in minores particulas discindant pro decoctis parandis: melius intima harum radicularum substantiam penetrare, & medicatam inde elicere poterit. *epius zarzeparillae* radices; saporem inveni lentum, farinosum; is decoctum valde meracum, in quo inveni saporem fatuum, fatuisse quasi subsalsum. Radiculae hanc semper in inodorbant hoc praecipue: quum *Nicolaus Massa* (x), qui inter auctores, & venerae scripserunt, merito magnum nomen habet, scripserit se. Si quis masticando, & in ore desinendo, eius gustum scire voluerit, in avaritundinem cum aliquali stipititate sentiet, & qualitatem gustum tem cognosces, & ideo flectant, qui eam inspidam ex omni parte, & tam esse dicunt. *Experientia* enim, & sensus contra eos pugnant. Fateidem zarzeparillam inodoram esse; quum siccata radix ad nos adfesset sed affirmat, decoctum eius spirare odorem, qui potius ingratus est, & suavis; ita ut sit quodammodo graveolens. licet autem laudet decoctum zarzeparillae in curanda lue venerea, far, nihilominus non posse comparari eius efficaciam cum viribus decocti *iaci*, verum esse medianam securitatis, & sine discrimine dari posse. Vientem debiliores habet. *Siquidem*, qui cum hac medicina sanantur, facile causa, & non multum post tempus in eandem aegritudinem revertuntur (y). *Vesalius*, qui zarzeparillam (Hispani Spartam parillam, idest, humilem forum vocant), ex India missam, sedulo examinavit, & perfectissime descripsit, in epistola de radice china (z) testatur sequentia: Stipites hos, aus Carmeata non minus quam chinam dicas, esse inspidam, imo magis omni manifestam. In schodula autem radicibus zarzeparillae annexa legebatur, praemissa purgatione, & unciali mensuris duabus aquae incoquant, & decoctum huius cyathum mane, ac ante coenam calide bibendum esse.

(1) Apocryphae. p. 217.

(2) Ibidem pag. 81.

(3) Ibidem pag. 394.

esse: pro potu communi in prandio, & coena idem decoctum uauari, more
lo ciborum usu: interdicto; simul hoc decocto utentibus liberè in publicum
prodire licebat. Ulceribus, & membris dolentibus applicabatur linza eod-
dem hoc decocto madida. Propinabatur hoc modo decoctum zarzaparillae
per viginti quatuor dies, & dein dato remedio purgante cura finiebatur.

Non videtur *Vesalius* magnam fidem adhibuisse zarzaparillae viribus: si-
tetur enim, quod nullum eius periculum faciendum dextit; quandoquidem
cui ab amicis druvini auxilii vice haec sarmenta missa sunt, Guaiaci deco-
ctam videretur restitutus, & neglectis sarmentis illis eorum portiones quasdam
assumere, ac amicis, ut indicas has imposturas expendant, transmittere, dissi-
pulis medicis proponere mihi liceat.

Eodem fere tempore cum *Vesalio* vixit *Gabriel Fallopius*, cuius tractat-
de morbo Gallico habemus, sed posthumum, & ab eius discipulis editi
qui plus virtutis medicatae in zarzaparilla agnovisse videtur; quam ex
describit, & fatetur se credidisse, quod sit radix ebulli; donec Hispani
ducem Florentinum integram attulit plantam; tuncque vidit radicem
latis asperae esse zarzaparillam; quod experimentis probatum fuit: i-
enim in monte sancti Iuliani Pisis videret crescentem similacem asperam
fodiendas eius radices curavit; quibus semper usus fuit loco sarsapae-
lae per biennium illud, quo ibi fuit, semper felici cum successu plurimos
Gallica liberavit (a). Notat tamen, ex Hispania delatam asperam b-
habere capillamenta; quod credit fieri, quia in saxoso solo crescent
nulla, & facilius, imo vivacior in nostra similace aspera scilicet.

De viribus autem zarzaparillae talia habet, quae vix inter se comp-
videntur: Fido salsae magis, quam ligno (guaiaco); imbecillior est ce-
habet tamen & ipsa nobiles vires, quibus superat guaiacum, & est,
post superatum morbum Gallicum Gallicum resistent ulcera, aut rhagades circa se-
plo citius sanat haec quam lignum indicum. Videtur hinc in zarzap-
eo usque, ut tantum per efficaciora remedia luis contagium debell-
quod & recentioribus observatis confirmari videtur. Tamen Fal-
tertia saltem effectum praestet. Sic autem habet: Quum ergo
adsumt ulcera, ad hoc medicamentum confugio, tamquam ad certissi-
mum auxilium, & si non facit prima diata, facit saltem i-
miserere haec duo simul; quod etiam in sequenti capitulo describit
ditque guaiacum, primo, quia leviter offendit ventriculum zarz-
coctum, & aliquando solvit ventrem; secunda ratio erat, &

(a) Aphrodisiac, pag. 804.

(b) Ibidem pag. 805.

...que jumebat & lignum, & salsam.
 andi guaiacum decocto zarzaeparillae adhuc his tempo-
 nosocomio Florentino, *arcispedale degl' incurabili* dicto,
 ae, addita parca. copia ligni guaiaci, lue venerea af-
 r. *Fallopianus* ex aequali copia guaiaci, & zarzaeparil-
 bat. Verum in hoc nosocomio, teste *celeberrimo* Targio-
 onsumuntur quotannis sexcentae quinquaginta librae zar-
 tantum librae ligni guaiaci. Mallet egregius ille vir,
 aci. adderetur decoctis, per quae lue venerea cura tentatur
 , saltem in usum illorum, qui gravius hoc morbo affliguntur.
 avic (d) moderatoribus huius nosocomii, utile futurum, si
 borantibus, praecipue illis, quibus ossa carie exesa forent,
 um solius ligni guaiaci cum omni regimine, & cautelis ante
 acile enim intelligebat, curam talium malorum a decocto zar-
 n facile expectandam esse.

ordyce (e) plures recenset casus lue venerea laborantium, qui
 itatem perceperunt ab usu decocti zarzaeparillae; imprimis ad
 flores nocturnos, osteocopos, vix tolerabiles. a lue venerea or-
 ctum illud sequenti modo parabatur (f).
 zarzaeparillae unc. iii, decoque in libris sex aquae fluvialitis, vase
 colaturam duarum librarum (civilium nempe, quae faciunt triginta
 ias). Monet, eligendam esse zarzamparillam, quae nec aetate vires
 , nec teredinibus, exesa, nec humiditate, aut aqua marina (in iri-
 corrupta fuit. Aliquando addebat huic decocto aliquam copiam liqui-
 ad saporis gratiam. Hanc decocti quantitatem dabat intra spatium
 i quatuor horarum, binis, vel ternis haustibus sumendam calide, vel
 de, prout magis aridebat aegrorum palato. Omni biduo parabatur re-
 illud decoctum, & quidquid superstes manserat, in cellari frigido ser-
 arur. Diaeta parca commendabatur simul, & abstinencia ab usu vini.
 Tentavit usum zarzaeparillae in pulvere, & decocto in iunioribus; sed
 n potuit sic radicatus extirpare luem veneream; forte quia non prae-
 sserat argenti vivi usum, vel quia non satis diu zarzaparilla uti volebant.
 Decocti huius usus, optime profuit illis, qui macilenti, & ad phthisim dis-
 positi erant a causa venerea: redibant enim vires, appetitus, torositas cor-
 poris, & color naturalis (g).
 Tunc imprimis multum boni ab usu zarzaeparillae sperabat, ubi argentum
 vivum, & usus decocti guaiaci non sanaverant luem integre (h).
 Unde conclusit, argentum vivum in genere loquendo curare pleraque
 mala venerea; zarzaparillam sanare forte illa, quae argento vivo resistunt;
 adeo

(i) Prima raccolta di
 (c) Medical histor
 pag. 181.

Observatio
 var. and
 (g) Ibid.

medicæ pag. 157.
 vires tom. I, pag. 149.
 pag. 169.

(d) Ibidem pag. 158.
 (f) Ibidem
 (h) Ibidem pag. 171, 172.

adeoque probabile esse, quod combinatione binorum locum remedium omnino mala venerea curari possint. Cuius rei exemplum in eodem volumine legitur (i).

Decocti zarzaparillae efficaciam suis quoque observatis practiciis confirmavit postea Strickius (k), & quandoque illud aliis, quas tenuerant, longe efficacius deprehendit; quod miro satis casu probat. Femina tuberculis venereis laborans petijt a balneario auxilium; qui unguento applicato intra biduum tumores dispulit; sed mox adfuit ingens dolor in infimo ventre, qui vespere, praegressa horripilatione, magna cum febre exacerbabatur, & copioso sudore fitebatur ille paroxysmus. Non anxia erat, sed mane abe omnis dolor, & pulsus erat naturalis. Post meridiem redibant omnia morbi & eodem quidem ordine. In nosocomium delata reticuit morbi causa sed quum remedia, nec ipse quidem cortex Peruvianus illam levamen cerent, sponte morbi originem fassa est. Tentatum fuit decoctum racibardanae una cum mercurio dulci in aqua dissoluto; ita ut quater de circiter granum assumeret. Intra biduum febris, & dolor erat minores licet in horum usu per binas septimanas pergeret, maior in melius non observabatur. Tentatus fuit usus mercurii sublimati cortesi, se gens ardor in sternis, siccitas pectoris, sitis, capitisque dolores fecerunt amplius ex vagina prodire; febris doloresque penitus siluerunt, vixit auctae sunt, & aegra tandem optimam recuperavit sanitatem quor septimanas, ut, si quid morbo si forte adhuc lateret, penitus e

Tandem sumit meracissimum decoctum zarzaparillae, & quarto die per urinam multa materiae subfusca tenax prodit, quinto die urina tenuis; verum per vaginam acris, crassa, foetens, subfusca materiae nst amplius ex vagina prodit; febris doloresque penitus siluerunt, vixit auctae sunt, & aegra tandem optimam recuperavit sanitatem quor septimanas, ut, si quid morbo si forte adhuc lateret, penitus e Circa annum 1535 in Europam deferri coepit *chinae radix*; quae longe minus stricta servaretur diuina tempore toto, quo propina coctum *radix chinae*, concederetur & moderatus usus vini dilu cocto, & magno satis pretio venderetur, brevi hoc remedium indidiores, quod etiam ad morbos articulares certissimum efferebatur; quam ob causam imperatori *Carolo quinto* hoc decoctum, quae unguis tenuitatem habebant, haec segmenta macerabantur ad consumptionem tertiae partis; Vas autem in quo parabatur ho debebat esse magnae capacitatis, ne quidquam prorumperet inter

(i) Ibidem pag. 406.

(k) Ann. medic. secund. pag. 225, & seq.

alios usus. Quotidie debebat parari novum deco-
ctum magnum calidum dabatur aegro, in lecto sub-

opertus tentabat sudorem elicere per duas horas: quo
scietur, eo plus accedet beneficii; dein bene absterfo
vestibus probe munebatur, & a vento cavebat. Interdum
bibebat, modo tepidum illud foret: praestantius autem
potatur. Pullis, aut caponibus elixis, sed absque sale
que ad diem octavam domi manebat aeger; post hanc
estibus bene munito. Ab omni acido, & carnibus assis ab-
er. 14 dies. Mellis usus laudabatur, ut alvi obstructio prae-
quocumque tamen forculo sumendum mediocriter est: constat enim,
fieri accedere a diacae norma quam ab aquae (decoctis chinæ)
Nec iure ullo, nec alio liquore utendum erat toto tempore
per 24 dies durabat. Integro hoc tempore veneris usus inter-

radicis chinæ, quae decoctis his parandis fervierant, & exsica-
ntur, sumebantur duarum unciarum quantitate, & eodem modo,
am duodecim libris aquae coquebantur ad consumptionem tertiae
oc decoctum post absolutam curam 24 dierum inserviebat aegro
communi per octo vel decem dies. Ulcera, si adessent, fovebantur
lecocto, dum aeger domi erat; si exiret, tegebantur aliis quibusdam;
reduci applicabatur denovo idem decoctum. Post decimum quartum
diem concedebatur modicum carnis assae. Radix chinæ, quae in of-
sub hoc nomine prostat, crassa satis est, tuberosa, nodosa, lignosa;
na superficies laevis est, & fusci coloris; intus rosei fere coloris est;
rem, & odorem evidentem vix ullum habet. Toties illam gustavi, &
quam aliter invenire potui. Nicolaus Massa (m) nihilominus irascitur illis,
hanc radicem inodoratam dicunt, & scribunt; quam sensus illos redarguit.
ego, inquit, non semel tantum frustum assini radicis volui mandere, & denti-
bus confregi, sed & aliis doctis, & sensatis viris ad masticandum dedi (ne forte
proprio sensu deciperet); quos omnes, & ego etiam, affirmant, post mastica-
onem saporem aliquem amarum sentire manifestum, & stipticitatem quandam.
Similiter post ebullitionem odoravit, & aliis ad olfaciendum dedi; qui necum omnes
odore aliquem levem percipi affirmant, & cognoscunt, ut ego cognovi &c.
Dolendum est, in diversis ari salutari cedit, dum medici, in arte sua
peritissimi, & in dedecus ari salutari cedit, circa remedii cogniti qualitates;
quae sensibus determinari possunt. Vesalius (n), qui non levi cura examina-
vit chinæ radicem, novum tunc temporis remedium, & magnis decantatum
laudibus, cuius virtutem imperator Carolus quintus experiri statuerat, sequen-

(1) Andr. Vesal. p. 101
(n) Aphorismi

de rad.
pag. 86

chinæ in aphorismo pag. 584-588.
(n) ibidem pag. 588, 589.

tia scripsit: *Uicumque chinam, modo aliqui siccam, & lignisam massicem, ut dentibus conteras, nullo illam sapore praeclisam affirmare possis, longeque ad minus (quantum in illius, non autem in adiacentium pharmacorum natura est) odorati quidquam prae se fert, neque unctuosi quidquam, quod alii in ipsa observasse contendunt, degustanti, aut alias perirastanti ostendit.* Deinde ingentem subiungit catalogum virium medicatarum, quae chinae radice decocto tribui solebant; tandem concludit: *Inserim dictus iam antea stupidus sapor cum omne adstrictionis indicium in china occurrit, neque, quantumvis simplici aqua incoquas, alium saporem, quam ex bordeco corticibus non emundato, & minime dulcis radice portione consurgere animadvertas, rubescens pariter nonnihil cinnae decocto subit admodum vini instar, aut eius, quod ex longa in canisb mora ruborem contraxit; adeo ut hinc, quod ad manifestas qualitates spectat vix tantum in sudoris, urinaeque provocatione, & illis virtutibus, quibus et hodie probatur, ex ipsius decocto, quam ex bordeci sperandum sit.*

Nec multum virtutis radice chinae in lue venerea curanda tribuit *Gal Fallopius (o)*, qui ceterum in observationibus suis anatomicis satis ac carpit *Vesalium*. Ille dabat meracius decoctum huius radice: nam ut duas decoquebat in duodecim libris aquae ad medietatis consumptionem, cet autem ad, alios morbos non inutile crederet hoc remedium, in Gallico curando dissuadet eius usum. Testatur enim, quod ter, & si lue curare tentaverit hoc decocto sine ulla successu. Unde monet scia: *Ego usus sum isto medicamento in infirmitatibus viscerum, in canceratibus, & in lippitudinibus felici satis successu, sed non in morbo.* Nota tamen, quod ex usu radice illius valde pinguis fiat homo. Reliqua in nostro orbe cadere respuit.

Illius efficaciae, qua corporis pinguedinem auget chinae radice decoctum testem se fuisse dicit *Prosper Alpinus (p)*. Asiatici nempe in gynaeceis suis obefulas mulieres praefereunt.

Quamvis ex dictis pateat, non adeo insigni virtute medicata esse hanc radicem, tamen ratione aquae, qua copiose diluitur haec cum meretur in illa remediorum classe, quae sanguinem depurantia eis vocari solent; utpote quae absque motu humorum aucto diluendo, urinae, & sudoris excretionem promovendo, ex humor eluere possunt, & simul vasa sic disponere, ut facile transmittant. Aquam solam magnum remedium esse, omnes medici norunt, cui tur simul frugalis diaeta, multum boni sperari poterit.

Pro illis, quibus res angusta domi erat, saepius dedi decocto *bardanae*; quae levi pretio ubique haberi possunt, & similem effectum maiorem, quam a decocto radice chinae potato, vidi.

Recentissimis observatis consistit, citius usum insigniter pro venerea, quae neque salivationi, nec aliis remediis mercurialibus,

(o) Aphrodisiae. pag. 803.

(p) Medicin. Aegypt. III, pag. 16, &c

ad omnia rebellis perstiterat. Homini quadragenario
im subito suppressam per injectionem adstringentem
proto durus, schirrosus, pugno virili maior: ambo ta-
munes, & fani. Per sesquiannum hunc tumorem gessit;
& alia plura externe, & interne absque ullo successu.
uit una cum copioso decocto radicum bardanae. Sed,
am integram drachmam extracti cicutae fumeret aeger,
ervabatur mutatum. Trigesimo die drachma cum dimi-
e dabatur. Trigesimo tertio die mollior erat tumor, &
uit; trigesimo sexto die datum fuit purgans addito mer-
dragesimo die sumsit quotidie drachmas duas extracti ci-
fuit minor.

e dosi usque in quintum mensem perrexerat aeger, interpo-
mo quarto die lene purgans mercuriale. Tunc tumor erat
us, & homo integre sanus (7). Iuvenis novemdecim annorum
pus ulcera venerea habebat, & tibiae os utrumque erat pro-
m. Remedia antivenera cuiuscumque generis nocuerunt mi-
iam debilitas, & summa macies. Dubitabat Storckius (7),
losi, & cautelis debitis haec remedia administrata fuissent; hinc
itavit varia, sed incassum omnia.

gitur cicutae vires tentare. Ulcera, & loca cariosa linteis so-
atae madidis regi curavit; interne datum fuit extractum cicutae
a copia decocti radicis bardanae, addita tertia parte lactis. Intra
ies magna in melius mutatio contigit, & vires increverunt. Circa
cundi mensis omnia cariosa optime separata erant; ulcera plura ob-
itur firmissima cicatrice; dolores nocturni, qui atrocissime torserant
, sedati erant penitus.

a magna adeo cicutae dosi opus fuit, quum maxima dosis intra 24
non excesserit drachmam. Finito tertio curationis mense optima vi-
tur adesse sanitas; nulli aderant dolores, & vires erant bonae. Nota-
effectus cicutae & alibi (1) habetur.

nsuper pulcherrimis Storckii experimentis evictum fuit, aconitum ipsum
erbis his curandis servare; infamem olim si ulla alia plantam; in omnium
am ore erat tritum illud:

Lurida terribilis miscens aconita novercae.

Stupebat Linnaeus (1), dum videbat, vetulam in Lapponia ex aconito pa-
rare ferculum familiae suae, quod impune comedeatur. Unde in mentem ve-
nit Storckio, tentare in lue venerea pessima quid praestare posset. Femi-
nam

(1) Anton. Storck libell.

(1) Henr. Jos. Cullen secund. de cicuta pag. 169.

(1) Flor. Lapponiae nosocom. civic. Pazmanniani anni tertii

pag. 179.

(1) Ibid. pag. 171.
Pag. 131, & seq.

na 40 annorum iam in octavum annum laborabat lue venerea; in omni-
bus corporis ossibus tophos habebat exulceratos, maxime in sterni fauce
erant exulceratae velum pendulum palatinum totum exesum. Omnes lue
curandi methodi in hac aegra tentatae sunt, sanabantur multa ulcera, ple-
rimi topi disparebant; fauces autem & os sterni in eodem statu permas-
serunt; nec dolores nocturni fuerunt imminuti; unde aegra vires amisit.

Ter de die dedit *Storckius* granum extracti *aconiti* cum tringenta grani
sacchari tritum, superbibendo singulis dosibus. hinc vascula decocti radicis
bardanae; quo ante iam utebatur larga copia.

Dolores nocturni brevi mitigati, imo sedati sunt, & ulcera omnia
melius mutata. Somnus, appetitus, vires redierunt; membra morēbat
cilius.

Doloribus nocturnis sedatis stetit mahum; nec tumores amplius minuet-
tur, nec ulcera consolidabatur, licet extracti *aconiti* dosin auxerit, eius
sex grana quotidie dederit per quinque septimanas. Unde mutavit consili-
um, grana extracti *aconiti* addidit totidem grana mercurii dulcis, &
tribus drachmis sacchari albi confecit pulverem, cuius drachmam me-
dedit, ter de die superbibendo iuscukum, vel infusum quodcumque.

Ufu huius remedii intra binos, & dimidium menses disparuerunt o-
tumores ossium; separata sunt magna fragmenta cariola; coiverunt al-
partes deperditae ex velo pendulo, & uvula recreverunt ita, ut aegra
me deglutiverit, & voce distincta potuērit loqui. Sana dein ad solit-
bores rediit. Unde conclusit extractum *aconiti* non tantum tuto, &
salubri effectu dari posse, sed & aequali copiae mercurii dulcis in
quandoque esse efficacius remedium, quam omne aliud remedium me-
le, etiam fortissimum (*).

Sic enumeravi remedia, & varios modos illa exhibendi, quae
novi in lue venerea curanda. Omnia evacuant per varias corporis vi-
minufve. Multa ex iis turbant sanitatem, & vires laedunt. Mihi,
semper placuerunt ista, quae morbum tollere poterant, corpusque re-
babant, dum agerent; licet curatio lenius procederet. Multos qui
curatos a lue drasticis remediis, quae rudi agebant modo, saepe
vitae periculo; sed & ex his plures vidi in morbo immedicabiles
quosdam languisse tota vita ad omnia vitae munera ineptos, sibi
molestos, & odiosos. Ipse, fator, acerrimo remedio mercuriali
mercurio nempe sublimato corrosivo ad curandum luem, illudque
ut tentarent. Verum adeo parca dosi dedi, & tali cura regimin
quam inde quid noxae viderim. Attentus semper eram, si aliquo
rem symptoma, quod merum incutere posset vel minimum tunc
tim vel minui dosin remedii, vel integre seposui, & alia tent
praeceidentibus monui saepius.

Sed nec in America luem veneream aggrediuntur uno quoda

(*) Anton. Storck libellus, quo continentur experimenta &c. pag. 117—1

omendant. Sic enim legitur (p), *lucem venericam*
specificum, aliquod remedium, quod tota substantia
 iusa huic morbo medetur; quum videamus, plurimas
 imas ab Americanis ad hunc morbum debellandum adhi-
 ces in eo conveniunt, ut sint acres, vel amarae, habean-
 tes, vel diaphoreticam; ut ab auctore nominantur in hos
 ymali, corymbiferat multae. Eandem rem confirmat
 (w), cuius ad eandem hanc paragraphum mentionem
 am lues in Europa apparuit, & postea in Hispaniolam,
 nentem missus fuit. Postquam enim de ligno guaiaco di-
 cia: Nec solo hoc ligno Indi curantur: maximi enim sunt
 imque plantarum tenent cognitionem, quarum facultates ad
 plures proficandos effectus experimendo deduce-
 a, uti Sydenhamus (x) optime monet invenitum est immedia-
 tificum, cuius ope sine evacuatione praegressa lues debellari
 nit vel mercurius, vel ligna exsiccatia dicta, specificorum titulo
 nisi exemplis in medium allatis probare qui possit, vel mercu-
 salivatione, vel lignorum decoctum nullo subsequente sudore luis
 ationem quandoque absoluisse. Solutio sublimati corrosivi curat
 alivatione, sed non sine omni evacuatione; quum rarius quidem
 veat, sudores tamen, & urinam moveat crassam, sedimentosam
 quentissime; unde nec hoc remedium absque evacuatione curat. Di-
 antea, validos labores in aere calido cum diasta rigida maci-
 rasse. Luem quandoque, sed & tali sub curatione sudores copiosi ex-
 ur, & corporis pinguedine lues tota consumitur, cui contagium luis
 ere imprimis in praecedentibus probare conatus sum, cum me-
 nime hinc mirum videbitur, satis numerosa inveniri remedia, quae le-
 dirum hunc morbum, & quandoque curant; evacuando nempe, licet a
 etis pro specificis decantentur, plenis buccis, & magno pretio sub ar-
 titulo vendantur credulis. Medici, quibus generoso incoctum pectus
 sto, & salus publica cordi est, non regunt illa, quae norunt utilia
 e spes est, quod plura forte, & cognitis meliora lera docebit dies.
 no a celeberrimo, & fide dignissimo viro accepi, radicem lebeliae, si
 te, & leniter cum aqua pura coquatur, vel & infundatur, dare reme-
 um, quod certo & tuto intra decem, vel ad summum viginti dies luem
 nereant curat. Vacuo ventriculo propinatur hoc decoctum, cuius largior
 os vomitum facit, parcius per alvum purgat, minutor adhuc sudores pro-
 vocat. Est autem lebelia caule erecto, foliis ovato lanceolatis, flori-
 bus lateralibus. Prodrum. florae Leydensis. Linnaci horti. Clifforti. pag. 426.
 Rapunculus Americanus. *Stige dilute caeruleo*. Boerhaave index plantar. tom. I.
 pag. 25. Sed & illud remedium evacuando curat.

§. 1479.

(p) Rerum medicar. novae

(w) Aphoristicae. pag.

Hispaniae thesaur. lib. VI. pag. 200 in notis.

(x) Epistola responsoria secunda, pag. 418.

§. 1479. **T**ophi minuuntur emplastris (1461); vel apertura facta osse abrafo.

Quid tophi sint, dictum fuit ad §. 1456. Solent plerumque curae generali luis venereae cedere. Dictum antea, pertinaces etiam tophos resoluti fuisse, si solutio mercurii sublimati corrosivi, quae interne datur, diluat quadruplo aquae purae, & externe applicetur fomenti instar. Si ne quidem cedant, os suppositum cariosum erit, & discissis integumentis, i curatio adhibenda, de qua dictum in *capitulo de morbis ossium*.



A C H I T I S.

o fere labente seculo decimo septimo, in mediterraneis Britanniae primo, deinde per totum hoc re-
c per omnia Europae borealis loca ortus est mor-
a frequentissimus, qui *rachitis* appellatur.

, qui de industria de hoc morbo scripsit, fuit *Glissonius*
nia Cantabrigienſi medicinae professor, qui testatur (quan-
aliorum relatione diligenti facto examine colligere potuit),
innotuisse primo in Occidentali Angliae parte triginta circi-
a, dum tractatum de *rachitide* scribebat. Quum autem secunda
ractus prodierit anno 1650, & prima hinc citius collegit
Floyer (a), rachitidem morbum in Anglia primo apparuisse
1620. Testatur *Glissonius* (b), quod morbus hic peragraverit
pene australes & occidentales Angliae partes. In septentriona-
Comitatibus multo rarius hic morbus occurrebat, imo vix dum
muniter innotuit in his locis.

morbo impositum fuit in Anglia *the rickets*. Quis primus morbum
ne donaverit, valde incertum est, ut & qua occasione, an casu,
io id factum fuerit.

nen videtur verosimile, quum dorsi spina in hoc morbo, saltem adul-
tale afficiatur, quod morbum spinae dixerint hoc mali genus; *ῥαχίτις* *ῥαχίτις*
& sicuti laterum morbum ac dolorem *πλευρῶν πόνον* & *πόνον* uno voca-
magna expresserunt Graeci medici, sic simili modo *ῥαχίτις* vocatus
morbus, in quo spina toties deformabatur miserrime, & quae vel in
mori primordiis sensim amittebat solitum robur, quo truncus corporis
neri debet in situ erecto imprimis. Aptissimum videbatur hoc nomen,
ad notabilem aliquam conditionem morbi comprehenderet, & satis di-
ctum foret ab aliorum symptomatum & morborum nominibus, simulque
tis facile pronuntiari esset, nec difficulter memoria retinendum. Facile
utem intelligitur, quomodo vocabulum Graecum *ῥαχίτις*, errore vulgaris
pronunciationis in *rickets* mutari poterit; quod nomen adhuc hodie in An-
glia in communi usu est, ut designetur hic morbus.

Postquam *rachitis* in aliis pluribus Europae locis sedem figere coepit, ubi
lin-

(a) *Phyſic or the history of Cold Bathing* pag. 77.
& seq.

(b) De *rachitide* pag.

lingua Anglica verba non erat, vocabatur *hunc morbum* a regione, in qua omnium primo apparuisse credebatur; sicque *morbus Anglicus* plurisque dictus fuit. Quibusdam placuit a symptomate quodam maxime obvio in rachitide nomen desumere, atque ita, quum ossa circa articulos tumeant in hoc morbo, *articulus duplicatus* vocaverunt Germani, *enfants nouez* Galli unde & alii diviserunt rachitidem in *perfectam* & *imperfectam*. Quamdiu ossium epiphyse circa articulos tumeant tantum, & tamen aeger adhuc incedere poterat utcumque, dicebatur rachitis *imperfecta*; ubi vero incessiebat tardior, minus firmus, ita ut facile laberetur, unde perpetuo seceret, & decumbere cupiebant aegri, vocabatur rachitis *perfecta*. Curant saepius habui infantes, quos matres sollicitae dicebant laborare *magnopate*, dum rachitide aegrotabant manifeste. Postea videbimus, in hoc morbo hepatis molem saepissime auctam fuisse, licet nihil vitii ceteroquin hoc viscere deprehenderetur post mortem. Haec sufficiant de variis nominibus.

Glissonius (c), qui hunc morbum, una cum aliis septem medicis Londonensibus, omni cura examinavit, habito cum iisdem consilio de morbo, natura, signis tam diagnosticis, quam prognosticis, ubi singulis symbolam conferebant, conclusit, rachitidem novum morbum esse. Dum omnes infantum & puerorum morbos hactenus descriptos conferebat rachitide, tunc temporis in Anglia grassante, nullum invenit, qui ex hoc morbo conveniret. Quin imo ipsa insoliti mali novitas impulit eos hos medicos, ut unitis viribus rimarentur morbi indolem, sicque possent detegere optimam medendi methodum. Sollicite hinc, & collecta signa morbi incipientis, incrementis descripserunt; consider quomodo, & quibuscum symptomatibus abiret in sanitatem, morte alios morbos; notaverunt, quid inventum fuerit in cadaveribus hoc defunctorum; & ex his omnibus deduxerunt indicationem agendi hoc morbo curando.

Tribus ex his octo medicis, *Glissonio*, *Bate*, *Regemortero*, et provincia, ut in ordinem redigerent illa, quae communibus omnibus probata fuerant, & dein typis evulgarent. Ne autem seque diversitas, dum tres partim diviso labore eidem tractatui incumbere, mutaverunt egregii viri consilium, & soli *Glissonio* commissa fuit, ut prima totius operis stamina pertexeret solus. Sub labore ea conditione, ut reliqui duo symbolam suam ex praehunc affectum observationibus in subtegmen conferrent, & de praestito iudicium dicerent.

Sic simul habetur norma, & pulcrum exemplum, quomodo examinandi sine, & quantum humano generi prodesse possit cordati partium studio, absque invidia cordati medici collima artis unicum, publicam nempe utilitatem. De novitate morbi conveniunt medici, dum quidam in illa fuerunt opinione, ve

ne descriptum, postea a *Glissonio* rachitidem fuisse ad §. 1379 nempe, ubi de variolarum historia a medicis veteribus, & etiam recentioribus, quos leger per illa, quae mihi profutura sperabam ad cognoscendos. Haec excerpta tali ordine in adversariis meis intuitu videre possem, quae unquam de morbo quocumque observaveram. Dum evolvo, quae de rachitide colat hoc morbo nihil excerpterim ex veteribus medicis; unde mihi licebit, non adeo obviam esse rachitidis descriptionem medicorum monumentis, ut ab omnibus facile observetur. tem huius morbi evincere conatur argumentis (d) eruditissimo capitulo, in quo collecta habentur praecipua argumenta novitatem rachitidis impugnauerunt, quae certe legi me-

t, omnia praecipua saltem symptomata huius morbi aucta fuisse vel separatim, vel simul unita. Sed certe symptomata definiunt morbum; separata possunt adesse in aliis hominibus definitus morbus non adsit in illis. Ut morbus determinetur, drome symptomatum huius morbi, non vero unum aut alterum

imprimis, egregium *Zeriani* (e) credidisse, reliquos medicos, i de rachitide conficiendo una cum *Glissonio* operam dederant, isse, quod rachitis novus morbus foret, & ideo noluisse subscribere, nisi prius indicassent, se aliter sentire quam *Glissonium*, quia longe magis intricata erat, quam ille quidem credebat. In notis auctor praefatio, quae huic opusculo praefigitur. Legi, relegi hanc nem, nec diversas has opiniones octo medicorum detegere potui. detor ex incuria error subrepisse.

conatur idem auctor (f) probare, quod *Glissonius* sibi ipse contrarius. Sed, si attente legantur loca citata, patebit, quod tantum miretur potuisse se invenire primum huius nominis auctorem. Certe nihil insoliti si morbo incognito, & nondum viso nomen imponatur in illis locis, ubi apparet, quod deinde retinetur, dum ad alia loca idem malum proditur. Admodum probabile videtur nomen illud a vulgo impositum fuisse, cum nullus ante *Glissonium*, quantum novi, de hoc morbo scripserit. Nec vile certe est, post triginta annos elapsos invenire primum huius nominis auctorem, vel aegrotum, cui primum nomen morbi accommodatum fuit, *Glissonius* (g) ipse ratione huius difficultatis dat: *Populus* nomen morbi quasi re graviter. *Gessa* acquiescit, neque ulterius se sollicitum vult de nominis auctore, aut re ipsa. Ut morbi huius maior antiquitas demonstretur, deberet demonstrari vocabulum illud *rickets* ante epocham rachitidis in Anglia.

(d) Zeriani della cura di rachitide pag. 15.

(e) Ibidem pag. 30.
Tom. V. pars II.

(f) Ibidem pag. 31.

(g) De rachitide pag. 4.

glia usitatum fuisse, vel saltem dari ratio, quare morbo iam dudum cognito novum & insolitum nomen vulgus imposuerit.

Sed & postea in aliis regionibus, dum observabatur rachitis, novum prae riter nomen datum fuit, sive a regione, ubi primo apparuit, sive ab aliquo quodam morbi symptomate manifesto; uti paullo ante dictum fuit.

Postquam Londini observari coepit rachitis, Londinenses medici non ibiaverunt de novitate insoliti mali, sed collata opera plures una cum Gersonio hoc pensum sibi sumserunt, ut indagarent novi morbi indolem. Hi non iudicaverunt ex auditu aliorum, sed propriis oculis viderunt morbi cursum totum, rimati sunt in cadaveribus hoc morbo defunctorum illas rationes, quae morbi tempore factae in sensus incurrerant manifeste. Quum haec omnia non observavissent antea in ullo alio morbo, conclusit rachitidem esse novum morbum, cuius historiam scribere, dum proponere indagaverunt merito, in quo loco primo observatus fuerit morbus, & nam fuerit illius nomen. Haec ex aliorum relatione se collegisse fatentur candidè; reliquorum omnium fuerunt testes oculati, idonei, & attentè

Allegat Zeviani (b) magnae in praxi medica auctoritatis Sydenhami (i), ac si ille cum tabe infantum, quae febres autumnales cum continuas intermittentes sequitur, confudisset, imò & iisdem remediis mansisset. Tres enim infantum post diurnas febres autumnales inflati, tumores duri evadunt; saepe etiam tussis, aliasque tabidorum symptomata nascuntur sed mox addit, quae rachitidem plane mentiantur. Hunc infantum purgationibus per plures dies repetitis aggrediebatur, sed moderatè iussit, inungi abdomen penetrabili unguento. Quum autem abdominis tumor saepe tumeat, & morbus ille quandoque in tabem definit ratio similitudinis inter binos hos morbos, licet a se mutuo distincti. Addit Sydenhamus, se quam plurimos infantes, etiam vera rachitide rantes, curasse eadem hac methodo; purgantia autem post diurnas autumnales locum habere, modo prudenter adhibeantur, & abdomen tumeat, nemo dubitat. At in rachitide, dum non semper in hoc talis saburrae copia in primis viis adest, sed turgente hepate intestinis, tumet in his abdomen, longe minus purgantibus indiget hoc morbo laborant. Audiamus ipsum Sydenhamum (k) in alicuius sequentia. Quoad rachitidem hoc notandum, quod in tumore qui ventres infantum post longas intermittentes febres olim infecta rachitidi non multum abluentes, repetita catharsis omnino videtur quum ante usum corticis Peruviani istae febres in diurnitatem locum tunderent, ac proinde sedimentum deponerent, huiusmodi tumorum ideo non nisi purgatione repetita abigi poterat. Attamen in rachitide cathartica locum non habens, nisi ut semel vel bis ut plurimum addatur, antequam usum alterantium aggrediatur &c. Denique hoc diligenter advertendum volo, quum non paucos infantes atque pueri

(b) De rachitide pag. 33.
epistol. pag. 311.

(i) Sect. I cap. V pag. 121.

forte tumor ventris: inuitaverat): incertum fuisse sa-

Sydenhamum non confudisse rachitidem cum tabe infan-
nas febres autumnales, nec eadem methodo curasse bi-
et quid commune videantur habere inter se, tumorem

c quod uterque morbus quandoque in tabem desinat.

ibium superesse possit, notanda sunt sequentia. Clarissimus

n dilectissimi filii, medicinae doctoris, conscripserat pro-

m praxeos medicae, quem & egregio medico usurpan-

a humanitate; qui, ne labili memoria exciderent utilissima

pta in arte medica, typis mandavit, & viginti circiter

it imprimi, ut amicis quoque inferviret. Quum autem po-

is. *curiosus* inveniretur idem ille tractatus, sed inepta mole

um hunc elenchum non tantum amicis, sed & publico com-

de postea omnibus eius operibus annexus fuit ille tractatus.

atur descriptio rachitidis (1), quae in hoc tractatu habetur

corporis puerorum, quibus abdomen post febres longas autu-

ruit, ingens occurrit diversitas, & evidentissime patebit, binos

esse omnino diversos. Dein & patet, *Sydenhamum* non eandem

se curationem in utroque malo. Leguntur enim ibi sequentia: In

nsantium ventres occupantibus, ab evacuationibus nimis procedentibus,

viscera herbis corroborantibus confortantur, ut in vera rachitide,

axillae etiam utraeque inungantur, at non atius -

am ad *Boottium* attinet, inveni (m): quidem *Arnoldum Boottium*

tractatum de *affectionibus* omissis editum Londini 1649 in 12^o; sed

ulos morborum, de quibus egit, non inveni rachitidem, nec hunc

m reperire potui, dum haec scriberem. Quum autem secunda editio

ii de hoc morbo fuerit anni 1650, credibile est, hunc auctorem vi-

primam editionem *Glissonii*. Dicitur & ille *Boottii* tractatus editus fuisse

um *Petri Borelli* historiarum & observationum medicarum centuriis iv

col. & Lips. 1676, sed mala fortuna *Borelli* editionem illam tantum

dam ad manus, quae Parisiis anno 1656 prodiit, in qua ille tractatus

ii non invenitur. Hinc illud testimonium de rachitide prius in Galliis

Siliari, antequam hunc morbum in Anglia observavit *Glissonius*, uti asse-

Leviani (n), in medio relinquo, quum in loco citato tantum legantur

quentia: Morbum non in Anglia dumtaxat & Hybernia, sed & in aliis quo-

ae regionibus grassari verisimile est &c. *Boot. de affectionibus* omissis cap. 12.

ibi saltem nulla sic mentio Galliae.

Illud autem testimonium, quod ex *Boyle* (o) adducitur, nullo modo docet,

quod negaverit, rachitidem esse morbum novum, sed tantum, quod nihil hic

affirmare vel negare voluerit. Praeterea egregius ille vir nec medicus erat, &

per

(1) Differat. epistol. pag. 778, 779.
Abrahamo Herckelino
(*) De utero p. 88.

(m) *Lindenius renovatus* a *Georgio*
(n) *De rachitide* pag. 33 & in notis.

per transfennam - de hoc morbo loquitur, ut commendet utilitatem *formicolosbaris* in hoc morbo curando; de quo remedio postea dicitur.

Mirum certe videri debet, Anglos medicos solos obstupuisse novitate tum rachitidem videbant, quam certe non perfunctorie examinaverunt; de quidam ex Germanis medicis audacter asseriebant, nullos novos nasci morbos, sed omnes humani generis calamitates veteribus non solum utique inuisse, sed iam ante Hippocratis tempora mortale hominum genus affixisse duntur simul ac demonstrantur, licet aliis atque diversis nominibus indigant. (p). Novi quidem, quosdam medicos in hac opinione fuisse, sed demonstrationem ignoro. Nec scio, ante Hippocratis tempora existisse vetusta menta, quae ad nos pervenerunt, ex quibus probari posset, omnes quos sera posteritas vidit, etiam in remotissima antiquitate cognitos fuisse. Ubi de variolis, morbis epidemicis, lue venerea egi, talia credo me argumenta, quae contrarium probant.

Dum autem celeberrimus Boërhaavius de hoc morbo scripsit, non revit de rachitidis novitate sententiam, quae iam fere exulabat (q); ferimur apud Batavos & alibi medici idem credebant. Verum quidem quod medio fere labente seculo decimo sexto statuat, rachitidem apparet novi, hoc per errorem factum fuisse, & ideo in textu correxi. haec est: dum notis numeralibus exprimitur seculum, manet nomen elapsi toto decursu seculi sequentis, & hinc facilis error nascitur, dicitur Romanis cifrae Arabum describuntur. Novi enim certo, optimus ceptorem circa epocham rachitidis eiusdem cum Glissonio fuisse seque neque hoc tempus rachitidis voluisse propinquius reddere origini lue reae, ut credidit egregius Zeviani (r), quia in historia huius morbi verat §. 1481, illum magis infestum esse his, quorum parentes tunc reae & iteratis gonorrhoeis multum obnoxii fuerant. Sed notari quod §. 1488, ubi causam proximam rachitidis describit, non affert causam proximam rachitidis concurrere luem veneream, sed dicit proponat sequentia: *Latente forte leni labe venerea permixta*. De hac dicendum erit. Nunc pergendum ad reliqua.

Tota autem lis illa componeretur statim, si constaret antiquior descripsisse morbum, licet alio nomine indigitatum, qui rachitidis mata haberet illa, quae sollicita observatione huius morbi per medicos facta hodie cognita & descripta habentur illo ordine, tum sequuntur in morbo incipiente, crescente, adulto. Sed quod hoc haecenus demonstratum non fuit.

Egregius medicus Navier (s) in pulchro tractatu de morbo ossium tale exemplum adfert de auctore medico, qui circiter ante epocham dictam rachitidis scripsit, & hunc morbum sic

(p) Zeviani de rachitide pag. 34 in notis.

(r) Ibidem pag. 36.
des os. pag. 24.

(s) Observat. theor. & praeq. si

abium superesse possit, quod illum cognoverit, licet
t, nec aliud quoddam singulare nomen ipsi dederit.
Iustus Bononienſis medicus ſcripſit medicinales epiſtolas,
Iuſtus Theodoſius poſt patris obitum collegit, & *Cardinali*
vixit nonis aprilis 1541. Prodierunt in lucem Baſileae
iorem menſe martio 1554. Epiſtola autem quadrageſima
te habet ſequentia: Pro puerò ex caſſi & hum. multis
ante conſilium. En morbi deſcriptionem: Eius tempera-
t frigidum & humidum, ex quo color totius cutis pallidus
& cachexiam tendere videtur, & multae in eo cruditates
us eſt debilitas virtutis motuæ, ita ut, quum menſium iam
on poſſet ullo modo ſe movere, nec ſtare, & quum in ulnis a
vix caput poteſt erectum tenere. Symptoma aliud omnium ſae-
tebrarum trium in coſtis notis ad exteriora declinatio, & eſt
is, & in modum arcus coſtae etiam incurvari videntur. Si quis
cum rachitidis ſignis diagnosticis, quæ §. 1485, 1486, 1487
videbit facile, magnam eſſe horum ſignorum inter ſe diverſi-
a ſit mentio in textu hoc tumoris abdominis, protuberantiae
nduras, nec praematuri ingenii acuminis, nec appetitus & di-
nae ſaris &c. Imo coſtas in arcus incurvari in hoc puero dici-
n rachitide thorax ad latera compreſſus ſit, & ſternum in acumen
adoſis coſtarum extremis.
dores medicos obſervaviſſe cachecticos pueros, & gibboſos, & de-
no dubitavit unquam, ſed illos noviſſe morbum, quem hodie ra-
vocamus, haſtenus demonſtrarum non eſt. Quum autem plurima
videantur pro morbi huius novitate, liceat mihi hanc opinionem
donec meliora & certiora edoctus fuerim.

81. Infantibus ille nunquam connatus, raro ante nonum aeta-
tis menſem, vix unquam poſt biennium vitae, ſed
hoc medio frequens accidit.

achitis vel nunquam, vel admodum raro connaſcitur, nec memini
unquam vidiffſe recens natum, qui hoc morbo iam laborabat. Licet enim
centum vitia, ut paullo poſt dicetur, prolibus talem corporis diſpoſitio-
nem concilient, ut facilius hoc morbo corripiantur, rariffime tamen accidit,
& rachitis in actum erumpat ante foetus partum. Quum autem Gliffonius,
& alii medici Londinenſes invigilarent huic morbo obſervando, ſcripſit ſe-
quentia (u): Teſtatur aliquis noſtrum, ſe ſemel, & ſemel tantum vidiffſe
puerum recens natum hoc morbo aſſectum. Atque in eo ſpina dorſi, & collum.
adco debilia; ut nulla ratione valuerint grandiuſculum caput ſuſtinere. Obiit: hic

(1) Theodoſii epiſt. medic.
pag. 172.

hinc intra tres menses post partum. Quibus patet, cum gravissime fuisse affectum. Unde & postea, ubi de prognosticis rachitidis signis agit (v), statuit absolute sequentia: Morbus hic proprie natus, sive qui ante partum invadit, periculosissimus est, & rarissime si unquam in sanitatem terminatur. Quo citius a partu, hoc est, quo iuniores, hic morbus invadit, eo ceteris paribus periculosior est; tanto enim debiliores sunt vires. Similiter aetate grandiores iuniorum pedibus incedentes non incedentibus facilius curantur.

In opere posthumo celebris *du Verney* (x) statuitur, rachitidis morbum plerumque invadere quinto vel sexto a nativitate mense. Non quidem non potest, quod hoc tempore quandoque incipientis morbi vestigia observantur, sed plerumque serius morbus incipit, imo, uti ad §. 1486 dicitur, satis frequenter morbus pueros aggreditur, postquam iam coeperint iulare, & signum morbi habetur fere primum, quod incessus in his fit dior & infirmior, donec aucto malo debilitati perpetuo decumbere coeant. Si nulla signa rachitidis se manifestaverint ante vitae biennium, bi huius periculum evaserunt plerumque, & ossa iam adeo solida evadunt, ut corporis pondus sustinere possint, absque eo quod incurvantur. Accedit, quod agiles maxime sint infantes hoc aetatis tempore, & tuo fere corpus moveant, nisi a severis custodibus quiescere cogantur, maior firmitas & robur corpori conciliatur. Unde etiam ad curam gestationes, concussiones, oscillationes, unctiones, frictiones committuntur, donec propriis viribus corpus movere possint; de quibus ad §. 1485.

§. 1482. **M**axime autem infestus habetur proli, cuius laxa & debili conditione corporis, otiosi, opipara mensa, cibis pinguibus, saccharatis, paucio pane, cissimis, & aqua multa calida usi, morbis chronicis, venete exhausti, tibi inprimis venereae, & iteratis gonorrhoeae tum obnoxii, effoetam ferme genituram impenderunt generis.

Dum medici omni cura examinabant omnia, quae morbum fuerant, ut indagarent morbi causas, viderunt, illos infantes rachiticos fieri, quotum parentes debiliore constitutionis erant, otio languidam vitam trahebant vix corpus moventes, dum si mensa quotidie invitabat, ut ultra satietatem manducarent. Ut (y) statuit, morbum hunc potissimum infestare generosorum cunctorum, qui molliter vivunt, deinde eorum, qui sedentariam & l

(v) Glissonius de rachitide cap. XXIII pag. 285.
des os tom. II livre III chap. I pag. 289.
pag. 286.

(x) Tr
(y) De rac

inas eorum, qui mediocres sunt fortunae, & qui labo-
uos sibi & suis necessaria ad vitam sustentandam
ae enim plebis infantes saepius rachitide afficiuntur,
is minus congruo victu ob penuriam uti coguntur,
das domunculas inhabitant non satis defensi ab aëris
morbo nocere quam maxime postea dicitur.

venatu, equitatione, pilae lusu, aliisque corporis exer-
 cient ab illis malis, quae lauta convivio & quotidianas fere
 in sequi solent; sed in amabili sexu praecipue a tali
 rvanur omnia, dum & longiori somno indulgere simul
 riam vitam agunt inerti torpentes otio. Sapiens I. yeur-
 sione ad §. 1291 notavi, futurae progeniei curam habens
 ora virginum cursu, luctu, discoruna & telorum iactu exer-
 octus radix validum in valentibus exordium sument germina-
 cavet, ne molles & delicatulae mulieres, licet robustis &
 ir viris, debilem & morbosam prolem in lucem ederent.

An saccharum adeo noxium sit sanitati, ut quidam volue-
 rubitari potest. Celeberrimus Boërhaavius (z) habet sequentia
 oc corpore, quod vix sibi simile habet. Saccharum in corpore
 rali latice dilutum slixivum praebet saponaceum, quod oleosa,
 itae adiuvante, dissolvitur; hinc pituitam nunquam generat, sed dissol-
 em auget, aut in illam convertitur, sed aperit, attenuat, dividit.
 ven olea nimis solvendo macilentiam inducere potest; ut & attenua-
 i debilitatem producit, & laxitatem nimiam. Quare & rachitidis &
 nocuisse visum. Paulo ante monuerat (a): Sine culpa male audit
 n quasi noceres hominum saluti, quum nunquam hoc probatum fuerit.
 iam vim solventem forte culpari posset, si nimia eius copia sume-
 Memini me legisse olim de Bernardo Costero (b), egregio iuriscon-
 sultavo, qui sedentariam vitam egit, sed simul sobrie admodum vixit;
 autem in cibo & potu amavit adeo, ut tantam copiam sacchari
 serit solus, quae quinque vel sex aliis hominibus sufficeret, nec ra-
 inde unquam nauseam sensit, vel biliosas eructationes, nec morbis ob-
 us vixit, sed ultra nonagesimum annum, senio exhaustus non morbo,
 esto mortuus inventus fuit. Plura exempla hominum, qui sacchari ac-
 illis ingenti copia usi fuerant, alibi (c) habentur, & tamen longaevi sa-
 que fuerunt.

Salte risit optima mater morosum medicum, qui praescripserat mixturam
 aucarum unciarum, quae unciam unam syrupi continebat, dum simul fe-
 ceto vultu monuerat, ne vel minimam sacchari miculam daret aegrotulo,
 si filium servaturo vellet. Non meminerat medicus, in omnibus syrupis offi-
 cinalibus duas tertias partes adesse sacchari.

Mul-

(1) Elem. chemiae tom. II pag. 160.
 Verhal de in de V.
 Londra, 1791 in 8.

(a) Ibidem pag. 159.

(c) Sarc de sacchato & lapid. Bezoar.

Multo evidentior noxa sanitatis percipitur in illis, qui perpetuis aequalibus potibus corpus debilitant; qualis mos pessimus apud Batavos invaluit; du una, quum vitae sedentariae indulgent, tota die potibus Africis, ex bac Caffae aut solis theae paratis abutuntur. Vidi tales, qui toto anno aquam frigidam, nec cerevisiam, nec vinum potabant, imprimis dum cebris olim apud Batavos medicus *Bontekoe*, & eius sequaces inculcabant omnibus, nullum praestantius esse in morbis remedium, nullum efficax sanitatis conservandae praesidium, quam si corporis humoribus, potibus pidis copiosis, conciliaretur maxima fluiditas, ut liberrime per omnia moveri possent. Unde chlorosis frequentissima, abortus frequentes, fluxus, languores puerperarum &c. toties fastidium pariebant medicis, vix curatae mulieres de novo his potibus tepidis indulgebant, sicque divam patiebantur frequenter. Quum autem saccharum male audiret multos, novi plures, qui omnino ab hoc abstinebant, vel saltem quam eissime utebantur.

Morbis chronicis, venere, aetate exhausti. Tales parentes debiles, rufos, languidos infantes gignere, nemo dubitat. Unde inter signa saepe optimae numeratur (d), si quis natus sit parentibus sanis, vegetis, aetatis, rara sed fervida venere utentibus. *Lycurgus*, qui validis exercitiis firmabat virginum corpora, antequam viris iungerentur, voluit, ut nuptii non cohabitarent, sed clam & furtiva quasi venere uterentur adeoque rara & fervida. Talem curam gessit robustae & bellicosae ratis. Facile patet, qualis proles expectanda sit a decrepitis, uti & illis, qui in ipso aetatis vigore libidine ac perditissimo vivendi genere hausti coniugia ambiunt, dum ante trigésimum annum iam imbellissimas virgines turpiter decipiunt.

Tabi imprimis venereae &c. Tota historia luis venereae, de qua denti capitulo fusius actum fuit, docuit, quam multiplicia mala hoc morbo contingant partibus genitalibus utriusque sexus; si iatur, humorem genitalem foedo rabo venereo allui, partemque coram illo simul abripi, misceri, facile intelligitur, qualis progenies a rentibus expectare poterit respublica. Certum est, lue venerea i utero materno prodire infantes saepius, qui nutricibus traditi infestas, illae maritos; cuius calamitatis exempla plura recensita su vero tales infantes citius aut peius rachitide afficiantur, quam a videtur penitus constare. Rachitis enim, uti postea patebit, div venerea morbus est; qui & facilius curatur, & longe aliam rachitide requirit, quam lues, qua infecti nascuntur infantes, non rachitide; quae vel nunquam, vel rarissime a nativitate incipit, postea tempore se manifestare solet. Luei congenitae rachitides posse, nullus dubito; sed & certus sum, sanissimos, dum nascantur rachitide correptos fuisse, licet nullum omnino nec in

(d) H. Boerhaave institut. medic. §. 885, 1.

in corpore, nec in parentibus ullum signum praesentiretur.

lues & frequentes gonorrhoeae sic enervare quandoque apparatus, ut effoetam ferme genituram impendant, beris, videtur concludi posse, sed nullo modo certum pendeat origo rachitidis. Praeterea lues venerea integro rachitide. Forte hoc verum esse posset, vitia parentum, censita, posse sic disponere infantes, ut in rachitidem in-vioribus causis, quas firmiore corpore donati proprio ro-tuissent.

m ad rachitidem prolium faciat laxa, debilis, mucosa ma-
ispositio, docet sequens observatio (e). Agebat celebris
net (f), de fluore albo simplici, nulla acrimonia venerea
qualis in laxis, mollibus, otiosis, & opipara mensa fruendi-
currit. Monebat, tales mulieres, nisi integre curentur, ante-
facile abortiri, si conceperint. Dum felici arte cavebatur
ut foetus ad maturitatem perveniret, notavit sequentia: *Tales
ut parvum plerumque infantes crassos, pingues, robustos, & bi sa-
per plures menses; postea vero emaciantur, lassae fiunt & membra
uni; tandem subsequitur pessima rachitis, quae raro hic usque sa-*

Ubi vero nutricem iisdem affectam malis nactus est,
magis augetur infanti praecoci incremento morbus.

m recens nati infantes solo fere lacte ex uberibus ducto vivant, pa-
cile, quod si victum praebat infanti nutrix, in qua similis vitia oc-
nt, ac praecedenti paragrapho enumerantur, tunc potius mutanda so-
utrix, ut ingruenti malo obex ponatur. Quamvis autem semper hor-
soleam matres, ut propria largiantur prolium ubera, si sanae fuerint
e, tamen in hoc casu sanae & robustae feminae lac praeferebat mater,
si illa inerti otio vitam ducat, debilis sit corpore, & a levi etiam ani-
affectu turbetur tota. Saepius rachitis nobilium cunas aggreditur; hinc
& pluribus oblati optimam eligere poterit peritus & prudens medicus; de
qua re dictum fuit in *capitulo de morbis infantum*. Sed quum ut plurimum
tardius rachitis ingruere soleat, saepius ablactandi tempus adest, antequam
rachitis incipiens magnum progressum fecerit, etenim satis lente incedit,
& in initio, a plebe saltem, non tam cito cognoscitur.

§. 1484

(e) Anton. Surck. 209. *medic. secund.* pag. 217.

(f) *Ibidem* pag. 217.

§. 1484. **I**nprimis si frigidius, humidiusque tractatur; aquosis, mucosis, crudis horaeis, piscibus, farinosis azymis, & saccharatis pascitur; febre autumnali intermittente, morbo chronice vel acuto diu laboravit; a scabie, herpete, ulceribus suppressis male curatus; balneo, fotu, linimentis, unguentis, vaporibus humidis enervatus; perpetuae quieti in sella perforata addictus; dato inferius corpore.

Consideranda iam sunt illa, quae praecedere observantur rachitidem impientem saepius, & illum morbum iam praesentem augent insigniter.

Si *frigidus humidiusque tractatur*. Nimis humidus aer laxat, solvit, biliat fibras; ob perpetuam respirationem talis aer pulmones afficit, pulmonum retinet, auget, accumulatur, & illorum perspirationem pro (g); quum autem cellulae pulmonum aëreae, si evolutae forent, totam poris superficiem extensione superarent multum, hinc magna admodum pulmonem perspiratio. Si iam humido aëri simul frigus se iungat, & colluvies metuendae sunt & in pulmone, & in ipsis thoracis cavi antea, dum de pectoris hydropse agebatur, pluribus dictum fuit. Haec detur una ex causis esse, quare toties pectoris viria comitentur rachitidem.

Unde etiam fit, ut rachitis non tantum generosiorum cunas, sed imperum tabernas pulset, dum inopia pressi nec cubicula calefacere lintea infantum debito modo exsiccare possunt. Si iam miseri tales humidis & uliginosis habitare cogantur, augmentum malorum & Postea, ubi de cura huius morbi agetur, patebit, quantum proficit & siccus: si enim humiditati accedat aestus, in putredinem on tendunt, & vix non certa perniciēs imminet.

Aquosis, mucosis, crudis horaeis &c. Omnia enim haec laxant, & ultimo effectu enervant actionem viscerum primae coctionis. S ter, vitiosum talem victum tantum locum habere posse in adultio pueris, quum iunioribus lac nutricis sufficiat. Solent quidem mulie etentibus infantibus, imprimis si famelici fuerint, dare subinde ex farina & lacte, imo quandoque misellos infarciant, dum quetum infantum oblata pulicula sedare tentant. Dum autem farin non attenuatur per coeptam fermentationem, ut in pane confic solet, brevi totum abdomen glutine collecto infarctum tumet, rime languent infantes. Piscium usus damnatur imprimis ideo, & bilioribus naturam suam sequantur, & facile putrescant. Praet ribus piscibus copia pinguis olei adest, quod facile rancescens, ditum insigniter nocere poterit.

De sacchari usu ad §. 1482 dictum fuit. Notavit tamen *Gloss*

(g) H. Boërhaave instit. medic. §. 748.

(h) De rachitide cap. X.

3. hoc morbo laborantes dulcia, ut syropos, eum bella-
 aut melle condita, quae aliis pueris in deliciis esse so-
 care videtur, an forte haec illis noxia sint; quod hu-
 maturatissima sacchari solutio, syrupus nempe, lentorem
 addatur quarta tantum aquae pars, illico diffluit len-
 ti dictum fuit, saccharum solvit atque attenuat, non in-

nte autumnali &c. Talia mala debilitando iuniorum cor-
 dem illos disponere posse, videtur admodum probabile;
 medicos induxisse, ut crediderint, rachitidem non esse an-
 vis morbis, sed semper genus humanum infestasse, licet alio
 post alios morbos chronicos, & post febres diuturnas abdo-
 mus tumere observetur, quod idem rachiticis pueris solemne est.
 §. 1480 pluribus demonstrare conatus fui, optimum in digno-
 is iudicem Sydenhamum multum discriminis posuisse inter ventris
 si febres longas in iunioribus sequi solet, & illum, qui rachiti-
 tur. Monet enim de hac re sequentia (i): Observatu non indi-
 quod, quum febres autumnales teneram aetatem diu cruciarint, nulla
 dem abigendi, donec abdominis regio, circa lienem praecipue, indu-
 tumescit: occoperit: iisdem enim gradibus, quibus hoc symptoma su-
 febris etiam fugam meditatur. Neque forte ex meliori prognostico
 orbem hunc brevi abiturum dixeris, quam si sedula observatione subori-
 ptoma perspexeris. Simul monet, dum febres autumnales praedomi-
 ntinent, tunc tumores illi tangentis digitum non aliter feriant, quam si
 am aliquam continerent in scirrhum induratum, quum qui aliis annis simili
 reprobata contingit, tactum ita afficit, ac si tanto tantum feres hypochondrio-
 a subiectis statibus. Unde etiam in compendio, quod in usum filii sui
 sci scripsit Sydenhamus (k), dum enumerat rachitidis signa diagnostica,
 ur: Abdominis repletio, hypochondriorum tensio.

scabie, herpese, ulceribus suppressis male curatus. In iunioribus saepius
 is eroditur acri sero; & frequentius sic afficitur cutis capillata capitis,
 ae incipit cum pruritu humescere; unde perpetuo caput affricant pulvinari-
 lecti, vel aliis obviis. Quum in initio talis mali subacidus satis nauseo-
 odor percipitur, hinc voluerunt quidam tales cutis eruptiones dictas
 isse acres. Postea incipit rubescere cutis, & granulosa fieri, tunc voca-
 erunt herpetem miliarum; quia & proserpit malum, & ex cute quasi grana
 milii prominent. Vocaverunt alii herpetem ficosum; quia, uti in sicu difficilia
 apparent semina parva rotunda, sic & in cute talia tubercula. Augetur tunc
 seri effluxus, quod in foedas crustas brevi concrefcit, quae aliquando satis
 densae sunt, pluribus foraminibus pertusae sunt, & lentiori iam humido
 rantium permittunt adhuc utrumque; sed illud crustae undique haerere inci-
 pit, illiusque crassitiem auget; tandem sub his crustis serum ex cute prorump-
 pens colligitur, putrescit, cutim erodit, haecque in ulcera profunda degene-
 rat.

(i) See, l. cap. V. pg. 121, 122.

(k) Ibidem pag. 220.

rat, quae sanie acrem foetidissimam plorant, & uti tinea vestem, sic cutis ichor destruit; unde & *tinea* solet vocari. Alia occasione ad § 586 edixi quod servaverim bregmatis ossa infantis erosa penitus ab hac sanie, quod licet mundata, eundem foetorem pluribus adhuc mensibus spirabant, & intolerabilis omnibus videbatur, dum miser infans viveret.

Omnibus notum est, quam difficilis cura sit huius mali, ubi ad illum dum pervenerit, ut ipsa capitis ossa afficere iam coeperit, & quam funestus effectus metuendi sint, si imprudenter acris huius ichoris effluxus supprimatur.

Imprimis hoc nocuisse iunioribus, qui ad rachitidem p[ro]p[ri]am erant, test Glissonius (1). Ad haec, quod intempestivam impetiginis, aut scabiei suppressionem sequatur, ut frequenter observavimus, quando, rursus erumpente scabie, atque pruritu excitato, indeque aucto in externis membris calore, tales p[er] facile restitutos vidimus. Quod & postea confirmat alio loco (m), ubi prognostica colligit: *Scabies, & pustulae in cute, pruritufue huic morbo venientes ad curam eiusdem multum conserunt.*

Balneo, s[ol]u, linimentis, unguentis &c. Patebit ex sequentibus, in t[er]m[in]e omnia solida corporis emolliiri, flaccescere, ne quidem ossibus exceptis, dum simul fluida degenerant in cacochymiam inertem, mucosam frigidam. Verum omnia hic recensita in textu, si diu continentur, sani infantis flaccidissimum reddunt, & enervant, adeoque talem dispo[n]tionem inducunt, qui morbo huic favet, & si haec iam addit in corpore traria his prodesse; aërem nempe siccum, & calidiusculum, veste calefacientes, frictiones siccas &c.

Perpetuae quieti in sella perforata &c. Nihil magis noxium est rebus, uti & infantibus ad hunc morbum dispositis, quam si perpetuo in sella perforata sedere cogantur. Obtenet hic mos in pluribus locis, p[ar]t[ic]ulariter apud plebem, cui res angustior domi. Commodum hoc matrem sic domesticis laboribus operam dare possunt, & reliquae famulae r[ati]onem habere, simulque cavetur, ne urina, & fecibus alvinis totum corpus linthea. In hunc finem nudato inferiori corpore imponuntur sellae, & dum simul omnis ambitus huius machinae undique clausus est, arceatur a nudis partibus. Truncus corporis per superiorem partem ginatae tabulae cum artubus superioribus, & capite eminet; tabulae tur crepundia, ut sine taedio sic cistulae inclusus infans maneat perpetuo supponitur, ne frigescent infantes. Sic inferior trunci pars cum artubus ex corpore infantis, eiusque urina, & fecibus accumulat in quod sellae perforatae supponitur. Quum autem rachitis vel in infante assiduam sedendi voluntatem faciat, per integrum fere diem in sella sedent quietissimi, &c. dum inde eximuntur, tetra nephitis undique

(1). De rachitide cap. V, pag. 36.

(m) Ibidem cap. XXIII, num. 17

are debent miselli. Inde pater facile, omnia mala vel rachiticis pueris multum augeri.

oscitur morbus hic incipiens in his, qui nondum indunt, 1 ab aetate, 2 a causis praegressis, 3 a frasi simili malo capitis, 4 a tumore flaccido capitis, & laxa, 6 a tumore abdominis, 7 a macilentia reli, 4, imprimis muscutorum, 8 a protuberantia epiphysion adii, ulnae, humeri, genu, tibiae, fibulae, 9 a mriarum, & venarum iugularium, dum reliquae decrefcunt.

t indagentur illa signa, quae demonstrant, morbum incipere, & efficax medela adhiberi possit, ne morbus pergat increis enim paribus eo facilius morbi sanantur, quo minus invalue. Quum autem, uti ad §. 1481 dictum fuit, diverso vitae orbus incipiat, hinc primo agetur de signis rachitidis incipientis as, qui nondum incedunt.

ac re iam dictum fuit.

ilae haftenus enumeratae fuerunt, tam quae in parentibus, & nu-

bservari potuerunt, quam quae in ipso infante occurrebant.

isputatione medica, quam *Argentorati* anno 1754 habuit egregius

is *Buchner* de rachitide perfecta, & imperfecta legitur (n) de un-

prolibus rachiticis genitis ab eadem matre, quae scrophulosa erat, &

agesimo aetatis anno facie vetulam, & effoetam mentiebatu ita, ut

etur medicus illam de mensium anomalia conquerentem. Saepius con-

t, plures in eadem familia rachitide laborare, licet non omnes, uti in

, hoc casu contigit. Quum autem pater & ante, & quamdiu genuit,

oncusae semper sanitatis fuerit, matris morbus scrophulosus solus inter

usas praedisponentes (vide §. 1482) poterit recenseri; cui tribui posset

umerosae prolis morbus. De reliquis enim causis eodem loco recensitis nul-

a potest esse suspicio facile, quum aerumnosam vitam egerint hi coniuges,

inter illos numerandi, quos vitam merendi difficultas conterit, & consumit.

Tales casus non sine aliqua ratione suspicionem fecerunt, an non per con-

tagium ex uno in alium transfret rachitis. Morbus enim ille, veteribus non

descriptus, occidentales Angliae partes invasit primo, & intra paucos an-

nos per totam Angliam, dein & per alias regiones dispersus fuit.

Alia occasione ad §. 1382 notavi, morbos posse nasci in homine a causis

manifestis, quarum causarum illi morbi effectus sint; & tamen per hos mor-

bos sic mutari corpus hominis aegri, ut per contagium iisdem morbis inficiat

alios homines, qui non expositi fuerant causis illis manifestis, a quibus ille aeger

morbum sibi contraxerat. Contagium ergo nascitur in humano corpore illa

tem-

(*) Disputat. ad morbos, histor. opera Halleri tom. VI, pag. 283.

tempore, dum morbus adest absque contagio natus, & per hoc contagium natum semel latissime morbus disseminari poterit. Pluribus eodem in loco hanc rem deducere conatus fui.

Forte & contagii in rachitide suspicionem possent augere illa, quae sequuntur. Celebris artis chirurgicae professor (v) Florentiae dissecuit cadaver nobilis pueri biennalis rachitide mortui, & remoto sterno invenit totum pulmonem tectum lamellis albis, figurae irregularis, magnitudine monetae (*ungulio*), substantiae subpolyposae, laxae adhaerentis pulmoni, itaque quaedam ex his lamellis sponte ceciderint in cavum thoracis.

Celebris in arte nostra vir, & utilissimis observationibus notus (p) invenit in cadaveribus illorum, qui perierant ex febribus contagiosis, in hoc, illo corporis cavo largam puris collectionem. In uno cadavere hominis, undecima febris flavae die mortuus erat, in abdomine nihil praeternaturum invenit, nisi quod bilis fuerit utcumque spissior, & grumosa; sed in sinu thorace aderat aquae flavescens copia, cui innatabant largae portiones starum flavescens, sive glutinis, quod perfecte referebat pelliculam, quae tegebat sanguinem venae sectione e brachio educum. Lamellae referebant substantiam membranaceam, quae incipiebat converti in gelatinam purulentam. Similes laminae externam & internam pleurae superficiei uti & externam membranam pulmonis tegebant, in quibusdam laxe rentes, in aliis firmius.

Quum ergo in morbo, qui manifeste contagiosus erat, illae lamellae descriptae in cavo thoracis, & in pulmonis, ac pleurae superficiei viderentur, & in rachiticorum cadaveribus adessent similes, hinc saltem suspicio subnasci potuit, an non & rachitis se per contagium proprium epidemicorum actum, & demonstratum fuit, posse causam communem quidem efficiunt eodem tempore, nec tamen ex uno homine transeunt communicato contagio.

Glissonius (q), de hac re disputans, non videtur multum alienus fuisse a suspicione, dicens: *Forse equidem nonnullam leviusculam inclinationem corpori possit imprimere; imo interdum ipsam forte morbi invasionem insigniter ad eum praedisposse acceleret, aut promoveat, neque tantum nomen morbi proprie contagiosi mereatur.* Postea de industria inquirens observavit frequenter pueros, seu coactaneos, seu prope alios, aut plures eorum minime laborarent. Imo novimus pueros non minus acribus, assidueque mutua societate gaudentes, sed & quot mensa, & lecto utentes, quorum alter hoc malo affectu socium convulsum

(o) Anton. Benevoli dissertazioni, e osservazioni ec. pag. 246, 247. Lind's two papers on fevers and infections pag. 95, 96. cap. XVI, pag. 183, & seq.

is: quod sane vix videtur contingere potuisse in morbo

naturalium regis Galliae (r) a summis in historia na-
 & *Aubenton*, descripto; quem sera mirabitur posteritas,
 atur species canis, quem ob humilem staturam *Basses*
 udo corporis satis insignis sit. In horum canum sceletis
 ras in ossibus extremorum anteriorum invenitur, & tunc
toris. Simile in ossibus extremorum vitium observatur in
 In reliquis sceleti talis canis ossibus nulla apparet defor-
 substantia ossium horum deformium nullum observatur vi-
 na sunt; quum e contra in rachitide ossium substantia a na-
 ifeste degeneret. Hinc dubitat celeberrimus *Aubenton*, an
 s in hac specie laboraverint rachitide, quae huic deformitati
 flet, & deinde sensim evanido hoc morbo mansisset effectus,
 stas nempe, ad posteros translata iure haereditario. Imo cre-
 , infantes, rachiticis parentibus natos, eandem corporis defor-
 longam generationum seriem traducere posse post morbum
 , superstitie manente tali deformitate. At, quantum aovi, in
 iere hoc nondum observatum fuit.

nibus rachiticis observatur, quod caput iusto maius sit, & facies
 eat, quam requiritur, proportionem habita ad reliquas partes cor-
 pe satis bonus faciei color manet; sed semper adest simul laxitas.
 voluerunt, rachitidem veteribus medicis cognitam fuisse, licet alio
 ne descriptam, crediderunt, quod apud illos sub hydrocephali titulo
 , & a magnitudine capitis, quae semper hunc morbum comitatur,
 bare conati sunt. Aliquos rachiticos hydrocephalo laborare cer-
 t; sed in pluribus caput proportionaliter maius est, licet nulla feri-
 pici copia adsit. Praeterea hydrocephalo decumbentes sunt hebetes &
 ossi, dum copia extravasatae aquae augetur, quum e contra, uti se-
 i paragrapho dicetur, rachitici praemature ingenii acumine, & sensuum

ro exercitio, a coetaneis distinguantur.
 omnes auctores, qui de hoc morbo scripserunt, mentionem fecerunt illius
 gnitudinis capitis auctae. Imo *Glissonius* (s) testatur, quod in omnibus hoc
 morbo extinctis, quos hactenus viderat, obtrivuerit aucta haec capitis moles,
 dico tantum excepto, qui simul cum hoc affectu suppuratos habuit pulmo-
 es, & plurimum confectus est. Sed & ille habuit per totum fere morbi de-
 cursum caput maiusculum, faciemque plenioram. Quatuordecim vero ante
 obitum diebus subito collapsae sunt partes carnosae circa caput, faciesque
 hippocratica facta est, stupentibus omnibus subitam hanc mutationem.
 , Et hoc observatur perpetuo. Quum enim musculosa caro in truncis &
 artubus minuat mole, & quasi atrophia absumatur, ideo cutis universa, tum

ve-

(r) *Histoire natur. generale & particuliere* tom. V pag. 300, 301. tab. 35 & 31.
 (s) De rachitide cap. II pag. 10.

vera, tum membrana carnea & adiposa, flaccida & quasi pendula, laxaque inflat cibothecae, apparet, ita ut multo plus carniū in continere possit potest (r). Imo nequidem a morte flaccidum corpus obtingit, nec innatum calorem mox exiit; uti in cadaveribus fieri solet (u).

6 Abdomen semper plus minusve tumet: consumitur quidem pinguedo, deficit in musculis torositas, & tamen abdomen prominulum est. Prudenter Glissonius (v) hoc notavit, dum recenset illa, quae apparent in cadaveribus rachiticorum, antequam dissecantur. Abdomen exterius quidem, respectu nempe partium continentium, macrum est, interius vero, respectu partium contentarum, nonnihil prominens & tumidiusculum sentitur.

Notandum est, tumorem abdominis iunioribus saepius contingere, licet non sint rachitici. Postquam enim primi dentes prodierunt, solent infantes esse satis famelici, & saepe parentes oblectantur, dum vident, infantes quibus vis oblata avidè devorare, etiam duriora, sperantes inde robur insignè corporis futurum. Matres saepe nimis sollicitae de incremento prolium, provendo illas infarciunt pulcibus farinaceis, ita ut aliquando ventriculus intestina his distentissima inveniantur post mortem. In tali casu purga sunt; uti etiam, ubi post febres, tam continuas, quam intermittentes toleratas abdomen intumescit, prout ante ad §. 148o dictum fuit. Semor abdominis in rachiticis diversus est, & ideo tunc notatum fuit, & hanc non voluisse, ut medicis purgantibus in rachitide uterentur copius, quum semel vel bis hoc tentasse sufficeret.

Dum cadavera rachiticorum lustrabat Glissonius (x), testatur sequi: *Hepar in omnibus a nobis dissectis inflexibile, alias autem non male colore neque valde induratum, aliove aliquo notabili vitio contaminatum.* Ex nonnulla cadavera, in quibus nempe ante obitum alii morbi cum complicati fuerant; uti in hydropico & extreme tabido se observari minerat. Inde patet ratio, quare in quibusdam locis sub nomine rachitis designetur rachitis. Lienem magnitudine, colore, substantia non contemnendum; non negat tamen in hoc viscere propter conditionem rachitidis cum aliis morbis aliter contingere posse.

In cavo abdominis serum hydropicum vidit, sed nec frequentius adeo copiosum. Notum est in cadaveribus post morbos chronicos, fere semper in corporis cavis aliquam copiam feri extravasata.

Ventriculum & intestina ultra morem sanorum nonnihil flatibus vidit, & inde causam tensionis hypochondriorum deduxit.

Mesenterium quandoque inculpatum invenit, aliquando glandularibus, si non strumis, oblitum.

(r) De rachitide cap. II pag. 10.
tom. VI pag. 287.

(x) Ibidem pag. 11.

(u) Disputat. ad morbor. histor.

(v) De rachitide cap. II pag. 11 & cap.

cas transversim sub ventriculo ponatur duplicaturae paroli involutum, dissecto abdomine non occurrit sensibus, thus conditione statuere voluit *Glissonius*, sed aliis hoc

Et ob hanc rationem meretur omnem fidem in illis, esse in rachiticorum cadaveribus.
ica satis sana invenit in rachiticis; nisi alius simul adfuisset

s observatis concludit sequentia circa tumorem abdominis, adest: Notamus in genere de omnibus visceribus in hoc ventre licet partes ea continentes, ut supra monuimus, multum extatae occurrant, ipsa tamen aequae magnae & plena, si non maiore dictum, quam in sanis deprehenduntur (y).

chitici cadaver aperuit ante laudatus *Benevoli* (z), & invenit vinalia mole aucta; intestina nempe ampliora quam naturaliter esse o respectu ad corporis staturam; lienem & pancreas invenit solito par prae reliquis magnitudinem auctam habuit; in quo tamen viarum molis incrementum nil praeternaturalis inveniebatur. Celeberrimus *Weslariae* per triennium habitavit, ut in rachitidis inquireret accuratius, hoc temporis spatio sex septemve rachitide auctum puerorum biennalium & triennalium cadavera incidit; meminitque, in his omnibus tumidum fuisse; at aperto abdomine nec aquam, in eius cavo invenit, sed intestina flatibus admodum distenta. Pleurae in intestinis inveniebantur vermes cum pituita copiosa, & in pluribus glandulae induratae, ac quidem tantae molis in mesenterio, ut pugnum erant; & tunc in illis abdomen ad tactum durius apparebat, quam in sano; quod minime mirum videtur. Non meminit *hepar* mole auctum fuisse; ne quidem mentionem fecit; uti nec lienis, nec pancreatis. Quum celeberrimus *Heisterus* tantus in arte fuerit, & adeo versatus in anatomicis, dubium inde moveri posset, an aucta hepatis moles adeo frequenter occurrat in rachiticis, ac *Glissonius* statuit.

Sed notari meretur circa hanc rem, sectiones alias rachiticorum factas fuisse a iuventute *Heisteri*, dum adhuc studio medicinae operam daret, & sub auspiciis ductuque *Molleri*, camerae imperialis medici, felici & numerosa praxi celebris in arte proficeret. Edidit autem has observationes, postquam septuagesimum iam aetatis annum absolverat sanus & vegetus. Unde probabile videtur, illum tunc praecipue attendisse ad morbos, quae in cadaveribus occurrant, & *hepar*, quamvis mole auctum, satis illibatam in rachitide mortuis inveniri solet, ut dictum est. Quum ergo alii graves & fide digni auctores de hoc hepatis incremento in rachiticis conveniant (b), videtur statui posse, quod & *hepar* mole auctum concurrat tanquam causa tumoris abdominis, qui observatur in rachiticis.

Va-

- (y) De rachitide cap. II pag. 12. (z) Dissertazioni & osservazioni &c. pag. 246.
(b) Medicin. chirurg. et anatomische Vorträge pag. 25.
(c) Vide S. hanc iam observat. lib. II de plethor. observat. pag. 258.

Variam autem in visceribus molem inveniri saepius anatomici noverunt, non tantum si morboſa haec fuerint, verum etiam, dum color, conſiſtentia, ſitus &c., nihil praeternaturales docerent eſſe, ſed ſola moles aucta in ſenſu occurreret. Neque ante mortem ulla adfuerunt ſigna ſaepe, quae ſuſpicionem facere potuiſſent, morboſi quid latere in hoc vel illo viſcere, quod in cada vere ſolito maiori mole conſpicuum inveniebatur. Memini me viſiſſe in cada vere adoleſcentis lienem in ſitu naturali haerentem, ſed adeo longum, ut extrema parte ad criſtam offis illi deſcenderet: color erat optimus huius viſceris, nihilque praeternaturale in eius parenchymate detectum fuit; licet cura a perito anatomico, & medicis praefentibus examinarentur omnia. Quam autem a primis incunabulis deſuncti curam geſſerim, ſed unquam detegere potui, quod vel leviſſimam ſuſpicionem daret lienis male affecti.

Videntur veteres medici ſimilia obſervaviſſe, & peculiari nomine denotare. Vocaverunt enim ſic affectos *μεγαλόσπληνους* illos, qui magna & in tumorem ſublata habent viſcera. Licet enim tales crederent morbis opportunos vivere imo & quandoque eodem nomine uterentur, dum viſcera mole aucta morboſa afficerentur, tamen videntur agnoviſſe dari homines, qui naturaliter morboſa viſcera habent; de qua re videri poſſunt illa, quae *Foëſius* (c) habet.

7.º Ad numerum quintum notatum fuit, omniae pinguedinem minui ſuo, & tandem vix non penitus evaneſcere: ſed, uti notum eſt, muſculi biuntur non tantum undique tunica cellulola, ſed & eadem ſe inſinuat ſingulos fibrarum muſcularium faſciculos, ex quibus maior muſculus conſtituitur ad ultimas etiam ſubdiviſiones uſque, ſicque efficit, ut fibrae ſummae cum vicinis non concreſcant, ſed maneant ſemper ſeparatae. Huius ſumma illa emaciatio adeſt, muſculorum roſitas minuitur, ultra quam poteſt. Verum quidem eſt in ultimo ſenio, dum totum corpus exſuc aridum obrigeſcit, vix ullum pingue ſuper-eſſe in corpore, & tamen penitus deletum eſſe motum muſcularem, uti nec in conſummatiſſima dum ſola cutis oſſa tegere videtur tantum. Verum adhuc ipſa muſculi ſubſtantia ſuper-eſt illibata, quae ſenſim in rachitide minui, & tandem ſubtrahitur, dum roſitate & mole quaſi muſculorum fere abolitis illi ſuper-eſt, inertis ſtacciditate languet. Cauſa enim muſcularis motus fieri poſſit, ſed in illos aliunde derivatur, dum agunt. Verum, ut fieri poſſit, requiritur debita ſtrutura muſculi, ut cauſa movens ad illam ad muſculum effectum praefare poſſit. Videantur de haec quae ad §. 1058 & 1059 dicta ſunt.

Egregius in hiſtoria naturali *Daubenton* (d), ubi deſcribit ſceletalia rachiticorum, quae in theſauro regio ſervantur, ob bonae defectum carneas corporis partes debitam firmitatem perdere non oſſa ſatis conſolidari, dum increſcunt; hinc vertebrae, quarum ſi roſa admodum eſt, emolliuntur & ſubſident; unde ſequitur co-

(c) Oeconom. Hippoc. litera M. pag. 242.
(d) Histoire natur. gener. & particul. avec la deſcript. du Cabin. d
pag. 56. &c.

rvorum, qui ex spina dorsi emergunt, & potestas mu-
 & artuum exercendi impeditur magis magisque, tandem-
 it, dum quotidie augetur malum. Mirae quidem depravi-
 i in scelere rachiticorum observantur, nec improbabile
 primi tandem medullam spinalem contentam in theca ver-
 os inter commissuras vertebrarum ex spinali medulla emer-
 ae paralysen in rachiticis vix observantur. In miseris illis,
 lecta fuit penitus, videmus quosdam emergere totos defor-
 deo distorta, ut vix possibile videatur, hoc contingere po-
 mpresione spinalis medullae ac nervorum, & tamen non ob-
 is. Quin imo *Glissonius* (c), cuius testimonium maximi pon-
 hitidis historia testatur frequentia: *nunquam, quod meminimus,*
apoplexiam huic affectui supervenisse novimus; deberes autem
us (saltem in morbo confirmato) evenire, si laxitas & debilitas
ae defectu influxus cerebri originem duceret. Minori cum peri-
 unt distortionem illae in spina dorsi, quia lente & sensim fiunt
 , & theca illa vertebrarum, dum divergit a recto tramite, no-
 cum circuli facit; unde sensim medulla spinalis se accommodat
 gurae canalisi ossei, per quem deducitur. Idem verum est de ner-
 ex vertebrarum theca toto hoc itinere egrediuntur.
 i sustinendo corpori humano serviunt, firmum fulcrum praestant
 mollioribus, quae illis adhaerent, nec possent vasti adeo muscoli
 ore humano, & animalium maiorum, potentiam, quae adeo valida
 ar, exercere, nisi duris affigerentur ossibus illorum extrema.
 centis autem animalis corpusculum refert molle gluten, nec ossa ipsa
 oliditatis habent in prima origine, quae tamen postea tantum robur
 acquirunt. Placuit celeberrimo *Hallero* indagare illa, quae in
 is contingunt, dum ex flexili glutine mutantur in duram adeo sub-
 iam, quae per secula aëris iniuriis in coemeteriis publicis exposita ma-
 potest vix non integra. Solita sua incomparabili industria haec expe-
 nentia perfecit in pullis nascentibus in ovo incubato. Vidit autem gluti-
 nis huius transitum in cartilagineum esse satis promptum & facile: videba-
 ur enim tantum requiri maior soliditas; sed non tam facile intelligebatur,
 quomodo flexilis & elastica cartilago in durum & fragile os mutaretur.
 Cartilago, dum tenuis adhuc est, pellucet; primum offescentis cartilaginosis
 indicium est opacitas & color flavescens; simul in eodem loco incipit tunc
 apparere fibrosa compages. Haec mutatio in ossibus pulli octavo incuba-
 tus die apparet. Decimo die sanguinis rudimentum adest in cartilagine
 offescente; undecimo die rubedo adest dilatatis iam sic arteriis, ut rubras
 sanguinis moleculas transmittere possint; eodem tempore & ossea durities
 in eodem cartilaginosis loco observatur: omnia haec & in callis ossium fra-
 cturum apparent, antequam in os consolidentur. De omnibus his egi alia
 occasione ad p. 126, ubi de *calce podagrica* agebatur. Illud autem,
 quod

(c) De rachide cap. IV. pag. 26.

quod per arterias, quarum iam aucta magnitudo est, ut crassiora admittant, adfertur ad cartilaginem, videtur esse terra, quae interposita substantiae cartilagineae facit, ut ex flexili & elastica cartilagine durum & fragile nascatur.

Unde sequitur, si terra illa, quae cartilaginem sua miscela in os convertit, tolli posset ex osse iam facto, tunc os denuo in cartilaginem mutari debere.

Pulcro & certo experimento hoc demonstratur (vide §. 1261). Calvaria enim, quae per plures annos in coemeterio iacuerat, macerata in aqua forti, diluta copiosa aqua pura, tota flexis & elastica facta fuit, ita ut in pavementum proiecta pilae instar in altum resiliere. Unde merito concluditur cartilaginem differre ab osse, quia caret substantia illa terrea, quae in ossibus solvitur, & si ex osse in acidis macerato auferatur illud terreum, dire cartilaginem, quae latuerat in vero osse per tot annos in coemeterio exposito.

Praeterea constitit ex celeberrimi du Hamel & aliorum experimentis, ream illam substantiam tingi rubro colore, si rubia tinctorum ingeratur cibo animalibus, & illis ossibus in acido maceratis liquore, soluta terra per omnem colorem, & manere cartilaginem non amplius coloratam.

Sed & inde patuit, per ipsas vitae sanae actiones deteri perpetuo per solidas corporis, ne ossibus quidem exceptis, & iisdem vitae sanae actionibus restitui perditas. Dum enim alternatim nutrebat animalia cibis coloris nunc addita rubia tinctorum, nunc non, per aliquod tempus invenit ossium variegata circulis albis & rubris, simulque didicit, mensis spatium tabilem terrae copiam ossi appositam fuisse; quod ex colore facile agnoscere poterat. Patuit pariter intra sex septimanas evanescere illam substantiam, si animal cibis solitis absque additione rubiae tinctorum uteretur, nempe iacturam terreae ossium substantiae supplet alia similis mater non tincta amplius rubro colore.

Inde concluditur, quod terrea haec materies, quae cartilagini addita in os convertit, fluxerit per vasa cum sanis humoribus, & ossibus repleta, quod quotidie de illorum substantia periit, uti ad id, quod ostendit experimentum ossium in iunioribus requiritur. Unde ovo incubato pullus per octiduum die, qui firmis iam ossibus insitit, & quaquaversum discursu per osses rite applicari nequit, ad alia loca deponitur, vel & elin-

contingit? Glissonius (f) habet sequentia: Aliquis nostrum testatur vidisse glandulas strumosas tam numerosas, ut viderentur aequare, rari magnitudinem ipsorum pulmonum: sitae autem fuerunt utrimque pulmones & mediastinum, & a thymo usque ad diaphragma protensus vere infantis rachitici membrana pulmones succingens aspera & verrucosa, tuberculisque verrucis non dissimilibus. Apertis pulmonibus locis tartarea seu gypseae substantiae concreverat (g). In cad-

(f) De rachitide cap. II pag. 13.

(g) Boneti sepulchret. tom.

Benevoli (b) invenit, substantiam pulmonis dissectam
 tam materia alba, tenaci, crassa, quam pressus pulmo
 labat: credidit, pulmonem plenum fuisse chylo in hoc
 indurato, quod vix verosimile videtur. Similis observa-
 puero rachitico, in cuius humero dextro supra flexuram
 ut tunica spissa, quasi cartilaginea; qua aperta effluxit
 noso lacti aut caseo coagulato similis. Similis in femore
 ilaginea inveniebatur, quae obvolvebat tumorem, quo
 prior similis, paullo quidem spissior, albus, caseosus,
 tres circiter uncias.

arteries terrea, a qua osium firmitas & robur pendet, non
 & modo debitis, maior flexilitas osium adest; unde dum
 s innititur ossibus nondum consolidatis, praesae epiphyse
 tumere incipiunt; & in iunioribus, qui nondum inceperunt,
 carpi, tales prominentiae apparent, quia sedentes saepius ma-
 tur, uti *Glissonius* (*) notavit. Illae protuberantiae si exami-
 partibus carnosus aut membranosis, sed in ipsis osium extremis,
 eorum epiphysebus radicari deprehenduntur. Imo si osium illae
 e lima radantur, apparet, quod sint eiusdem similis substantiae.
 osium partes (l). Hoc autem notatu dignum credidit ideo,
 conieciarunt aliqui ossa in hoc affectu interdum esse flexibilia instar
 d nos nusquam id vidimus, neque ab oculato recte fide digno relatum.
 Quare, ut fabulosum hoc signum plane reiicimus. In adultis qui-
 servatum fuit, aliquoties ossa penitus emollita fuisse, sed in rachiticis
 int, minus incurvantur a pondere incumbente, epiphyse pressae pro-
 it, sicque corpus misere defiguratur, & nisi curetur integre morbus
 pure ossa illa deformia indurantur denuo, & tota vita manent mise-
 tolerati morbi vestigia.

Adeo frequens occurrit in rachiticis vasorum caput petentium, vel
 edeuntium magnitudo, ut plures auctores, qui de hoc morbo egerunt, vo-
 nt eius essentiam tantum consistere in illa nutritionis depravatione, per
 m quaedam partes nimio graventur nutrimento, hinc mole augeantur ni-
 m, aliae vero tanto minus recipiant, adeoque necessario contabescant. De
 ceribus mole auctis ante dictum fuit, & notatum, quod non semper mor-
 ossa videantur; uti etiam, quod caput & facies mole aucta appareant, dum
 eliqua decrescunt potius. Attenti ad causam aucti in superiore parte corporis
 incrementi observaverunt arterias & venas iugulares ampliores esse, dum re-
 liquae decrescunt. *Glissonius* (n) idem quidem affirmat, sed solita fide ad-
 dit, aliquoties augmentum illud vasorum capitis apparuisse in corporibus novissi-
 me

(1) Dissertazioni ed osservazioni pag. 247.

(i) Adu physico-medica natur. curiosorum tom. I par. 103.

(v) De rachitide cap. II pag. 10.

(n) Ibidem cap. XXI pag. 269.

(i) Ibidem pag. 11.

(n) Ibidem cap. II pag. 15.

me apertis, non tamen audet ille concludere illud perpetuo in hoc affectu obtinere, vel non, licet suspicetur, ita se rem perpetuo habere. Rationem, quare huius rei oculatum testem praestare non possit, sequentem addit: Non venerat nobis in mentem, id antea ab initio nostris numquam circa hoc subiectum indaginis scrutari.

§. 1486. **I**n illis vero, qui iam ambulare incoeperant, noscitur adveniens malum 1 ex omnibus antecedentibus; 2 abcessu tardiore, infirmitate, prolapsu, instabilitate, transeunte in a duam sedendi voluntatem, mox abituram in decubitus perpetuum tandemque in impotentiam motus quoruncunque artuum, collo flili, capite nutante; 3 ab ingenii praematurae acumine, sensuum cetero exercitio, appetitu & digestionem ferme illaesis.

Dictum fuit ad §. 1481, rachitidem vix unquam nasci, raro autem vitae menssem incipere, & si nullum inchoati morbi vestigium apparuit ante biennium aetatis absolutum, postea vix de hoc morbo per pueros; actumque hactenus de signis morbi in illis, qui nondum incipere indaganda sunt morbi indicia in illis, qui iam ambulare coeperunt.

1.^o De his actum fuit.
2.^o Sani infantes, quandiu vigilant, vix unquam quiescunt, sed per artus movent & totum corpus, nisi coërceantur, perpetuo hinc inde runt, quaevis obvia arripiunt, quibus dum positi fuerint, mox reit alia festinantes, sic non leviter custodes suas solent fatigare parvuli. est, vix non omnes morbos graviores imprimis a lassitudine spont gravitate corporis incipere; non ita diu post febres, vel & morbi quantur haec morborum praeludia. Ubi ergo in iunioribus agilitas & puerilis petulantia incipiunt minui, licet nullus alius morbus lassitudo insolita & tarditas ad motum corporis diutius perdurent, geantur. Haec motus muscularis debilitas incipit a primis morbi Si intra primum aetatis annum, aut circiter, pueri hoc morbo infedius solito pedibus insistant prae illa debilitate, & plerumque p tur, quam incedunt; quod in Anglia pro malo omine haberi ambulare iam coeperunt, antequam morbus ingruat, tardius inced infirmius insistant, vacillant, titubant, cadunt. Si quando laetent profuse ridet, neque tanto cum vigore se excitant, artusve tractantium manibus exsiliare gestirent, nec irati adeo ferociter & que tanta cum animositate plorant, ac solent sani coactantur. Iac sis ab aliis praestita non delectantur, nec motu violentiore, ut

(*) De rachitide cap. XI pag. 263, 264.

seriam aliquam medietatem effens.

Quum autem exceptis illis, qui in capite & facie locantur, reliquorum musculorum firma torositas sensim minuat, ita ut laxi & penduli sub flaccida cute tangantur, hinc assidua sedendi voluntas tandem in decubitus perpetuum abit; eo quod sedentes corpus erectum tenere nequeant; sed id inclinantes modo antrorsum, modo retrorsum, modo ad alterutrum latus, quaerunt sustentacula, quibus recumbentes ignaviae suae auxilium praebant. Miserimum visu est, quomodo caput mole auctum, dum adultior morbus iam est, tenui collo sustineri amplius nequeat, sed nutando in hanc illamve partem dilabatur. Similis debilitas in spina dorso observatur. Unde & *Glissonius* (q) hanc prognosin dedit: *quo enormior est moles capitis, eo longior & difficilior curatio. Quo debilius est spina dorso, eo gravior & periculosior morbus.*

3.^o Miselli illi, licet debiles, & ad motum corporis artuumque inepti acumine ingenii valent, ac quidem plus, quam in tenera tali aetate quis expectaret: simul sensuum omnium exercitium illibatam manet. Hinc functiones encephali in hoc morbo satis integrae supersunt; deficit aut languet saltem illa, quae motui musculorum voluntario praesidet. Forte in encephalo non haeret causa labefactati motus muscularis, sed potius pendet a perdita musculorum torositate & inerti languore, qui in rachitide observatur. Ubi enim per idonea remedia emendatur vapida, quae in hoc morbo adest, cacochymia, & restituitur firmis partibus solitum hac aetate robur, muscularis motus pari passu redit, quo haec vitia solidarum & fluidarum corporis partium corriguntur.

Disimulandum tamen non est egregium *J. Petrum Buchnerum* (r), qui indagando huic morbo non levem operam dedit, scripsisse, quae sequuntur: *Ego saltem plures stupidos rachiticos, quam facultatibus animalibus valentes, haecenus vidi: ceteri quoque viderim.* Verum notandum est, quod hic agatur de signis rachitidis advenientis in illis, qui iam ambulare coeperant, antequam morbus illos invaderet. Hinc non mirum foret, si rachitici in morbi principio ingenii acumine & sensuum exercitio valerent, dein in morbi aucti decursu stupidi & hebetes fierent. Imprimis hoc continget, si serum extravasatum in calvariae cavo incipiat colligi. *Glissonius* (s) de dissectis rachiticorum capitibus testatur sequentia: *Inter duram & piam matrem, atque in ipsi ventriculis cerebri, serosas aquas in nonnullis a nobis dissectis reperimus; unde*

(p) De rachitide cap. XXI pag. 265.

(q) Ibidem capite XXII pag. 286.

(r) Disputat. ad morbor. histor. opera Halleri tom. VI pag. 285.

(s) De rachitide cap. II pag. 15.

unde patet affectum hunc cum hydrocephalo complicari posse. Certe *etiam* in aliis a nobis dissectis satis firmum & inculpabile, neque illius *sepe inundatum deprehendimus*. Unde illa hebetudo, si comitetur quandoque rachitidem, non pendet ab ipso huius morbi genio, quum e contra in solium ingenii acumen toties mirentur medici in rachiticis, sed ab alio morbo accedente ortum ducit, feri nempe aquosi collectione in calvariae cavo.

Sapienter enim *Glissonius* (1) monet, medicos morbos fere omnes tractu temporis alios diversi generis sibi adsciscere, & ideo morbos chronicos plurumque ante obitum iam esse complicatos. Non ergo credendum est, quid quid in rachitide defunctorum cadaveribus praeternaturale reperitur, ad hunc morbum pertinere, quum forte potius ad alium morbum rachitidi ante eam supervenientem spectet. Ut igitur certi quid statui possit, plura caetera eodem morbo defunctorum debent perlustrari, ut rite distinguatur quaeenam perpetuo, quae plerumque, quae frequenter, quae raro in dictis corporibus eodem morbo extinctorum observentur. Simul monet memoria habendum esse, quod illi, quorum cadavera secantur, rachitide gravissime decubuerint, quum succumbere debuerint malo, adeoque non spectanda esse in vivis, recens affectis, eadem symptomata, eandem et magnitudinem, cuius effectus in cadavere reperitur. Erroris periculum exponeret, qui post empyema in cadavere repertum concluderet, pus dedisse originem pleuritidi, quae suppurata postea empyema produxit.

Ceterum in hoc morbo imprimis incipiente appetitus & digestio satis integra. Unde subdole prorepat malum sensim auctum. Quum ex praecedentibus patuerit, viscera abdominalia in rachiticis mole augeri, sed ceterum satis sana inveniri non adeo mirum videtur illorum actiones in morbo incipiente persistere adhuc illibatae.

§. 1487.

A dultior morbus exhibet magnum caput futuris interstinctum; thoracem ad latera compressum sternum in acutum assurgens, cum nodosis costarum extremis protuberans; cariosos cum nigritudine dentes, quae saepe in omni vita perniciosos similes morbos creant, maxime ventosam & cariem ossium.

Sequuntur nunc illae mutationes, quae procedente morbo ob aegris. *Caput magnum futuris amplis interstinctum*. In recens, uti notum est, calvaria nondum est tota ossa, sed capitis ossa adhuc separata sunt, & ossis defectum supplet membrana: hoc ut caput infantis partus tempore per ultimas pelvis angustias cedere possit validis parturientis nixibus, & prodire facilius. variae loco, ubi ossa bregmatis cum frontis ossibus unient

(1) De rachitide cap. II pag. 8.

est irregularis figurae, ubi nihil offci, sed mera mem-
lo deprehenditur. Locus ille *fontanella* dici solet: pro-
rana haec sensim in os mutatur citius aut serius in di-
mel fontanellam pro parte adhuc membranaceam fuisse
aetatis anno. Ossa cranii postea per suturas uniuntur,
o membranaceo, ideo illud interstitium inter ossa cranii
em contigua reddita, suturarum nomine venit, quae co-
unt, quo magis ossa cranii adhuc a se mutuo distent.
variae cavum naturaliter semper plenum esse, & patuit ad
vulneribus capitis agebatur, nisi ossa cranii coërcerent con-
ion molle, illud facile protuberatum illo tempore, dum
isu pondus attollit, obstaculum quodvis totis viribus remo-
lvum duram magno conatu exprimit, subito & protracto risu
da & repetita sternutatione concutitur. Unde fit, si per vul-
lud propugnaculum laeditur, aut arte chirurgica excinditur
calvaria ossa, ut pareretur via humoribus extravasatis sub cra-
, & molle encephalon comprimantibus, quod chirurgi adeo sol-
laesum muniant, probe gnari, si hoc neglexerint encephalon in
trepanum appellatum fuit, brevi emerfurum sub forma luxuriantis
substantiae, quae resecta cito recrefcit, & non tantum foramen
replet, sed etiam ultra eius margines protuberat undique.
ergo notabilis cranii pars in recens natis adhuc membranacea sit
ter, sensim in os mutanda, patet ratio, quare caput proportionaliter
it in iunioribus etiam sanis, quod pictores & statuarii semper obser-
Verum in rachiticis ossa sunt molliora, interstitia membranacea inter
alvariae sunt ampliora, hinc calvariae tota compages facilius ced-
halo distendenti; unde patet simul ratio, quare capitis moles auctior
rachitidis signa diagnostica numeretur. Si iam consideretur copiam &
rum humorum versus caput augeri ob magnitudinem arteriarum & ve-
m iugularium (vide §. 1485 n. 9.), patet evidenter, cur ob tres cau-
concurrentes ossium mollium, partem insignem calvariae adhuc menbra-
ceam, & copiosorem sanguinis appulsus, capitis moles augeatur, dum
eliquae partes decrefcere videantur porius.

Sic & nascitur dispositio ad *hydrocephalum*, quod malum aliquando comi-
atur rachitidem, quandoque sequitur..

Antea §. 1485 n. 8 pluribus dictum fuit, soliditatem ossium pendere a ter-
ra debita proportionem admista, ac adunata, & si illa terra tollatur, tunc os
mutari in cartilaginem elasticam flexilem: simul tunc notatum fuit, intime
unitam ossibus terram vitae sanae adione deteri, eliminari de corpore, & in
eius deperditae locum restitui similem, quae debitam ossium firmitatem con-
servat. Haec firmitas minuetur, si non restituatur quotidie idem & tale, quale
perierat, simulque addatur illa quantitas, quae ad debitum corporis incremen-
tum in hac aetate requiritur. Firmitas certa in ossibus rachiticorum minuitur;
hoc omnia morbi phaenomena docent; & non sine ratione roboris in ossibus
decre-

decrementum, vel minutae copiae terrae ad firmitatem ossium requiritae, vel vitiosae unioni eius cum reliquis partibus os constituentibus tribui possit videtur.

Pulcra quaedam, quae huc spectant, apud celeberrimum Boerhaavium (u) habentur. Agebat ibi de vi solvente aquae simplicis purae, quae sola non solvit terrestria pura corpora, verum si haec acidis corrosiva fuerint, tunc perfecte in aqua dilui possunt, & in illa latere, ita ut totus liquor appareat limpidissimus. Animalium pariter verae ultimaeque terrae, ossae, carnae, testaceae, ceteraeque, ita possunt solvi in acidis, & solutae dilui in aqua, sicque efficere cum aqua, in qua latent, pellucidissimum liquorem.

Contrarium obtinet, dum terrestria corpora intime ununtur salibus alcalinis: tunc enim terra his unita in aqua postea solvi & dilui nequit. Docet hoc vitrum evidentissime, utpote alcali & terra intime coniugatis constans, quod eo minus solubile habetur in aqua, quo arctius haec bina inter se unita fuerint: sic enim formatur materies, qua non habetur alia aquae viribus solventibus magis intacta. Ideo credidit magnus vir, quod naturae auctor alimenta fere omnia animalium paucis admodum exceptis accescentia fecerit. Ita enim acidi sales in prima ventriculi officina praedominantes, felicius ad dissolutionem disponunt nutrimenta assumpta, quorum partes firmae per terram imprimis cohaerent, & ideo longe difficilius in liquidum chylum dissolverentur. Verum, ubi postea ex hoc chylo formanda est iterum materies solidis compingendis apta, tunc mutatur prorsus accescentia, quae in chylo parando necessaria fuerat, & alcaliescentia salium enascitur, quae apprehendens elementa terrestria compagem format aqua non solubilem, sed humoribus coercendis parem. Ex quibus omnibus tandem concludit sequentia: Utique, quando vis mutandi accescentia in alcalia in corpore humano desinit, ossa sum, cartilagineae, dentes, ligamenta laxa, debilia, mollia, flexibilia redduntur; ut in rachitidis animadvertitur quotidie.

Thoracem ad latera compressum &c. Ubi signa rachitidis recenset Glissonius (v), quae apparent in cadaveribus hoc morbo demortuorum, antequam sectio instituatur, sequentia notat, quae circa thoracem apparent: Pectus ierius macrum, & valde angustum praesertim sub aliis, & a lateribus compressum conspicitur; sternum vero nonnihil acuminatum, instar carinae quae aut pectoris gallinae. Costarum extrema, quibus cum cartilaginibus sterni mixtuntur, nodosa sunt, quemadmodum de articulis carpi & talis diximus. Custodes infantum, manibus utrimque lateribus applicatis, illos humo vel & ulnis impositos gestant. In quibusdam locis moris est, ut non iri circumligetur firmum pulvinar, ex crinibus equinis paratum, cui infans, dum utraque manu custodis thoracis lateribus applicata sustinetur

{u} Element. chem. tom. I pag. 737
{v} De rachitide cap. II. pag. 22.

clinans vacillet perpetuo, sed manet in situ erecto pe-
autem latera tantum premuntur, columna vertebrarum
terni os antrorsum elevabitur; quumque vertebrae magis
surget magis ex hac causa; sicque thoracis cavum late-
detur angustius, pulmo difficilior poterit dilatari ab aëre
hma, & alii periculosi pectoris morbi toties sequuntur, &
nior si fuerit, facile in phthisin migrat. Hinc in prognosi
tuitur: *Asthma* (praesertim oribopnoea, atque ea spirandi
a decubitus in neutrum latus admittitur) valde periculosum:
n sibi comitem perpetuo sere adscripsit, nisi forte alius morbus aut
interveniens accelerata morie tabem adveniantem praeveriat.

tubercans. De hoc dictum fuit §. 1485 n. 6.
nigritudine dentes. Quum rachitis frequenter invadere solet
ais tempus, primi dentes solent male affici, imo & sequentes
morbus in longum protrahatur. Ita ut aliquot viderim adole-
rum morbus in initio negligentius tractatus fuerat, qui eden-
int tota vita: raro quidem hoc contingit; sed saepius observa-
iori modo, aliquot ex incisoribus imprimis deficere dentes, quo-
tamen circa septimum annum, vel & serius aliquando, quando
tes lactei dicti vacillare solent & cadere, renovantur. Quum enim
validus fuerit, & diuturnus ossa male afficiantur, mirum non est
militar affici. Sub adamantina crusta dicta, quae extra gingivas
t, tecta latet substantia ossea tenerior, quae, dum corrumpitur
rustillatim excidit. Observavit *Glissonius* (y) dentitionem, dum
rachitidi, morbi progressum multum accelerare; simulque monet se-
a: Dentes nigrescere, aut frustillatim excidere periculo non vacat, atque
perius est, quo tardius alii in eorum locum succrescunt. Docetur enim
s medicus validum fuisse malum, si secundi dentes in alveolis adhuc
es a prioribus insidentibus corruptis male affecti fuerint, vel saltem
ilius cedere medellae adhibitae, & tardius eradicari posse. Observa-
antea iam laudatus *Buchnerus* (x); a dentibus oriri morbum; unde si
ans serius post primum annum, v. g. anno uno & dimidio, aut quadrante,
t plane explorato iam annorum binario dentes edat, utut antea vegetus & ala-
t fuerit, metuendum est, ne in spinalem morbum incidat, sive convulsiones
lentissimae accedant; vel non. In rachitide imperfecta dentes, carie ciebti, si-
pimo anno reparantur, in perfecta vero non. Notandum est, hunc auctorem per-
fectam rachitidem tunc vocasse, ubi omnino desperabat de morbi curatio-
ne. Rachitis imperfecta difficulter, perfecta rix aut raro curatur. Saltem
oblata licet occasione curam perixitari n. luit. Quod tamen laudari nequit,
quum toties & in hoc, & in aliis morbis emerferint aegri, qui conclamati
omnibus videbantur.

Observavit autem, si dentium cariei accederet insignis oris graveolentia mor-

(x) De rachitide cap. XXIII pag. 288. (y) Ibidem pag. 287, 288.
(1) Disputa, ad auct. histor. opera Halleri tom. VI pag. 286, 287, 288.

morbum fere lethalem esse. Sed & prognosin *Glissonii* circa tardam in
rum dentium in rachitide eruptionem confirmavit (a). Tarde enim
dentes prodierunt, & cum continuis fere convulsionibus; postea rach
incipientis omnia signa adfuerunt, dentes fiebant flavi, dein nigri, &
derunt: ita per quinque annos vixit edentula; tandem undecimo aetatis
unicus dens emerfit, qui ad mortem usque perstitit, quae decimo q
aetatis anno calamitosae vitae finem imposuit: miram corporis defo
tem rachitidis tam diu toleratae affectum, tabula huic dissertationi a
exhibet..

Licet enim saepe citius longe morbo succumbant rachitici, tamen
pauci emergunt, sed miseram vitam trahunt deformes, & ad omni
inhabiles, nisi in tempore idonea medela adhibeatur; de qua postea
Unde *Glissonius* (b) de prognosi huius morbi agens statuit sequentia
statum morbi attingunt, quo nempe is non amplius augetur, omnes se re
bentur, evadunt, nisi forte alius morbus sit coniunctus, aut casu aliquo
veniat, aegrumque in augmentum ulterius deturbet. Declinatio sympt
similiter, sed certius sanitatis restitutionem pollicetur.

Quae sensim aucta saepe in omni vita perniciosos tales morbos creant
me spinam ventosam, & caviem ossium. Ossia debitam firmitatem ne
re in rachiticis antea pluribus demonstratum fuit; hinc naturalem
figuram non retinent, dum premuntur a pondere incumbente corp
cti; unde toties spina dorsii deformatur, uti & extrema inferiora;
mis superioribus idem contingit, dum sedilibus insidentes perpetuo
decumbentes in lectulis, manibus & brachiis innituntur, ut situm
mutare possint, qui si idem manet diu, molestiam sanis etiam &
hominibus creat: unde & observatur in sanis dormientibus, qu
tempore situm mutant aliquoties, ut molestiam leniant, quae sent
pondus corporis iacentis haec vel illa loca premit diutius. Nisi e
fitus mutatio obtineret subinde, suffocaretur circulatio in partibus, c
cumbimus, & sequeretur gangraena in locis maxime pressis, uti tot
medici factum fuisse, dum aegri hebetes & soporosi decumbunt,
molestiam sentiunt, simulque custodes, licet moniti, situm decumbe
tare negligunt. Quam autem sensuum sincerum exercitium adsit
eis miselli manibus utuntur frequentius, ut situm mutare possint;
tuberant epiphyfes radii, ulnae, humeri, & pars ossium inter artici
debita firmitate carens, incipit incurvari. Posset & musculorum
fixorum actio mutare naturalem figuram ossium, quae in hoc m
rachitide, & decrescere illorum activitatem; unde forte minus a
metuendum erit. Dum autem felici cura musculis robur redit,
rat, & simul firmitas in ossibus succedit sensim, tum musculo
affixorum sola vi emendatur ossium incurvatorum figura saepius;

{a} Disput. ad morbor. histor. opera Halleri tom. VI pag. 280.
{b} De rachitide cap. XXIII pag. 287.

atione huius morbi dicitur. Accuratissimus *Daubenton* non tantum ibenda corporis humani fabrica, sed cui nullus comparari nequit in anatome comparata, ut solet vocari, quae plurimorum animalium describit, & cum humanis eiusdem nominis comparat, unde monstratur intellectus omnium functionum; celeberrimus, inquam, ille in describit locupletissimum rerum naturalium thesaurum (c), cuius lo & augendo tanta cum laude praeest, plura specimina describit, etiam figuris nitidissimis exprimit, quae docent evidenter, quam multa ossa humana mutari possint in hoc morbo, imo & quandoque ipsa distantia miserrime destrui tandem. Quum autem morboosi hi ossium accuratius conspici possint in ossibus siccis, hinc & sceleta descripsit *avir*, in quibus ossa propriis ligamentis inter se nexa manserant. Omnia ante legi & considerari merentur.

am, quae ad decimum quartum annum usque cum rachitide luctata antequam morbo succumberet delineavit *Buchnerus* (d). In hac figuris membrorum deformitas apparet quidem, verum ossium partibus mollibus rectorum status non apparet; sed in sectione cadaveris eiusdem (e) leguntur sequentia: *Supra modum molles & scissis faciles cartilagineant. Ipsa vero ossa cartilagineam naturam & mollitiem, & saepe ipsa lata sunt. Cuius anatomico absque vi totum os femoris discidi. Articuli naturali sua constitutione, nisi totum corpus, degeneraverant. Ita contra & ipsa pelvis ossa erant, ut digitum ano immissum vix admitterent, atque ut tota vesica in abdomen expulsa peregrinaret. Cavum ossium cylindricum in binis oppositis lateribus admodum compressum erat, ut cavitates cylindricae in eam & paralelogrammiformem mutata esset. Miras tales deformationes in rachitide defunctorum cadaveribus observavit & *Daubenton* (f), sed tam raras, ut de exacta illarum descriptione desperaret, licet ossa sceleti huius relicta ligamenta, quantum fieri poterat, in naturali situ manserint; unde notandum huius sceleti sic finit: uno verbo dicam, pleraque ossa complanata esse diversimode secundum illorum longitudinem. Tres pedes & duos pollices longum erat illud sceleton, licet ex dimensione ossium singularium, & ossificationis progressu observato credibile videretur, subiectum hoc vetustate aut viginti annorum fuisse, dum ab hoc morbo moreretur. Antea ad 6. 1316, ubi de partu difficili agebatur, notatum fuit, obstetricantes semper difficiliorem partum metuere, dum assistere debent parturientibus, quae in iuventute laboraverunt rachitide, praecipue si circa ultimas lumborum verebras, & ossa, quae pelvis cavum constituunt, notabilis deformitas manserit, quae non tantum difficilem partum facere potest, sed & quandoque penitus impossibilem. Videantur illa, quae in hoc loco dicta fuerunt. Similia incommoda ab eadem causa nasci poterunt, dum ob spinarum deformationem*

(c) Histoire naturelle avec la description du cabinet du Roy tom. III pag. 57 & suivantes.
 (d) Dissertat. ad morb. histor. oper. Hailer. tom. VI pag. 300.
 (e) Ibidem pag. 281.
 (f) In loco citato pag. 74, 75.

mationem angustatur thoracis cavum, ita ut pulmones libere nequeant explicari; unde tussis molestissima, perpetua, asthma incurabile, anxietas incredibilis, cum facie livente tumida a motu corporis vel leviter aucto, promonis vomicae, phthisis incurabilis, scirrhi, concreciones pulmonum cum pleura sequuntur; uti ex praecedentibus patuit.

Sed & in reliquis ossibus corporis mira vitia contingere observata fuerunt. *Daubenton* (g) in illo sceletro rachiticae, cuius modo mentio facta fuit, per os ossium occipitis & parietalium abscidit, & invenit ossa parietalia quibusdam locis sex lineas crassa, in aliis vero adeo tenuia, ut pellucere in ossibus frontis, temporum, in occipitalibus tenuia talia loca invenit. & in extremorum ossibus tenuia talia loca inveniuntur, in quibus a leviori fractura metuenda est? In alio sceletro, cuius figuram tabula aenea pressit (b), notavit litera E adscripta in media parte ossium humeri, radius, femorum, tibiae, & fibulae, iuncturarum quasi vestigia per os ossis ambitum; imo & quaedam familia vestigia in costis apparebant. Mirabatur egregius vir, an forent fracturarum per callum consolidatarum vestigia. Obstare videbatur difficultas, quomodo frangi potuissent tot ossa hoc corpore, & fracta iterum tam bene consolidari. Credere maluit chitidi tribuenda esse, morbumque hunc, qui adeo turbat ossium incrementum, invertisse solitum osteogeniae ordinem, qui a parte media incipit versus extrema ossium progreditur; per morbum autem pars media mansisset diu cartilaginea, dum interim ossificatio ab utroque extremo incoepit versus medium progrediretur; binae illae ossificationes ab extremitatibus, dum in medio concurrunt, produxissent illa iuncturarum vestigia imo olim antequam ossa penitus induruerant, ossa haec in medio fuissent; praecipue primo post nativitatem tempore.

Unde infer, quod si mater talis infantis graviditatis tempore crucis supplicium coram vidisset, rachiticus infans natus ossibus in mediis speciosum argumentum potuisset dare illis, qui vim imaginati ternae in foetum eius utero contentum tueri conatur.

Verum notari meretur, rarissime, vel nunquam rachitidem connotatum esse, uti pluribus ad §. 148r dictum fuit, & licet foetus in utero iam coepisset hoc morbo infici, non potuisset primo post nativitatem adeo invaluisse malum, ut tot ossa fracta fuissent. Totam hanc historiam docet, tardius incipere rachitidem, & lento gradu augeri.

Sed plures auctores meminerunt facilis ossium fracturae in rachitide in arte sua *Petit* (i), ubi de morbosa mutatione ossium agit, monet, os humeri quidem vix mutari in figura, quum undique sit muscularis, qui fere aequalis roboris sunt, nec pondus corporis debeat, ut os femoris: notat tamen, ubi per morbum iam multum fuerint ossa, tunc in loco insertionis musculorum deltoidis &

(g) In loco citato pag. 74.

(h) Ibidem pag. 76.

(i) Traite des maladies des os tom. II pag. 547, 548.

humeri incurvari sic, ut convexa pars anterior reddatur, pars rior concava fiat: *Verum saepissime in hoc loco os invenitur semimod pluribus vicibus viderat. Hoc infortunium non tantum esse hu-*
is, sed saepe etiam costis, uti & mediae partis ossium femoris & cr-
puella, quae decimo sexto aetatis anno expleto rachitide perit,
empore vitae femoris os levissima vi fractum fuisse, observavit Bu-
k), licet ultimo hoc morbi stadio nequidem sedere valeret, multo
edere. Alia puella per duos ferme annos lactata, satis bene se
lein rachitica facta, postquam tertium annum & medium expleve-
latea currens os femoris fregit, & licet in cadavere post decem
annos mortuae fractura haec consolidata inventa fuerit, tamen au-
do post fracturam gradiendi facultate privata fuit.

sufficere credo ad probandum ossium minutam firmitatem in rachie saepius occasionem fracturae ossium.

crea notari meretur, quod epiphyfes ossium protuberent ad iuncturas
 1. 1485 n. 8.), adeoque generaliter omnia ossa tumere circa articu-
 i in sceleris rachiticorum observavit *Daubenton* (1): imprimis ossa
 & tibiae circa extrema articulata hoc vitio laborant, neque cava-
 rum proportionatam amplitudinem habent, ut possint in se recipere
 ossis articulandi mole auctum per morbum: unde facilis luxationis
 um, quae forte frequentius, quam creditur, in rachiticis contingit.
 igna prognostica in hoc morbo recenset *Glissonius* (m), inter alia dicit:
ura sursum trahunt, neque ea libenter extendi patiuntur, difficulter cu-
Si caput ossi femoris non satis profunde acetabulum ingreditur in-
icis, ubi ligamenta laxa sunt, facile excidit, & ex articulo suo ela-
sursum retrahitur a musculis; unde membrum accurtatur, nec absque
lia extendi poterit. Forte huc & spectat ultima prognosis (n): qui
us tolerant omnimodam inflationem corporis, ceteris paribus, facilius cu-
ur. Haec enim tolerantia monstrat, articulos esse bonos non tantum,
& pectus esse liberum; quod optimum signum est. Unde in protracta
itide, & ubi lethalis exitus metuitur, miselli aegroti non tantum pro-
m corpus movere nequeunt, sed nec ab aliis corporis situs mutari po-
t absque instantis suffocationis periculo. Vidit summas tales miseras
hnerus (o) in puella rachitica, quae ultimo vitae tempore integro pede
vior reddebatur, & magno capite, ac inter elevatas scapulas quasi gremphosi
niss, brachiis & pedibus curvatis mirumque intortis, elevato sterno & emi-
nente abdomine, ex homine in monstrum degenerabat. Tunc nequidem sedere
lent, & brachiis & dorso miserandum spectaculum! suspendenda erat. Es re-
nisi caput perpetuo muniretur, mox totum caderet; quo nempe curvatura
rictratum colli divertebatur.

Maxi-

(1) Dis ut. ad morbor. histor. opera Halleri tom. VI pag. 279.

(1) Histoire naturelle avec la descript. du cabinet du Roy tom. III, pag. 74.

(m) De rachitide cap. XXIII pag. 287. (n) Ibidem pag. 290.

(o) Disput. ad aorbor. histor. opera Halleri, tom. VI pag. 279.

Maxime etiam metuendum videtur in illis, qui ex diuturniore rachitide emerferunt, ne praeter deformitatem staturae superfit hinc inde in ossibus talis mutatio fabricae, unde postea mali ossium morbi curatu difficillimi sequuntur; caries nempe, & spina ventosa.

Antea patuit in firmo & sano osse per ipsas sanitatis actiones deteri & evanescere quasi de corpore illa, a quibus firmitas & robur ossium pendent, quasi nisi ex ingestis vasorum & viscerum actione in naturam fluidarum & solidarum partium nostri corporis converfis restituantur, degenerabit ossium compages a nativa sua indole, & tandem morbosa fiet, si idem defectus diu manserit. Quum autem tota rachitidis historia doceat, morbum solidis partibus corporis, praecipue ossibus noxam inferre, mirum non videbitur, post morbum diutius toleratum in ossibus superesse mali vestigia, quae relictis viribus redeunte sanitate se manifestabunt, & quandoque deb. bunt separari a sanis partibus ossis; quod quidem optime fieret, si bona suppuratione partium mollium via pararetur ossium affectorum exfoliationi. Verum raro haec felicitas contingit, quum in morbo hoc, si gravior fuerit, magis in putredinem proclivitas adsit, quae quandoque in tantam malignitatem ascendit, ut viderit *Buchnerus* (p) miserimam puellam extremo vitae diu, adeo *secram ore expirasse mephitum, a qua sanissimus volueris caueat, quae puellae vertici perpendicularis imminabat, inclusus, mox enecatus est.*

Sed, quum antea ad §. 512, & sequentibus peculiari capitulo de morbis ossium actum fuerit, omnia, quae ad hanc rem spectant, ibi videri poterunt.

§. 1488. **T**oto interim decursu mali lenta febricula depascitur corpus usque in mortem; tumque cadaver omnes fibras, membranas, vasa, viscera, mollia, flaccida, humores solutos, mucososque exhibet.

Quare causa proxima mali cacochymia iners, mucosa, frigida, vappida latent forte leni labe venerea permixta cum laxa partium firmarum fabrica.

Rachitis lente progreditur, & non tantum per plures menses, verum etiam per annos decurrit, antequam corpus destruat, uti ex ante dictis colligitur facile. Exempli enim fuerunt allegata, ubi post primam dentitionem se manifestabant prima morbi inchoantis symptomata, & ad decimum quartum, imo ad decimum sextum annum usque misera vita protrahabatur, antequam mors tantis calamitatibus finem imponeret. Considerandum autem est, plures rachitidem in tenera aetate passos longe diutius superesse. Notavit enim *Glissonius* (q) illos, qui ante annum quintum aetatis completum non perfecte sanantur, postea miseros ac valetudinarios supervivere, & ante consistentem aetatem

(p) Disput. ad morbor. histor. operâ Halleri tom. VI pag. 279.

(q) De rachitide cap. XXIII. pag. 289.

aetatem asthmaticos, vel cachecticos, aut phthisicos perire, *vel saltem gibbosos, nanos, curvos, aut aliter deformes postmodum superesse*. Verum notum est, omnem morbum triplici modo finire: vel enim abire in sanitatem, vel in mortem, vel desinit in alium morbum diversum a priori, cui tamen ut causae originem suam debet. Sic gibbosus non amplius dicitur rachiticus, licet gibbus rachitidis praegraessae originem debeat: idem de aliis deformitatibus rachitidis toleratae sequelis verum est. Hic autem affirmatur, lenta febricula sensim depasci corpus ad mortem usque, dum proprie dicta rachitis adest, licet abire saepe, dum postea in alium morbum rachitis transiverit. Dubitari tamen potest, an in ipso invadentis rachitidis primordio lenta febricula iam comes adsit.

Glissonius (r), qui tanta cum cura hunc morbum examinavit, fatetur sequentia: *Adeo lente, sensimque obrepit, ut ad plures menses vix sui manifesta vestigia prodant, nisi forte a vehementissimis causis eius progressus promoveatur, ut a morbo violentiore, aut colliquante, seu antecedente, seu superveniente*. In morbo proveciori adest illam febriculam lentam, satis convenit inter omnes, sed est tarditas motus huius morbi in sua prima invasione. De signis autem incipientis morbi in iunioribus, qui nondum ambulare coeperunt ad §. 148; dictum, ubi simul notata fuit ad numerum 5 insolita illa flacciditas cadaverum rachiticorum; quum ceterum in aliis morbis obtinere soleat, ut non tantum post mortem, sed quandoque & ante mortem totum corpus rigescat. Unde propinqui ultimum illud obsequium praestant defuncto, ut oculos claudant, maxillas ad se invicem adducant, ne, apertis post mortem oculis, & ore hiant, foedum spectaculum exhibeat cadaver; sic & caput in recto situ deponunt, manusque iungunt. Si nimis diu moras trahant post mortem, tanta observatur in cadavere rigiditas, ut hoc pietatis opus amplius perfici non possit, vel saltem quam difficillime. Sed in rachiticorum cadaveribus omnes articuli flexi manent, & magnum caput sola gravitate, nisi fulciatur, in hanc illamve partem dilabitur.

Humores solutos, mucosisque. Merentur hic conferri illa, quae in capitulo de morbis viscerum debiliū, & laxorum ad §. 41, & sequentes dicta sunt; uti & illa, quae notata fuerunt in morbis fibrae debilis, & laxae §. 24, & de simili vitio in vasis obtinente §. 38, & sequentibus: omnia enim haec in rachitide quoque locum habent. Ad §. 25 demonstratum fuit, defectum motus muscularis inter primarias causas debilitatis, & laxitatis fibrarum merito recenseri; §. 30 patuit, fibras esse debiles iunioribus, quiescentibus, & crescentibus; §. 35, 2, per quietem in aëre humido frigidiusculo, cum somno pleniore, fibras solidas, nimis rigidas, & elasticas emendari; dum nempe sic redduntur molliores, & debiliores; §. 43, 3 deducitur inde inertia liquidior per maiora vasa fluentis, quae pendet a minuta copia, fluiditate aquosa aucta, & motu musculari torpescente. Sed haec omnia in rachitidis historia habentur; §. 44, ubi mala a vasis, & visceribus nimis debilibus, & laxis oriunda enumerantur, inter praecipua ponuntur *sacboxia, & cacochymia*,

(r) De rachitide cap. CXVIII, pag. 219.

Tom. V pars II.

Q

mia, pessimaeque horum sequelae, *phthisis*, *empyema*, *hydrops*, *astropbia*; quae omnia in rachitidis decursu observantur. Ad §. 48 probatum fuit, ipsum sanguinem, & cruorem esse in robustissimis maxime densum, lentum, blandum, in tenerrimis dissolutum, levem, acrem.

Omnia ergo haec conspirant in rachitide, ut humores soluti sint, nec habeant firmam illam consistentiam sanguinis sani, sed mucosum aliquem lentorem tantum; de quo §. 69, & sequentibus dictum fuit.

Observata fidelia confirmant modo dicta. *Celeberrimus Du Verney* (1) affirmat: *carnes rachiticorum albas, molles, decolores esse, sanguinem autem aquosum, & valde dissolutum*. In cadavere puellae rachiticae *sanguis summo pere tenuis, resolutus, & rutilus erat*, teste *Buchnero* (2).

Quare causa proxima &c. Ex tota historia morbi haecenus descripti sequitur causa proxima rachitidis, qualis hic describitur. Causa proxima morbi dicitur, quae totum iam praesentem directe constituit; cuius praesentia ponit, continuat morbum; cuius absentia eundem tollit. Degenerant enim humores ab illis conditionibus, quae requiruntur in sanitate, & tunc *cachymia* adesse dicitur, quae varia esse potest; sed in hoc morbo iners, vappidā, & mucosa invenitur. Adest simul laxa nimis partium firmarum corporis fabrica, uti demonstratum fuit; sed humores nostri robore vasorum, & viscerum sic perficiuntur, ut dotes ad sanitatem requisitas acquirant, adeoque sensim degenerant, dum robur solidarum partium debilitatur.

Simul & dubii instar proponitur, an forte adsit in rachitide aliquid labis venereae, sed lenioris tantum.

Celeberrimus Astruc (u) credit, contagium luis venereae aliquando posse esse mitioris indolis, ita ut sensim viribus extenuetur, & decrescat copia, tandemque totum evanescat de corpore. Verum simul monet, hanc felicitatem nunquam sperari posse, nisi virus venereum benignum, & paucum fuerit, simulque sanguis purus, rite constitutus, & perfecte elaboratus adsit. Hoc modo, si virus non integre diffilaretur de corpore, concipiebat, illud diu superstes manere posse in corpore, *sed ita coërcitum, & reserocatum, ut effectus careat*; seu, quod idem est, *latebit quidem in sanguine, sed latebit innoxie, quemadmodum in praxi videre obvium est*. Si autem per febrem, aliumque aliquem morbum, per diaetae errores, vigilias, crapulam &c., sanguis a sana indole degeneret, *eadem ratione venenum ante latens viribus, & copia promte invalescit, naturali ferociae restituetur; unde lues manifesta*.

Conatur suam sententiam confirmare argumento a sylvestribus arboribus desumpto, quarum fructus acerbum, acrem succum fundunt: qui tamen hortensi cultura sic misciscit, ut blando sapore placeat. Si autem a debita cultura talium

(1) *Traité des maladies des os* Tom. II, pag. 291.
 histor. opera Halleri tom. VI, pag. 281.
 V, pag. 102, 103.

(2) *Disputat. ad morb.*
 (u) *De morbis venericis lib. II, cap.*

lium arborum cessatum fuerit, fructuum succus ad priorem acerbitem re-
dit. Idem obtinere statuit in luis veneno, quod innoxie latet, *quamdiu san-*
guis purior largiorem similis veneni renovationem refroenaturus est; suae vero
redditur naturae ferociae, & virulentiae, ubi primum depravata sanguinis in-
tegritate datur latenti veneno nocendi locus.

Inde explicat, quare aliquando lues sequatur, dum coniugum alteruter
miasma venereum latens in corpore gerit, licet diu in connubio vixerint simul,
a lue manifesta penitus immunes. *Id enim supponit, quidpiam ex alterutra*
parte mutatum fuisse, unde contagium, quod ab infecto viro manat, iam effica-
cius sit, vel sanguis mulieris, qui inficiendus est, ad concipiendum venenum ma-
gis comparatus. Quum autem statuatur egregius ille vir, strumofas, & rachiticas
affectiones esse degeneris luis symptomata, hinc ex eodem fundamento
explicat, quare ex pluribus liberis ab iisdem parentibus genitis quidam po-
stea laborent rachitide, alii non. *Id enim arguit, hunc aut illum nativa*
corporis constitutione, vel morbis, qui, dum utero gestantur, matrem debilitant,
ceteris imbecilliores esse, unde contagio alius inficiatur. Verum ex historia
luis venereae patuit, optimam, & robustissimam sanitatem non enervare
susceptum in corpore virus, sed e contra sanissimos, & succis plenos iu-
venes peius adhuc infici ab impuro concubitu. Imo, si post curationem luis
tentatam aliquid adhuc de contagio venereo latet in corpore, silent omnia
luis symptomata, quamdiu languent miseri, validis curationibus, & severa diae-
ta emaculati, sed simul ac vires redeunt, & bono nutrimento impletur cor-
pus, repullulant omnia mala, & quandoque repeti debet curatio. Praeterea
luis venereae symptomata differunt omnino ab illis, quae rachitidem comi-
tantur: de qua re videantur illa, quae ad §. 1482 dicta sunt.

Videtur autem celeberrimus Astruc in secunda editione tractatus absolutissimi
de lue venerea accuratius determinasse, quid sentiat de lue venerea, tanquam
causa rachitidis. Quamvis enim in capite quinto libri secundi eadem legan-
tur, quae modo recensui, tamen alio loco (v) habentur quaedam, quae in
prima editione non inveniuntur. Agit ibidem de variis periodis luis vene-
reae; ubi monet, se non pauca novorum morborum genera, quae a lue vene-
rea sobolescere, vel reviviscere multis credita sunt, prudenter silentio prae-
termisisse, & postea subiungit, non defuisse, qui putent, ex eodem fonte
fluxisse rachitidem. *Sed qui ita putant, semper chorda oberrant eadem; scilicet*
probans quidem egregie virus venereum degener producentiae rachitidis symbolam
conferre, ut & producentis non paucis morbis aliis: probans vero minime, vene-
num idem esse coniunctam, & adaequatam causam rachitidis; quum certum sit
rachitide saepius tentari infantes plurimos, quorum parentes omni lue venerea
contagio perfectissimo semper vacavere.

Non videtur ergo lues venerea inter causas rachitidis numerari posse,
quum certum sit, morbum illum nasci in infantibus, absque ulla suspitione
contagii venerei prius communicati.

Con-

Confirmatur haec sententia ulterius, quod longe alia curatione indigeat rachitis, quam lues; imo quod illa, quae ad virus venereum extinguendum commendatur, in hoc morbo minime prosint. Monet enim *Gliffonius* (*) sequentia: *Observavimus, pueros nonnullos, unguentis mercurialibus illius ad necandam scabiem, in hunc postea morbum incidisse.*

Supereft iam, ut de curatione rachitidis dicatur.

S. 1489. **C**uratio optima fit. Cibo levi, eupepto, sicciori, minus pingui, aromatibus mitioribus condito, saepe dato, & copia moderata. Potu paucō, meraco, ex cerevisia imprimis, non veteri quidem, at diu cocta, & spissa. Aëre sicco, & calidiusculo. Vestitu accurate sicco, calefaciente, ex lana praepressis confecto. Decubitu super storeis, ex aromaticis, roborantibus, exsiccantibus herbis factis, in elatiori aedium parte, supra tabulata lignea. Gestatione, concussione, oscillatione, unctione in rheda super strata viarum, frictione multa, calida, sicca, pannis fumo aromatum perfusis instructa, maxime ad abdomen, & spinam. Cantharidum iterata quandoque applicatione, vomitoriis lenibus aliquoties cum prudentia repetitis. Purgantibus deinde roborantibus per aliquot dies successivos adhibitis. Denique usu diu continuato medicamentorum roborantium, exsiccantium, antiscorbuticorum, & spiritus excitantium. An & immersio in frigidam prodest. An linimenta. Et quae.

Ex omnibus, quae haecenus de rachitide dicta fuerunt, constat, laxam nimis esse compagem partium solidarum corporis, & in illis deficere elasticitatem, ac robur. Unde omnia illa, quae antea ad §. 28 pro curatione fibrae solidae nimis debilis, & laxae commendata fuerunt, hic etiam conducunt fere, nisi quod in rachitide curanda siccior victus soleat potius commendari, adeoque a lacte, iusculis, panis decoctis abstinere malint medici, & ficiores potius cibos commendent.

Cibo levi, eupepto, sicciori &c. Seliguntur illa, quae facile digeruntur, & nihil glutinosi habent, sicque promptius vi viscerum chylopoieticorum subigi, & in bonum chylum mutari possunt. Notatum fuit ad §. 1486 num. 3, appetitum, & digestionem ferme illaesa manere in hoc morbo, qui absque hoc non tam diu tolerari posset. Dantur tamen haec alimenta copia moderata, & saepius de die, ne chylus copiosior pulmonem, ob mutatam thoracis cavitatem (vide §. 1487) plus, minusve pressum gravet. Pinguia repudiantur in victu rachiticorum; quia nimia mollities, & flacciditas partium solidarum adest, & in debilibus corporibus iure metuitur, ne haec in rancidam acrimoniam, quae pessima est, degenerent.

In

(*) De rachitide cap. XVI, pag. 189.

In *materia medica* ad hunc numerum recensentur illa, quae praecipue conducunt pro victu in hoc morbo.

Laudatur imprimis panis bene fermentatus, biscoctus: farina enim lentorem habet insignem, qui emendatur, dum pasta ex farina, & aqua simul mistis parata incipit attolli in maiorem molem & fermentari, antequam clibano immitatur, & excoquatur panis. Offis enim ex farina, & aqua paratas absque fermentatione robusta, & duro libore exercita corpora ferre possunt; debiliores autem homines, uti etiam, qui sedentariis artibus sibi victum parare coguntur, a glutinoso tali victu misere languent. Rite sic paratus, & bene excoctus panis in lamellas tenuiores discinditur, & in clibano rursus excoquitur, ideoque vocatur biscoctus panis; qui siccissimus tunc est, & vasis ligneis, siccis, clausis reconditus servari potest diu immutatus, ab humido nempe aëre defensio, ne situm contrahat. Notum est, in longis itineribus saluberrimum navigantibus victum dare panem sic bis coctum. Pro rachitici paratur ex purissimo tritico panis biscoctus, additis gratissimis, & roborantibus aromatis, parca copia, quae maiorem saporis gratiam conciliant, & languentes vires blando stimulo excitant. Tales panes biscocti sapore placent iunioribus, saliva statim mollescent, & penetrantur, ita ut quasi integre deliquescent videantur, sicque utilissimum nutrimentum praebent, quod a debilibus etiam cito, & facile digeritur. Quum autem dentitio saepe tarda sit in hoc morbo, dentes, qui iam emerferunt, carioli fiant, & frustillatim excident, panes illi biscocti, tenues quum parentur, etiam edentulis conveniunt, eo quod statim in ore humido emolliantur. Vix credibile est; quantum beneficium a tali pane percipiant rachitici; aliquoties incipientem morbum hoc solo curatum meminimus. Unde apud Batavos pistorum officinae panum biscoctorum varietate luxuriant, dum sollicitae matres solas has delicias fere dilectis proliis indulgent.

Ex classe animali conceduntur carnes macilentae, iuniorum imprimis animalium, sed assatae; solent auferre crustam exteriorem, quam ignis vi produxit, proximamque huic carnem in propriis succis coctam sub hac crusta, quae exhalationem subtilioris partis impedit, minutim concidere; & cum pane biscocto coactro, addito paucio sale, & lenibus aromatibus, sic parant fercula sapidissima, quae etiam edentulis prodesse possunt. Grati satis cibi etiam ex cerealibus cum ovis passis parantur, dum haec simul in aqua coquantur ad molliem, & postea pauculum vini additur cum lenioribus aromatibus.

Potu paucio, merace &c. Imprimis hic laudatur cerevisia, antiquissimus potus: nam variis populi, quibus natura vitis culturam negaverat, ex frugibus aqua maceratis non insuaves potus sibi concinnarunt, ut nusquam cessaret ebrietas lenocinium. Unde Aegyptii ab Osiride edocti potum ex hordeo, saporis bonitate paullo vino inferiorem consecerunt, quem *cer* vocant, vinum ex hordeo vocaverunt. Licet autem ex frumento, & aliis cerealibus parari possit similis potus, illud tamen nomen diu mansit. Cerevisia, & cerevisia hinc solet vocari a *Cerre*, idest fruge vocata: est enim potio ex seminibus frumenti vario modo parata (y). Unde & dictum fuit Cereris vinum, univervo

(y) Videatur de his Nonnius de re cibaria lib. IV, cap. XVI, & XVII.

septentrioni familiare: provida enim natura, cessante ibi vitis cultura ob aëris inclementiam incolis liberali manu frugum copiam dedit, unde non solum abunde alimentum sumerent, sed & potum sibi instar vini nec insalubrem, nec insuavem conficerent. Ab antiquissimis seculis Germanos hoc potu usos fuisse, *Tacitus* de moribus Germanorum testatur. *Potus humor ex bordeo, aut frumento in quendam similitudinem vini corruptus.*

Notum est, cerealia omnia abundare tali substantia, qua homines, & plurima animalia nutrirî commode possunt; sed adest in omnibus plus, minusve lentor, qui incoepa fermentatione, dum panis ex frugibus paratur, dividitur, & attenuatur; ubi autem cerevisiae parandae interserviat, aliud artificium adhibetur; ut lentor ille corrigatur.

Primo hordeum maceratur aqua, donec intumescat; mox germen emittit; deinde cum ipso germine exsiccat ignis ope, quem in hunc usum constructus fornax per exigua spiramenta emittit: raro citra ignis beneficium hoc obtineri poterit, idque nonnisi aestivis mensibus vigente aestu, cum sublimi loco in tabulatis saepius per diem convertitur, ut humiditas a maceratione relicta diffari possit, & incoepa germinatio suffocari: si enim haec pergeret diutius, germen plantulae cito crescens consumeret illud nutrien; quod in singulis seminum cerealium granis contentum cerevisiam parandam ditare debet. Magni momenti in praeparatione cerevisiae est; observare illud tempus, quo incoepa germinatio satis attenuavit farinaceam cerealium partem, ut germen in his latens evolvi, & crescere incipiat; nec tamen eo usque protrahendum est calore, & humiditate germinis incrementum, ut consumatur nimis illa farinacea frugum pars, a qua cerevisiae efficacia pendet; unde tunc exsiccatione impeditur ulterior germinatio. Hordeum, triticum, & alia frugum genera, quae variis cerevisiis parandis adhibentur, postquam hanc incoeptam germinationem subierunt, non amplius suo nomine vocantur, sed simpliciter dicuntur generali nomine *malum*. *Aëtius* (z) *Bôur* appellavit; *est autem bordeum madefactum, deinde cum enatis ligulis tostum*. Unde cerevisarii hominem versatum in hac arte *malum* ex frugibus parandi conducunt etiam maiori stipendio, nisi ipsi huic operi invigilare maluerint.

Malum mola frangitur in crassiorem farinam, quam aqua fere servida digerunt, non tamen ebullient; sed separatim postea liquidum, *malis* substantia dives, decoquunt ad variam spissitudinem, prout meracior, vel dilutior cerevisia desideratur, quae vel recens potatur in mensis, vel post fermentationem absolutam vim inebriantem, & fragrantiam spirituosam acquirit, & maiori cum cautela usurpari debet, quum largius potata temulentiam inducat, & quidem magis durabilem, quam a vino nasci observatur. Miratus *Plinius* hanc rem exclamat: *Hæu mira vitiorum solertia! Inventum est, quomodo aqua inebriaret.*

Cerevisiae, quae rachiticis commendantur, non sunt fermentatae, sed saturatae admodum substantia nutriente frugum, ita ut cibi potabiles dici mereantur,

tur; & vix in fermentationem deduci possunt ob maiorem spissitudinem, nisi prius aqua addita diluantur. Quamvis enim in praeparatione cerevisiae, uti dictum fuit, *maltum* non coquatur cum aqua, sed infundatur aquae fere servidae, & perpetua agitatione permisceatur, ut frumenti substantia diluatur in aqua, tamen postea illud infusum decoquunt, postquam a *malo* separatum fuerit, & inspissant pro lubitu; unde pro varia spissitudine pretium talis cerevisiae crescit. Tales cerevisiae recentes laudantur: veteres enim post fermentationem peractam deposito sedimento limpidissimae fiunt, & vinosam fragrantiam acquirunt; sed & simul temulentiae redduntur, & per plures annos fervari possunt. *Mumma Brunsvicensis* magnam famam obtinuit inter cerevisias huic usui servientes; quae adeo spissa est, ut Cereris extractum liquidum vocari possit. Quom autem ad fermentationem requiratur certa humidi copia, hinc *mumma*, saturatissima quum sit frugum substantia, manet immutata, licet ad diffusa deferatur loca. In Indias orientales navibus deferuntur, & gustavi inde reducem, nec mutatam tamen. Facile intelligitur, meracas has cerevisias siti sedandae impares esse, sed vim roborantem, & nutrientem insignem possident. Uncia una talis cerevisiae ter de die dari solet, cum pane biscocto ante laudato rachitide laborantibus optimo cum effectu. Anglorum, & Batavorum cerevisiae meraciores minus spissae quidem sunt *mumma Brunsvicensium*, sed saporis magis grati, hinc & instar potus communis adhiberi possent. In *materia medica* ad hunc numerum laudatur, si aetivio tempore, dum minus meraci potus magis placent omnibus, cerevisiae illae diluantur aequali copia aquae spadanae, vel alterius aquae ferratae. Raro obtineri potest, ut iuniores tali potu utantur. Cerevisia enim aqua diluta multum de saporis gratia amittit, & plus adhuc, si aquis medicatis misceatur. Vinum longe melius aquae connubium fert. Medicamenti loco potius servit vinum rubrum adstringens, sed simpl bene maturum, si cum pane biscocto sumatur.

Vinum autem Hippocraticum dictum paratur, dum semilibris vini generosi Rhenani infunduntur unc. iv cinnamomi lectissimi forficis conficci, sed non contusi; infundantur frigide vase clauso per 24 horas, addita simul tali copia sacchari, quae edulcorationi sufficit; dein vinum sic medicatum redditum coletur per saccum laneum conicum, quem *manicam Hippocratis* vocant in officinis, & lagenis optime clausis servetur.

Gratissimum sic habetur remedium, quod subtilissimam tantum cinamomi fragrantiam continet, & ter vel quater de die ad mediam tantum unciam cum pane biscocto datur.

Ceterum & similis potus parari posset, si vino Rhenano substitueretur vinum Florentinum rubrum, Gallicum rubrum adstringens, vinum Graecum nigrescens adstringenti sapore praeditum: talia enim vina & uberrima spirituum copia, & roborante virtute praestant.

Aëre sicc, & calidiusculo. Dictum fuit §. 1484, rachitide corripitales infantes, qui frigidius, humidiusque tractantur; imprimis si balneo, foru, vaporibus humidis enerventur. Ad §. 1488 constitit, causam proximam morbi consistere in cacochymia inerti, mucosa, frigida, una cum laxa

par-

partium firmarum fabrica. Unde sponte patet, prodesse aërem siccum, calidiusculam, utpote indoli morbi adversum. Magnus enim calor enervat, debilitat, uti vel robustissimi homines experiuntur, & nisi calori moderato aëris iungatur simul siccitas, nullo modo prodesset; a calore enim humido solidarum partium laxitas augetur, & subito increfcit morbus. Illi, qui maris litora incolunt usu edocti, infantes rachiticos in collibus arenosis exponunt aprico soli, verno imprimis tempore, & serena tempestate magno cum emolumento. *Buchnerus* (a) notat, puellam, quae rachitica vixit usque ad decimum quartum aetatis annum, tandem morbo succubuisse, postquam longa tempestas austrina praecedens omnia mala auxerat. In alio puero rachitico (b) observavit, quod pedum officio aestate magis valuerit, quam hyeme; praesertim si sicca fuerit aestas. Diuturna autem tempestate austrina praegressa adeo invaluit morbus, ut amplius pedibus incedere non valeret. Unde videtur in prognosticis pro axiomate posuisse sequentia (c): *Austrina tempestas rachiticiis mala; mala hyems. Coelum humidum rachiticos facit: hinc & morbum auget.*

Vestitu accurate siccō &c. Magni momenti monitum hoc est; quod, si observetur, in rachiticiis curandis insigniter prodest. Nisi enim vestes siccae fuerint a corpore calefactae, vaporem humidum emittunt, qui corpus aluens labefactat ulterius nimis flaccidas partes. Hinc suasi semper, ut vestes depositae siccarentur sedulo, & suffumigiis ex olibano mastiche imbuerentur, antequam induerentur denuo: idem verum est de lectorum stragulis. Indusia ex lana parata praeferruntur his, quae ex lino conficiuntur. Linea enim repercutiunt illa, quae irruunt; hinc calefaciunt quidem corpus, sed calore humido ob repercussam exhalationem cutaneam, quae si copiosior fuerit, linea indusia penetrantur, & tota madescunt. Lanae vestes bibulae sunt, & quum crassiores sint lineis, plus humidi in se recondunt, antequam humidae ad tactum appareant: hinc sedulo exsicandae sunt, antequam de novo induantur. Quum autem & lanae asperior superficies sit, quam lini, si nudum corpus tangant vestes laneae, ab omni corporis motu frictioni species excitatur, quae insigniter prodest, uti statim dicitur.

Decubitu super floreis ex aromaticis &c. Quum saepius rachitici pueri compressum ad latera thoracem habeant, qui ad sternum affurgit in acutum, hinc difficilius ab aëre inspirato pulmones explicantur, & sere semper, praecipue adultiori iam morbo, respiratio difficilior adest; unde storeas, & culcitras plumis refertas non sine incommodo tolerant infelli; quum autem fore ubique locorum

Negleſtis urenda filix innascitur agris,

hinc illi, quibus domi res angustior est, colligere solent filicis folia, vel vili ad-

(a) Disputat. ad morbor. histor. opera Haller. tom. VI, pag. 280.
pag. 284.

(c) Ibidem pag. 288.

(b) Ibidem

admodum pretio comparant, ut lectulos ac pulvinaria parent prolihus rachiticis, & saepe solis his foliis utuntur, quae firmioris substantiae quum sint, a pondere comprimantis corporis aegri non facile uniantur inter se in maiores massas; praecipue si prius in umbra siccata fuerint; unde merito ad hunc usum laudantur aptissima.

In materia medica ad hunc numerum specimen habetur, quomodo tales lectuli vel pulvinaria parari poterunt ex foliis filicis & gratis aromaticis herbis, quae iubentur conteri in pulverem tenuem. Fortè minutim conscissas forfice herbas addere conducirer magis: pulveres enim a corporis incumbentis humiditate conglobarentur facile non sine aegrorum molestia in maiores massas, & fragrantia herbarum suaveolentium periret citius, dum in pulverem tenuem trita sunt; praecipue quum tales lectuli saepe exsiccare debeant. Ne autem nimia fragrantia incommoda foret aegris, duplum ponderis omnium herbarum simul sumtarum additur de paleis hordei.

Dum de die adhuc surgere, & in sedili sedere possunt, lectulus interea quotidie poterit exsiccare; si autem perpetuo decumbere cogantur, praestat binos tales lectulos conficere, quibus alternatim incumbant, ut singuli exsiccare possint.

In clatiori aedii parte supra tabulata lignea. Maximam partem vitae nostrae omnes transigimus in illis locis, ubi dormimus; & quum aer siccus calidiusculus adeo profit rachiticis, hinc convenit, ut in altiori aedii loco dormiant: inferiora enim domus conclavia semper humida sunt plus minusve. Aestivo tempore, occiduo sole, imò citius in tellure ros humidus observatur, qui quandoque ad sex vel octo pedes ascendit, & inferiorem domuum partem reddit humidissimam; ita ut situ & fungis obfitos non semel videam conclavium angulos, & pavementum, ligneum si fuerit, perpetuo tali madore putrescere. Talis aer pessime nocet hoc morbo decumbentibus; unde patet necessitas, ut aegri superiorem aedii partem incolant, vel saltem ibi dormiant. Lectuli fiant ex ligno, & parietes ligno obtegantur, si sumtibus ferendis sufficiant parentes. Ligna autem, quae his usibus servantur, sicca debeat esse, nec obducta ullo pigmento aut vernice. Observatur enim, quod ligna in se rapiant humidum ex aëre, & quidem magna vi; unde, si libere distendi nequeant in omnem dimensionem, ligna distillant toties cum magno fragore. Ubi autem lignum pigmento oleoso aut vernice obducitur, tunc non amplius absorbet ex aëre aquam in se, sed humida tempestate aqua striatim per superficiem lignorum decurrit.

Gestatione, concussionem, oscillationem &c. Quantum profit corporis motus in curanda fibra debili & laxa, antea ad §. 28, 2 dictum fuit. Verum omnia, quae ibi laudata fuerunt, in rachitide curanda obtinere nequeunt; deficit enim sensim in hoc morbo vis muscularis, ita ut tandem omnimoda impotentia motus quorumcumque artuum adsit. Unde beneficium motus ut sentiant miseri, aliorum viribus indigent, ut absque virium propriarum dispendio omnes fere fructus muscularis motus acquirant.

Facile intelligitur a lenioribus hic incipiendum esse, & sensim ad fortiora progrediendum.

Gestatio inter placidissimas atque debiles exercitationes numeratur a *Mercuriali* (d), & propterea non solum sanis & valetudinariis, verum etiam longis, ac inclinatis morbis, & denique iis, quibus lentae morborum reliquiae remanent, nec aliter eliduntur, accommodatae sunt. Gestationem coeliacis commendat *Aretaeus* (e); sed illam fieri iussit in locis, ubi lauri, myrti, thymus crescunt; & secundum *Petii* emendationem (f), qui vocabulum *miris* in genitivum pluralem *miris* mutandum voluit, quod nempe suavolentium herbarum fragrantia bene concoquendum vim quamdam haberet. Certe gestatio in talibus locis, ubi hae plantae crescunt, locum habere posset in rachiticorum cura, quum in eundem finem decumbere iubeantur in lectulis, qui aromatibus repleti sunt; uti dictum fuit.

Nutricum vel regularum ulnis iuniores gestari possent quidem, sed ossium mollities magnam hic cautelam poscit. Dum enim ulnis insident aegri, circa thoracem illos sustinere solent manu apposita mulieres, quum proprium corpus sustinere nequeant; sed sic periculum est, ne figura thoracis mutetur. Ubi autem diu eidem brachio insident, dum gestantur, vertebrae in unum latum declinare incipient; hinc tutius est, ut iacentes in lecticis gestationis beneficio fruantur; quod vario modo fieri poterit, uti notum. Ditiore sellis gestatoriis uti possent, quas muli barulant (litieres); plectis curruiculis utitur in eundem usum, in quibus decumbunt rachitici pueri satis commode; qui a mulieribus trahuntur. Huc referri potest navigatio, si sicca & calidiuicula tempestas fuerit; uti & lecti pensiles, quales sunt cunae fulcris sic sustentatae, ut pavimentum non tangerent, quae levi vi agitari possunt absque ullo strepitu excitato. Imo cunae vulgares, quae insunt binis segmentis circularibus, similem usum habent, nisi quod, dum rotantur supra pavimentum, somnum quandoque impediunt sono, quem faciunt, dum moventur. Omnes autem illi motus debent esse primo lenes sensim augendi, sed prudenter. Vidi non semel, a nimis valida cunaru agitatione vertiginem natam primo, dein sequente nausea molesta, & vomitu. Dum tentatur navigatio, sic illa timoribus carens, nec ullo pacto nauseam commoveat.

Oscillatio merito commendari meretur; quod exercitii genus sub *oscillarum* appellatione a veteribus appellatum putat *Mercurialis* (g); *assere funibus quatuor ad laquearia suspensio, & ibi sedentibus pueris aut puellis per aërem iactatis*. Binis pariter vicinis arboribus funem alligare solent, cuius laxa dependentis medio insident, & per aëra pelluntur a focis: sic levi arte machinam oscillatoriam parant, qua se oblectant. Omnibus his modis, spes est, ut obtineantur sequentes effectus: scilicet, ut pendula viscera abdominalia illis concussionibus agitata roborentur, & concreta resolvantur; ut feces ex ultima digestionem residuae eliminantur ex primis viis, quum in rachiticis intestina inflata minus in ingesta agere videantur; tandem & ut im-

(d) De arte gymnastica lib. VI cap. IX pag. 372.

(e) De curatione morbor.

diuturnor. lib. I cap. VII pag. 133.

(f) Ibidem pag. 294.

(g) De arte

gymnastica lib. III cap. VIII pag. 215.

impetus ac efficacia aëris in pulmones augeatur, ambiensque atmosphaera calore corporis statim tepescens, renouetur assiduo.

Concussiones in teneris illis corporibus non nisi magna cum cautela tentandae sunt, & forte nunquam locum habent, nisi in morbo incipiente, quando nondum ossa firmitatem amiserunt, vel circa finem curae, ubi denique maximam roboris perditam partem recuperarunt. Docuit historia morbi, ossa sic debilitari, ut levi etiam vi frangantur: disponuntur enim ad cariem & spinam ventrosam. Et licet nullum fracturae ossium periculum foret, tamen ossa cederent concussionibus, figura vitiosa illis induceretur; unde plurima & tristissima mala metuenda forent. Concussiones autem tentatas fuisse in curanda rachitide; videtur concludi posse ex ultima prognosi *Glissonii* (b), cuius antea memini ad §. 1487, ubi sic habet: *Qui facilius tolerant omnimodam inactionem corporis, acris paribus, facilius curantur.* Bonum signum hoc dare lubens agnosco; verum caput magnum nutat sponte quaquaversum, hepar mole auctum ultra limbum costarum prominet, anhelum pectus difficili respiratione vix non opprimitur in morbo iam provento. An tutum est concutere talia corpora? Molli carpento vebi lente miseros suaderem facile, sed uestione in rheda per strata viarum abstinere potius ob rationes dictas.

Frixiōne multa calida &c. Omnes medici, qui frequenter hunc morbum vident, noverunt, quantum boni expectandum sit a frictionibus. *Asclepiades*, uti notum est, in morbi curandis plurimum sperabat a frictionibus. Sed uti optime monuit *Celsus* (i), auctor ille nihil reperit, quod non a vetustissimo auctore *Hippocrate* paucis verbis comprehensum sit; quae sequuntur: *Frixiōne, si vehemens sit, durari corpus; si lenis molliari; si multa minui; si medica impleri; sequitur ergo, ut tum utendum sit, quum aut adstringendum corpus sit, quod sturns est; aut mollicendum, quod induxit; aut digerendum in eo, cui copia nocet; aut alendum id, quod senex & infirmum est.* Perfricatur autem abdomen mane vacuo adhuc ventriculo, panno laneo, qui imbutus vapore *benzoini, succini, olivani*, & his similium aromaticum, huic usui adhibetur. In *materia medica* ad hunc numerum formula talis suffragii habetur. Quum autem ex historia morbi patuerit, hepar mole auctum excedere limbos costarum, blanda tantum frictione abdomini applicari poterit, ne vis inferatur hepati. Simul & intestina flatu turgida molliter comprimuntur inter fricandum, sicque cavetur, ne congestiones in illorum cavis accumulentur.

Quum autem caput maius in rachitide sit, lenes frictiones & huic adhibentur, sed magna semper prudentia, quum suturae calvariae cultum a se mutuo distent, & totum illud medium interpositum ossibus sit membranaeum, adeoque a validiore frictione comprimi posset, sicque cerebri functiones turbari.

Toti spinae dorsu frictio prodest; sed moderata tantum: semper enim debemus

(A) De rachitide cap. XXIII pag. 290.

(i) Lib. II cap. XIV pag. 88.

mus memores esse, corporis ossa in hoc morbo mollescere, atque ita rudius tractata facile naturalem amittere figuram; unde & eadem lenitas observanda est, dum artus superiores ac inferiores in carne musculari roburare tentamus sensim. Postquam morbus iam coepit in melius vergere, sensim frictionum robur crescere poterit. Unde & Celsus (k) monet circa frictiones sequentia: *At ubi totius corporis imbecillitas hanc curationem per totam id exigit, brevior esse debet & lenior, ut tantummodo summam cutem emolliat, quo facilius capax, ex recenti cibo novae materiae fiat.* Licet enim magnam spem in frictionibus posuerit Celsus, tamen intelligebat facile, per illas quidem tolli posse obstacula, quae sanitatem turbant, verum nihil a frictionibus addi corpori, sed potius aliquid tolli (l). Nam & adstringitur aliquid, eo demto, quod interpositum, ut id laxaretur, efficerat: & mollior eo detractio, quod duritiem creabat: & impletur, non ipsa frictione, sed eo cibo, qui postea usque ad cutem digestionem quadam relaxatam penetrat.

Cantharidum iterata quandoque applicatione. Caput rachiticorum mole maius est; hinc obtinuit, ut & illud minuire tentarent illi, qui olim morbi curam aggrediebantur, & quidem varia methodo. Memorat Glissonius (m), Empyricos Anglos, qui hunc morbum tractabant, adhibuisse scarificationem aurium; & sine hac vix felicem curationem sperabant. Plerumque bis vel ter illam adhibebant, & quidem in concha auris: utebantur autem rarius lanceola, vel acutiori scalpello, obtusiori cultello id perficiebant non morantes infantum ciulatus. Sed & quidam iubebant, dextrae auris sanguinem lana exceptum sinistro hypochondrio sinistrae dextro alligari debere. Fateretur Glissonius, quod hoc remedii genus non improbet quidem, *videris tamen absque illius usu nonnullos pueros sanatos.* Quantum novi, hodie illa scarificatio aurium penitus eviuit, nec illam unquam tentatam vidi.

A fonticulo videtur Glissonius plus boni expectasse, & dixit: *Hoc solum praesidio nonnullos pueros liberatos fuisse novimus.* Credebat enim potens esse remedium, si inter secundam & tertiam colli vertebrae poneretur fonticulus, a quo sperabat, enormem capitis magnitudinem imminuendam fore, & superfluum serositatem evacuandam, uti & ossium augmentum nimium impediendum, & nimiam spinalis medullae humiditatem, quam metuebat, exsiccandam. Quum tamen rachitici collum flexile, & caput nutans habere soleant, fonticulus talis difficile tractari poterit, nec levem faciet molestiam; unde concludit, *fonticulum non praescribendum, nisi ea morbi magnitudo sit, ut cum aliis remediis absque hoc satis domari possit vix speremus.* Fateor candidè, quod nunquam fonticulum rachiticis applicari suaserim, & tamen succellit cura, si adhuc sanabilis morbus foret.

Quum in rachitide adulta imprimis tandem adsit impotentia motus omnium artuum, & antea ad §. 1069, ubi de paralyti curanda dicebatur, vesicatoria laudata fuerint, tamquam efficax remedium ad excitandum motum in musculis para-

(k) Lib. II cap. XIV pag. 90.
cap. XXIX pag. 339 & seq.

(l) Ibidem pag. 88.

(m) De rachitide

paralyticis, mirum non est, cantharides a quibusdā laudatas fuisse ad curam rachitidis. Dictum tunc fuit, paralyticis applicari vesicatoria in illo loco spinæ dorsi, qui altior est partibus paralyti affectis; sic, si hemiplegicus homo fuerit, vesicatorium applicatur nuchæ; si unum ex extremis inferioribus paralyticum sit, vertebri lumborum potius cantharides applicabuntur. Unde in rachiticis, in quibus omnes artuum musculi languent, nuchæ vesicatorium applicari deberet; quod ob rationes modo dictas absque molestia fieri non poterit, & quandoque dolorem excitat. Sumus autem certi, in cura huius morbi, rediturum musculis motum, si possimus efficere per artem, ut redeat torositas, quæ per morbum perierat musculis. Nec videmur adeo hoc posse expectare ab evacuatione lymphæ, quæ ex vesiculis per vesicatoria elevatis, dein ruptis exit. *Glissonius* (n) fatetur, quod vesicatoriorum usum in hoc morbo curando nondum satia expertus fuerit, tamen utiliter interdum admitti posse coniectatur.

Notat autem, aliquem ex medicis illis, qui cum ipso rachitidis indolem indagabant, bienni puello hoc morbo affecto, qui in febrem quoque continuam & malignam inciderat, quique iam prope phreniticus factus fuerat, præscripsisse inter alia vesicatorium vertebri colli adhibendum; unde manifestum levamen secutum fuit; & post aliquot dies a febre liberatus est. Postea bis vel ter infusione rhabbari purgatus præter omnium expectationem fere absque aliis remediis rachitidem quoque excussit.

Neque impedire potuit felix ille successus; quin *Glissonius* minus faveret vesicatoriis (o): talis enim remedii vis subito exeritur, & mox paulatim exhausta est; quod non usquequaque chronico morbo quadrat. Unde tandem concludit sequentia: *Quocirca vix medicamenti vesicatorii applicationem in hoc curando morbo admisimus, nisi acutus una complicetur morbus, qui sui causa hoc remedii genus exigat.*

Vomitiviis lenibus aliquoties cum prudentia repetitis. Si nempe signa docuerint, ventriculū, & alia abdominalia biliosis, pituitosis, aliisve fordibus collectis sic gravata esse, ut actionibus suis rite fungi nequeant. Talia quidem in rachiticis contingere posse, negari nequit, attamen non semper in rachitide curanda vomitoriis opus est. Verum quidem (§. 1485, 6) abdomen plerumque in hoc morbo tumidiū esse, licet aegri potius macilentī sint; adeoque posset credi, ventriculū & intestina infarcta, adeoque evacuatione opus esse. Sed ad eandem paragraphum dictū fuit, hepar in rachiticis maiorem molem habere, quandoque & lienem, licet eadem hæc viscera bene colorata ac sana videantur, & nullo modo sint indurata, aut alio notabili vitio correpta. Intestina autem flatu distenta inveniuntur sæpius post mortem; uti & in viventibus: ex quibus facile patet, quare abdomen nonnihil prominens & tumidiūculum inveniatur in rachiticis.

Non ergo videtur concludi posse, vomitoriis semper opus esse, quum non semper saburra evacuanda addit; imo sæpius, uti §. 1486, 3, dictum fuit, ap-

(n) De rachitide ibidem pag. 346.

(o) Ibidem pag. 348.

petitus & digestio ferme illaesa. Quum autem hepar mole auctum ultra costas toties eminere observetur in rachiticis, an tutum foret unquam valido vomitorio dato viscus illud exponere validis concussionibus diaphragmatis & musculorum abdominalium? Hepar naturaliter costis incumbenticus tuto defenditur. Hinc prudens usus vomitoriorum lenium laudatur tantum, ubi opus erit.

Unde in *materia medica* ad hunc numerum ponitur formula vomitorii, ex granis viginti ipecacuanhae parati, quae per noctem in unc. j vini infusa mane depurata exhibentur, saccharo edulcorata. Lenissimum vomitorium dat, & potest, si iunioribus aegris propinari debeat, quantitas ipecacuanhae tuto minui multum manente tamen efficacia. Egregius medicus *Samuel Pye* (p) monet *Sydenhamum*, cuius tempore *ipecacuanha* nondum cognita erat, usum fuisse vomitorio antimoniato; vino benedicto nempe, sed saepius non ausum fuisse illud propinare infantibus, cum nimis valide ab illo corpus turbaretur, licet certo sciret, illos emetico indigere. *Ipecacuanha* licet longe mitius agat antimoniatis emeticis, tamen observaverat, & a viginti huius radices grans datis non leves in corpore excitari turbas. Egregius ille medicus quadragenariae mulieri, quae emetico indigebat, dedit bina grana *ipecacuanhae*, quae bis vomitum excitaverunt summo cum levamine, & facile. Postea in pluribus adultis ac iunioribus a tam parva dosi similem effectum vidit. Imo medium granum profuit recens natis, & paucorum dierum infantibus: tabellas plures curavit imprimi, quae nomina aegrorum, quandoque & aetatem, uti & vomituum ab exigua dosi ipecacuanhae secutorum numerum exhibent. Possent ergo leves tales emetici doses tentari, si signa decerent illas requiri.

Facilius, credo, hanc methodum omnis prudens sequetur, quam in tenera aetate audacissima tentare. *Buchnerus* (q) infanti rachitico unius anni cum dimidio dedit largas doses resinae scammonae, tartari emetici, sulphuris antimoni aurati; sed frustra: tandem amplo singulo mercuriali, cum spiritu vini saepius fricata spina dorsi, & tinctura veneris Helvetii, quae vitriolum Cyprum spiritu vini solutum continet, ita data, ut vomituriendi quidem conatus, raros tamen vomitus ciceret, & appetitum plane prosternebat, in integrum restituit: furibundam prae nimis Excusat hanc audaciam, quod morbum crederet extremum esse, adeoque & extrema requiri remedia. Sed simul addit: Id adhuc notabis, nisi doses tartari emetici & vitrioli veneris oblitus sim, me tamen obstupuisse, ad excitandam nauseam & inappetentiam ea copia opus fuisse; non propterea, quod stupido drastica convenire ex dogmatibus veterum ignorarem, sed quod eam vim requiri, non augurerer. Admodum verosimile videtur, puerum, qui tot & tanta pati potuit, leniori arte curari potuisse.

Purgantibus, dein roborantibus per aliquos dies successive adhibitis. Antea ad §. 1480, & 1484, pluribus demonstratum fuit, rachitidem esse morbum distinctum a tumore & duritie abdominis, quae in iunioribus observatur, post

(p) Medical observat. and inquiries vol. I pag. 240 & seq. histor. oper. Haller, tom. VI pag. 286.

(q) Disputat. ad morb.

post toleratas diu febres autumnales. Probatum tunc fuit ipsissimis *Sydenhami* verbis, quod purgantibus frequenter repetitis expellere tentaverit illud, quod post febres colligebatur in sinistro abdominis latere in iunioribus; sed in rachicidis curatione semel vel bis tantum suadet purgantia dari, quum non paucos infantes a repetitis saepius catharticis periisse vidisset.

Unde etiam in *materia medica* ad hunc numerum non habetur formula remedii purgantis, quod unica vice sumendum foret, sed rhabarbarum cum myrobalanis citreis, & pariori copia agarici trochiscati, infunditur frigido potui infantum communi tantum: succedit enim plerumque satis feliciter in iunioribus, si potus communis reddatur medicatus: in principio quidem difficulter sumunt; sed si sitientibus non detur alius potus, citius assuescunt, quam creditur: imo aliquoties vidi, quod postea puram cerevisiam repudiaverint, dum medicata non amplius indigebant.

Cerevisia fortior huic usui adhibetur, qualis antea laudata fuit. Postquam frigida infusione cerevisia per 24 horas cum his purgantibus digesta fuit, incipiunt uti; hinc quandoque alvus in initio evacuatur; sed, quum nulla sit intentio corpus subito deplendi, si videant alvum nimis evacuari, statim cerevisiam illam vi cathartica imbutam aequali copia cerevisiae purae diluunt, imo & maiore, donec moderatus reddatur admodum alvi fluxus. Quum enim hepar maioris molis sit semper, lenis alvi evacuatio non debilitata sufficit.

Satis commode obtinetur ille effectus, si omni vesperi lagena repleatur eadem cerevisia: sic enim diluitur magis & magis efficacia catharticoe quotidie; quae non solum renovari: simul hoc commodi sic habetur, quod medicamentorum ingratus sapor quotidie fiat mitior, & vi purgante rhabarbari ac myrobalanorum exhausta iam supersit tantum virtus roborans & adstringens; quae una cum cerevisia fortiori in cura rachicidis quam maxime prodest.

Ubi aqua inservit potui communi, difficillime hoc tentari poterit; quia aqua ex sua natura insipida & inodora sapore purgantium imbuta displicet nimis. Unde aquae puritatem intemeratam reliqui; & purgantia *Hydromelli* recenti puro infundi curavi; pauca copia corticis cinamomi addita; atque talis infusi mane & vesperi cochlear, plus minusve pro varia aetate dedi.

Denique usu diu continuato &c. Laxa omnium partium solidarum fabrica est; inerta, mucosa, frigida; vappida humorum indeoles; membranae vase, viscera mollia, flaccida; ossa ipsa consistentiam requisitam non habent. Omnia, quae hactenus ad curam mali laudata fuerunt, conspirant, ut morbosas has solidarum & fluidarum partium dotes mutant, emendent.

In *materia medica* ad hunc numerum recensentur simplicia, qualia & ad §. 28, 4 plura recensita sunt, quae diversis sub formis tentari possunt. Omnium commodissime potus communis aliquibus ex his medicatus reddi poterit. Habentur formulae in *materia medica*, quibus similes plures concinnari poterunt. Vinum medicatum describitur, in quo lenibus aromatibus & roborantibus additur ferri limatura, uncia media nempe libris octo vini; post frigidam infusionem ter de die uncia talis vini datur & magno cum fructu. Quandoque hydro-

hydromelli cortices cinamomi infundi curavi cum parca quantitate limaturae ferri, & bis de die cochlear dedi, augendo quantitatem in adultioribus.

Sed, quum iuniores repudient saepe oblata remedia, coguntur medici quandoque talia adhibere, quae parva sub mole insigniter profunt. Magnum nomen habuit remedium a Boyle descriptum, *ens veneris*, vocatum (r), quod specificum contra rachitidem remedium laudabat auctor, quum iam *ultra centum infantes malo hoc ad conditionem usque desperatam laborantes sanati hoc fuissent*. Nec hoc remedium turbabat tenera haec corpora ullo modo, quum ad duo vel tria grana tantum daretur, licet in quibusdam tamen corporibus absque periculo ad viginti vel triginta exhiberi potuerit ex aqua destillata, cerevisia tenui, aut vehiculo convenienti quocumque. Si sensibilem operationem faceret, per sudorem, & ex parte per urinam, agebat, eratque specificum certissimum Anglorum contra rachitidem.

In Italia hoc remedium famam retinuit, & celebris Antonius Benevoli (s) felicissimum successum se vidisse testatur in nobilissima familia, in qua quatuor filii, dum ad terminum secundi aetatis anni pervenerant, rachitide perierant. Quintus filius undecimo aetatis mense eodem morbo laborabat quam certissime; cuius symptomata enumerat. Genuensis medicus per Florentiam transiens rogatus a Benevoli suasit usum *entis veneris Boylei*; quod credebatur esse remedium praeparatum ex sublimatione *salis ammoniaci a vitriolo Cyprino*. Quum Florentiae non proflaret illud remedium, Genua missum adhibuit quotidie ad grana duo; post aliquot septimanas dedit omni die grana tria; & hoc modo pergebatur per duos menses aliqui mali levamine. Quum autem utile crederetur, usum *entis veneris* subinde intermittere per aliquot dies, deinde denuo incipere, & hoc tentatum fuit; sed post octo vel decem dies augebantur mala, accedente diarrhoea sanguinolenta, quae 15 vel 20 vicibus alvum evacuabat de die cum febre, urina parca, & macie totius corporis; iterum tunc *ens veneris* adhibebatur; quum autem adesset anasarca, tentandus videbatur & ferri usus, licet defuncto uni ex fratribus sine fructu adhibitus fuisset. Hinc mane quatuor grana *croci martis aperientis* dabantur, & vespere tria grana *entis veneris*. Sed non diu datus fuit *crocus martis*, quin sequeretur haemorrhagia narium, quae quodam vespere notabiliter augebatur cum vultu inflammato & delirio valido. Unde solo *ente veneris* cura tentabatur. Clysmata tamen adhibebantur ex aqua ferrata cum rosis rubris decocta, vel ex ovo in eadem aqua diluto ad diarrhoeam sedandam. Quum a cibo angeretur, decocto panis, ovo subinde addito, nutriebatur. Indusio laneo tegebatur. In hoc languore mansit usque ad decimum nonum mensem.

Aliquot post biennium mensibus paucorum dierum spatio omnia in peius ruebant subito; gingivae reddebantur nigrae, putridae; maculae lividae tingebant varias corporis partes cum tanta debilitate, ut morti proximus videretur.

(r) Robert. Boyle considerat. circa util. philos. natur. exper. exerc. V cap. VI pag. 234.
(s) Dissertazioni & osservazioni: tre delle quali sulla rachitide &c. pag. 229.

retur. Aderant macies, debilitas, diarrhoea; datum fuit decoctum *radicum salsaeparillae*, additis aliquot foliis *cobleariae*, & *yuac arthriticae*; simul dabantur mane duo grana *entis veneris*, & totidem vespere. Tentabatur una & usus lactis muliebris; in quo perrectum fuit per quatuor menses; una cum *ente veneris*; & tertio aetatis anno completo magna malorum pars cessaverat iam; diu adhuc perrectum in usu *entis veneris*, & integre convaluit. Postea alias similes curas enumerat, quae *entis veneris* in rachitide efficaciam confirmant; imprimis si simul daretur decoctum *salsaeparillae*, & lac muliebre.

Videtur *Benevoli* credidisse, parum sperandum esse ab usu ferri in rachitide curanda: credebatur enim, *ens veneris* Boylei ex vitriolo cyprino parari. Verum quidem est, quod *Boyleus* (1) dicat sequentia: *Quamvis medicinae huius experimenta & Helmontii neustiquam convenire, eam tamen e censu ordinariorum eximendam esse, observaverimus, a minerali, e quo ipsam eliciimus, ens primum veneris vocavimus.* Sed sequenti pagina, ubi praeparationem eius describit, nullam mentionem facit vitrioli *veneris*, sed in formula legitur: *Recipe vitriolum daniscanum (aut huius destitu Ungaricum, vel Goslaricenses), & calcina, donec calx colorem purpureum, aut rufum obtineat.* Vitriola haec ferri sunt; & colorem illum rufum, aut purpureum calcinatione acquirunt. Iubet dein, hanc calcem aquae calidae affusione ab omni falsedine liberandam esse, quantum fieri poterit; adeoque supererit sola pars metallica. Misceri iubet hanc calcem edulcoratam & exsiccata in mortario, contundendo, vel alio quocumque modo exquisitissime cum *sale armoniaco puro* eiusdem ponderis; dein hanc miscelam ex retorta vitrea, igne arenae per gradus aucto sublimari iussit per decem aut duodecim horas, quibus praeterlapsis, ignis augeatur, donec si fieri potest, retortae fundus igneo colore rubescat. Notat simul, sublimatum flavum seu rubicundum colorem habere, & si non fuerit coloris egregie flavi, sed pallidi, hoc contingere ut plurimum, si ingredientia non fuerint exactissime inter se commista; tuncque monet, sublimatum illud cum residuo, capite mortuo nempe, exactius commistum de novo sublimandum esse. Si vero flores illi non a capite mortuo, sed per se iteratis resublimationibus traientur, quod forsitan mirabere, color & sublimatum incrementi loco diminuentur. Si haec omnia confiderentur, nullo modo videtur verosimile, *ens veneris* dictum ex vitriolo cupri a Boyleo paratum fuisse. Nulla mentio coloris caerulei fit, & addit auctor, hoc remedium in quibusdam etiam corporibus absque periculo ad viginti vel triginta grana exhiberi posse. Omnes tamen chemici periti norunt remedia ex cupro parata tantum tentari tuto parca dosi. Si vero videantur illa, quae contingunt, dum recentissime limatum ferrum cum aequali copia salis ammoniaci simili modo tractatur, patebit, *ens veneris* adeo laudatum in cura rachitidis agere vi medicata ferri.

Dum

(1) In loco modo citato pag. 233.

Dum enim bina haec conteruntur simul in mortario vitreo (a), quo diutius eo melius, ex his antea prorsus inodoris, vapor volatilis subtilissimus, quasi alcalinus prodit: nam, dum acidum salis ammoniaci in ferrum trahitur, pars volatilis alcalina eiusdem liberari incipiens, sponte avolat. Pulvis ille imponitur cucurbitae vitreae, siccae, purae, capaci, ut in fundo satis late explicatus sit. Alembico imposto applicetur excipulum; luto muniantur omnes commissurae; apparatus totus imponatur furno arenae, sic ut solum capitellum emergat; applicato igne 220 graduum prodibit vapor acer; stillabit liquor acer, penetrabilissimus alcalinus maxime volatilis: dum nil amplius ascendit, augeatur ignis, ut alembicus caleseat; ascendent exhalationes albae primo, mox variorum colorum, & tota cavitas alembici obducetur mistis variegatisque coloribus albis, rubris, flavis, viridibus, rubris, subnigris, ut variis picturis flores referant; & ideo in officinis *flores salis ammoniaci martiales vocentur*; qui quantocyus inde ablati vitro sicco, calido statim obturando reconduntur; quod nisi fiat, ab aëris humido solvuntur statim in liquorem aureum, pinguiusculum, austerum, salinum. Certum est, salem ammoniacum sursum rapuisse secum ferrum divisum, dum in flores sublimabatur, qui ferri medicata virtute praediti sunt. Ideo *celeberrimus Boërhavius* (v) dicit: *Flores hi habent vires fere easdem, quas in ente veneris disto Boyleus laudaveras. Est enim hoc medicamentum mirifice instaurans, calefaciens, aperiens, habetque metallici sulphuris apertum corpus.* Si omnia haec inter se conferantur, bina illa medicamenta videntur eiusdem efficaciae esse; sed dubie tantummodo hoc voluit proponere Boërhavius, quia Boyleus (x) paullo post addit sequentia de eodem remedio: *Interim, quum solvatur hoc exaltatum exigua saltem dosi propinetur, ubi dextre paratum est, baud secus quam ex Helmontii sententia, Butleri medicamen pauperum medicina dici meretur: ut tamen bene praeparetur, plus curae, ne dicam artis requirit, quam processum solum legens suspicari potest.* At, si conferatur descriptio Boërhavii cum illa, quam Boyleus dederat, ratio facile patebit.

Quum autem iunioribus saepe difficulter ingeri possint remedia, usus sui non semel *tinctura vitrioli martis aurea* (y), cuius paucae guttulae vino Hispanico exceptae, ieiuno datae instaurant, & vires excitant. Paratur ex vitriolo martis in crucibulo ad calcem coloris purpurei rubri usto, quae calx digeritur mensis spatio in phiala alta chemica cum copia vicecupla optimi spiritus salis marini dulcis. Unica huius tincturae guttula incredibilem vim possidet in atro colore producendo: si enim vigesima guttulae parte illinatur vasculum porcellanum purissimum, cui mox infunditur infusum herbae theae, mox nigredo adest. Verum ater ille color ferrum adesse docet; uti notum ex chemicis. Sed spiritus salis marini nunquam totam hanc calcem

(a) H. Boërh. chem. tom. II processu CLXIX pag. 447.

(v) Ibidem pag. 449.

(x) Considera. circa utilitat. philos. natur. exerc. V cap. VI pag. 235.

(y) H. Boërh. chem. tom. II processu CLXVI pag. 444.

cem solvit, licet saepius affundatur novus; unde ex calce rubra vitrioli martis partem solvendam tantum elicit. Quare crediderunt quidam, hanc tincturam esse veterum chemicorum aurum putabile. Pane biscocto, cerevisia meraca, generosa, nec acida, nec inebriante numerosos rachiticos me curasse, laetus recorder, dum huius tincturae, quandoque tantum tres vel quatuor guttulas darem, semel, vel bis de die in adultioribus.

Haec videtur esse ratio, quare in *materia medica* ex quatuor formulis tres ferrum contineant: *ens veneris* enim ferri virtutem habere, ex dictis satis patere puto. Hoc remedio egregius *Leviani* (x) feliciter utitur; sed a lactis usu, quod *Benevoli* commendabat simul, abstinere maluit acidam in rachitide acrimoniam non sine ratione metuens. Ossa certe in hoc morbo firmitatem perdunt, tument circa epiphyses, curvantur; acidisque mollescere ossa constat experimentis. Econtra illa, quae acidam acrimoniam domant, prodesse, observatum fuit. Dedit *celeberrimus de Haen* (a) in rachitide curanda *ostreodermata* in pulverem trita bis vel ter de die ad scrupulum: si simul infantes sole aprico, aëre rurali, motu in curru infantili creberrimo quotidiano, lecto & conlavi siccis, fanisque fruantur alimentis, propemodum omnes cito sanantur. Qui vero horum adminiculorum plerisque carent, solo hoc pulvere, motuque, tardius quidem, tuto tamen & certo curantur; quamdiu degeneratio universae compagis curam necdum reddiderit cuiusvis notio huc usque remedio impossibilem.

Infans trium annorum pessima laborabat rachitide debilis tumens toto corpore. Tentatis incassum multis, quae in hoc morbo prodesse solent, datum fuit extracti cicutae granum mane & vespere; quarto iam die grana quatuor per diem exhibita melius appetiit. Octavo die sex grana data sunt, robustior erat; pedibus se sustinuit. Dosis extracti cicutae non amplius aucta fuit, quum omnia quotidie in melius tenderent.

Mensis spatio infans haëtnus piger, morosus, meticulosus factus fuit agilis, iucundus, optime comedit; articularum tumor ad duas tertias decrevit; color faciei fuit ruber & naturalis. Tertio mense fere finito optime sanus erat; & usu cicutae multum increvit, nec unquam malum symptoma observatum fuit (b).

Quum radix *rubiae tinctorum* ingesta animalibus illorum ossa tingat rubro colore; uti alia occasione dictum fuit; celebris in arte obstetricia *Levres* (c) fuscipabatur, utile posse esse in rachitide hoc remedium, quum insignes vires diureticas haberet, & in multis morbis chronicis prodesset. Tentavit rubiae tinctorum usum, & profuisse testatur.

Ossa in hoc morbo nimis mollia cedunt corporis ipsius insistentis ponderi, vel & a vicinis duris corporibus pressa incurvantur saepius, unde mirae quandoque sunt ossium deformationes; quae nisi in tempore emendentur ossi-

(x) De rachitide cap. IV pag. 135.

pag. 248.

(b) Ant. Storck libell. secund. de cicut. pag. 150.

(c) L'art des accouchements §. 1431 pag. 244 & suiv.

(a) Ration. medendi part. IX cap. VI

pag. 248.

(c) L'art

ossibus postea solitam duritiem acquirentibus manent tota vita incurabiles.

Interim maxime notandum est, si idonea cura superetur malum, musculis redire citius, quam crederetur, robur & torositatem; quorum numerosissimi ex ossibus originem ducunt, vel ossibus inferuntur. Vis autem muscularis magna est, & ossium figuram per morbum mutatam restituit perfectissime in multis; protuberantes tunc epiphyses mole minuuntur, gibbosa spina dorsi, vel in alterutrum latus declinans ad naturalem figuram redit, licet nullae loricae adhiheantur, nullis fasciis vel ocreis utantur parentes, quandoque nimis folliciti de prolium figura, & huius curam committentes mulierculis, quae valida compressione saepe plus nocent, profunt quam rarissime. Notabile exemplum talis curae apud *Benevoli* (d) legitur de sorore nobilis puellae, cuius casus ante descriptus fuit. Sana nascebatur, & primis vitae mensibus adeo bene colorata, ut omnes sperarent, quod fratrum calamitates evaderet penitus; vix primum vitae annum finiverat, quin iam inciperet pallefcere, & angere; abdomen tumescebat, carpi, genua, malleoli protuberabant, elevabatur thorax, claviculae incurvabantur, spina reddebatur tortuosa, omnia capitis ossa surgebant, ac si laborarent exostosi, omnium corporis ossium structura reddebatur vitiosa, scorbutus, anasarca, diarrhoea sanguinea, urinae parcas, febris, tussis molesta cum anxietate & suffocationis metu affligebant. In his miseriis vixit ultra biennium. Fatur ipse *Benevoli*, quod a remediis, quibus frater servatus fuerat, in hac aegra per triginta menses frustra adhibitis vix non abstinisset, quum nulla curationis adfulgeret spes, sed optima mater nullis taediis, nec laboribus parcendum voluit, & perrexit infestissima.

Coepit tandem anxietas cum tussi minui, & febris cessavit: melior carnis evadebat color; tumor abdominis minuebatur; spinae curvatura dirigebatur; articularum protuberantiae minuebantur; sterni elevatio descendebat; clavicularum arcuata figura decrefcebat; ossa capitis subsidebant; stare incipiebat, dein incedere; tandem nullum morbi tanti ac tam pertinacis vestigium mansit, roboreque & sanitate aequavit coetaneas.

Musculorum robur simulac coepit restitui, absque ullis artificiis adhibitis rediit ossibus debita figura, quae per triginta menses adeo vitiosa fuerat.

Confirmavit hoc suis observatis *Zeviani* (e), qui merito prohibet, ne rachitici insistant pedibus, vel incedant, quamdiu ossa mollia sunt, & figura illorum a corporis pondere, vel pressione externa facile vitari possit; maluit, ut horizontaliter decumbant, quam ut circumgestentur in brachiis; quia metuitur, ne spina in hoc illudve latus inclinet, ossa extremorum incurvantur magis, thoracis cavum mutetur, dum pectus manibus prehendant nutrices. In multis locis moris est, ut lectulo incumbant, qui curriculo imponitur, quem protrahunt mulieres, quae rachiticis inserviunt: sic certe aegri lenis beneficio motus, & aëre aprico frui possunt, dum tempestas favet. Ubi morbus bonis remediis minui incipit, motus musculares,

vix

(d) Dissertazioni & osservazioni, tre delle quali sulla rachitide &c., pag. 236 & seq.

(e) De rachitide cap. IV pag. 133 & seq.

vix non delati antea, vigorem acquirunt, incipiunt artus movere, & sponte corpus erigere in lectulo decumbentes, manibus crepundia tractant, crura movent, & pedibus insistere sponte cupiunt. Ubi hoc videbam, licet ossa crurum adhuc incurva forent, permisi facile, & redibat ossibus nativa figura absque ullis etiam machinis adhibitis.

An & immersio in frigidam prodest: Frigida balnea antiquis temporibus in usu fuisse, hodiernis etiam ad quosdam morbos laudari, & cum fructu usurpari, satis notum est. In illis regionibus, ubi mos obtinet, ut mares natationem discant adolescentiae tempore, balnei frigidi usus frequens est. Legi de balneo frigido meretur Anglus eques *Iohannes Fleyer*, qui magnam huius remedii vim contra rachitidem commendavit, imo credidit, inter causas rachitidis, novi morbi, neglectum balnei frigidi esse numerandum.

Pluribus demonstrat (f), antiquis temporibus Baptismi sacramentum trina totius corporis immersione administratum fuisse baptizandis, non sola aspersione aquae, uti nunc fieri solet. Certum est, olim satis familiare fuisse, ut in proximo flumine, aut piscinis, nudato corpore, baptizarentur homines utriusque sexus. Imo manifestum credit, non fuisse aedificata baptisteria, nisi tertio seculo aerae Christianae; neque erigebantur tunc in templis, sed extra eadem; quod pluribus probat. Unde concludit, immersiones illas in aquis aëri communi expositas factas fuisse.

Simul ostendit, baptismum per immersionem diutius in Anglia, quam in aliis regionibus mansisse immutatum (g). Tempore enim Eduardi sexti Angliae regis in rubrica 1547 edita legitur sequens baptismi forma: *Sacerdos manibus suis prebendes infantem, rogabis nomen, & ter in aquam demerges: primo immerges latus dextrum; secundo latus sinistrum; tertio demerges faciem versus fontem: sic ut fiat discrete, & prudenter.* Dum autem regnabat *Elisabetha*, tunc rubrica permittebat, si infans debilis foret, vel privatim baptizatus in casu necessitatis, ut aqua ipsi inspergeretur.

Quoniam auctor credat, rachitidem sanari posse balneo frigido, hinc putat, baptismum per immersionem administratum praeservare illos ab hoc morbo; qui ideo frequens in Anglia apparuit circa annum 1620, dum immersio baptismi tempore incipiebat negligi.

Verum si consideretur, rachitidem raro corripere infantes ante nonum aetatis mensem, an credibile videtur, trinam immersionem simul & semel brevi tempore factam profuisse morbo post tot menses nascituro? Si immersio baptismi frigida sic firmasset corpus, ut postea non afficeretur a rachitide, cur novus ille morbus prius in Anglia observatus fuit, & increvit validius, quam in aliis regionibus, ubi immersio baptismalis cessavit citius; unde adhuc hodie rachitis vocatur morbus Anglicus? Nec probatur, recens natorum immersionem factam fuisse semper in aquam frigidam; ex rubricis Anglicanis non improbabile videtur, aquam egelidam potius immersioni intersuisse. Imo,

fi

(f) *Ψυχασαία*, or the history of Cold-Bathings pag. 50 & seq. pag. 60.

(g) *Ibidem*

si gelidae immerſi fuerint, mox linteis calidis exſiccabantur, & ſtatim tegebantur veſtibus; unde frigidae immerſionis efficacia momentanea tantum eſſe potuit; quae tamen averteret morbum poſt plures meſes naſciturum.

Nec immerſio credebatur neceſſaria, ut baptiſmus ſacramenti efficaciam haberet (b). Cyprianum quaerebat Magnus ſequentia. *Quaeſiſti, mihi chariſſime, quid mihi de illis videatur, qui infirmitate & languore gratiam Dei conſequuntur; an habendi legitimi chriſtiani, quod aqua ſalutari non loti, ſed perſuſi. Reſpondet: In ſacramentis ſalutaribus, neceſſitate cogente, & Deo indulgentiam ſuam largiente, totum credentibus conſerunt divina compendia.*

Si iam conſideretur, recens natum infantem per novem meſes haeſiſſe in liquore amnii calido intra corpus maternum, inſuetum penitus frigus ſentiet, dum tribus immerſionibus in aquam frigidam baptizatur inprimis hyberno ſub frigore. Parentibus, familiae, medicis periculoſum videri debuit, ſi ſubito frigori tenellum corpus exponeretur, dum baptiſmi efficacia nullo modo penderet ab hoc frigore; adeoque procul dubio egelida aqua adhibita fuit ſaepius; uti adhuc hodie fit.

Quod enim ſubita haec refrigeratio non leviter mutet corpus, patet ex relationibus illorum, qui balnea frigida in iunioribus adhibuerunt, & illa laudant ad rachitidis curam.

In epiſtola ex *Newcaſtle* miſſa ad equitem *Floyer* leguntur ſequentia (i): Ad cavendam & curandam rachitidem nihil hic frequentius, & generatim utilius eſt, quam infantes annuos, & adultiores quotidie immergere frigido fluvio, menſibus iunio & iulio, vespertino tempore, per quatuordecim dies, vel diutius: ſi infans ſit admodum debilis, unus alterve dies, imo & plures dies quandoque intermittuntur totius curationis tempore. Quidam integram immerſionem adhibent bis vel ter aliquod temporis ſpatium remittentes, ut inter ſingulas immerſiones respirare poſſint; alii immergunt tantum ad cervicem uſque, & pileos aquae penitus immerſos ſtatim capiti imponunt, ut totum corpus aequae ac in prioribus induſio & pileo madidis regatur. Omnia haec conſciuntur tam brevi tempore, quam fieri poteſt. Quidam infundunt aquam capiti, ut mafeſcant toti; alii induſum & pileum penitus mafeſacta nudato prius corpori applicant. Mox illis applicantur toti corpori & capiti lintea calida, lecto imponuntur, & valide ſudant: ſic manent tota nocte; mane ſiccum induſum & pileus datur.

Monet autem, quod trium minutorum ſpatio redeant a terrore, quem haec immerſio induxit. Si annuis infantibus, imo & adultioribus tantus terror contingat a ſubito illo frigore, an tuto hoc tentari poterit in recens natis?

Simul notat, quod validis illis ſudoribus reddantur debiliores; ſed tamen gradatim vires recuperent datis gelatinis cornu cervi, pedum vitulinorum &c.; ita ut circa tempus, quo folia arborum cadunt, integre ſani ſint, vel melius ſe habeant. Si haec curatio unico anno non ſucceſſerit, ſequenti anno repetenda erit; tuncque generaliter reſpondet votis.

Un-

(A) *Ψυχροθερία*, or the hiſtory of Cold-Bathings pag. 54.

(i) Ibidem pag. 133.


Unde videtur morbus non adeo facile tolli hac methodo & cura per tutiora cum optima spe tentari posse.

An linimenta, & quae. Omnia, quae in curatione haecenus laudata fuerunt, praecipuum scopum habent, ut flaccidas nimis partes roborent, & inertem, mucosam, vapidam, humorum cacochymiam emendent. Quare linimenta, quae emollunt, quae lubricant, hic locum non habent. Demonstratum enim fuit, multum boni expectandum esse a frictionibus calidis, siccis pannis fumo aromaticum imbutis; quae imprimis abdomini & spinæ dorsi applicantur.

Verum quidem est, quod apud Sydenhamum (k) legantur sequentia. Quum vero, quae exterius admoventur, tenera infantum corpora facile penetrant, proindeque sanguinem ipsum qualicumque virtute sua penitus afficiant, e re erit in tumoribus, qui ventrem eorum occupant, sive scrophulis, sive rachitidi verae originem illi debeant, linimentis uti, quae sanguinem & viscera corroborandi, ac pariter labem aliquam morbosam his indutam delendi vi possint; sed illud linimentum, cuius formula apud Sydenhamum legitur, ex aromaticis, amaris, & roborantibus herbis per 12 horas super cineres calidos cum axungia porcina & sevo ovillo maceratis paratur. Facile autem possit talium usus tolerari: notandum tamen est, talia remedia minus prodesse quam creditur. Parantur enim ex herbis recentibus, additur vinum, & post macerationem factam pingua illa debent ebullire ad humiditatis consumptionem; sicque fragrantia ingredientium diffatur in auras.

Si simul considerentur illa, quae §. 1480, & §. 1484 dicta fuerunt, apparebit ratio, quare linimentorum usus in rachitidis curatione occurrat rarius.

(k) Dissertat. epistol. pag. 511.





R H E U M A T I S M U S.

§. 1490. **A**rthritidi, podagrae, scorbutoque, agnatus morbus frequentissimusprehenditur, qui *rheumatismus* appellatur.

Non semper in *aphorismis de cognoscendis & curandis morbis*, quos in usum doctrinae domesticae digessit *celeberrimus Boërhavius*, actum fuit de *rheumatismo*. In prima enim editione, quae prodiiit Lugduni Batavorum 1709 apud *Ioannem van der Linden*, ultimus morbus, de quo agitur, est *lues venerea*, nec ulla fit mentio *rachitidis*, & *rheumatismi*; in quinta autem editione aphorismorum, quae auctior est, & ultima, quae vivente auctore prodiiit anno 1737, utriusque morbi historia describitur. Sed iam in tertia editione, quae in titulo *auctior* dicitur, uterque morbus adest.

An in secunda editione horum morborum mentio facta fuerit, vel non, certo determinare non possum; quum, dum eiusdem libri, vivente adhuc auctore, nova editio prodit, & auctior, priores vix amplius quaeri soleant; unde hoc tempore inveniuntur difficulter.

Admodum tamen verosimile videtur, quod editioni secundae adfuerit *rachitidis* historia, sed non *rheumatismi*. Probe notavit *celeberrimus Boërhavius* (1), quod in toto opusculo (sic placuit auctori vocare hunc artis medicae thesaurum) *aphorismorum de cognoscendis & curandis morbis* nullum commemoraverit medicamentum, ne, audito remedii nomine, & morbi, exercendae se pares arti iactarent *empyrici* impune in hominum perniciem grassantes. In discipulorum, quibus hos *aphorismos* explicabat, usum praescripserat pauca de materie medica, & quidam summa cum cautela, ut medicamina morbis curandis rite applicare possent. Quum autem *Boërhavii* fama iam plurimum increvisset, ipso nec consulto, nec volente, optima haec circa medicaminum usum monita in usus publicos extendenda curavit Londini vir eruditus: neque tamen ita res gesta, quin errores simul bene multi & noxii in edendo contingerint. Coactus hinc recensuit, correxit, amplificavit nonnulla. Quo facto edidit *libellum de materie medica, & remediorum formulis*; quae *serviunt aphorismis de cognoscendis & curandis morbis*; qui editus fuit Lugduni Batavorum apud *Isaacum Severinum* anno 1719. Ne autem nocerent editiones aliae minori cura impressae, pagina tituli versa sequens habetur monitum: *Auctor nulla huius libelli agnoscit exempla, nisi*

(1) In praefatione materiae medicae.

nisi quae sint edita apud bibliopolum, qui suum ipse nomen hic subscripsit; quod etiam in omnibus factum fuit.

Verum in hac editione, cuius tantam curam gessit celeberrimus auctor, nulla mentio fit *rheumatismi*; sed ubi enumerata fuerunt remedia ad curam *rachitidis* utilia, pagina 259 subscribitur *finis*. Dein sequitur *index morborum* accuratus: in quo rachitidis nomen habetur, rheumatismi vero nullibi.

Unde concludi posse videtur, quod in secunda editione aphorismorum non fuerit actum de rheumatismo. Sed in tertia editione, quae Lugduni Batavorum anno 1721 prodiiit apud Ioannem van der Linden, habetur & rachitidis & rheumatismi descriptio; qui morbus tunc additus videtur ideo, quia celeberrimus Boërhaavius enormes huius mali cruciatus ipse toleraverat eodem anno.

Magnus ille vir ab optimo patre educatus, qui non magna in re, sed virtutis plenus, novem liberis educandis exemplum praebebat singulare, quid exacta parsimonia valeat & frugalitas (m), ab eodem Latinae Graecaeque linguae elementa didicerat. Divisus interim temporibus corpus filii leniori agriculturae exercitio durabat solers pater, atque ipso labore animum lassari nescium ad studia resciebat (n); unde mansit per omnem vitam eiusdem laboris suscipiendi amor, sustinendi vigor, atque ad Herculeam quamdam firmitatem, nervosissimam artuum compagem corroboravit. Sed nemo, qui cum Boërhaavio vixit, ignorat, virum alias temperantissimum, intemperantia quadam laborum, firmum, & ad omnia obsequiosum, corpus imperiose & duriter nimis habuisse.

Quamdiu horti botanici curam gessit, ante solis ortum in horto iam aderat, non tantum aestiva, sed & verna, & autumnali tempestate, ut lectio- ni academicae, quam hora septima matutina tradebat, omnia parata forent. Probe memini, quod anno 1721 dolorem rheumaticum passus fuerit in cer- vice & scapulis satis molestum, dum fervidissima aestate numerosissimis ho- minibus consilia dabat in loco frigidiori aedium, quas incolebat, & minus recto corpore; sed brevi cessit malum; sequenti anno rediit saevissimum.

Valetudinis enim prodigus, & nimis fidens ferreo corporis robori, diro longumque duraturo morbo correptus fuit augusto mense fere medio anni 1722. Per quinque lunas inde, lecto immobiliter adfixus, immanes crucia- tus toleravit (o).

Causam tanti mali ipse aeger candide fassus fuit. En ipsissima eius verba: (p) *Leti tempore relaxata corporis spiramenta antelucano frigori, & penetrabili irrigui rois humori, exponens, vitam fere perdidit, in se, in se incurio- sus committens, quae ut cum cura cauerem, aliis fideliter inculcaras.*

Forte mirum videbitur, quod crudelibus & perpetuis adeo doloribus vix non eneatus Boërhaavius posuerit aphorismis eodem anno editis addere historiam rheumatismi, quo iam laborabat medio augusti mense. An prae- te-

(m) Alberti Schultens oratio academica in memoriam Hermannii Boërhaevii pag. 7.

(n) Ibidem pag. 20.

(o) Ibidem pag. 39.

(p) Ibidem pag. 66.

terito anno toleratum malum, licet multo levius & brevi cedens, illum impulit, ut de hoc morbo ageret, antequam eodem, sed gravissimo corripereetur. Non videtur hoc omnino absonum. Sed illa, quae de rheumatismo scripsit, nequidem implent binas pagellas, & finem aphorismorum faciunt. Praeterea tanta erat animi constantia in summo hoc viro, ut non dubitem, quin saevi morbi tempore haec scripserit. Confirmat hanc opinionem sequens *celeberrimi Schultensii* testimonium (9). Aliquot ante mortem annis *Boërhaevius* retulit ipsi, aliquid penitus de acerbitate morbi istius requirenti familiariter, se infomes per noctes, diebus continuatas, immanes dolores non alio allevamento mitigasse felicius, quam contentissima cogitatione percurrando, & quasi relegendo in memoria, quidquid unquam legisset, dumque equaleo ipsum admoveret dirus morbus, se literarium sibi ludum aperuisse intus, quo carnificinam tamquam murarum cantu sopiret.

Dum sanus circa finem iunii sequentis anni de rheumatismo coram discipulis suis verba faceret, dixit quod per tres fere integros menses dolores acerbissimos passus tandem iacuerit resolutus, ut vix amplius sensus ulus, nullus utique motus inferioribus artubus superesset. Addebat, quod simulac dolor parum remitteret, coeperit evolvere omnes auctores antiquos & recentiores: excitabat enim attentio ad propria mala; sed simul monebat, quod non multum bonae frugis invenerit, praeterquam in solo *Sydenhamo*. Ex quibus omnibus credo satis confirmari, quod *Boërhaevius* morbi tempore scripserit illa, quae de rheumatismo in aphorismis habentur; licet illa editio prodierit anno 1722.

Quum autem prima editio *materiae medicae* anno 1719 impressa fuerit, mirum non est, quod nulla in hac fiat mentio rheumatismi. Sed & in secunda, quae anno 1727 Lugduni Batavorum apud eundem *Severinum* prodit, nec in tertia editione, quae post mortem *Boërhaevii* ab eodem bibliopola anno 1740 edita fuit, aliquid de remediis ad hunc morbum invenitur; licet in titulo haec editio dicatur *autilior* atque *accuratissima* non tantum, sed & in *monito* ausus fuerit dicere sequentia: *Libellus, in quo ipse autilior plura adscripsit nova tam simplicia, quam composita medicamenta, vivensque adhuc typis concessis*. Haec nullo modo vera esse mihi videntur.

Minime mirum videtur, quod *celeberrimus autilior*, licet aphorismos descriptione rheumatismi auxerit, morbi remedia tamen non addiderit sequenti editioni *materiae medicae*. Si enim confideretur §. 1493, ubi morbi cura describitur, patebit, nulla laudari remedia, nisi talia, quorum iam saepius mentio facta fuit. Purgantia antiphlogistica, vesicatoria, medicamenta diluentia, emollientia, antiscorbutica, fomenta antiphlogistica omnino cognita erunt illis, qui attenta mente operam dederunt his aphorismis intelligendis; sique non statim memoriae occurrerent haec remedia, *materiae medicae* subiungitur

in-

(9) Alberti Schultens oratio academica in memoriam Hermannii Boërhaeve pag. 67.

index, in quo facile illorum nomina inveniuntur una cum pagina, ubi exacte describuntur.

Haec praemittenda credidi, antequam morbi descriptionem aggrederer.

Rheumatismus a *ρῑν*, fluo, nomen habet; unde *ρῑνισμὸς* apud medicos fluxio vocatur, ex quacumque parte prodeat, & in quamcumque partem incidat. Catarrhi similiter *κατάρρῑς* dicti, quia credebantur a capite semper deorsum fluere, & articulos a quacumque causa debilitatos aptiores evadere, ut materies morbosa versus illos determinaretur. Alia occasione ad §. 1264, ubi de podagra agebatur, credo me demonstrasse, quod non erraverint veteres, quando materiam catarrhi a capite incipientem descendere versus inferiora vocarunt defluxionem.

Quum autem omnia articularum cava mucro lubrico subpingui inungantur, si similis mutatio hic contingat, ac in membrana mucosa, nares, fauces, pulmonem &c. investiente fit, dum adest defluxio, molestissima in articulis mala sequi poterunt ab iisdem causis. Sic vere & autumnio catarrhi ac coryzae frequenter occurrunt; sed & tunc morbi articulares solent frequentes esse. Si ex calido cubiculo in aërem frigidum non bene tecto corpore prodeat homo, catarrho laborabit; & ab eadem causa sanissimi homines post saevos dolores toleratos articularum motum perdididerunt toties.

Pertinet ergo rheumatismus ad illos morbos, quos veteres vocaverunt fluxiones, defluxiones; qui morbi materiam impellebant in quamdam partem cum dolore magno, licet in hac non apparuerit antea notabile vitium. Sic oralgia subito oritur, licet in aure nec eius vicinia apparuerit quid mali, unde aurium fluxio vocari solet. Sic & aliquoties saevam odontalgiam vidi, licet in nullo dente mali quid observaretur antea: solet tamen fluxio plerumque derivari in dentem cariosum potius, si ullus in ore adfuerit.

Rheumatismi nomen rarius occurrit apud veteres medicos; videntur tamen illum satis cognovisse, & sub arthritidis nomine descripsisse (r): *Communis enim omnium articularum dolor est arthritidis; sed pedum dolorem podagram vocamus, coxendicium ischiada, manuum vero chiragram.* Quum autem in podagra intervallo inter paroxysmos sensim accumuletur morbi materia, antequam in pedes deponatur, & morbum faciat, contingit saepe, ut podagrici mutatam sanitatem sentiant aliquo tempore, antequam dolores in pedibus sentiant (vide §. 1257); sed rheumatismus subito ingruit saepius. Videtur & Aretaeus hoc notasse: *Nempe aut ex tempore dolor est, si ex aliqua parum durante causa consurgat; aut latenter meditationibus longo tempore contractus est morbus, quum ab exigua occasione dolor & morbus accenduntur.* Nam ad §. 1258 enumerantur illa, quae accelerant, & inexpectatos paroxysmos accerunt; imo ad hanc rem sufficit vitium quodcumque admissum in sex rebus non naturalibus; unde cruditas oritur.

Hinc Petrus (s) in commentariis & animadversionibus suis ad Aretaeum con-

(r) Aretaeus de caus. & sign. morbor. diuturn. lib. II cap. XII pag. 66.

(s) Ibidem pag. 212.

concludit, quod auctor ille duas arthritidis differencias faciat iuxta diversum generationis modum: propterea quod alia repente a causis recentibus & temporariis constat; alia occulte & progressu temporis obrepit; donec cuiusvis exiguae causae impulsu existerit, atque in apertum erumpat.

Confirmatur hoc, quia Aretaeus (1) dixit in eodem capite de arthritide: Quibusdam in pedum articulis usque ad mortem refidet morbus; quibusdam in omnis corporis ambitu vagatur. Ob hanc rationem recentiores medici rheumatismum vocaverunt arthritidem vagam. Transiit quoque in dorsi thoracisque musculos fit, & incredibile est, quam late malum serpat. Vertebrae cervicis & dorsi dolent, & in summo sacri ossis dolor imbaeret. Haec proclivitas locum mutandi maior longe est in rheumatismo, quam in arthritide, quae articulos occupat; quam & Aretaeus (u) notavit, quod nempe dolores rheumatici maxillarum & temporum musculos invadant: Post omnia nares, & aures, & habia inficiuntur; nam quoqueversus nervi & musculi in capite ferantur; dolent capitis suturae, & quid doleat aegrotus ignorans, indicat suturarum species, aliquam, rectam, transversam, posterius, anterior. Verum quidem est, quod in podagra morbus etiam diversos articulos & varia loca corporis aggreditur, uti iam eius historia probatum fuit. At hoc observatur, ubi iam inveteravit morbus; in rheumatismo hoc fit, & in morbo incipiente.

Dum Boërhaavius de rheumatismo loquebatur coram auditoribus suis dixit, quod circa medium mensis augusti, dum hora quarta matutina observationibus in horto botanico faciendis occupabatur, senserit dolorem quasi nephriticum, quem mirabatur; dolor a renis sinistri regione incipiens secundum decursum ureteris ad os pubis usque tanta cum vehementia pergebat, ut crederet, calculum de rene per ureterem in vesicam descendere: simul aderat propensio in vomitum. Utebatur copia mollissimi decocti ex farina feminum lini parati; oriebatur ingens tenesmus, ita ut calculus praefens esse videretur, quem sperabat exiturum; unde pergebat animose in eodem remedio, ut laxaret & lubricaret viam: sumit eodem tempore aliquot guttulas arophi Paracelsi, extractum nempe croci ope alcoholis purissimi paratum (v), quod tanti fecerunt chemicorum principes, ut aroma philosophorum appellaverint, perque primas literas vocabulorum arophi. Paulo post aberat omnis dolor; sed sequenti die immanis aderat in lumbis, qui duravit per tres menses eadem vehementia. Postquam parum remittere incipiebat illud tormentum, evoluit auctores, & vidit Sydenhamum notasse illa, quae passus fuerat; reliquos vix quid bonae frugis dixisse. Dum enim agit de rheumatismo (x), habet sequentia: Est & alia huius morbi species, nec non huius prospae vulgo vocatur, quae lumbago rheumatica aptissime dicitur: immanis dolor scilicet, idemque fixus circa lumborum regionem, ipsumque aliquando ad os sacrum se demittens, paroxysmus nephriticum

(1) Aretaeus de caus. & sign. morbor. diuturn. lib. II cap. XII pag. 66. (u) Ibidem.
(v) H. Boërhaavius elem. chem. tom. I pag. 344. (x) Sect. VI cap. V.
pag. 345.

mentitur, nisi quod aeger non vomituriat: nam praeter dolor em atrocissimum & vix ferendum circa ipsos renes, aliquando & ureteres per omnem eorum ductum ad vesicam usque eodem, licet mitiori tentantur. Qui & mihi olim imposuit, tamquam a materia aliqua sabulosa in iis partibus haerente penderet, quum vera materiae rheumatismi peccanti & inflammatae ortum suum debeat, quae quidem partes illas iam solas urit insano reliquo corpore.

Notari meretur apud Aretaeum aliquid reperiri, quod videtur docere, illum simile quid novisse, ac quod Sydenhamus tam accurate descripsit (y). Postquam enim coepit describere partes, quas arthritis aggreditur quandoque, secundum ingeniosam emendationem textus certo vitiosi factam a Petito (z), addit: Omnium simul partium morbus est, & proprius cuiusque partis dolor. Et paulo post: Item communicatur renibus & vesicae. O rem admirabilem! Unde videtur sequi, quod cognoverit Aretaeus, in hoc morbo quandoque contingere nephritica mala, & tenesimum dolentissimum vesicae, similem illi, dum calculus a rene descendens per ureterem exitum molitur.

Trallianus (a) in describendo podagram saepius rheumatismi vocabulo utitur; & dum diversam podagram statuit pro varietate materiae in articulos fluentis, sanguineae nempe, biliosae, pituitosae, atrabiliariae, dein addit sequentia: Porro rheumatismi, non solum ab materiae influxum articulis oboriri solent, sed etiam propter nudam qualitatem solam, calidam & frigidam; ad haec siccitas & humiditas sunt saepe causa rheumatismorum. Et ubi de podagra biliosa agit, monet medicamento bilem evacuante utendum esse; non semel autem, verum saepe, si res postulet, aeger purgandus est. Sic enim articulos a recrementis & a fluxionibus tutos (ut apud antiquos) servare poteris (b). Ubi postea de podagra sanguinea agit, suadet, ut sanguinis missione & moderata diaeta reddatur aeger aptior (c).

Videntur ergo antiqui medici observasse rheumatismum, sed sub nomine arthritidis morbi articularis descripsisse, imo & in podagrae descriptione talia quandoque enumerasse symptomata, quae in rheumatismo hodie vocato morbo apparent. Quum autem secundum quatuor humores, bilem, sanguinem, pituitam, atram bilem, dividerent morbos articularios, & diversam curandi methodum adhiberent, invenimus plurima rheumatismi signa in descriptionibus podagrae & arthritidis biliosae ac sanguineae, dum nimirum illi duo ex quatuor humoribus, nimia copia, vel acriori indole peccare credebantur, vel copia & acrimonia simul iunctis, a quibus nascebatur peior morbus. Rheumatismi tamen nomen Trallianum saepius occurrit; uti patuit, & quidem in variis morbis articularibus.

Hinc non videtur absolute verum esse, quod egregius in arte nostra vir eruditissimus Tralles (c) statuit; apud veteres nempe rheumatismi nomen nullibi legi: illud tamen verissimum est, quod omnes dolores in artubus
toto-

(y) De causis & signis morbor. Chron. lib. II cap. XII pag. 66.
pag. 315.

(z) Lib. XI cap. I pag. 599.

(c) Ibidem
pag. 600.

(c) Usus opii salubris & noxius in morborum medicata. Sectione 2 pag. 301.

totoque ambitu externi corporis obvios salutaverint nomine arthritidis, aut podagrae. Merentur certe legi, quae eodem loco habentur de doctissimis medicis Gallis, qui superiori saeculo rheumatismi vocem in medicinam practicam demum introduxerunt. Videtur tamen ex omnibus, quae ibi collecta habentur, celeberrimos medicos, Gallos, Germanos, Anglos, &c. celsissime in determinandis signis diagnosticis, quibus rheumatismus ab arthritide distingui possit; unde Tralles ex Chesnau adducit sequentia: *In primo insultu difficile est internoscere, utrum morbus rheumatismus, vel arthritidis dici debeat.* Rheumatismus enim, qui tantum articulos aggreditur, maximam affinitatem habet cum arthritide, nec nisi temporis progressu agnoscitur, quum pluries irruunt in articulos fluxiones dolorificae, quod non fit in rheumatismo, qui quandoque toto vitae decursu semel tantum infestat, generalis praecipue dictus, utpote qui aliis magis proprie hoc nomen sibi vindicat (d).

Rheumatismi vocabulum & apud Caelium Aurelianus (e) habetur: auctor ille aliquanto Galeno superior fuisse creditur; quia non meminit Galeni; quod mirum foret, si post eum vixisset, quum tot minorum gentium Graecos citaverit (f). Sectae methodicorum addictus erat, qui universum morborum exercitum in duas phalanges dividebant, alios *stricturæ*, alios *solutionis* morbos appellantes. Dum peripneumoniam definit (g), dicit: *Est autem passio generaliter acuta, atque strictura suffocata, adiuncto levi humoris fluore, quem rheumatismum vocant.* Sed ad §. 149^o dicitur de frequentia rheumatismi varia eius morbi facie, & summo periculo, si cerebro, vel pulmone incubuerit, dum simul adest maxima difficultas eum hic detegendi. An non verosimile videtur, quod haec observaverit Caelius Aurelianus? Alio autem loco (h), ubi de articulorum passione quam Graeci *ῥευματισμὸς* vocant, enumerat plura, quae in rheumatismo hodie dicto occurrunt. Sic dicit (i): *Saepe denique prioris articuli dolore declinante secundus invadit, atque eodem similiter misciente tertius sumit exordium, consentiente etiam vesica, atque spinæ maioribus nervis, quos *ῥιζοί* appellant; & in stomacho etiam nausea vel vomitu iactantur aegrotantes &c.* Ubi imprimis notandum est, quod & vesicam consentire his doloribus monuerit. Plures certe vidi auctores, qui de rheumatismo scripserunt. Sed mihi visa fuit semper aliqua manere difficultas in distinctione adaequata inter rheumatismum & arthritidem. An ideo forte celeberrimus Boërhavius maluit dicere, quod rheumatismus, licet frequentissimus, sit morbus agnatus arthritidi, podagrae, & scorbuto, quam aliam definitionem dare, quae illum ab his morbis accurate distingueret. Ipse rheumatismum saevum passus fuerat, & sub hoc nomine coram discipulis quotannis morbum hunc describebat. Tamen in oratione funebri, quam celeberrimus Schultensius in memoriam Boërhavii

pu-

(d) Usus opli salubris & noxius in morborum medela. Sectione 2 pag. 302, 303.

(e) Morbor. acutor. lib. II cap. XXVII pag. 139 (f) In praefatione pag. 10.

(g) Ibidem pag. 139.

(h) Morbor. chronic. lib. V cap. II pag. 557.

(i) Ibidem pag. 559.

publice dixit, legantur sequentia: *Arthritis exquisitissimae tormentis discruciatum tandem iacuit resolutum, ut vix amplius sensus ullus, nullus utique motus inferioribus artibus superesset.* Forte quis credere posset, *Schultensium*, maximum academiae Lugduno Batavae ornamentum, arthritidis nomen substituisse, quum medicus non esset, sed linguarum orientalium celeberrimus professor. Verum in praefatione monet, quod commentariolum studiorum & vitae Cl. defuncti habuerit, quo usus fuit, additque: *Insignes hae pericopae, ut lectorem adverterent, eas maiusculis literis a reliquo contextu distinxit & eminere iussit.* Commentariolus enim ille propria Boërhaevii manu scriptus erat.

Dum haec omnia perpendebam, videbatur mihi *Caelius Aurelianus (k)*, ubi de variis nominibus morborum articularium agit, non sine ratione dixisse sequentia: *Sed de his nominibus, quae locorum causa discreta esse videntur, unius tamen virtutis esse intelliguntur, in curationibus certandum non est. Sunt enim harum passionum causae antecedentes variae, ut violentia, frigus profundum, eruditatio, libido venerea, labor immodicus, vel repentina desertio solitae exercitationis, &c.*

Verum rheumatismus non sine ratione scorbuto agnatus morbus dicitur, si considerentur illa, quae ad §. 1151 in historia scorbuti dicta sunt. *Eugalenus (l)*, dum signa & symptomata scorbuti enumerat, reprofert arthriticos dolores, & statim monet medicos sequentibus: *Quapropter diligentem animadversionem, & exactam a veterum arthritis distinctionem, haec res exigit, & meretur, ne curando prius impingamus, quam morbus eiusque causa nobis sit cognita atque perspecta.*

Noluit, in his doloribus, qui scorbutum comitantur, dari in morbi principio cathartica fortiora; quia inde exasperantur dolores, & morbus ipse in deterius vergit. Monuit autem, scorbuticos illos dolores maxime in morbi initio errabundos esse, ad alium atque alium elusdem vel oppositi lateris articulum transire, & per vagam hanc loci affecti mutationem imprimis distingui a doloribus arthriticis.

Sydenhamus (m), qui summa cum attentione animi examinabat morbos, quos pertractabat, notat, ubi rheumatismus non feliciter & bona methodo curatus fuerat, aegros per totam vitam fuisse discruciatos doloribus vagis, nunc quidem mitioribus, nunc vero atrocioribus, qui a minus cautis pro scorbuti symptomatibus haberi solent. Licet enim non dubitaret, quin scorbutus in plagis borealibus revera inveniretur, tamen non credebatur, illum adeo frequentem esse, ac quidem fert vulgi opinio; sed multos ex iis affectibus, quorum nomine scorbutum insumamus, vel morborum sentiam, nondum vero saeculorum, quique nullum adhuc certum inducunt typum, effecta esse, vel etiam infelices reliquias morbi alicuius nondum penitus devicti, a quibus sanguis ceterique humores contaminantur. Verbi gratia, quibus in corporibus materia aliqua,

(k) Morbor. chronic. lib. V cap. II pag. 557.

pag. 85, 86.

(l) De morbo scorbutico num. XXX

(m) Sect. VI cap. V pag. 349.

aliqua, arthritidis producendae apta, recens generatur, nondum tamen in artus depluit, varia se ostendunt symptomata, quae scorbuti suspicionem facient, donec arthritidis, iam formata, atque actu se exerens, nullum amplius dubitandi locum relinquat. Optime notat; nisi ad modo dicta serio attendere velint in praxi medici, scorbuti nomen crescet in immensum, & omnem fere absolveret numerum morborum, imprimis chronicorum. Unde in illis regionibus, in quibus scorbutus frequens est, in medicorum formulis occurrunt fere semper antiscorbutica, in initio omnium morborum fere, nec ab his abstinere, antequam observentur talia symptomata, quae praesentiam alterius morbi, a scorbuto diversi, certo annuntient. Quum autem morborum chronicorum decursus lento procedant gradu, in ipso hydropse solent dicere; *Ubi definit scorbutus, ibi incipit hydrops* (*). Verum optime Sydenhamus addit sequentia: *Hact tamen regula saepe saepius non aliter est accipienda, quam quod, ubi primum se hydrops manifestis produs indicis, praeconepta de scorbuto opinio statim collabescat.*

Licet ergo petitis distinctos morbos esse crediderit auctor egregius, fatetur tamen (o), esse speciem rheumatismi, quae ad scorbutum quam proxime accedit, & insigniora huius morbi symptomata aemulatur, ideoque vocatur ipsi *rheumatismus scorbuticus*; qui eadem pariter remedia poscit ac scorbutus; quorum formulae legi possunt (p); quarum usu quam facillime debellari & vinci posse hanc rheumatismi speciem testatur. Plurimos sic ipse sanavit, quibus repetitae venae sectiones, catartica, diaeta lactea, pulveres testacei &c., nihil profuerant.

Describit hanc speciem rheumatismi sequenti modo. Dolor nunc hanc nunc illam partem obsidet, sed eandem in tumorem raro attollit, neque febrem sibi comitem adiungit. Nec adeo fixus manet; sed magis vagus est, & anomalis inconditisque symptomatibus stipatus. Nunc hunc vel illum artum discruciat, mox internas partes solum afficit, & aegritudinem parit, quae redeunte externarum partium dolore iterum disparet, sicque alternatim divexat aegros, & fit morbus chronicus quam maxime. Observavit etiam, quod rheumatismus ille scorbuticus foeminas prae reliquis adoriatur; uti & viros, qui imbecillioris naturae sunt; hinc fatetur Sydenhamus, se suspicatum fuisse, morbum hunc ad hysteri corum classem referendum esse; sed experientia edoctus fuit, remediis hysterici morbum minime cessisse. Simul notat, illos, qui longum & repetitum corticis Peruviani usum experti sunt, huic morbo esse obnoxios, hocque esse unicum incommodum, quod ex usu corticis observavit unquam (q). Si iam omnia dicta ad hanc paragraphum confiderentur, patebit ratio, quare rheumatismus, morbus frequentissimus, dicatur agnatus arthritidi, podagrae, & scorbuto.

(*) Sect. VI cap. V pag. 350.
pag. 352

(o) Ibidem pag. 351.
(q) Ibidem pag. 351.

(p) Ibidem

S. 1491. **Q**uem antecedunt temperies sanguinolenta labe acri infecta, aetas mascula, victus lautior, calefacto corpori subito admissum frigus, autumnalis tempestas, perspiratio prohibita, diathesis inflammatoria lentior cruore pleuritico se manifestans. Cum febre continua incipiens dolorem creat atrocissimum, dilacerantem ad minimum motum saevissime auctum, diu in uno loco fixum, iuncturas quorumcumque artuum obsidentem, ceterum genubus magis infestum, lumbis, & coxendici quandoque cerebrum, pulmones, viscera excruciantem cum tumore, & rubedine loci, periodico itu, & reditu.

Sequitur, ut considerentur illa, quae observata fuerunt frequenter, praecedere rheumatismum, & ideo quandoque inter causas morbi, praedisponentes saltem numerari solent.

Temperies sanguinolenta labe acri infecta. Veteres, uti ad praecedentem paragraphum dictum fuit, rheumatismum, & alios articulares morbos distinxerunt a quatuor humoribus, sanguine, bile flava, bile atra, phlegmate, & variam curam adhibuerunt, prout hic, vel ille ex quatuor istis humoribus praedominabatur. Hinc & ipsam podagram sanguineam esse quandoque statuerunt. In rheumatismo autem calido saepe morbo sanguinis copiam abundantem accusaverunt saepius, & uti postea in curatione dicitur per sanguinis missionem etiam repetitam, rheumatismi cura a medicis tentari soler frequenter. Haec videtur esse ratio, quare sanguinolenta temperies ad rheumatismum disponere credatur. Quam autem & in sanis ceteroquin hominibus sanguinis boni copia adsit, ab hac causa sola vix oritur rheumatismus, nisi alia causa simul accedat. Imprimis enim metuendus est ille morbus, si in sanguineae temperiei hominibus adsit simul aeris labe.

Humores corporis humani, etiam optimi per sanitatis actiones inevitabilem acquirunt acrimoniam, nisi illud acre eliminetur de corpore per vias naturales, antequam nocere possit, sequuntur morbi brevi. Per urinam, sales, & olea sanguinis acriora iam facta exeunt; per cutanea vasa diffillantur talia, quae diutius relicta in corpore nocerent insensibili perspiratione, vel sudore; dum simul per utramque hanc viam exit abundans in sanguine aquosum, in quo soluta haerent olea, & sales iam acriore facta, sique facilius expelluntur. Per alvum exeunt foeces ab ingestis residuae, uti & omnia illa, quae ab humoribus sanis in oesophagum, ventriculum, intestina depluentibus, reorpto prius per venas omni utili, manserunt residua.

Si ergo quacumque de causa horum acrium separatio a humoribus sanis, & separatorum libera de corpore expulso impedita fuerit, nascitur acris in sanguine labe, quae pluribus morbis originem dare poterit.

Observata autem docuerunt, a causis similibus rheumatismum, & diuturnum quidem nasci posse.

Testa-

Testatur celebris medicus (r), quod viderit in rheumatismo longis in cute exfurgere efflorescentiam salinam.

Ho veduto nei luoghi reumatici, o vogliamo dire doglie articolari, fiorire sulla cute un minuto principio biancastro sale, quale è un fiore salino, che penetra i vasi, nei quali si chiude il sale. Si libera perspiratio aduissit, salinum illud concrevisset minime supra cutim, sed solutum defluxisset facile. Sydenhamus (s), qui in febribus omnibus, quae inflammationis intensioris sunt participes, cavebat, ut non semper lecto incarcerarentur aegri; fatetur tamen, eosdem, si diutius quam par erat, pro una vice lecto abfuerint, declinante praesertim morbo, in dolores vages, qui in rheumatismum desinere possunt, nonnumquam facile incidere &c.: quae si contingant, lecto addicendus est, quo apertis cutis spiraculis commodè diffilari possint istiusmodi particulae, quae malo fomite praebent; hoc vero ad diem unum, aut alterum tantum sudore non provocato (ut nempe illud acre, quod perspiratione cutis exit de corpore, non retineatur amplius). Idem verum est de sale acris, quod cum urina exit de corpore. Observatum dicitur, quod in rheumatismo laborantibus tantum trigesima pars illius salis inveniatur, quae in urina sanorum hominum adest (t). In febribus arthriticis, & rheumaticis observavit Storckius (u), quod in magna dolorum exacerbatione, urina plerumque prodit tenuis, pallida, quandoque stranguriosa; decrecente autem dolore urina primo prodians erat ruffa; secunda vero turbida, & mox foecuit, ac posuit sedimentum fursuraceum, subalbidum. Haec omnia videntur probare, quod in rheumatismo acris labes adfit, quae quandoque copiosis urinis, & sponte obortis sudoribus salutariter expellitur, vel per metastasin ad alia loca deposita a dolore requiem concedit. Testatur Hoffmannus (v), quod saepius notaverit, artuum dolores ulceribus sponte subortis in pedibus mox conquiescere, qui postquam arte consolidata fuerant, mox resuscitati sunt. Novimus pariter, immanes artuum dolores, oborta psora, vel scabie leprae albae naturam habente sublato.

Antea ad §. 1051 γ, dum de morbis chronicis agebatur, monui, ab acrioribus ingestis frequenter & copiose acrimoniam conciliari posse sanguini; ab aromatum calidorum, piperis imprimis, alliorum, ceparum, sinapi, raphani rusticani, & similium, immodico in condimentis usu, & dolentissimum, & longum toties morbum, rheumatismum nempe, produci posse.

Eruditus medicus Baynard (x) fuit in hac opinione, dolores rheumaticos non adscribendos esse salinae, aut acidae sanguinis acrimoniae, sed potius oriri a viscida densitate sanguinis, distendentis vasa, per quae difficulter fluit: postea patebit, lentorem morbosum sanguinis adesse in rheumaticis; sed non inde sequitur, quod non simul adfit acrimonia, quae viscosa, & lentis humoribus irritata haeret pertinacius in partibus affectis, & difficilior ablui potest. Ipse egre-

(r) Pietro Cornacchini della pazzia pag. 64.

(s) Sect. V cap. II, pag. 283.

(t) Raulin. des maladies occasionées par le promptes & frequentes variations de l'air pag. 308.

(u) Ann. medic. secund. pag. 121.

(v) Medic.

ration. tom. IV, part. 2, pag. 437.

(x) Philosophic. transact. abridged.

tom. III, pag. 265.

egregius auctor asserit, adesse copiam salis acris alcalini in humoribus rheumaticorum, quod acre non satis eluitur per urinam, quam in rheumate laborantibus longe minus falsam esse dicit, quam in sanis. Ipsi enim huic medico debetur experimentum, quo demonstratur, urinam rheumaticorum habere tantum trigessimam partem materiae salinae, quae in urina sanorum adesse solet. Viscidum lentorem in locis rheumatico dolore occupatis adesse statuerunt plures celebresque medici, & in cadaveribus hoc morbo defunctorum se vidisse testantur. *Ballonius* (y) in cadavere viri, qui saepius dolores circa scapulas, & humeros passus fuerat, invenit, quod *omnes nervi, & ligamenta musculorum humeralium erant oppleta sero pingui: idem observatum in aliis similes dolores passis, quos nulla pene ars levaverat.* Celebris auctor Anglus *Cloppon Havers* (z), plurima experimenta tentavit circa mucilaginem, quam in articulis maiorum animalium collegerat, & credidit, illam inspissari ab acribus admistis, acidis imprimis. Notat, vesicatoria applicata locis dolentibus excitare vesicas, quae plenae sunt spissa gelatina cutim spissam referente. Sed imprimis innititur testimonio *Drelincourtii* celeberrimae medicinae professoris Lugduni Batavorum, qui testabatur, quod in cadavere hominis rheumatismo mortui invenerit gelatinam concretam supra musculos, quae duos tresve aureos crassitie aequabat. Sed & postea *Havers* ipse vidit binos casus, qui *Drelincourtii* observationem confirmabant.

Pulcra experimenta tentata fuerunt circa similem materiam gelatinosam ex ingenti femoris tumore sub periosteo haerente variis tentaminibus eductam (a), quae docent, acidam acrimoniam adfuisse in hoc gelatinoso. Non tamen videtur absolute inde concludi posse, quod acrimonia, quae rheumatismum comitatur, semper acida sit. Nam in mucilagine articulorum desumpta ex maioribus animalibus, & ex hominibus similia tentamina facta fuerunt, quae docere videntur, quandoque non acidam, sed alcalinam acrimoniam adfuisse (b); licet tamen in plerisque acidum signa inventa fuisse fateantur.

Omnia haec dicta satis probant, temperiem sanguineam labe acri infectam antecedere frequenter rheumatismum, & acrimoniam illam non semper eandem, sed variam esse posse. Sic ex ante dictis patet, acrimoniam scorbuticam saepius inculpandam esse, quum rheumatismus dicatur inde scorbutico agnatus morbus.

Credidit egregius *Raulin* (c), aliquando de luis venereae acrimonia in hoc morbo cogitandum esse; imprimis in illis, quos non sua culpa, sed parentum, quidquam de foedo morbo contraxisse, credi potest. Putat enim, quod longinquior fuerit prima origo luis venereae, eo magis equivocos esse dolores, quibus miseri tales excruciantur, & eo similiores esse doloribus rheumaticis. Fatetur candide, se deceptum fuisse, dum nimis tarde revelabatur ipsi hoc

(y) Ephemerid. lib. I, tom. I, pag. 30.

(z) Osteolog. nova pag. 226, 227.

(a) Mémoires de l'academ. de chirurgie, tom. 1, pag. 277, 278.

(b) De

Bonon. scient., & artium instit., atque academ. commentar. tom. I, pag. 148,

& seq.

(c) Des maladies occasionées par les promptes, & fréquentes variations de l'air pag. 306.

hoc familiae arcanum, & in altero simili casu mercurium profuisse solum, incassum tentatis illis, quae ad rheumatismum curandum adhiberi solent.

Aetas mascula. Ubi de articularum, & coxendicis dolore agit *Arctaeus* (d), monet, viros facilius in hunc morbum incidere, & ex mulieribus agiliores. Viri duris laboribus, aëris iniuriis, itineribus, belli calamitatibus, victui inordinato magis exponuntur, quam mulieres; hinc minime mirum est, quod talibus morbis corripiantur frequentius, quam mulieres, nisi illae, ut *Seneca* in epistolis in luxum invehens de feminis sui temporis dicit: *Beneficium sexus vitium perdiderunt, & quia feminam exuerunt, damnatae sunt morbis virilibus* (e). Notat tamen & *Arctaeus* (f) sequentia: *Mulieres, licet rarius quam viri, difficilius tamen hoc vitio laborant. Quod enim neque usitatum, neque familiare est, id si aliqua urgente causa potentius evaserit, violentum quomodo sit, maiorem calamitatem infert.* Vidi sic in femina macilenta, hysterica, quae a motu corporis incalescens multum exposita fuerat aëri vespertino frigido, autumnali, dolorem acerbissimum natum circa os coccygis, qui subinde levior dispersebatur per totum corpus, dein redibat ad os coccygis longe molestior, ita ut nec in lecto manere posset: febris aderat satis lenis. Tuum septimanarum spatium morbus sanatus fuit quidem, sed singulis autumniis postea sensit aliquas eiusdem mali reliquias.

Puella nobilis a corporis motu valido incaluerat, multum, dein in scapha aperta sedens quiescebat rori vespertino. Sequenti die dolor cervicis validus aderat, qui inde per totum corpus dispersebatur miris vagis modis, pedes, cubitos, digitos manuum occupans; quandoque & lobum auriculae invadebat cum rubore, & tumore. *Arctaeus* (g), dum vagam horum dolorum indolem describit, dicit: *Post omnia nares, & aures, & labia afficiuntur.*

Vitius laetior. Quia inde temperies sanguinea augetur. Saepe etiam in conviviis laetioribus condimenta acriora offeruntur, dum fames non amplius cibos poseit; unde acris labes sanguini inducitur.

Calefacta corpori subito admissum frigus. Nulla inter causas rheumatismi frequentior est, nulla validior, quod & confirmatur testimonio *Sydenhami* (h), agentis de rheumatismo. *Hac ut plurimum occasione nascitur aeger sc., sive exercitio aliquo vehementiore, sive alio modo ex calefactus mox repentinum frigus admisit.*

Calor sive ab aëre nimis aestuante, sive ab exercitiis corporis validis productus fuerit, humores externos, semper tenuiores auferit, internos residuos excoquit, dissipat mobiliora, lentiora aggregat, compingit, exsiccat (i), tandem in massas irrefolubiles adunat; unde inmeabilitas humorum, simulque elongatio; & debilitatio solidorum. *Hippocrates* (k) a calore ischiadem nasci mo-

(d) Morbor. diuturno, lib. II, cap. XII, pag. 67.

(e) Ibidem pag. 67.

(f) Ibidem pag. 66.

(g) Ibidem pag. 66.

(h) Ibidem pag. 66.

(i) Ibidem pag. 66.

(k) Ibidem pag. 66.

(l) Ibidem pag. 66.

(m) Ibidem pag. 66.

(n) Ibidem pag. 66.

(o) Ibidem pag. 66.

(p) Ibidem pag. 66.

(q) Ibidem pag. 66.

(r) Ibidem pag. 66.

(s) Ibidem pag. 66.

(t) Ibidem pag. 66.

(u) Ibidem pag. 66.

(v) Ibidem pag. 66.

(w) Ibidem pag. 66.

(x) Ibidem pag. 66.

(y) Ibidem pag. 66.

(z) Ibidem pag. 66.

(aa) Ibidem pag. 66.

(ab) Ibidem pag. 66.

(ac) Ibidem pag. 66.

(ad) Ibidem pag. 66.

(ae) Ibidem pag. 66.

(af) Ibidem pag. 66.

(ag) Ibidem pag. 66.

(ah) Ibidem pag. 66.

(ai) Ibidem pag. 66.

(aj) Ibidem pag. 66.

(ak) Ibidem pag. 66.

(al) Ibidem pag. 66.

(am) Ibidem pag. 66.

(an) Ibidem pag. 66.

(ao) Ibidem pag. 66.

(ap) Ibidem pag. 66.

(aq) Ibidem pag. 66.

(ar) Ibidem pag. 66.

(as) Ibidem pag. 66.

(at) Ibidem pag. 66.

(au) Ibidem pag. 66.

(av) Ibidem pag. 66.

(aw) Ibidem pag. 66.

(ax) Ibidem pag. 66.

(ay) Ibidem pag. 66.

(az) Ibidem pag. 66.

(ba) Ibidem pag. 66.

(bb) Ibidem pag. 66.

(bc) Ibidem pag. 66.

(bd) Ibidem pag. 66.

(be) Ibidem pag. 66.

(bf) Ibidem pag. 66.

(bg) Ibidem pag. 66.

(bh) Ibidem pag. 66.

(bi) Ibidem pag. 66.

(bj) Ibidem pag. 66.

(bk) Ibidem pag. 66.

(bl) Ibidem pag. 66.

(bm) Ibidem pag. 66.

(bn) Ibidem pag. 66.

(bo) Ibidem pag. 66.

(bp) Ibidem pag. 66.

(bq) Ibidem pag. 66.

(br) Ibidem pag. 66.

(bs) Ibidem pag. 66.

(bt) Ibidem pag. 66.

(bu) Ibidem pag. 66.

(bv) Ibidem pag. 66.

(bw) Ibidem pag. 66.

(bx) Ibidem pag. 66.

(by) Ibidem pag. 66.

(bz) Ibidem pag. 66.

(ca) Ibidem pag. 66.

(cb) Ibidem pag. 66.

(cc) Ibidem pag. 66.

(cd) Ibidem pag. 66.

(ce) Ibidem pag. 66.

(cf) Ibidem pag. 66.

(cg) Ibidem pag. 66.

(ch) Ibidem pag. 66.

(ci) Ibidem pag. 66.

(cj) Ibidem pag. 66.

(ck) Ibidem pag. 66.

(cl) Ibidem pag. 66.

(cm) Ibidem pag. 66.

(cn) Ibidem pag. 66.

(co) Ibidem pag. 66.

(cp) Ibidem pag. 66.

(cq) Ibidem pag. 66.

(cr) Ibidem pag. 66.

(cs) Ibidem pag. 66.

(ct) Ibidem pag. 66.

(cu) Ibidem pag. 66.

(cv) Ibidem pag. 66.

(cw) Ibidem pag. 66.

(cx) Ibidem pag. 66.

(cy) Ibidem pag. 66.

(cz) Ibidem pag. 66.

(da) Ibidem pag. 66.

(db) Ibidem pag. 66.

(dc) Ibidem pag. 66.

(dd) Ibidem pag. 66.

(de) Ibidem pag. 66.

(df) Ibidem pag. 66.

(dg) Ibidem pag. 66.

(dh) Ibidem pag. 66.

(di) Ibidem pag. 66.

(dj) Ibidem pag. 66.

(dk) Ibidem pag. 66.

(dl) Ibidem pag. 66.

(dm) Ibidem pag. 66.

(dn) Ibidem pag. 66.

(do) Ibidem pag. 66.

(dp) Ibidem pag. 66.

(dq) Ibidem pag. 66.

(dr) Ibidem pag. 66.

(ds) Ibidem pag. 66.

(dt) Ibidem pag. 66.

(du) Ibidem pag. 66.

(dv) Ibidem pag. 66.

(dw) Ibidem pag. 66.

(dx) Ibidem pag. 66.

(dy) Ibidem pag. 66.

(dz) Ibidem pag. 66.

(ea) Ibidem pag. 66.

(eb) Ibidem pag. 66.

(ec) Ibidem pag. 66.

(ed) Ibidem pag. 66.

(ee) Ibidem pag. 66.

(ef) Ibidem pag. 66.

(eg) Ibidem pag. 66.

(eh) Ibidem pag. 66.

(ei) Ibidem pag. 66.

(ej) Ibidem pag. 66.

(ek) Ibidem pag. 66.

(el) Ibidem pag. 66.

(em) Ibidem pag. 66.

(en) Ibidem pag. 66.

(eo) Ibidem pag. 66.

(ep) Ibidem pag. 66.

(eq) Ibidem pag. 66.

(er) Ibidem pag. 66.

(es) Ibidem pag. 66.

(et) Ibidem pag. 66.

(eu) Ibidem pag. 66.

(ev) Ibidem pag. 66.

(ew) Ibidem pag. 66.

(ex) Ibidem pag. 66.

(ey) Ibidem pag. 66.

(ez) Ibidem pag. 66.

(fa) Ibidem pag. 66.

(fb) Ibidem pag. 66.

(fc) Ibidem pag. 66.

(fd) Ibidem pag. 66.

(fe) Ibidem pag. 66.

(ff) Ibidem pag. 66.

(fg) Ibidem pag. 66.

(fh) Ibidem pag. 66.

(fi) Ibidem pag. 66.

(fj) Ibidem pag. 66.

(fk) Ibidem pag. 66.

(fl) Ibidem pag. 66.

(fm) Ibidem pag. 66.

(fn) Ibidem pag. 66.

(fo) Ibidem pag. 66.

(fp) Ibidem pag. 66.

(fq) Ibidem pag. 66.

(fr) Ibidem pag. 66.

(fs) Ibidem pag. 66.

(ft) Ibidem pag. 66.

(fu) Ibidem pag. 66.

(fv) Ibidem pag. 66.

(fw) Ibidem pag. 66.

(fx) Ibidem pag. 66.

(fy) Ibidem pag. 66.

(fz) Ibidem pag. 66.

(ga) Ibidem pag. 66.

(gb) Ibidem pag. 66.

(gc) Ibidem pag. 66.

(gd) Ibidem pag. 66.

(ge) Ibidem pag. 66.

(gf) Ibidem pag. 66.

(gg) Ibidem pag. 66.

(gh) Ibidem pag. 66.

(gi) Ibidem pag. 66.

(gj) Ibidem pag. 66.

(gk) Ibidem pag. 66.

(gl) Ibidem pag. 66.

(gm) Ibidem pag. 66.

(gn) Ibidem pag. 66.

(go) Ibidem pag. 66.

(gp) Ibidem pag. 66.

(gq) Ibidem pag. 66.

(gr) Ibidem pag. 66.

(gs) Ibidem pag. 66.

(gt) Ibidem pag. 66.

(gu) Ibidem pag. 66.

(gv) Ibidem pag. 66.

(gw) Ibidem pag. 66.

(gx) Ibidem pag. 66.

(gy) Ibidem pag. 66.

(gz) Ibidem pag. 66.

(ha) Ibidem pag. 66.

(hb) Ibidem pag. 66.

(hc) Ibidem pag. 66.

(hd) Ibidem pag. 66.

(he) Ibidem pag. 66.

(hf) Ibidem pag. 66.

(hg) Ibidem pag. 66.

(hh) Ibidem pag. 66.

(hi) Ibidem pag. 66.

(hj) Ibidem pag. 66.

(hk) Ibidem pag. 66.

(hl) Ibidem pag. 66.

(hm) Ibidem pag. 66.

(hn) Ibidem pag. 66.

(ho) Ibidem pag. 66.

(hp) Ibidem pag. 66.

(hq) Ibidem pag. 66.

(hr) Ibidem pag. 66.

(hs) Ibidem pag. 66.

(ht) Ibidem pag. 66.

(hu) Ibidem pag. 66.

(hv) Ibidem pag. 66.

(hw) Ibidem pag. 66.

(hx) Ibidem pag. 66.

(hy) Ibidem pag. 66.

(hz) Ibidem pag. 66.

(ia) Ibidem pag. 66.

(ib) Ibidem pag. 66.

</

monet: Si quis per multum tempus in sole iter fecerit, & condescens incaluerint, & qui humor articulis inest, ab aestu refuscatus fuerit. Quod autem refuscetur, & durescat, id mihi certum signum est. Arger enim articulos prae dolore, qui in eis est, vertere, aut movere non potest; & eo quod digitis rigidi non moveantur. Notari meretur, quod Cornarius illam lectionem praetulerit, quae loco *αὐτὸν δὲ τὸν αὐτὸν* habet *αὐτὸν δὲ τὸν αὐτὸν*, dum in ischiade malum potius ad vertebrae, quam ad digitos transit.

Corporis calore aucto funditur pinguedo, quae antea quiescente haerebat in tunica cellulosa, omento, mesenterio &c., subito miscetur sanguini, & humorum circulantium molem auget. Videmus in calefactis hominibus vasa turgida, faciem rubram, uti & artus, imo totum corpus, adeoque sanguinem rubrum penetrasse in vasa minora, per quorum extrema vel omnino non, vel saltem difficulter aucto circulationis motu penetrare poterit in venas; unde obstructionis, & inflammationis periculum sequitur. Si iam corpori per calorem sic mutato frigus subito admittatur, fibrae solidae densantur, roborantur, vasorum cavitas minuitur subito, partes crassiores in vasa prius dilatata ingressae haerent immobiles; adeoque omnia haec mala, a calore prius producta, augentur plurimum, & difficiles morbos producere possunt. Contrantur & illa, quae in pleuritidis historia §. 881, 2 dicta sunt.

Haec dum considerabat celeberrimus medicinae, & anatomiae professor Simonius (1) statuit, a subito frigore admissio contrahi vasa, quae per externam superficiem corporis distribuuntur, & humorum liberum transitum per illa impediri. Illi vero vasa, quae profundius locantur, tardius longe a frigore admissio afficiuntur, hinc totam vim, & impetum sanguinis patientur, qui per externa vasa subito frigore contracta libere transire non potest. Sic autem plures rheumatismi effectus explicat.

Si ponamus, magnam summi corporis partem simul excipi frigore, ex eoque rheuma quaquaversum spargi in multos tam musculos, quam articulos, facile intelligitur, qui singulorum musculorum usum, & actionem sequatur dolor, atque punctio; qui variata corporis positura punctiones illae subito de loco in locum migrent, pari scilicet celeritate, atque se mutuo excipiant muscoli, quorum usus est in corpore vertendo, surrigendo, vel alio quovis modo inflectendo; qui etiam ceteris rheumatismis gravior sit is, qui inquietus spiritui trabendo, & reddendo musculos infestat. Denique cur destillatio, si circum articulos diutius haeret, & in partes ambientes redundat, earum tandem tonum, & vigorem ex nimia distensione prorsum infringat, quarum ubi deficit actio in liquores hos extravasatos, efficitur, ut ne amplius liquores ipsi fluidi remaneant, habilesque, qui visum absorbentur, sed contra, ut facile coagulentur, & indurecant, postremo ut reddant articulum plane immobilem, qualem eventum saepe ostendit usus.

Merentur legi, quae celeberrimus auctor de origine rheumatismi latius deducit, quam adscribit huic imprimis causae, quod nempe vasa profundius demersa totam vim, & impetum sanguinis patiantur, qui per vasa corporis superficiem

(1) De re medica dissertat. quatuor, pag. 110, 111.

ficiem perreptantia, subito frigore constricta, libere transire non potest, adeoque tanto validius urgeat illa vasa, quae profundius sita sunt, & simul horum vasorum secretiones naturales augeat; unde deducit causam, quare pars rheumatismo affecta saepe cum rubore intumescat.

Simul sic explicat, *cur aer per angustam rimam irruens corpori constanter imprimat frigoris symptomata, illique praecipue parti, quam perflavit proxime (m).* Concludit hinc catharrum, tussim, rheumatismum &c. solidarum, non fluidarum partium corporis morbos esse. Interim videtur & admissum frigus subitum in humores vasis contentos agere, illorumque fluiditatem minuire. Sanguinis ex naribus sani hominis labentes guttulae in aquam frigidam statim perdunt fluorem. *Argineta (*)* monet sequentia: *Est humor a natura alienus, & particularum imbecillitas morbum adfert articulare.*

Iuvenes, tenelli, aliique debiles in hos morbos proclives sunt; quia in illis latera vasorum facilius cedunt impulsu liquidis. Inde etiam intelligitur, quo saepius, diutiusque pars aliqua rheumatismo affecta fuit, eo promptius postea reversurum morbum; quia vasa saepius, vel diu distracta labefactantur, & postea cedunt promptius cuilibet vi ingruenti. Femina illa hysterica, cuius paullo ante in eadem hac paragrapho mentionem feci, sensit singulis autumnis redeuntis morbi minas.

Quum ergo articuli, & tendinosae expansiones musculos tegentes, in pluribus locis corporis non multum a cute remota ponantur, in quam subito admissum frigus statim agit, intelligitur ratio, quare toties in illis rheumatismus contingat.

An validum frigus subito admissum calenti valde corpori posset partium mollium, quae ossa tegunt, vasa sic subito stringere, ut rheumatismus interna ossium cavorum vasa afficeret, quae non tam cito a frigore affici possunt, adeoque fortiter irruentium humorum impetum sustinebunt. *Storckius (n)* credit, se tales casus observasse, dum aer humidus, nebulosus, frigidus autumnis, hyeme, & vere frequenter fuerat. Licet enim reliqua symptomata, quae comitantur rheumatismum, adessent, aegri quidam externum ad tactum, quamvis satis rudem, sine magna molestia ferebant. Febris etiam erat valde mitis in his; sed in pectore siccitas, & frequens tussis semper aderant: vires brevi concidebant, & corpus extenuabatur.

Remedia penetrantia, sudorifera calidiora, diuretica calidiora his maxime nocuerunt. Medicamenta emollientissima profuerunt; a quibus per plures dies copiose, & calide sumtis circa articulos coeperunt apparere tumores; molesta vigilia, & inquietudo cessabant, dum aegri placide obdormiverant.

Autumnalis tempestas. Mane, & vespere frigus saepe adest, quod toties laedit incautos, qui diurni caloris impatientes corpus non satis tegunt vestibus. Monuit *Galenus (o)*, ut matutina frigora devitent, nec ob aestum vestes exuant,

(m) De re medica dissertat. quatuor, pag. 119, 120.

LXXVII, pag. 257.

(n) Ann. medic. secund. pag. 124.

human. corpor. constitut. Charact. 10m. VI, pag. 441.

(*) Lib. III, cap

(o) De

exuant homines autumnali tempore; quod & confirmavit *Celsus* (p), dicens: *Per autumnum neque sine veste, neque sine calcamentis prodire oportet, praecipue diebus frigidioribus, neque sub divo nocte dormire, aut certe bene operiri.* Quum in Hungaria matutina illa, & vespertina frigora autumnali tempore non tantum, sed & proventa iam aestate adsint saepius, licet in meridie aestus sit molestus adhuc, solent huius regni incolae pallio pelliceo corpus tegere fere semper; quod a collo pendulum, dum meridianis horis calet aër, vix molestum, a tergo fluctuat satis libere, & brachia, manusque libera relinquunt ac intacta. Ubi vero frigus matutinum, vel vespertinum ingruit, levi negotio manus, & brachia manicis pallio annexis muniunt, dum simul pallio adducto thoracem, & abdomen ab omni frigore defendunt facile. Sic vestita haec gens bellicosa in castris autumnalis aëris intemperiem tolerat facilius.

Dum *Hippocrates* (q) morbos autumnales enumerat, inter illos & *ischias* recenset; quod nomen datur rheumatismo, dum coxam occupat. *Ischiadas* autem tempore autumnali ex humorum cum malignitate, tum refrigeratione maxime fieri, *Galenus* (r) in commentario huius aphorismi statuit. *Sydenhamus* (s) pariter observavit, quod nullo non tempore invadat rheumatismus, sed maxime autumno.

Perspiratio prohibita. Totum corpus humanum perspirare *Hippocrates*, & *Galenus* probe iam noverant, posteaque a *Sanctorio*, *Keil*, de *Gorter*, *Kau* pulcre confirmatum fuit, qui per observationes omni cum attentione factas, & experimenta tentata maximam utilitatem arti medicae conciliaverunt.

Demonstratum enim iam est evidenter, per arterias cutaneas, & emissaria cryptularum cutanearum ex pulmone, naribus, ore vaporem tenuem, copiosum diffari in aëra: tenuissimus autem debet esse perspirationis humor, quum *celeberrimus Simson* (t) saepius tentato experimento invenerit, indusium, quo corpus tota nocte tectum fuerat, ne grano quidem ponderosius inventum mane fuisse, licet integra libra facile tempore noctis perspiraverit de corpore. Imo in indusio, quod per tres dies, ac noctes gestaverat continuo, nullum ponderis augmentum invenit.

Quum observaretur, perspirationis excretionem magis mutari a motibus animi, quam corporis, & simul adeo subtile esset liquidum perspirans, ut nec indusium corpus tegentis pondus augeret, hinc dubitaverunt quidam, an forte pars subtilissimi liquidi, quod per nervos movetur, hac via diffaretur de corpore. Sed & tenuis illa lymphæ, quæ nervos involucris suis tectos aluit, humectat, fovet, & sic impedit, ne fibrillæ nervosæ in maiori trunco nerveo collectæ haerentes concreseant inter se, videtur per viam perspirationis posse diffari de corpore, quum involucra hæc cecedant a nervis, dum illorum extrema ad cutim pervenerunt, ut tactus organum constituent.

Dis-

(p) Lib. I, cap. III, pag. 3.

(q) Aphor. XXII, sect. III, Charter. tom. IX,

pag. 117.

(r) Ibidem.

(s) Sect. VI, cap. V, pag. 344.

(t) An inquiry how far the vital and animal actions can be accounted for independent of the Brain, essay IV, pag. 196.

Diffantur perspiratione & quaedam, quae diutius relicta in corpore nocent, morborumque causae fieri possent; est & alia perspirabilis liquidi pars, quae per vias urinae exire posset tuto; & hinc minuta perspiratione urinae copiam augeri observatur, ac contra. Videntur per cutis spiracula diffari illa, quae per alias vias integre de corpore expelli nequeunt, & sic perspiratione prohibita retinentur nocitura.

An, dum in morbis acutis periculosis tota cutis arida fit, non cessat omnis perspiratio? An non illud perspirabile per vasa exhalantia exire nequens, introrsum repulsum, pallidas, & decolores urinas facit, quas periti medici in talibus morbis metuunt semper? Quum autem in iisdem morbis omnia in putredinem tendant, an non aliquid volatile, alcalinae fere iam naturae, in corpore retinetur magno cum periculo, quod perspirationis ope diffari potuisset? Unde medici gaudent, dum talium aegrorum cutis sicca humescere incipit. Videtur probabile, tenuiorem partem chyli cum sanguine quidem fluentis, sed nondum naturam humorum nostrorum adepti perspiratione invisibili expelli de corpore. Auctores, qui de perspiratione scripserunt, statuunt, trihorio post prandium minorem perspirationem observari; dum nempe ex ingestis chylus paratur; sequentibus horis augeri denuo; dum chylus iam paratus cum sanguine per vasa fluit. An non verosimile est, quasdam ingestorum partes in chylum iam mutatas, sed quae nimis resisterent integrae subactioni, qua ex chylo sanguis paratur, per vasa cutis perspirantia diffari? In hominibus, qui copioso alio utebantur in cibis quotidie, puto me olfecisse quandoque alii odorem ex digitorum apicibus exspirantem. Si per impeditam perspirationem ingestorum acrium subtiles partes retinentur diutius, aeri labe poterit infici sanguis, & sic disponi ad rheumatismum producendum; uti in eadem hac paragrapho dictum fuit. Antea ad §. 386 β, ubi de febrium causis agebatur, ex Hippocrate (u) sequentia allegavi: *Qui probe perspirant, imbecilliores, & salubriores existunt, & facile convalescunt. Qui male perspirant, priusquam aegrotent, robustiores sunt. Quum vero in morbum inciderint, difficilius sanantur. Haec autem & toti, & parti.* Quamdiu enim in debilioris fabricae hominibus perspiratio rite procedit, optime se solent habere; quumque a levioribus causis haec quidem impediatur in iisdem, sed & facile restituitur, convalescunt facilius. Qui vero minus perspirant, robustiores sunt plerumque ceteris paribus, neque a levibus adeo causis laeduntur. Ubi vero a validioribus morborum causis naturale talium robur superatur, periculosius aegrotant, & difficilius convalescunt. Ob hanc rationem videtur aetas mascula inter praecedentes causas recensita fuisse; quia mares ceteris paribus feminis sunt robustiores.

Diatheſis inflammatoria lentior, cruore pleuritico se manifestans. Quando rheumatismo laborantibus vena secatur, invenitur, quod cruoris emissi pars rubra sero innatas tegatur alba, dura, crassa, rigida pelle, fere inflar
co-

(u) De alimento. Charter. tom. VI, pag. 287.

corii porcini; hunc craorem vocant sanguinem pleuriticum; quoniam talis crusta in hoc morbo sere semper invenitur; unde concluditur, in rheumaticis diathesin inflammatoriam lentiozem adesse. Videri poterunt illa, quae in historia inflammationis de hoc sanguine inflammatorio pleuritico dicto habentur ad §. 384.

In rheumatismo decumbentibus, quem ingens febris comitabatur, secta vena, sanguis semper regebatur crassa flava, crassa, tenacissima; serum a sanguine subinde per quatuor, aut quinque horas non secessit, & quod secessit, paucum fuit, & crassum, & aliquoties observavit (w), id virgula elevatum fila egisse. Unde proponit: An in sero sanguinis cras praecipua mali sedes. In his enim aegris secundo, aut quandoque primo statim die partes dolentes tumore albo inflantur, & inde omnia adeo erant tensa, ut aegri nullum membrum absque summo dolore potuerint movere (x). Imo & a minimo ad tactu tantus exaltabatur dolor, ut miseri clamorem inhibere non potuerint.

Multi aegri tumore rheumatico universali adfiebantur; etenim tertio, vel quarto morbi die cutis totius corporis coepit tendi, albo tumore elevari, & acute dolere; ipsa quoque facies tumore deformis facta est (y). Haec omnia videntur confirmare, quod aliquando in sero, forte & in lymphâ sanguinis, rheumatismi praecipua sedes sit. Quandoque & articuli in hoc morbo affecti parvo tumore subrubelli coloris prominent, uti saepius vidi.

Si post talem tumorem rheumaticum universalem subito omnia membra detumescerent, materies per totum corpus dispersa in unum locum confluent ingentes tumores lymphaticos formavit, qui plerumque genua, coxas, aut inguina occupabant. Nec cesserunt hi tumores remediis discutientibus externe applicatis, nec sudoriferis, aut diureticis datis de corpore expelli poterant; sed scalpello debebat parari via & semper tunc prodit serum flavum viscidum, quod leni calore potuit inspissari (z). In unico aegro tumor talis inter scapulas nascebatur caput humanum mole excedens; ex quo apertu novem librae flavi visceri effluerunt.

Hinc lentor, & visciditas, ac facilis humorum concretio videntur in rheumatismo adesse, forte & iam aliquatenus praexistisse ante eius originem, quae quandoque admodum subitanea est; uti postea patebit. Concrectiones enim fluidorum nostri corporis subito fieri posse, satis notum est. In morbis acutis quandoque paucae guttulae sanguinis de naribus cadunt, fluidae adhuc, sed momento post solidae, ac concretae. Ille sanguis paullo ante per pulmonem transire potuit in cor sinistrum, & simulac de vasibus exiit, soliditatem acquirit. Unde pro malo omine periti medici hoc habere solent; dum credant, sanguinem in subitam concretionem primum tunc esse, simulac vasorum in liquida contenta actio concretionem impediens a quacumque demum causa minui incipit.

Quare, si diathesis inflammatoria lentior in sanguine adfit, quidquid liberi-

(w) Anon. Stork ann. medic. secund. pag. 115.

(y) Ibidem pag. 116.

(z) Ibidem pag. 117.

(x) Ibidem pag. 114.

rimam circulationem impedit, poterit rheumatismo originem dare. *Celeberimus Hofmannus* (a) monet, se aliquoties observasse, quod a paullo strictiori ligatura post scissam venam ob institum paullo gravius vulnus in pedibus per 24 horas relicta, dolor ipso pedum, & maxime pollicis articulos, n. n. secus ac in podagra fieri solet, per multos dies cum molestia durans invaserit. Inprimis hoc contigerat celebri medico, qui sibi in sura venam pertundi iusserat, & ob profundiorē venae situm fortiori ligatura opus habuerat: sed altero mane atrox dolor non tantum suram, verum ipsos quoque pedis articulos infestavit.

Cum febre continua incipias dolorem creat atrociſſimum dilacerantem &c. Sequitur nunc considerandum, quomodo rheumatismus incipiat, qualis sit eius decursus, quibus symptomatibus stipatus progredi solet. *Sydenhamus*. (b) sequentem huius morbi descriptionem dedit: A rigore, atque horrore orditur tragoedia; quos statim excipiunt calor, inquietudo, sitis, & reliqua illa infelix symptomatum caterva, quibus stipantur febres. Elapso uno die alterove (est & ubi citius) aeger atroci dolore nunc in hoc, nunc in illo artu infestatur, in carpis, humeris, genibus praesertim, qui locum subinde mutans vicissim illos occupat, rubore quodam, & tumore in parte, quam postremum affecit adhuc residuis. Primis aliquot diebus febris, & symptomata iam memorata quandoque coincidunt; febris autem sensim evanescit manente dolore, quin & nonnunquam immanius faciente, materia scilicet febrili in artus translata; quod satis arguit febris ipsa saepius recrudescens ob materiam morbosam ab intempestivo externorum usu repressam.

Quandoque post aliquot horas febris inceptae percipitur dolor vagus, eodem adhuc die, quandoque & sequenti sedem figens in hoc, vel illo loco, qui quandoque intumescit; aliquando nullus tumor observatur, sed ad tactus loci occupati semper dolorem auget (c). Aliquando contingit, subito excitari dolores tales, & acerrimos quidem. Puella 21 annorum sana, sed sanguinei temperamenti autumnali tempore coepit conqueri de dolore circa cristam ossis ilii dextri: sequenti die flectens subito corpus, ut aliquid humo tolleretur, dolor ille uno momento augebatur immaniter, & mox se disperfit per totum latus dextrum, crus, ac brachium dextrum, imo & per latus dextrum capitis; a levissimo corporis motu dolor augebatur. Sanguinis missione facta statim menstrua prodierunt. Quarto die morbi urina subsedit albo crasso copioso sedimento; uti & sequenti die; sexto die urina naturalis; septimo die cessavit omnis dolor.

Quo validior est febris, a qua morbus incipit, eo plerumque acrior dolor, & molestior totius morbi decursus. Licet saepe hunc vel illum articulum occupet dolor, & ibi figatur malum, febre plurimum minuta, vel & omnino cessante, tamen non semper in eodem loco fixus manet. Aliquoties vidi, ex dextra manu v. g. in sinistram genu dolorem rheumaticum migrasse, inde

re-

(a) Medicin. ration. tom. IV, parte secunda, cap. VIII, pag. 434.

VI, cap. V, pag. 344.

112, 113.

(b) Sect.

(c) Anton. Sorsk ann. medic. secund. pag.

rediisse ad locum priorem, vel & alias corporis partes, imo quandoque relicto priore loco totum corpus occupasse. Similia & ab aliis medicis observata fuerunt. Sic *Storckius* (d) vidit, materiam, quae articulos manuum, & pedum occupavit, per totum corpus fuisse dispersam, summos excitasse dolores, atque universalem induxisse rigorem, imo tetanum. Sola tamen maxilla inferior mansit libera: ipsi oculi sanguine suffusi protrudebantur, & prae dolore lacrymae acerrimae, quae genas eroserunt, defluxere: postea pectus fuit affectum cum respiratione sublimi, & suffocationis metu. Applicabantur sinapismi satis fortes articulis manuum, ac pedum, & post sesquihoram ingens dolor occupavit genua, carposque manuum, minuto statim suffocationis periculo, subito aderat dolor acutissimus circa umbilicum, qui illico disparuit, scybalis multis durissimis post enema injectum evacuatis. Inguina porro invasit dolor, qui dein transivit ad testiculos sequentibus convulsionibus, & animi deliquio cum perfecta asphyxia, quae per septem minuta duraverunt; dein calor extremorum, & pulsus redierunt; sequebatur placidus somnus cum sudore continuo in genibus, & carpis manuum levis mollis tumor apparebat cum dolore exiguo, & octiduo elapso rediit sanitas post copiosissimam urinam expulsam usu infusi florum sambuci, ac feri lactis.

Plures casus vidi, qui docent, materiam morbosam in rheumatismo mira satis mobilitate subito locum mutare, & iuncturas quoruncumque artuum obsidere; licet genibus, lumbis, coxendici magis infestus sit morbus. Sed non tantum articulos obsidet morbus, verum & expansiones tendinosas, dictas aponeuroticas, quibus teguntur muscoli colli, dorfi, & artuum; quam rem optime notavit celeberrimus *Cocchi* (e).

Quandoque cerebrum, pulmones, viscera excruciantem. Ex illis, quae haecenus dicta sunt, haec res satis evidenter patuit. Verum quandoque contingit, ut materies rheumatica admodum vaga sit, & mox externas, mox internas partes occupet (f); unde tales aegri in maiori versantur periculo. Aliquando enim dolor in membris disparet, oritur pectoris anxietas, cordis palpitatio, pulsus intermittens, & redeunte ad membra dolore haec symptomata disparent, pulsusque paullo ante tremulus, & intermittens denuo aequalis, & liberrimus est. Alibi (g) describuntur plures similes morbi, qui mense novembri 1759 in nosocomio *Pasmaniano* aderant, quorum initium fuit horror per totum corpus, dein languor; postea dolor rheumaticus partim vagus, partim fixus, qui omnia membra obsedit, & subinde post unam alteramve horam cessavit, tuncque pectus oppressum fuit, & aegri coeperunt russitare. Caput etiam doluit vario modo. Quandoque post plures horas dolor rheumaticus de novo per omnia membra diffusus est; & tunc illico desit dolor capitis, pectoris oppressio, & tussis evanuerunt. Illae autem mutationes in eodem aegro saepius contigerunt.

Haec

(d) Anton. Storck ann. medic. secund. pag. 126, 127.

(e) Dei bagni di Pisa

trattato pag. 171.

(f) Anton. Storck ann. medic. secund. pag. 126.

(g) Ibidem pag. 40, 41.

Haec materies rheumatica quandoque adeo mobilis, & vaga, nisi bona curatione, de qua paulo post dicetur, dissipari possit de corpore, vel expelli, in unum locum confluit aliquando, & ingentes tumores lymphaticos producit; de quibus eadem hac paragrapho dictum fuit, quomodo in externa corporis superficie appareant, & illis pertusis exiverit semper serum flavum viscidum, quod leni calore potuit inspissari. Quum ergo pateat, eandem hanc materiem ex artubus derivari posse ad caput, ad pectus, si nec inde salutari metastasi redeat ad artus, nec curatione expellatur de corpore, poterunt tales tumores in interioribus colligi, & pessima mala producere, imo mortem, uti cadaverum hoc morbo defunctorum sectio docuit.

Tres aegri, in quibus serum per universam corporis superficiem antea dispersum subito interiora occupavit, rheumatismo perierunt (b). In binis cadaveribus reperiebatur copiosissima flava gelatinosa materia inter membranam pulmones ambientem, & ipsos pulmones, totaque pulmonum substantia in admodum parvam molem compressa erat. Talis materies valde copiosa quoque inter piam matrem, & cerebrum, atque cerebellum haesit; anteriores cerebri ventriculi simili gelatina pleni erant.

In tertio aegro disparuit tumor artuum, secuta fuit difficilis respiratio, & tussis convulsiva, quae nullis remediis obedivit; unde miser intra quatuordecim dies, omnibus viribus exhaustus periit. In medio pulmonis dextri detegebatur saccus, qui quinque libras feri flavi subacris reclusit. Cetera fuerunt sana.

Sydenhamus (i), dum de rheumatismo agit, dicit sequentia: *Iam plus satis grassatur hic morbus, & licet rarissime hominem e medio tollat febre semel depulsa, tamen & vehementia doloris, & diuturnitas cum prorsus contemni non sinunt. Etenim, si minus perite trahatur, non ad menses tantum, sed ad annos etiam aliquot, imo per omnem adeo vitam miserum haud infrequenter discruciat. Verum ex illis, quae sequuntur immediate, satis patet, quod hanc prognosin fecerit de rheumatismo, qui articulationes obsidet, & in illis fixam sedem obtinuit. Ubi enim vaga materia rheumatica locum mutat, & ad vitalia viscera deponitur, tunc de hoc morbo non posset dici, quod rarissime hominem e medio tollat. Postea ad §. 1495 patebit, quod maxima saepe difficultas addit morbum detegendi, dum cerebrum, aut pulmonem occupat: tunc enim summum periculum adest, & mors sequens non tribuetur rheumatismo, ut causae.*

Ipse Sydenhamus (k) monuit, se observasse affectum quemdam, modo rheumatismum aemulantem, modo a nephritico dolore, quoad saevissimum humorum cruciatum non multum abludentem, qui febres intermittentes excipere solet, & hunc morbum translationi materiae febrilis in musculosas corporis partes adscripsit. Huic malo illam methodum medendi adhibendam iussit, quae feбри intermittenti convenit. *Quum a frequenti venae sectione, & quibus-*
cum-

(i) Anton. Storck ann. medic. secund. pag. 119.

(i) Sect. VI, cap. V, pag. 345.

(k) In epistola I responsoria ad Robertum Brady in fine, pag. 406.

cumque aliis evacuationibus, exasperetur illud, atque aeger in vitae discrimen committitur.

Notabilem observationem vidi apud *Storckium*, quae huc referri meretur (1); per quam confirmatur, confortium febris intermittens cum rheumatismo quandoque contingere.

Aeger validissimo dolore rheumatico per totum corpus torquebatur; febrim habuit valde mitem, & subinde per tres quatuorve horas ab omni dolore liber fuit. Simulac dolor aberat, tertio quovis ictu intermisit pulsus, & tempus intermissionis aequabat longitudine illud, quo tres priores pulsus peragebantur.

Aeger tamen nunquam de pectoris anxietate conquestus fuit, sibi praefens semper, nec multas vires amisit.

Quarto die mane omnia erant valde mitia; circa meridiem rigor, febris exacerbatio, sed absque dolorum augmento, nox sequens inquieta. Quinto die dolores cessabant; sed tertio quovis ictu pulsus intermisit; circa meridiem redierunt dolores & febris, praegresso rigore, fuit adeo vehemens, ut vires plurimum minutae essent; ideo statim datus fuit cortex Peruvianus; nox sequens, dato paregorico, quieta erat.

Sexto die febris mitis; circa meridiem vix ulla exacerbatio; dolores manserunt aequae validi. Cortex Peruvianus conservis antiscorbuticis mistus, magna dosi quotidie adhibitus fuit una cum fero lactis floribus sambuci infuso. Sic penitus suppressa febris, sed dolores nequaquam minuti fuerunt; si minuerentur, post tertium quemvis ictum pulsus intermisit.

In horum medicamentorum usu perrexit ad duodecimum diem; uique, quo erupit sudor copiosus, foetidus, subfuscus, tenax, qui aegrum valde debilem reddidit: dolores autem penitus evanuerunt; pulsus naturalis esse coepit.

Postea, sepositis hactenus usitatis remediis, claretum datum fuit, & serum lactis pro potu. Diaeta molli, ac probe nutriente intra aliquot dies redierunt vires, & aeger optime convaleuit.

In quibus praecipue notari meretur, corticem Peruvianum abstulisse febrim; sed dolores rheumaticos, pulsusque intermissionem mansisse; solo foedo hoc sudore expulso, omnia haec mala fuerunt superata.

Cum tumore, & rubedine loci. Sic saepius contingere solet, non semper tamen. Vidi aliquoties, acerrimum adfuisse dolorem absque ullo tumore, vel rubedine partis affectae. *Storckius* (m) notat sequentia: *Plaga dolore affecta quandoque intumuit, quandoque nullus tumor advertebatur; omnis autem adactus dolorem auxit.* Vidit quandoque in multis aegris (n), praegresso dolore, ingentem febrim ortam, & secundo, quandoque statim primo die partes dolentes albo tumore inflabantur; unde omnia adeo erant tensa, ut aegri nullum membrum absque summo dolore potuerint movere. Vidit (o) & multos aegros tumore rheumatico universali affecti. Etiam tertio, vel quarto morbi die

(1) Ann. medic. secund. pag. 128, & seq. (m) Ibidem pag. 113, 122. (n) Ibidem pag. 114. (o) Ibidem pag. 116.

die cutis totius corporis coepit tendi, albo tumore elevari, & acute dolere. Aliquoties me vidisse memini articulum quemdam acerrimo dolore rheumatico afflictum, sed non tumentem; dum postea in alium articulum migrabat malum, locus prius affectus subrubello colore tumidus apparebat; simul in eodem loco doloris lenimen aderat. Videtur & Sydenhamus hoc notasse (p), dum de dolore rheumatico agit; dicit enim: *Qui locum subinde mutans, vicissim illos occupat, rubore quodam & tumore in parte, quam postremum affectus, adhuc residuis.*

Periodico ita & reditu. Ad praecedentem paragraphum, ubi de rheumatismi definitione agebatur, patuit, quod ille morbus merito dicatur agnatus arthritidi, podagrae, & scorbuto; hinc mirum non est, si quaedam, quae his morbis praecipue conveniunt, etiam rheumatismo tribuantur. Arthritidem, & podagram, periodico ita & reditu renovare cruciatus, apud medicos in confesso est. Dixit Sydenhamus (q), de hoc morbo agens: *Morbis hic, quoties a febre coniungitur, arthritidis saepe audit, quamvis essentialiter ab illa distinguatur, prout cuiusvis facile constabit, cui uterque morbus intimus fuerit perspectus.* Verum ipse paullo ante dixerat, febrem in rheumatismo sensim evanescere, manente interim dolore, quin & nonnunquam immanius faeviente; non mirum ergo foret, quod a quibusdam dolores tales absque febre comite pro arthritide habiti fuerint. Notavit autem (r), rheumatismum, si minori tractetur pericia, quandoque diuturnum fieri morbum; *in hoc casu, non eodem semper vigore, sed paroxysmis quibusdam periodice repetentibus, adinstar arthritidis, subinde laessit.* Quum autem rheumatismus (vide §. 1490) frequentissimus morbus sit, datur satis frequens occasio medicis illum considerandi; & credo, patebit, rheumatismum ex sua natura non habere semper illos periodicos itus & reditus, qui in podagra & arthritide observantur. Plurimos novi, qui tantum semel in vita rheumatismum passi sunt, licet satis acrem; quo prudentiores facti cavebant frequentissimam huius morbi causam, subito admissum frigus calefacto corpori. Vidi plures post male curatum rheumatismum diu miseros; nec potui detegere, quod determinato tempore dolorum paroxysmi redirent; sed potius a temperie aëris subito mutata videbantur excitari; neque erant illi dolores adeo validi, ac fuerant illi, qui initium rheumatismi comitabantur.

§. 1492. **S**i durat, & augetur, saepe post atrocissima tormenta articulum motu privat, anchylosin creat, vix ulli cedentem remedio.

Ex antedictis patuit, rheumatismum non tantum articulos, sed & musculos, illosque tegentes membranas occupare; in sequentibus patebit, membranas nervos tegentes eodem quoque morbo posse affici. In hac paragrapho
agi.

(p) Sect. VI cap. V pag. 344.

(q) Ibidem.

(r) Ibidem pag. 345.

agitur de illis malis, quae articulis a rheumatismo accidunt; imprimis, si augeatur malum, & diu duret.

Diuturnos ex defluxione affectus, qui nempe circa articulos omnes, & praecipue circa coxam fiunt, *Galenus* (1) *xistum* vocavit; in alio loco eodem nomine describit decumbentes in crura defluxiones, easque potissimum, quae primam articulationem iuxta coxendicem occupant.

Antea ad §. 362, ubi de *luxatis* agebatur, dictum fuit de causa luxationis, quae cavo articuli increta, os articulatam extrudit. Ibi notatum fuit, quod ligamenta articularum ex illis locis, ubi epiphyses reliquo ossi iunguntur, enata, capsulae cavae instar, totum articulum ambient, neque aliquid foris ingredi, vel intus elabi patiantur. In hac capsula cava adsunt extrema ossis excipientis & excepti, cartilagine undique in crustata; & in maioribus articulis glandulae satis insignes, imo similes minores, copiosae, internam ligamenti articulum ambientis superficiem occupant. Simul ibi probatum fuit, oleum tenue medullare, quod in cavernosa ossium parte prope articulos haeret, satis copiosum transudare per cartilaginea ossium articularum extrema in articuli cavum.

Per has glandulas fecernitur mucus instar albuminis ovi, saporis subsalsi, qui cum oleo meduloso permixtus constituit illud linimentum, quod ossium articularum extrema inungit, & lubricissima reddit, ut sine multo attritu ossium ad se mutuo articuli moveri possint. Simul & in cavum articuli ex ultimis arterioliis exhalantibus tenuis ille ros expellitur, quem in omnibus cavis corporis, maioribus atque minoribus, adesse novimus.

Si ergo rheumatismus in articulo quodam duret, & augeatur, turbabitur naturalis secretio mucii articularis; uti & excretio olei medullosi in cavum articuli; unde merito concludit *Simsonus* (2) sequentem prognosin. *Si circum articulos diutius haereat, & in partes ambientes redundet, earum tandem sonum & vigorem ex nimia distensione prorsum infringit; quarum ubi deficit alio in liquores hosce extravasatos, efficitur, ut ne amplius liquores ipsi fluidi remaneant, habilesque, qui vicissim absorbeantur, sed contra ut facile coagulentur, & indurefiant, postremo, ut reddant articulum plane immobilem.*

Unde apparet, quanta cura statim rheumatismo succurrendum sit, quum mora sola morbum augere possit. Saepius contingit, ut aegri tardius opem petant; quamobrem in insanibilem affectum inciderunt; quoniam principiis, quum debilissimus morbus est, medicus non resistit; qui ut temporis spatio vires acquisivit, nihil medici diligentia proficitur (3).

In spina dorsii post toleratos dolores rheumatismi tales anchyloses natas saepius vidi, quae cogeant miseros tota vita antrorsum flexo corpore incedere, quod nunquam potuerunt postea erigere. Agricola illi, qui olera culinibus servientia in hortis suis colunt, prae reliquis tali infortunio exponuntur; quia an-

(1) Foëssii oeconom. Hippocrat. pag. 201, 202. quatuor pag. 111.

lib. II cap. XII pag. 66.

(2) De re medica dissert.

(3) Aret. Cappadoc. de caus. & sign. morb. diuturn.

antrorsum inflexo corpore labores suos peragunt. Si aestivo sole spina dorsi incaluerit, & subito cadente pluvia, ut toties fit, maduerit indusium, aut vestis calefactae spinae dorsi subito admissum frigus humidum rheumatismum saepe producit, quem toties negligunt miseri, vel noxiis remediis tractant. Contingit his hominibus, postquam diu acres dolores passi sunt, ut illi tandem sponte cessent, ac licet in his stomachus valeat, & quoad cetera sani videantur, manet tamen in spina dorsi ad mortem usque anchylosis insana-bilis. Observavit similia infortunia Sydenhamus (v). Vidit enim, post cessationem dolorum, *digitorum articulos quasi inversos, & protuberantes, ut in arbritide, nodosis, in interna magis quam externa digitorum parte se prodentibus.*

Antea ad §. 1490 dictum fuit, Sydenhamum (x) observasse rheumatismi speciem, quem scorbuticum vocat; quia insigniora huius morbi symptomata aemulatur; sic autem describit: *Dolor nunc hanc nunc illam partem obfides; sed eandem in tumorem, ac in alia specie, raro attollit; neque febrem sibi comitem adiungit. Insuper non adeo fixus manet, sed indolem magis vagam ac incertam refert, cum anomalis inconditisque symptomatibus stipatus.* Quandoquidem autem foeminas prae reliquis adoriretur hic morbus, uti & viros imbecillioris naturae suspicabatur, ad affectuum hysterico-rum classem referri debere hunc morbum; qui tamen remediis antihystericis minime cessit. Tringenta quatuor anni elapsi sunt, quod primo viderim hanc rheumatismi speciem in muliere 25 annorum, tenerae penitus fabricae, saepius valido terrore percussae, quae calefactum motu corpus aëri frigido exposuerat per rimam fenestrae adacto. Dolores acres valde sensit, nunc in hac, nunc in alia parte corporis, qui durabant per tres, vel quatuor horas, dein minuebantur cum tumore articulo-rum prius acerbè dolentium: manifesta scorbuti incipientis indicia in gingivis apparebant. Per decem septimanas morbum tulerat, antequam meum consilium peteret. Levamen a praescriptis remediis sensit; post quatrimum sensit dolorem in humero dextro, auctum insigniter, dum tentabat brachium elevare. Post octiduum, mane de lecto surgens, sensit omnes artus rigidos; imprimis humeros; sed illa rigiditas brevi evanuit, post aliud octiduum; manus difficulter flecti poterant circa carpos. Quum sibi satis sana in reliquis videretur, & dolores, qui subinde in diversis locis redibant, admodum tolerabiles forent, artis medicae auxilium sprevit. Post aliquot menses vidi tumidos articulos digitorum manuum, & genua tumentia; difficulter omnes hi articuli flecti poterant; tandem fere integra aderat anchylosis, quae ad mortem usque duravit.

Postea adhuc aliquot similes casus vidi.

Monuerat de his morbis agens Paulus Aegineta (y) sequentia: *Humor superans; qui iuncturis sese inserit, nunc biliosus, nunc sanguineus, alias atra bile vitiosus, plerumque etiam pituitosus, crudusque, copia alimentis, aut cruditate, aut otio, congestus, vetustate in articulis crassescit, & glutinosior evadit, sic ut*
in

(v) Sect. VI cap. V pag. 345.
cap. LXXVIII pag. 258,

(x) Ibidem pag. 352.

(y) Lib. III

in duritiem consumatissimam, quam Latini topum, Græci poron appellant, occalleſcat.

Imprimis hoc contingit, si adsint & humor a natura alienus, & particularum imbecillitas (x).

§. 1493. **C**ausa proxima eius videtur inflammatio in arteriis lymphaticis membranarum, quae ad ligamenta iuncturatum, non tam saeva ut in suppurationem eat. Curatur missione sanguinis, purgatione antiphlogistica repetita & semper vesperi per narcoticum sedata, balneo leni, tepido, fomentis antiphlogisticis loco affecto applicatis, vesicatoriis validioribus, & cauteriis, medicamentis summopere diluentibus atque emollientibus simul, victu tenuissimo, quiete, tepore lecti, & ad finem curationis frictione sicca, calida una cum usu antiscorbuticorum.

Si considerentur illa, quae ad §. 1491 dicta sunt, patebit satis, rheumatismum pertinere ad classem morborum inflammatoriorum; adoritur enim praecipue tales, qui ad hos morbos dispositi sunt, & temperiem sanguinolentam labe acris infectam habent, lautoque victu utuntur; imprimis tales, in quibus diathesis inflammatoria lentior cruore pleuritico se manifestat; sed & frequentissima inflammationum causa calefacto corpori subito admissum frigus toties rheumatismum antecedit. Unde conclusit Sydenhamus (a): quod neque quisquam reperitur, qui hos (rheumaticos nempe) inflammatione laborare vel dubitaverit. Adest haec inflammatio in arteriis lymphaticis membranarum, quae ad ligamenta iuncturarum pertinent; sed antea iam dictum, membranas, quae musculos tegunt, & aponeuroses, toties a rheumatismo affici: idem contingit in vaginis nervos investientibus, de qua re ad sequentem paragraphum plura dicenda erunt; unde & dolores rheumatici ab involucris nervorum sic affectis diu saepe durant absque nervorum destructione. Quandoque in tali casu sequitur paralytis; quae tamen sensim postea evanescit; quia integri manserunt nervi. Celeberrimus Boërhaevius tormentis his discruciatu tandem iacuit resolutus, ut vix amplius sensus ullus, nullus utique motus inferioribus artubus superesset. Nempe consumptis ut cruratum fuscis paralyticis femora, crura, pedes movere impos, integros menses in dorsum recumbere coactus fuit (b). Tamen post quinque menses, 11 ianuarii 1723, scholas aperuit, licet infirmior adhuc; & postea integre convalevit, reditque in artubus inferioribus movendi potestas, quae per quindecim & ultra annos ad mortem nempe usque illibata perstitit.

Hoc videtur confirmare, in rheumatismo inflammationem obtinere in membra-

(a) Paulus Aegineta lib. III cap. LXXVIII pag. 257. (a) Sect. VI cap. V pag. 146.

(b) Alberti Schultens oratio academica in memoriam Herimani Boërhaevii pag. 67.

branis; quæ ad ligamenta iunctionarum pertinent, vel musculos & nervos involvunt. Unde celeberrimus *Hufmannus* (c) monet, quod ingens plerumque admittatur confusio in cognitione doloris arthritici & rheumatici, quos morbos dein sic distinguit: Quod dolor arthriticus a sero tartareo acri intra iun-
cturas articularum obbaescente, proficiatur; in rheumatico vero materia illa
ferosa salino caustica membranis muscularum, & ligamentis articularum exte-
rius potius infideat. In arthritide quoque tum glandulae, quæ in articulationibus
reconduntur, mucosæ a *C. Anglo* Cloptum *Havers* inventæ, tum ligamenta
glandulosa materiam arthritidis evomunt: contra ea in rheumatismo stagnans
illud acre serum ex sanguine in canalibus nimium congesto inter membrana-
rum & musculorum interstitia magis secedit & colligitur.

Quamvis autem rheumatismus pro causa proxima inflammationem habeat,
exitus tamen inflammationis in suppurationem raro sequitur admodum, &
ita rheumatismus ab aliis morbis inflammatoriis differt. Celeberrimus *Boërhae-
vius* per quinque menses cruciatibus rheumaticis miserrime vexatus nullam
suppurationem passus fuit. Ad §. 1491 pluribus exemplis consistit, tumores
a rheumatismo valido productos non continuasse pus, sed viscidum lentum
humorem. Egregius medicus *Raubius* (d) testatur, rheumatismum raro in
abscessum abire, licet partes his doloribus affectæ tumeant insigniter: vidit
in homine, dolores rheumaticos in genu fixatos fuisse, illudque intumuisse
admodum: & licet in hoc tumore manifesta adesset fluctuatio, paucis die-
bus totus dissipabatur.

Iam monuerat *Hippocrates* (e) sequentia: quibus ab ischiade diuturna vexa-
tis ischium exiit, & rursus incidit, iis muci innascantur. In commentario
ad hunc aphorismum *Galenus* (f) probat, ischii vocabulo significari in hoc
loco ischii articulum.

An rheumatismus absolute nunquam in suppurationem abire posset, dubium
videtur; sed satis certo constat, raro hoc contingere (g). Celeberrimus *Tisser,
dum* varios rheumatismi exitus enumerat, notat, quandoque abscessum for-
mari in parte affecta, vel in vicinia. Vidit ipse, hominem acrem lumbagi-
nem passum in suprema femoris parte habuisse abscessum ingentem; quem
aeger neglexit, & ex quo postea dissecto puris ingens copia exivit. Post
aliquod tempus miser ille perit.

Quum autem in illis partibus, quas rheumatismus occupat, & vera phlegmo-
ne nasci possit, omni cum cura attendendum est, ut bona diagnosi habeatur
mali præsentis. De signis rheumatismi amplo satis sermone actum fuit §. 1491.

Imprimis talis error metuendus videtur in ischiade, ne abscessum conitan-
tes dolores pro rheumatismi cruciatibus habeantur. En locum *Hippocratis*;
qui diagnosi difficultatem confirmare videtur (h): *Eupolemis in oeniaditis
ischii*

(c) Med. Ratio. systemat. tom. III chap. III §. 34 pag. 49.

(d) Des maladies

occasionnées par les promps & frequentes variat. de l'air chap. XV pag. 301.

(e) Aphor. 59 sect. VI Charter. Tom. IX pag. 289.

(f) Ibidem pag. 290.

(g.) Avis au peuple sur sa santé chap. XI. (h) Epidemic. lib. V. Textu V. Charter.
tom. IX pag. 334.

ischii dexteri, & inguinis, & propinque ischii iuncturae ab inguine & anteriore ischii postiac dolore vexabatur. Huic sanguis ex malleolo detractus copiosissimus, & niger & crassus, epotoque pharmaco deorsum album purgante, tum multum purgatus est, tum melius quadansenus habuit. Sed dolores non cessabant, verum potius exiendebantur latius. Pus os potius quam carnem alte pervadebat, & aliquamdiu sic se habere ignoratus est, donec admodum debilis exiit. Postea crustis permulsi, iisque magnis, ac densis inustus est; pusque multum & crassum effluxit, ac paucis post diebus interiit tum ex ulcere magnitudine & multitudine, tum ex corporis imbecillitate. Faretur Hippocrates, aegrum hunc servari potuisse, si in tempore ampla sectio facta fuisset. Quod autem imprimis notari meretur, est, quod Hippocrates in eodem loco alium aegrum viderit, Lyconem nempe, qui reliqua quidem eadem patiebatur, sed dolores ad crus non admodum pervadebant, neque suppuratus factus est, sed sanus longo tempore.

Si ergo Hippocrates, uti ipse ingenue fatetur, errare potuerit in tali casu, quanta cura indigebunt omnes medici, ne ipsis simile quid contingat? Apud *Tulpium* (i) habetur casus matronae, quae post partum haemorrhagia uterina fere integre exhausta infestabatur coxae dolore acerbissimo, qui coëgit miseram per totos quadraginta dies eidem incumbere loco. Neque latum unguem inde recedere licebat, quin protinus deficeret anima, disraberentur nervi, & obringeret inflar alicuius slipitis corpus universum. Quod autem rheumatismum hunc dolorem aestimaverit *Tulpius*, patet inde, quod crediderit, a valida uteri haemorrhagia infirmatis viribus, & exhausto impense calido innato tantam imbecillitatem contraxisse artus, genio fraudatos, ut nequiverint a se depellere defillationes, quas nimis quam frequenter ipsis transmitteret refrigeratum cerebrum.

Notum est, *Tulpii* tempore, communem fuisse fere medicorum opinionem, fluxiones, *piuura*, a cerebro descendere in artus, & rheumatismum producere. Valentissima remedia adhibita fuerunt absque ullo levamine. *Tulis* tandem suppeditas Deus, expulso immedicabili hoc dolore per insignem femoris abscessum, in quo tantum puris suis collectum, ut inde, primo eruptionis die, pressuervit ultra decem vascula. Convaluit tamen, postea gemellos peperit, vivens non minus prospera, quam unquam ante insitum infortunium.

Curatur missione sanguinis. Quum causa proxima rheumatismi accusetur inflammatio, mirum non est, quod missio sanguinis in rheumatismo curando laudetur fere ab omnibus medicis, & a multis quidem satis larga. Veteres quidam medici, dum de his morbis, rheumatismo, arthritide, podagra, agebant, causam quaerebant in quatuor humoribus, sanguine nempe, pituita, bile flava, & bile atra, diversamque curam praescribebant, prout hic vel ille ex his quatuor humoribus praedominari credebat. Sic *Trallianus* (k) dixit: *si humor, qui articulis insit, acris & biliosus esse, ex iudiciis, quae commemoravimus, sibi appareat, liquet, sanguinis vacationem adhibendam non esse,*

(i) Observat. medic. lib. III cap. XXV pag. 222.

(k) Lib. XI cap. I pag. 600.

esse, sed medicamento potius bilem ducente utendum. In illis autem, in quibus sanguineus humor abundat, protinus sanguinem mittendum esse, iubet *Aegina* (1) neque tantum in his, sed etiam in pituitosioribus, ac melancholicis idem fieri suadet. *Galenus* (m) in sanguineis laudat dicens: *novi enim ischiadas una die sanatas scissa ex cruribus evacuatione (sanguinis).* Sed addit prudenter mox sequentia: *nimirum, ubi non ex frigore, sed impletis sanguine, quae in coxa sunt, venis, proveniunt.* Videtur talis venae sectio satis larga fuisse; quia dicit, quod *scissa in poplite vena commodior ita affectis, quam in malleolo.* Scarificatio autem nihil perspicuo illis prodest.

Quum autem quisquis intolerabilis dolor est (n), sanguinis missionem postulet, patet ratio, quare rheumatismi curatio a venae sectione incipere soleat. fere semper.

Unde *Sydenhamus* (o) ut primum accersibitur, statim uncias decem sanguinis ex brachio lateris affecti iussit emitti; sequenti die tantundem sanguinis detrahi praecipiebat; atque intercalato uno die alterove pro aegri viribus, tertio dein interiecto trium quatuorve dierum intervallo (prout aegri vires, aetas, constitutio, aliaeque circumstantiae suadent monentque) quarto, atque ultimo ut plurimum venae sectionem reperi iussit. Statuebat enim pro axiomate practico; *curationem non aliunde, quam a phlebotomia, debere sumi.*

Raro plus quam quater venam secari iubebat; & tantum tunc, quando regimen iusto calidius praecesserat, vel medicamenta calidiora aegro erant ingesta, aut anodynus & paregoricus acerbis dolores popsi fuerant, quorum usu magis fugebatur morbus, pluribus sanguinis missionibus opus fuit.

Videtur tamen in illa opinione fuisse *Sydenhamus*, quatuor sanguinis missiones requiri ad debellandum rheumatismum, non tantum recentem, sed & annosum ac inveteratum. Sic enim habet (p): *Sed hic notandum, non adeo consultum esse, quando rheumatismus aliquot annorum diuturnitate altas radices egit, sanguinem tam brevibus, ac sub eiusdem primordiis fiebat, interval- lis mittere, quin praestare, septimanarum aliquot intercapedine repetitis illas venae sectiones discernere, quae tandem vel penitus morbosam materiam averruncabunt, vel saltem eo conducent &c. &c. ut reliquiae eius exstinguantur.*

Ex his apparet, magnum illum virum materiae morbosae evacuationem expectavisse a repetitis illis sanguinis missionibus. Si autem considerentur illa, quae in cura inflammationis de venae sectione dicta fuerunt §. 396, & sequentibus, patebit forte, quod alia utilitas a sanguinis missione expectari possit potius, quam morbosae materiae evacuatio, & praecipue in rheumatismo annofo, qui altas iam radices egit.

Interim, quum magni *Sydenhami* auctoritas apud omnes medicos summo iure magnum pondus habuerit semper, & casu factae ingenies sanguinis eva-

cua-

(1) Lib. III cap. LXXVI I pag. 161.

(m) De curandi ratione per venae sectionem

cap. XXVIII, Charier tom. X pag. 448.

(n) Celsus lib. II cap. X pag. 79.

(o) Sectione VI cap. V pag. 346 & seq.

(p) Ibidem pag. 350.

cutationes rheumaticis aliquando profuerint insigniter, hinc contingit, ut multi a sola venae sectione copiosa, vel & frequentius repetita, curam huius morbi expectaverint.

Vidit *Galenus* (q) casu vulneratam fuisse in malleolo arteriam; nec sanguinis fluxus cessavit, donec ipse vocatus arteriam vulneratam dissecuerit totam, & sine aneurysmate sequente curatum fuit vulnus. *Vir autem ille, quartam iam annum, haud exiguis temporum intervallis sonae dolore venatus, exinde prorsum sanus exiit.*

Mulier iam in senium vergens, nec firmæ constitutionis per plures septimanas laboraverat febre rheumatica, a qua vix evasit post repetitas sanguinis missiones, & alia remedia. Post duos annos iisdem corripitur symptomatibus, quæ comitabantur priorem morbum incipientem. Morbus coepit mane vesperti, eodem die unciae quatuordecim sanguinis ex brachii vena educæ fuerunt, vix ullo cum levamine: de nocte sanguis erupit ex vena vesperti secta, & copiosus quidem; antequam observaretur hoc contigisse, in somnum incidebat; mane evigilans, de nullo conquerebatur malo (r).

In castris frequenter rheumatismum observavit *Pringle* (s), & magnam curæ spem posuit in repetitis sanguinis missionibus fere quotidie adhibitis, donec abesset febris, & cessarent dolores, vel saltem lenirentur. Quum autem plurimi milites in ætatis vigore sint, & plethorici, aut satis apti ad ferendas magnas evacuationes, audacter insistebat huic curandi methodo, quum simul crederet, frequentes sanguinis missiones minus debilitare corpus in rheumatismo, quam in ullo alio morbo. Interim optimus ille medicus prudenter repetebat sanguinis missiones, dum urgebat validus morbus. Si vero rheumatismus unicam corporis partem occupabat tantum, & febris exigua, vel nulla adesset, unica venæ sectione contentus ad alia pergebat remedia, de quibus postea dicitur (t). Imo, ubi repetitis venæ sectionibus febris impetus mitigatus erat, attamen dolor & tumor articulorum persistebant; applicabat sanguiifugas loco, in quo inflammatio tumorque maxime apparebant, & deciduis sanguiifugis sanguinem ex vulnere exire sinebat, donec sponte cessaret ille effluxus. Quum aurem minor copia sanguinis sic tollatur, quam per venæ sectionem, hinc non putavit esse operæ pretium, ut limitaretur sanguiifugarum repetita applicatio.

Prodiit Parisiis 1747 libellus (u) mentionem faciens anonymi cuiusdam medici Monspelienfis, qui omnes rheumatismi species sanabat ingenti sanguinis iactura, dum intra triginta sex horarum spatium ex vena in brachio & pede simul aperta educebat plus quam viginti sanguinis libras. Fatetur animi deliqua, convulsiones contigisse, dum una vice quatuor libras sanguinis educeret; suadet tunc, ut chirurgus sanguinis exitum vel digito vel ligatura coër-

(q) Libri de venæ sectione capite ultimo. Charter. tom. X pag. 451, 452.

(r) Alexander Monro in medic. Essays and observat. tom. V part. 2 pag. 502.

(s) Observat. on the Discases of the army part. 3 cap. II pag. 182. (t) Ibidem pag. 187.

(u) Observations interessantes sur la cure de la goutte & du rhumatisme. Praefat. pag. VI & pag. 129 & seq.

coërceat tantum, donec vires redierint aegro, tuncque ex vena educat determinatam sanguinis quantitatem.

Quamvis de utilitate sanguinis missionis in cura rheumatismi satis convenienter medici, tamen prudentia hic opus esse pro diversa morbi intensitate, & varia aegri constitutione, nemo dubitat.

Sydenhamus (v) quater venam secare in cura rheumatismi commendat; sed ubi aegri febre continua laborantes, diutius, quam par erat, pro una vice lecto abfuerant, incidebant in dolores vagos, qui in rheumatismum definire possent. His non suadet sanguinis missionem, sed lecti teporem tantum; ut apertis cutis spiraculis, diffari possint illa, quae tali malo somitem praebent. Alibi monet (x), affectum rheumatismum aemulantes excipere febres intermittentes ob translationem materiae febrilis in musculosas corporis partes. Sollicite autem monet, quod hoc symptoma non postulet diversam medendi methodum, quam ipsa febris intermittens; quum a frequenti phlebotomia, & quibuscumque aliis evacuationibus exasperetur illud, atque aeger in vitæ discrimen coniceretur.

Videtur nihilominus Sydenhamus etiam in vero & proprie dicendo rheumatismo postea minori copia sanguinem detraxisse, quam antea suaserat in cura rheumatismi. Sic enim loquitur (y): *Tametsi ex quo cum scripsit, experientia didicim, satius esse post secundam vel tertiam venae sectionem ad plurimum cathartica saepe saepius exhibere, atque repetere, donec symptomata omnia penitus cessaverint, quam phlebotomiae rem totam committere.* Etenim ob catharsin suppetias ferentem phlebotomiae ad everruncandum morbum citra ingentem illam sanguinis iacturam subsistere fas erit. Imo in pharmacopoeo, qui decimo ab hinc anno rheumatismo miserrime cruciabatur, cui antea sanguinis missiones adhibuerat saepe repetitas, tandem hunc morbum aggressus fuit solo sero lactis ac pane pro nutrimento dato, & curavit feliciter absque ulla sanguinis missione: morbus tamen gravis erat; a coxendice coeperat, & per biduum claudicabat miser; exinde pulmones tentabant dolore gravativo cum dyspnoea, quae post aliud ferme biduum evanescebat; dein caput vehementer coepit dolere, mox etiam coxendix dextri lateris, quae omnium primo laborabat, & postea pro morbi indole, omnes fere tam brachiorum, quam crurum articuli per vices molestabantur. Dyspnoea certe, & vehemens capitis dolor sanguinis missionem poscere videbantur; sed iure metuebat Sydenhamus (x), ne minus firmas iam diu vires labefcentesque demo copiosius sanguine prorsus exsolveret, & aestas iam adultior quum esset, facile praevidebat, hyemem superventuram, quae viribus in debili corpore redintegrandis minus favet; hinc solo lactis sero per quatuor dies ut viveret aeger, suavit. Quotidie autem utebatur sero domi parato ex octo lactis libris, & satis bene nutriebatur: postea panem similem gineum concessit, prandii loco; deinde eandem panis copiam pro coena dedit. Felix hanc curae methodum eventus probavit.

Quod

(v) Sect. V cap. II pag. 283.

(x) Epist. I responsor. pag. 406.

(y) Ibidem pag. 405.

(z) Ibidem pag. 402.

Quod autem optimus Sydenhamus in eadem sententia, quoad usum venae sectionis in curando rheumatismo, postea manserit, patet ex ultimo eius scripto (a), quod posteritati reliquit, in quo habentur sequentia: *Sedulo observandum est, quod in hoc febris genere (perinde hac in rheumatismo & aliis morbis quamplurimis, quorum curatio solis evacuationibus absolvitur), si diutius evacuationibus pertinaciter insistamus, usque dum symptomata omnia prorsus ablegaverimus, saepius aegro non nisi morte medebimur.* Optime notat, relictas morborum reliquias debere quandoque evacuationibus praegressis, & exinanitioni illi corporis, quam abstinencia a consuetis cibis ac potibus produxit. Quapropter post factas, quae tollendo morbo sufficere queant evacuationes, prudentis medici est ab importuna eorumdem ordinatione sibi temperare, & paulisper attendere, quid tempus medicorum saepe felicissimum optimusque ab levissimorum illorum symptomatum depulsione consistere possit, quae quidem saepe numero, prout multoties repetita observatione comperi, a paretorio duabus vel tribus noctibus assumto sine alio quovis apparatu sub morbi huiusmodi exitu devincuntur.

Operibus Sydenhami adiuncti sunt integri processus de morbis fere omnibus curandis, quos in usum proprii filii conscripsit auctor, & hinc magni faciendos esse in eodem hoc capitulo monui. Leguntur in his sequentia (b): *In iuvenibus, atque iis, qui temperate vixerunt, vino non plus aequo dediti, rheumatismus diacta admodum refrigerante simplici, & mediocriter nutriente, aequè felicitè ac repetitis venae sectionibus (quas minus ferre queant), prestari potest.*

Si rheumatismus in initio levem tantum febri comitem haberet, nec dolor adeo immanis esset, saepius mihi successit absque sanguinis missione cura solis diluentibus mollioribus copiose sumtis; & levior talis febris quandoque secundo, tertio die cessavit penitus. Ubi vero post horrorem praegressum, febris sequebatur valida cum pulsu duro, pleno, celeri, siti magna, dolore acutissimo, statim mittendum sanguinem suavi, & venae sectio repetita fuit; donec minuerentur symptomata haec gravia & periculosa. Unde venae sectionum numerum certum nunquam habui; qui determinabatur tantum maiori vel minori vehementia morbi: raro quarta venae sectione opus habui; rarissime ad plures ascendi in curatione huius morbi. Idem Sorskius (c) observavit. Videri possunt & alia, quae ad §. 609 de moderando febris impetu dicta fuerunt; ubi simul demonstratum fuit, quod vis ipsius febris, ita moderata primum remedium sit ad solvendam visciditatem & lentorem humorum, qui in rheumatismo adeo manifeste observatur adesse.

Purgatione antiphlogistica repetita, & semper vespèri per narcoticum sedata. Quum cora inflammationis soleat adhiberi rheumatismo; uti modo dictum fuit, dum de venae sectione in hoc morbo applicanda agebatur; etiam cogitatum fuit de aliis remediis, quae in cura inflammationis laudantur. Ad §. 396, ubi de illis agitur, per quae ulterior vasculorum inflama-

(a) Schedula monitor. de novae febris ingressu pag. 676.

(b) Sydenam. oper. pag. 735. (c) Anno medico secundo pag. 113 & 114.

matorum laesio impediri potest, laudata fuit fortis alvi subductio; & §. 398 ad conciliandam materiae obstruenti fluiditatem commendabatur una cum sanguinis missione purgatio multa; ad quam obtinendam in *materia medica* §. 396, uti & §. 334 habentur plures formulae purgantes, quae antiphlogisticae vocari solent, quia tuto adhiberi in morbis, quos inflammatio comitatur, possunt.

Vidi aliquoties in gravi rheumatismo, sponte natum alvi fluxum insigniter profuisse. Celeberrimus *Tissot* (d) observavit pariter rheumatismum finiri quandoque alvi evacuationibus. *Trallhanus* (e), ubi a biliolo humore morbum ortum esse per signa constitit, medicamento bilem purgante utendum iussit, ubi prius acrimonia humoris aut rosionis humectata fuit, & temperata. Sed leniora purgantia praefert; nam non cupiebat simul & semel catharsi valida expellere morbi causam. Hinc dixit: *Non semel autem, verum saepe si res possit purgandus est ager; ita namque articulos a recrementis & fluxionibus tuos servare poteris, si materiam superantem, non universam, sed per vires semper subtrahere coneris.*

Purgantia in rheumatismi curatione serius adhibuit *Sydenhamus* (f) non initio: nam primum morbi octiduum sanguinis missionibus quatuor destinatum erat, dum simul tenui diaceta, & pitisanæ aut tenuis cerevisiæ potu, sustinebantur aegri. Enema quidem ex lacte saccharato curavit subinde inici, ut alvus duceretur, diebus scilicet a phlebotomia liberis; sed serio hortatur, & monet, ut haec omnia ad dies minimum octo ab ultima venae sectione observentur, & diligenter quidem. Hoc tempore elapso praescribebat portionem catharticam e lenitivis mane hauriendam, eodem die vespere dabat dosin paullo liberaliorem *Syr. de Meconio*, ut sanguinis organus, cathartico excitatus, a quo recidivæ periculum metuebat, penitus reprimeretur.

His factis aeger pedetentim redibat ad pristinum vitae genus; hac lege tamen, ut a vino & spirituosius, cibisque sale vel aromaribus conditis, diu adhuc abstineret; uti & ab omnibus, quae difficilius digeruntur.

Dolores hac methodo admodum quidem imminuebantur, nondum prorsus evanescerant, nec videtur tamen aliud quid tentasse postea. Observaverat enim, quod resarcita, quam fecerat sanguinis detractio, virium ictura, & superveniente illo anni tempore, quod magis faveret ad redintegrandum corporis robur, quam id, quo primum decubuerat aeger, symptomata ad unum omnia cessarent, & aeger pancreaticè postmodum valeret. Quum autem, ut ad §. 1491 dictum fuit autumnali tempestate rheumatismi occurrant frequentius, verna tempestas dissipare debebat gravis morbi, qui praecesserat, reliquias.

Verum postea egregius *Sydenhamus* (g) minus indulsit venae sectionibus; uti paullo ante dictum fuit; & cathartici usus fuit frequentius in rheumatismo

(d) Avis au peuple sur la santé chap. XI §. 156 pag. 197.

(e) Lib. XI cap. I pag. 600.

(f) Epist. I respons. pag. 409.

(g) Sect. 6 cap. V. pag. 348.

nismo curando. Experientia enim didicerat, *satius esse, post secundam, vel ad plurimum post tertiam venae sectionem cathartica saepe saepius exhibere, atque repetere, donec symptomata omnia penitus cessaverint, quam phlebotomiae totam rem committere.* Lenitiva tantum purgantia commendavit: *Tamarindos, fenae folia, ribum, mannam, syrup. rosar. solutivum; quum alia, quae ex scammonio, calapio &c. parantur, tumultum cieant, & dolorem exasperent.*

Hoc Sydenhami monitum secutus fuit Storckius (b). Praemissa enim sanguinis missione etiam repetita, si magna febris adesset, & dolores acutissimi, omni tertio die optimo cum effectu purgas antiphlogisticum dedit.

Raro ante quartum, quintum, sextum, septimum, aut quandoque octavum diem aegri levamen perceperunt; dein remisit dolor, & tensio in parvis affectis.

Nec tamen nimis diu indulgit catharticorum usui. Quam primam enim symptomatum vehementiam remittebat, & tumores fiebant molles, ac flaccidi, aegrique membra movere poterant absque magno dolore, non amplius necesse fuit toties repetere purgantia: nimis frequens illorum usus aegros debilitabat, & morbus prolongabatur.

Nunquam ante vigesimum diem omnis dolor abivit; qui quandoque ultra trigessimum, aut quadagesimum durabat.

Sydenhamus (i) dum per sanguinis missiones repetitas rheumatismi curam tentabat, observaverat, paregoricis datis effusorem sanguinis missionem requiri, quod evitare cupiebat; unde monet sequentia: *Quamobrem, ut ut saevius dolor, per omnem huius morbi decursum, religiose mihi ab his temperandum existimo: modo mihi animo sit curationem a sanguinis missione solum prece-re; quum illorum usu figatur morbus, neque tam facile venae sectioni cedat; quae ideo ob haec medicamenta nimis officiose exhibita saepius quam erat opus celebranda.* Ino observaverat, quod in morbi statu anodyna non efficerent illud, quod titulo pollicentur. Quum autem post purgantia remedia data soleret Sydenhamus dare anodyna vespere, idem fecit in hoc casu: fuit enim, *ut singulis vespertinis post peractam catharsin uncia syrupi de melleo aequantulum temporis, quam id fieri solet, propinetur* (k). Unde aegri dolorum, qui adhuc aderant, levamen procul dubio receperunt.

Fuerunt tamen medici quidam, circa narcoticorum usum in cura rheumatismi, non eisdem opinionis cum Sydenhamo. Sic Raulin (l) consulti, ut statim post primas sanguinis missiones dentur quotidie vespere narcotici. Vidit, hanc methodum tentatam fuisse, sed effectus non respondebant spei, quae de usu horum remedium concepta fuerat.

In omnibus fere aegris febre arthritica, aut rheumatica affectis febris, & dolores circa vespere augebantur, & datum tunc paregoricum semper male cessit: *Nam aegri admodum inquieti dormiverunt, deliraverunt, habuerunt an-*

xia

(i) Ann. medic. secund. pag. 115, 116.

(k) Epist. I. respon. pag. 406.

variations de l'air, chap. XV, pag. 315.

(l) Sect. VI, cap. V, pag. 347.

(2) Des maladies occasionées par les

xia insomnia saepe subito evigilaverunt, coacto hoc somno multum defatigati sunt, toto postero die erant soporosi, subdeliri, & pulsus fuit celer, inaequalis, contractus (m).

In quibusdam ex his aegris mane dolor remittebat; tunc sponte tranquillum coeperunt somnum, leviter sudaverunt, & post longe fuerunt alacriores: multi etiam ex his manebant vigiles, & debilitabantur. Ideo matutino tempore circa doloris remissionem dabatur his paregoricum remedium; a quo producebatur somnus tranquillus, reficiens, & aegri reddebantur aptiores ad sustinendam exacerbationem dolorum vesperti secururam.

Quantae utilitatis sit sollicita observatio nocentium, & invantium in morbis curandis ad §. 602, 7 dictum fuit.

Si aegri admodum debilitati essent, & dolorum exacerbatio quotidie statim rediret praecedente horripilatione, tremore, & frigore, tunc uncia media pulveris corticis Peruviani intercalari tempore data maximum levamen attulit.

Ubi a nimia dolorum exacerbatione tendinum subsultus, & membrorum convulsiones oriebantur, quod aliquoties contigit, tunc opio per epicrasin dato licuit mitigare, sopire. Videtur tamen prudentia suadere, ut memores suus semper moniti, quod *Aegineta* (n) dedit: *His, quae torporem inducunt membris, narcotica Graeci vocant, diutius non eris insilendum, quam ut doloris vehementia saltem lenierint. Si quidem largior ipsorum usus sit insertum constringis humorem, ut in sophascas durities, quas Graeci νύψος appellant, oscallefeat, ac diuturnas morus difficultates parias.*

Balneo leni tepido, fomentis antiphlogisticis loco affecto applicatis. Quantum haec prodesse possint, pluribus dictum fuit ad §. 396, ubi de inflammationis curatione agebatur. *Sydenhamus* (o) loco dolenti perpetuo applicabat cataplasma, e mica panis filiginei & lacte croco tincto, vel *fil. brassicae*; & hoc saepe renovandum voluit. Alii multi saponem Venetum in aquae & lactis partibus aequalibus solvunt, fomentumque tale dolentibus locis applicant perpetuo. Uncia media saponis Veneti in binis libris hydrogalae solvitur plerumque ad hunc usum. Solent omnia haec balnea, & fomenta repide filtem applicari locis affectis.

Homburgius (p) opinionem, quae aliis paradoxa videbatur, habuit, rheumatismum posse curari balneo frigido aequo ac balneo calido & sudore. Causam rheumatismi statuit serum acre, & tenue satis, quod de venis exitum ioveniens, diffundatur per musculos, quorum fibras pungendo turbet morbum, quomodo magnam subtilitatem possideat illud serum, diffundatur quum plurimum, nec possit denuo recipi venis, ex quibus egressum fuit.

Cura ergo eadem videbatur expectanda, sive serum hoc expelleretur de corpore, sive ingrederetur denuo venas, ex quibus exierat. Maior calor

cx-

(m) Storck anno medico secundo pag. 120, 121.
pag. 260.

(o) Sect. VI cap. V pag. 347.
des sciences l'an 1710 histoire pag. 46.

(n) Lib. III cap. LXXXVIII

(p) Academ. royale

expellet illud serum extravasatum per transpirationem. Frigus constringet partes, sicque serum denuo in venas adiget. Frigido balneo magis favebat *Homerius* ideo, quod per frigus applicatum credebatur impediri novi serii exitum de venis, dum interim serum antea extravasatum morbi causa attenuatur & dissipatur. Calido balneo videbatur ipsi subtile hoc serum sic disponi, ut facilius de vasis exire posset.

Circa finem elapsi seculi, & initio huius nobilis Anglus *Iohn Floyer* (g) multum laudavit usum balnei frigidi ad variorum morborum curam, & imprimis rheumatismi. Venae sectionem, ac cathartici usum praemittebat. Dietae ratio, & remedium usus determinabantur a medico, prout morbi indoles, & aegri constitutio requirebant.

Balneum frigidum non adhibebatur, si aeger incaluisse, aut sudaret, sed expectabatur, donec haec cessassent. Non diutius manebant in balneo frigido aegri, quam per duo, aut tria horae minuta. In primo balneo, postquam corpus totum penitus immersum fuerat, nullam faciebant moram; sed exibant statim. Novem, aut decem vicibus his balneis utebantur tantum, ita ut bis vel ter ad minimum septimanae spatio balneum frigidum ingrederentur (r).

Describit casum aegrae, quae iam integro quadriennio laborabat rheumatismo (s). *Articuli cubiti, pignorum, genuum, malleolorum tument, multum, & duri erant; delebant omnes adeo, ut nullum motum ferre posset; digiti contracti erant omnino; brachia, & manus miro modo distorta; macies aderat corporis, & tussicula, quae tabis dabat suspicionem.* Difficilis cura tanti mali praevidebatur facile. Quum autem nullum motum ferre posset aegra, sellae insidens ter immergebatur balneo frigido, & terna talis immersio pro uno balneo computabatur. Novem talia balnea adhibita fuerunt. Sed post singula balnea in lectum deponebatur, bibebat cerevisiam calidam, dabatur aliquid de spiritu cornu cervi, unde profusus sudor sequebatur cum levamine. Dum semel, vel bis non sequebatur sudor, minus levamen percepit. Usu sic balnei frigidi, sudoreque sequenti dolores, & tumores statim minuebantur; dein omnino cessabant; artubus redibat motus, appetitus melior fiebat, torositas corpori reddebatur, sicca tussis minuebatur.

Hoc felici successu non tantum, sed & plurimis aliis similibus edoctus auctor statuit sequentia: *Balnea frigida levare dolores rheumaticos repellendo humores stagnantes in vasa circulantia, qui dein sequente sudore evacuantur facile. Idem sudores inveniebant necessarios post balneum frigidum in cura rheumatismi adhibitu (r).* Ob hanc causam serio monet, non diu relinquendos esse tales aegros in balneo frigido, sed tantum ter mergendos esse, statim educendos, ut cito redeat nativus calor, & sudor sequatur, qui discutit dolores ac tumores. Plures casus enarrat idem auctor, quibus suam opinionem probat (u).

Videntur balnea frigida tentata fuisse praecipue in rheumatismis inveteratis, dum non succederent aliae curandi methodi prius tentatae. Sed *Antonius Cocchi*

(g) Of Cold-Bathing pag. 174.
pag. 175.

(r) Ibidem pag. 24.
(r) Ibidem pag. 177, 178.

(s) Ibidem.
(u) Ibidem pag. 224, 225.

Cocchi (v), qui balnea Pisana descripsit, & illorum efficaciam laudat in curando rheumatismo, notavit sequentia: *Verum est, quod in quibusdam casibus rheumatismi recutis, mediocritis, & extensi per superficiem, in personis satis robustis, mira promptitudine, & felicitate dissolvimus morbum sola affusione (duclitura) aquae frigidae ad partem dolentem aliquoties repetita. Unde per contractionem, & relaxationem canalium vicissim saltam, quam mechanicum tale remedium facit, humores stagnantes moventur, & in massam communem reduces libere circulant. Antea in capitulo inflammationis §. 390, & 396, 6, ubi de sedando impetu in ipso loco inflammato agebatur, dictum fuit, hoc posse fieri duplici modo; vel laxando sic vasa obstructa, ut transmittant per ultimos fines suos in venas moleculas obstruentes immeabiles; vel sic constrigendo vasa per refrigerantia, repellentia, aut adstringentia, ut retropellatur obstruens immeabile ex angustis, in quibus haeret, ad latioris vasis locum: simul tunc notatum fuit, hanc methodum repellentem a veteribus medicis saepe fuisse usitatam, quando a nulla evidente causa praegressa subito inflammabatur pars corporis; tuncque a fluxione deducebant originem. Sed simul pleribus probatum fuit, non semper prodesse refrigerantium, ac repellentium usum, & requiri cautelam in horum applicatione, quum magnopere ledere possint, si non profuerint. Prudentis ergo medici est pro re nata diversam seligere methodum.*

Probe memini, me lumbaginem rheumaticam molestissimam variis methodis tentatam absque ullo effectu curasse, dum bis de die infusum thymi, dilutum satis, forma vaporis, calidum, per rubum dirigebat ad locum dolentem mediae horae spatio; deinde leniter perfricabatur linteo calido per quadrantem horae.

Vesicatoriis. Quum, uti antea dictum fuit, colluvie mucosa rectae partes inventae fuerint in cadaveribus rheumaticorum; quum tumores quandoque nascantur in rheumaticis, quibus dissectis similis prodit materia satis lenta; quum, licet morbus a febre incipiat, sedata febre tamen saepe dolor augeatur; mirum non est, si a vesicatoriorum usu curas spem magnam conceperint medici in rheumatismo ad sedandos dolores; praecipue si febris iam cessaret penitus, vel saltem longe mitior tantum superesset. Solvunt, uti notum est, vesicatoria epidermidem a cute, & sub elevata epidermide colligitur magna lymphae copia, quae aliquando etiam satis viscida est, & pertusa tali vesica, per plures dies effluere pergit; unde non sine ratione crediderunt, partem materiae morbosae, atque acrimoniae irritantis sic tolli, & morbum minui. Observavit celeberrimus *Tissot* (*), naturam ipsam tale quid indicare. Quandoque enim licet rarius terminatur rheumatismus per metastasin materiae acris ad crura, quae statim vesicas elevat; hae apertae in ulcera degenerant; quae si nimis cito claudantur, redeunt dolores rheumatici.

Magnam a vesicatoriis emolumentum vidi saepius. Curavi a molestissimo tali

(w) Dei bagni di Pisa cap. IV, pag. 172.
chap. XI, pag. 197.

(*) Avis au peuple sur la santé

tali cervicis dolore nobilem virum, qui numerosa tentaverat remedia incassum, cucurbitas, embrochas thermarum Aquilgranensium, unguenta, emplastra, frictiones &c. largum, acre satis, vesicatorium suasi ut applicaretur loco dolenti; obluetabatur aeger; impetravi tandem; ingens lymphae copia effluxit cum insigni levamine; & paucorum dierum spatio integre convaluit.

Per haec enim, & his similia irritantia morbi materies vel educitur, vel quandoque locum mutat, sicque pars affecti dolore liberatur. Celebris apud Vratislavienses medicus *Tralles* (y) a suppressa saepius perspiratione, dum ex conclavibus aegrorum calefactis egrediens exponebatur aëri frigido, nebulis, ventis, dolentissimo rheumatismo, humerum & scapulam sinistri lateris occupante corripiebatur. Aberat febris; sed ardebat humerus cum scapula, ita ut crispelaceum ruborem adesse coniceret; cuius nullum tamen vestigium aderat. Dolor molestissimus extendebatur ad pectoris musculos, & pleuritidem spuriam inducebat. Post largam venae sectionem, & optima remedia interna externaque adhibita, idem dolor pertinaciter urgebat per quatuor dies. Confectis tunc emplastrum ex contrito semine sinapi in aceto fortissimum macerato, additis cera & therebinthina; quo imposito *brevi erysipelas rubor & dolor in exterioribus quum antea falso adfuisse existimaverat, vere movebatur, atque intus saeviens rheumatismus felicititer abigebatur.*

Confirmavit tutum in hoc morbo vesicatoriorum usum *Storckius* (z), qui febre ad iustum moderamen redacta applicuit locis dolentibus latum vesicatorium; quod simulac coepit epidermidem elevare, dolores v. l. penitus delevit, vel multum imminuit saltem. Testatur, quod nullum unquam malum symptoma ex viscantium applicatione observaverit; hinc nullus fere fuit in corpore locus, cui haec non applicuisset aliquando, si dolor urgeret. Tentavit & *ranunculi pratensis* folia recentia in pulvem confusa; quae partibus dolentibus applicuit vesicatorii loco. Magnum semper dolorem excitavit hoc remedium; dein epidermide in vesicam elevata magna feri copia effluxit; quo facto dolores rheumatici penitus dissipabantur. Unde in pertinacissimis & inveteratis articulorum doloribus *ranunculi* folia in pulvem trita magnam dederunt utilitatem. Sed ulcus a *ranunculi* foliis productum longe diutius stillavit serum acre, & difficiliter curabatur, quam si vesicatorium applicatum fuisset.

Cauteris. Ultimum fere hoc remedium fuit a veteribus medicis satis laudatum, quod recenti rheumatismo non novi applicatum fuisse, sed inveterato morbo postquam alia remedia plura frustra tentata fuerant. Cauterium tam actuale, quam potentiale dictum sequitur suppuratio, per quam separatur eschara a cauterio applicato producta a partibus sanis; quod dum fit, saepe copiosius ichor exit ex ulcere cum mali levamine. *Gesnerus* (a) dum acerrime laboraret ischiade, testatur sequentia: *A principio etiam morbi, sponte ortum est ulcus in eisdem lateris nate; quod mihi profuisse non dubito, &*

(y) Usus opii salubris & notius. Trm. II pag. 372.

pag. 122 123.

(z) Epistolae medic. lib. III pag. 89 verba.

(t) Ann. medic. secund.

cauterii alienius visum praefuisse. Unde apparet, *Gesnerum* in illa opinione fuisse, quod ulcus a cauterio excitatum profuit, quum, elchara separata, facilis exitus sit noxius, quae profundius latebant. Ad levandum dolorem ischiadicum iusserat medicus, ut panis, ex clibano prodians, calidissimus, discissus per medium, linteo prius obvolutus, applicaretur loco dolenti. Oblitus aeger huius cautela, panem calidissimum nudum applicuit; unde cutis combustio satis profunda, suppurata postea, longo satis tempore pua fuit; &c, sanato hoc ulcere, nullus dolor supererat (*b*). Similem casum notavit *celeberrimus Tissot* (*c*) de uxore, quae dolentissimum rheumatismum brachii, quo laborabat maritus, perfricabat spiritu vini; qui, casu a vicina candela accensus, combussit partem affectam. Dum curabatur haec ambustio, dolor rheumaticus integre desuit.

Veteres medici cauteriis in hoc morbo curando frequenter usi fuerunt; in pertinaci nempe morbo, nec aliis remediis cedente. *Hippocrates* (*) de ischiade agens, dicit: *si in unum aliquem locum decubueris dolor, & constitueris, neque medicamentis expellatur, urito, quocumque loco dolor, existeris, sed cum lino crudo inurito.* Haec erat lenior ubionis species, non abstinilis illi, quae postea *moxa* Asiaticorum tentata fuit. Unde alio loco (*d*) de insitibus loquens dicit: *urendae vero sunt carnosae quidem partes serratimentis, ossae vero & nervosae fungis.* Nec tantum uno in loco has ulsiones tentavit, sed, postquam lacte prius crassum reddiderat aegrum, tredecim locis cauteria applicuit; si in dextra corporis parte morbus adesset, sub scapula dextra quatuor crustas inussit, coxendici dextrae tres, natibus duas, medio femori duas, genu unam, & unam malleolo. *Hic si ita usus fueris neque sursum, neque deorsum morbum progredi sinis* (*e*). Alibi (*), ubi de quadruplici ischiade agit, postquam varia medicamenta praescripsit, dicit: *& si quidem ab his invenitur; sin minus, ipsum ploribus & aliis crustis, in officiis quidem partibus per fungos, in carnosius vero per serratimenta, inurito.*

Ex his omnibus apparet, cauteria tantum adhibita fuisse, postquam plura alia absque effectu tentata fuerant. Simul videntur sperasse, ut ulcere, intentionem semper sequente, via pararetur materiae morbosae, quae dolorem producit circa articulos. *Celsus* (*f*) hoc optime notavit. Ubi enim de coxarum morbis agit, pro ultimo remedio suadet, *tribus, aut quatuor locis, super coxam, cutem candentibus serratimentis exulcerare.* Quum enim carnosae adeo haec pars sit, leniora caustica, quae per *maxam* Asiaticorum accensam hodie tentari solent, quandoque non sufficerent. Quum vero saepe aliquid exulcerandum sit candenti serratimento, ut materia inutilis evocetur, illud perpetuum est, non, ut primum fieri potest, huius generis ulcera sanare, sed ea trahere, donec id visum, cui per haec opitulamur, conquiescat.

Videtur

(*d*) Van der heyden discours & advis sur les flux de ventre douloureux pag. 231.

(*e*) Avis au peuple sur sa santé pag. 206.

(*) Libro de affectionibus pag.

Vill Charter. tom. VII pag. 619.

(*d*) Libro de internis affectionibus cap. XIX.

Charter. Tom. VII pag. 612.

(*e*) Ibidem.

(*) Ibidem cap. LIII pag. 677.

(*f*) Lib. IV cap. XXII pag. 236.

Videtur & *Hippocrates* similem effectum sperasse a cauteriis. Dicit enim (g): *Quibus ab ischiade diuturna vexatis ischium e proprio loco excidit; atque rursus incidit, his muci immascentur.* In commentariis ad hunc aphorismum *Galenus* monet, per ischium hic intelligi articulum ischii, & noluit sequentem aphorismum (h) separandum esse a priori, sed ambos simul in unam orationem coniungendos. Sic autem habet: *quibus ischiade diuturna vexatis ischium excidit, his crux tabescit; & claudicans, nisi uratur.* Tum ut efficitur mucus, uti *Galenus* (i) dicit: *sicque mucosa illuvies assumatur, tum ut cutis laxitas, in quam articulus elabebatur, per adustionem ad condensationem ducta, articulum ardet, & loco moveri prohibet.*

Mitiora cauteria, quae veteres parabant ex lino crudo, fungis, & aliis quibusdam similibus, hodie ex foliorum artemisiae lanugine parantur: quae tunc *moxa* vocatur; longe leniora sunt haec, nec cutem in escharam comburunt, dolorque inde natus satis tolerabilis est, quum in Asia pueri etiam absque eiulatu cauterium ex *moxa* paratum ferant. Applicui proprio femori satis magnam moxae conum, quem accendi in apice, & facile dolorem inde natum tolerare potui. Nullibi dolebam; sed experimenti causa hoc tentare volui, antequam in aegris periculum facerem. Tota spes videtur in eo consistere, ut ignis actione citius dissipetur materia morbosa, quae ad artus deposita molestos illos dolores facit. Tentavi in ischiadico dolore, sed absque successu. Profundius videtur haerere morbi causa, quam ut a leni moxae cauterio superari possit.

Videantur illa, quae ad §. 1278 de *moxa*, eiusque usu, dicta fuerunt. Crudelior longe inustio candenti ferro facta; quam horrent omnes, pauci subire volunt, paucissimi tolerare possant illa constantia, quam *Tulpius* (k) vidit in animoso iuvene, qui coxae dolore excruciatu remediis adhibitis nihil proficientibus, decrevit vehementi morbo succurrere remedio acque vehementi. Iussit chirurgus, ut ferro candenti non tantum exureret cutem coxae impositam, sed ad os usque per carnes adigeret. Inusitata haec crudelitas perterrita magis ferre medicos, quam aegrum, qui fortiter haec tormenta sustulit, dum non cursum, sed lenta manu candens ferrum imprimebatur. A morbo ipsum ex toto vindicavit haec crudelis medicina, per continuum profundi ulceris profluvium; quod tamdiu tenuavit, donec, evacuata omni materia fuerit extra omnem recidivae metum.

Magnam procul dubio laudem merentur illi, qui conati sunt tentare novis remediis curam huius morbi, dum medicamentis hactenus cognitis pertinaciter resistebat malum, ita, ut cauterii crudelis usus tantum superesse videretur. Temnavit *dicatur* usum *Storckius* (l) in homine 43 annorum, qui iam a plurimis annis passus fuerat dolorem vagum arthriticum calore lecti malum auctum. Variis, externis, internis remediis usus fuerat absque ullo

(g) Sect. VI aphorism. 59 Charter tom. IX pag. 289.

290.

pag. 225.

(i) Ibidem.

(l) Libell. secund. de cicut. pag. 75.

(k) Aphor. 60. Ibidem pag.

(k) Ol servat. medic. lib. III

cap. XXVI

ullo levamine. Nec balnea sulphurea, aliaque diversissimi generis longo tempore adhibita quidquam profuerant. Tandem materies haec vaga figebatur ad humerum dextrum, & coxendicem eiusdem lateris. Minuta est eius lateris sensibilitas, accessit macies. Varia interne, externae tentata fuerunt absque ullo successu. Nec vis electrica per trimestrem spatium applicata quidquam profuit.

Quum multis aegris in doloribus rheumaticis vagis & fixis profuisset cicutam, dedit mane & vespere decem grana extracti cicutae, simulque copiosum usum decocti radicum bardanae consuluit.

Post octiduum rediit aeger; conquerebatur, auctos esse humeri & coxendicis dolores, simul accessisse ingratam per totum brachium & pedem formationem.

Summisit tunc mane & vespere sedecim grana extracti cicutae, & perrexit in usu decocti radicum bardanae.

Die decimo quarto dolores minores erant. Verum in toto latere affecto, ut in pede & brachio, percipiebatur sudor pruriens, foetens; oriebantur pustulae albicantes, pellucidae, acri fero plenae; sensibilitas longe maiot aderat in litere affecto; appetitus bonus erat, alvus naturalis, vires sat, magnae; fluxit urina copiosa ardorem excitans in urethra, dum prodiret.

Coepit aeger tunc sumere mane & vespere viginti grana extracti cicutae & perrexit in usu decocti radicum bardanae.

Vigesimo quarto die aucta apparuit brachii torositas, & aliqua advertebatur mobilitas; pustulae autem semper apparuerunt copiosiores, nec desuit pruritus.

Trigesimo sexto die aeger per universum corpus ingratum ardorem, & pruritus conquerebatur; oriebantur ex ruptis pustulis crustae craesae; & scabies superveniebat. Sed pes & brachium longe erant mobilia, sat robusta, optime sensibilia. Bis quotidie tunc lavabatur totum corpus infuso cicutae cum lacte parato; unde intra paucos dies crustae plurimae ceciderunt: pustulae autem hinc inde longe frequentiores comparuerunt; & augebatur pruritus.

Quinquagesimo die brachium moveri poterat in omnem partem; pes autem aegro videbatur adhucdum gravis; ceteroquin erat mobilis, flexilis, & in omni loco aderant optima sensationis signa.

Dedit tunc mane & vespere triginta grana, adeoque per diem integram drachmam extracti cicutae, & loco decocti bardanae exhibuit serum lactis. Corpus quotidie bis lavabatur infuso cicutae cum lacte parato.

Octidui deinde spatio omnis pruritus cessavit; disparuerunt postulae, & omnes crustae; aeger optime convalescere coepit.

Sexagesimo nono die aeger ambulare potuit, & brachium in omnem partem movere, neque ex itinere unius & dimidia horae multum defatigabatur.

Sensim tunc minuta fuit dos extracti cicutae, nec corpus amplius infuso cicutae lotum fuit, sed iussu aegro, ut feri lactis ingentem copiam quotidie biberet.

Octuagesimo die sanissimus accessit *Storckium*, & gratias egit (m).

Postea placuit eidem *Storckio*, dum iam archiatri munereungebatur, explorare *aconiti* efficaciam in proprio corpore. Habebatur haec planta venenata admodum; sed vetula Lapponica, oleris instar, hac planta utebatur, ut prandium sibi, marito, liberis pararet, & monita *celeberrimi Linnaei*, qui aderat, ridens, impune comedit hunc cibum.

Horrorum ornamento serviebat haec planta frequenter; sed ab eius medico usu abstinebant omnes. Pulverem ex foliis & caule paravit *Storckius*, cuius pauculum linguae imposuit: sequebatur ardor linguae inhaerens diu, & momentanei, vagi, lancinantesque dolores linguam pervadebant saepius. Ast licet pulvisculus ille per bina horae minuta supra linguam maneret, nec inflammationem, nec rubedinem linguae attulit (n); sed quamdiu ardoris sensus in lingua aderat, copiosa affluebat saliva; ceterum nil mali.

Insuperit eundem pulverem ulceri cancroso, fungoso; sed nullus dolor, nec ardor sequebatur. Per quinque dies idem tentabat, nec consumebatur haec fungositas.

Extractum dein ex hac planta paravit, cuius pauculum linguae impositum levem tantum excitabat titillationem. Granum extracti *aconiti* posuit inter palpebram inferiorem & bulbum oculi, nec inde afficiebatur aliter, quam a quocumque alio corpore heterogeneo. Per bina minuta reliquit extractum *aconiti* in hoc loco, copiosae quidem profluxerunt lacrimae, sed nullum peculiarem ardorem sensit. Dein tentavit, quid idem hoc extractum deglutitum in corpore proprio faceret, grana duo extracti *aconiti* diu contrivit in mortario marmoreo cum sacchari albi drachmis duabus, ut fieret pulvis subtilissimus, cuius sex grana sumisit mane vacuo ventriculo absque ullo effectu observabili; secundo die eiusdem pulveris grana octo, tertio die grana decem sumisit absque ulla observabili corporis mutatione.

Audacior factus, quarto die mane sumisit viginti grana eiusdem pulveris; nec tamen ulla actio corporis turbabatur; sed extrema, & totum corpus praeter consuetudinem multum transpirabant, madescebantque toto die.

Idem tentavit per tres dies sequentes cum eodem effectu.

Octavo die a pulveris usu cessavit; sed mador ille non aderat amplius.

Repetiit haec experimenta; aderat semper ille mador, si pulverem hunc sumisset; si non, nullus mador sequebatur.

Hinc conclusit, *aconiti* extractum promovere transpirationem, sudorem, & quom nullae functiones in corpore turbatae fuerint, illud exhiberi posse aegris incipiendo ab exigua dosi. Grana enim viginti huius pulveris continebant tantum tertiam partem grani extracti *aconiti*. Hinc convenire posset morbis, in quibus materies peccans per vias sudoriferas potest expelli.

Tentavit pulveris huius effectum in homine triginta & aliquot annorum (o), qui mense octobri tertiana febre laborabat, a qua curatus satis bene se habuit.

Sed.

(m) Libell. secund. de cicut. pag. 80.

cap. III pag. 71.

Tom. V pars II.

(n) Libell. de Stramon. hyosc. *aconiti*.

(o) Ibidem pag. 71.

V

Sed mense novembri ingens dolor corripuit totum latus dextrum; aeger nec manum movere potuit; appetitus erat deletus, noctes infomnes.

In quartum mensem usque remedia omnis generis adhibita fuerunt leuiora, fortissima, tam externa, quam interna absque ullo successu.

Dolores quandoque erant adeo vehementes, ut eiularet aeger instar illorum, qui crudelem torturam subeunt.

Data fuerunt grana decem pulveris modo descripti mane, & totidem vespere, superbibendo iusculum, vel infusum qualecumque. Prima nocte sudavit aeger copiose; quod ei antea non contigerat. Altero die iidem pulvisculi dati sunt, & dolores fuerunt multo mitiores: noctu iterum sudor, sed multum foetidus; nec debilitabatur ab his sudoribus aeger. Tertio die dabantur tres tales pulvisculi; noctu sequebatur sudor. Eadem dosis data fuit quotidie, id est medium granum extracti aconiti usque ad duodecimum diem; omni nocte corpus sudore maduit, uti etiam de die, dum aeger in lecto fuit; sexto iam die aeger ab omni dolore liber fuit, & extra lectum ambulare potuit, appetitus rediit, alvus quotidie naturalis, somnus tranquillus.

Decimo tertio die aeger, quum optime se haberet, abstinuit ab horum pulverum usu; sed sensit membra languere, & dolorem minari reditum. Iussit hinc *Storckius*, ut per tres septimanas absque ulla interruptione quotidie sumeret triginta huius pulveris grana. Fecit hoc aeger; actiones omnes restauratae sunt, macies disparuit, nec rediit dolor, postquam a pulverum usu cessavit. Binis autem ultimis septimanis, quibus hunc pulverem aeger sumsit, nullus observabatur sudor.

Alia occasione, ubi de calculi renalis diagnosi agebatur, ad §. 1422 dictum fuit, quod in urina arthritide vaga laborantium saepe fluctuant filamenta quaedam, quae, licet minus transpareant, quam urina, tamen indeeducta initali crytalli pellucida sunt, in magnam longitudinem distrahi possunt, & dum exsiccantur, in calcem albam abeunt. Haec credebatur esse materies morbi. Sed certe in eodem hoc aegro *Storckius* observavit, *urinam solito copiosius fluxisse, & multa gessisse sterculamenta, & sili mucosa (p)*.

Pluribus dein felicibus curationibus efficaciam extracti aconiti confirmat, proponitque sequentia (q): *Aconiti extractum esse innocuum, & valde efficax, medicamentum. Parva dosi praestat id quandoque, quod alia fortissima remedia, magna dosi, & longo tempore exhibita efficere nequeunt. Acce, quod circa articulos tendines, & ossa haeret, irritat nervos, excitatque summos dolores, solvitur inde, agitur in motum, & per urinam, vel alvi fluxum, vel sudorem, vel insensibilem transpirationem ex corpore eiicitur.*

Certe plerisque aegris, quorum casus describit, dedit tantum granum medium extracti aconiti singulis diebus. In unico homine a tali dosi coepit, sed tertia septimana dedit quotidie tres quartas partes grani; & in principio secundi mensis auxit dosin ita, ut aeger quater de die quindecim grana sumeret

(r) Libell. de Stamon, hyosc. aconit. cap. III pag. 78.

(q) Ibidem pag. 110.

ret huius pulveris, sicque integrum granum extracti aconiti sumeret quotidie; nec opus fuit dosim augere postea, quum opatus inde sequeretur successus (r).

Effectus huius remedii erat, ut plurimum aucta perspiratio, & sudor in quadam femina ab usu illius augebatur totius corporis perspiratio quidem, sed & alvus aliquoties quotidie solvebatur (s). Femina quadragena-ria, quae integrum annum hos cruciatus passa fuerat, & cui in manuum ac digitorum articulis nodi tophique durissimi, quasi verae exostoses, fuerant, qui mole nucem iuglandem maiorem superabant, nec prae dolore tactum ferebant, eiusdem remedii usu primo quatuordecim dies levamen percepit, & finito tertio mense solo usu extracti aconiti curata nosocomio valedixit. Nec per alvum, nec per urinam, nec per vias sudoriferas manifesta evacuatio fuit observata (t).

Non credo, aegrum hoc morbo afflictum facile candentis ferri tormentis se traditurum, nisi prius tentaverit illa, quae modo laudata sunt. Pulcrum horum effectum toties vidi, & plures alii mecum, ut aequum postea fuisset cauteria in curando rheumatismo.

Medicamentis summo pere diluentibus, atque emollientibus simul. Haec imprimis in initio morbi locum habent: tunc enim cum febre continua dolor atrocissimus dilacerans adest, qui ad minimum motum saevissime augeatur. Solet hinc rheumatismus incipiens tractari, ut morbus inflammatorius. De his remediis in cura inflammationis, & morborum inflammatoriorum, iam dictum fuit saepius. Larga copia haec solent administrari, quantum ventriculus aegri tolerare potest. Dum Sydenhamus de cura rheumatismi agit, remedium talium simplicem usum commendat (u), dicens: *Nisi oblatens praedicta vulgi, nullus dubitarem, methodum iam dictam aliis etiam morbis, quorum impraesentiarum nomen reticere libet, accommodare. Quod sane aegris magis prodesset, quam solemnior illa remedium pompa, quae in iam moribundis, tamquam bestis, ut mox immolentur, coronatis male collocatur.*

Egregius medicus Brocklesby (v), dum curabat in castris milices a rheumatismo incipientes, si athleticum habitum haberent, largam venae sectionem imperabat, & dein largam copiam decocti avenae propinabat, in singula cuius libra solvebat drachmam nitri puri; quandoque & addebatur saccharum pro edulcoratione. Suasit, ut huius remedii, sed calidi tantam sumerent copiam, quantum ventriculus ferre posset, & obtinuit quandoque, ut primis 24 horis milites biberent sex, octo, decem, imo duodecim libras decocti avenae nitrosi; repetebat venae sectionem, si opus esset; & pergebat in largo hoc nitri usu per tres vel quatuor dies optimo cum successu. Levamen insigne percipiebant aegri; sed & saepe sanabantur integre, copiosissimo orto sudore. Simul a copioso nitro sumto alvus evacuabatur semel vel bis de die satis magna copia. In paucis, qui salubri illo sudore diffuebant, strictior alvus per clysmata duci debuit.

Ple-

(r) Libell. de stramon. hyosc. aconit. cap. III pag. 100.

(s) Ibidem pag. 106.

(t) Ibidem pag. 103.

(u) Epist. & responsoria pag. 403.

(v) Oeconomica.

and medical observations pag. 116.

Plerumque in dolentissimo inflammatorio rheumatismo intra septem vel octo dies cura succedebat radicalis; in illis nempe, qui in vigore aetatis hoc morbo tentabantur.

In morbis acutis inflammatorii largo usui nitri indulsi satis; unciam mediam, imo & drachmas sex intra viginti quatuor horas dedi saepius; sed semper curam habui, ut magnam diluentium copiam simul fumerent aegri. Nihil metuebam a vi frigefaciente nitri, quum certo scirem, illam tantum obtinere illo tempore, dum nitrum solvitur, evanescere satis cito, postquam nitrum solutum est; quod optime notat egregius auctor, & experimentis probat (x).

Prudenter autem addit (y), talem methodum non tentandam esse, nisi in rheumatismo inflammatorio incipiente. Ubi enim morbus iam remittit, uti & in illis, qui rheumaticos dolores vagos patiuntur absque febre, vel cum febre modica tantum, & in his, qui diuturno iam rheumatismo, aut ischia-dico & coxario dolore torquentur, alias curandi methodos adhibuit.

In doloribus rheumaticis inveteratis vel ad quamvis etiam aëris externi mutationem recrudescentibus nil mihi successit melius, quam si darem aegris largam copiam infusi, vel decocti ex talibus parati, quae magnos motus non excoitant in corpore, fundunt tamen omnia fere concreta, diluunt, perspirationem augent leniter; *Ligni sassafras* uncia media duabus libris aquae fervidae infusa, leve tale decoctum ex tribus *lignis santalis*, ex quinque *radicibus aperientibus*, felicem effectum praestitit saepius. *Radice levisi* & *glycyrrhizae* plebetis aegris suasi, ut instar potus theae infunderent aquae fervidae, & potarent calide saepius de die. Levi pretio haec haberi possunt, & insigniter profunt, nec corpus ullo modo turbant.

Vitū tenuissimum. In hac re satis severus fuit Sydenhamus (z), qui interdixit prorsus carnibus non tantum, sed & illarum iusculo, quantumlibet tenui lymphoquo. Concedebat tantum iuscula hordeacea, avenacea, panatellam, & eiusmodi cum aqua pura parata; pro potu cerevisiam tenuem, mitemque; cui tamen praeferebat prisanam ex hordeo rad. liquirit. acetosa &c. paratam. Boërhavius, dum exquisitissimis huius morbi tormentis discruciaretur, solo lactis sero vitam sustinuit per dies duodecim, satis constantibus corporis viribus. Facile apparet, tenuissimum victum tantum habere locum in primo morbi vigore. Dum enim dolores & reliqua symptomata remittunt, vel levior rheumatismus in longum trahitur, severa illa victus tenuissimi regula non amplius locum habet.

Quiesce. Tempore leiti. Notum est, & antea in morborum acutorum cura saepius dictum fuit, Sydenhamum laudasse, ut aegri subinde lecto exirent, & in sedili manerent per aliquod tempus, prout vires tolerare poterant; sic observabat febrium intensitatem minui, & erecto corporis situ, a capite averti morbi impetum. Quum autem rheumatismus a febre continua inciperet, dixit

(x) Cerevonic. and medical observations pag. 112 & seq.

(z) Sect. VI cap. V pag. 347.

(y) Ibidem pag. 116.

dixit Sydenhamus (a): *Volo interim; ut per aliquot horas singulis diebus lecto se abstinere, quoniam calor, qui a iugi decubitu nascitur; morbum promoveat, intendatque.* Dum rheumatismus artus superiores occupat, hoc tentari posset, sed, si lumbos; vel artus inferiores occupet, vix possibile videtur; ut aegri lectum relinquunt. Boërhaavius (b); dum saevum rheumatismum patiebatur, integros menses in dorsum recumbere cunctis suis absque ut vel eductum se commovere auderet; quod ad minimam inflexionem laterum irritata veterum sarcinierum praesentissimam necem intenteret.

Praeterea blandus lecti tepor huius morbi curationi prodest: licet enim non semper opus sit largum promovere sudorem, debitam tamen perspirationem conservare summopere necessarium est. Unde aegri monentur a medicis, ut morbo iam remittente, vel & penitus cessante non exponant se aëri frigido, ut periculum recidivae, quae saepe curato longe est difficilior. Inde etiam autumnali tempore valido rheumatismo correpti vix in integrum restituntur, antequam gratus verni aëtis tepor adspiciat.

Et ad finem curationis frictione succa, calida. Quando nempe dolor iam eo usque remisit, ut frictionem ferre possint aegri. Quandoque enim post rheumatismum superest in articulis tumor, & difficilior mobilitas, quae frictionibus multum poterunt emendari.

Pulcherrime de frictionum efficacia scripsit Celsus (c), & statuit, *usus frictionum omnes ex una causa pendere, quae demit. Nam & adstringitur aliquid, eo dempto quod interpositum, ut id laxetur, effecerat; & emollitur, eo delevato, quod duritiam creabat, & impletur, non ipsa frictione, sed eo cibo, qui postea ad eam digestionem quodam relaxatam penetrat.* Videantur & illi, quae de frictionum usu ad §. 28, & ad §. 133 in curandis obstructionibus dicta sunt. Sed frictione oritur velocior humorum motus per vasa in parte, quae fricatur; augeturque calor, & quidem satis valide, si valida, & diuturnius adhibeatur frictio; unde in fine curationis rheumatismi frictio laudatur; quae in morbi principio noceret, & aegris intolerabilis foret: & dolbris augmen-
tum. Unde prudenter de frictionibus Celsus (d) dixit: *Amari hoc auxilium valendo longa, & iam a primo impetu inclinata.* Refutat autem illos, qui statuebant, omne auxilium necessarium esse incrementibus morbis, non quum iam per se finiuntur; unde sequeretur, etiam in principio rheumatismi frictiones adhibendas esse. Potest enim morbus, etiam qui per se finem habet, nus, citius tamen addito auxilio tolli. Cre. potest morbus minus gravis esse, quam fuerit, neque ideo tamen solvi, sed reliquis quibusdam inhaerere; quae adiuvant aliquid auxilium discedat (e). Hinc, ubi de coarum morbis agit (f), quod rum ingens dolor esse consuevit, & qui difficillime curantur, iussit: *Fricatione quoque curandum est maxime in sole, & eodem die scapiis; quo facilius ea, quae curando neciuntur, digerantur.* Eaque, si nulla exulceratio esset, etiam ipsi

(a) Secti VI, cap. V, pag. 347.

Herim. Boërhaavii pag. 67.
pag. 89.

(c) Ibidem.

(d) Alberti Schottens orat. academ. in memora-

Lib. II, cap. XIV, pag. 88.

(e) Ibidem

(f) Lib. IV, cap. XXII, pagi 295, 296.

ipsis coxis, si est, ceteris paribus adhibenda est. De reliquis, quae ad lumbaginem rheumaticam, & dolorem coxarium, vel ischiadicum curandum spectant, quaedam adhuc sequenti paragrapho dicentur.

Una cum usu antiscorbuticorum. Quum rheumatismus (§. 1493) arthritidi, podagrae, scorbutoque agnatus morbus vocari soleat, mirum non est, antiscorbutica remedia ad curandum hunc morbum adhibita fuisse: Boërhaevius (g) non in morbi principio, & summo eius vigore, sed quum iam catenus remississet, ut medicinam pati, & audire velle videretur, succos pressos bibis berbarum ciccorei, endiviae, fumariae, nasturtii aquatici, veronicae aquaticae latifoliae, copia ingenti; simul deglutens abundantissime gummi ferulacae Asiatica. Inde ad mirasulum convalescit. Probe memini, quod, dum in collegiis postea de hoc morbo loqueretur, dixerit saepius, se & trifolii aquatilis succum amarum valde addidisse reliquis, idemque hoc remedium alius commendasse tamquam efficacissimum.

Quandoque contigit Storkio (h), dum plures rheumaticos curandos habebat in nolosocomio, cuius curam gerebat, ut tumores circa articulos compa-
ruerint absque magna febre, & sine multo dolore. In his casibus remedia antiscorbutica plurimum iuverunt. Succum socleariae, nasturtii aquatici dedit optimo cum effectu. Verum his tantum usus fuit, postquam morbus iam misceceret per venae sectiones, & alia remedia adhibita, vel ex sua indole lenior esset.

Quum morbus ille saepe sit pertinax, & quandoque resistat optimis quibusvis remediis, uti ex ante dictis satis patuit, mirum non est, quod optimi etiam medici tentaverint nova quaedam remedia, & efficacia, quae novum ad curam huius morbi adhibita fuerant.

Celebris in arte medica Ioannes Hunham (i), dum describit febrem catarrhalem mense novembri 1737 epidemice grassantem, notat, quod sequenti mense evanesceret, sed permulti inciderent in arthritidem, & rheumatismum pertinacem, cuius curam optime describit. Quum nihil magis in hoc morbo prodesse videret blando, tepido, per omnia membra diffusio sudore, hunc bonis remediis promovere conabatur. Observabat tamen post febrem penitus subactam obstinatissimos saepe permanere dolores rheumaticos; pro quibus expugnandis nihil invenit praestantius, quam vitri antimonii infusum in vino generoso factum, aromate addito aliquo stomachali. Possides enim, ex-
pento crede, possides tutas antimonii vires; quippequod epotum largiter manimas movet vomitiones; in minuta tantum quantitate ad guttas viginti, aut triginta exhibitum sudores elicit benignos; paullo maiore dosi alvum solvis leniter.

Quum mirabilis illa vitri antimonii efficacia vino concilietur absque ulla fere iactura ponderis, minutissimis sibi effluviis tribui debent omnes illi effectus; quae angustissima corporis vasa permeant facile absque laesionis periculo.

Li.

(g) Albert. Schultens orat. academ. in obitum Herm. Boërhaevii pag. 67.

medico secundo pag. 221.

pag. 149, 141.

(h) Anno

(i) Observat. de aëre, & morbis epidem.

Licet autem olim *Huxhamus* varios chemistarum, & alchemistarum processus tentaverit, ut ex stibio medicamentum aliquod utile expromeret, & plures antimonii praeparationes mirabilis agnoscat virtutis, *hos tamen affirmat sanctissime, nihil inde melius, nihil tutius, nihil efficacius deprehendi unquam, quam iritum illud, & simplex vitri, antimonialis infusum ex vino albo generoso.*

Scripterat mihi ante viginti annos celeberrimus *Sauvages*, quod vis electrica applicata loco dolenti in rheumatismo profuerit insigniter. Mulieri integro biennio arthriticis doloribus dire cruciatae applicuit electricos succusculi celeberrimus *Haenius* (k); sed paucos tantum ictus primis diebus adhibuit, quos tulit egregie; tulitque eosdem postmodum sensim auctiores. Tertia dein septimana motui apta, & doloribus libera fuit, ita ut per quinos dies integre curatam se crederet; sed rediit partim saltem antiquum malum, percepitque ad carpum utrumque tumorem, qui remittente dolore abiit, dolore repente rediit. Hinc loco mota fuisse videtur morbi materia, non exturbata de corpore. Hoc confirmatur & experimentis, quae in nosocomio Upsaliensi tentata leguntur (l). Saepe enim inventum fuit, articulorum dolores evanescere; dum scintillae electricae profiliunt; sed videbatur morbi materia introrsum pelii, & sequebantur periculosa magis symptomata. Saepe enim post repetita haec tentamina sequebantur capitis dolores, vertigines, ventriculi molestiae, validi dolores abdominis, qui denovo sedabantur, simulac morbosa materies articulos iterum occuparet. Quidam, dum haec tentabantur, copiosam excernebant urinam, & nocte sudabant valide; unde sperabatur, morbi pertinaciam sic vinci posse; verum prius enumerata mala redibant, & vehementiora quidem.

In dolore ischiadico, dum applicabatur vis electrica, quidam insigne levamen perceperunt; sed redibant postea dolores. In aliis nullum sequebatur levamen. In quibusdam vis electrica statim dabat magnam felici successus spem; verum post paucos dies elapsos morbi vis diris doloribus viscera occupabat (m).

§. 1494. Si lumborum sedem occupans lumbago rheumatica, si coxam ischiadicus, vel coxarius dolor audiens, eadem methodo, licet paullo difficilius curatur.

Hic agitur de rheumatismo, qui lumborum regionem occupat, & de ischiadico, dum rheumatismus coxae articulum, ac vicina obsidet. Verum quidem est, quod eadem curandi methodus adhibeatur, de qua actum fuit praecedenti paragrapho; artamon unanimiter conveniunt medici, quod in binis his locis si figatur rheumatismus, cura difficilior sit, & longior plerumque, quam in aliis.

(k) Rat. medendi part. III, cap. VI, pag. 240.

(l) Verhandelinge uitge-

geven door de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem 3 Deel pag. 326. (m) Ibidem pag. 330.

alijs corporis locis. Simul patebit ex mox dicendis, quod & aliqua in cura varietas quandoque occurrat, de qua re agendum erit.

Muscularis, quae in lumbis locatur fabrica, nervi ex medulla spinali orti, vertebrae dorsii, expansiones tendinosae, coxae articulus profundus musculis validis rectus, nervi ischiadici adeo magni &c. facile demonstrant, ingentes molestias a rheumatismo in his locis expectandas esse, & curam ceteris paribus fore difficiliorem.

As quo magis in tenuissimis fueris venulis, ac in plurima corporis necessitate conspiciuntur, & in nervis, & ossibus multis, ac densis eo sane tum permanentissimus morbus est, tum acerrime progigatur (n). Observavit & eadem, quae in ischia de laborantibus roties contingere videmus. Quum ischias sis, dolor coxae commotionem impavidus, & extremam natem, & lumbum; tandem vero per totum etiam erus dolor deerrat (o). Tunc enim non levis suspicio est, nervum ischiadicum ab hoc morbo affectum esse; quod confirmatur ex illis, quae Celsus de eodem morbo dicit (p): In coxae doloribus, si vehemens torpor est, frigescente crure, & coxa, aliusque nisi coacta non reddis, idque, quod excernitur, mucosum est, iamque aetas huius hominis quadragesimum annum excessit, is morbus erit longissimus, minimumque annuus. Non sine ratione ergo Cosunnius (q) de ischiade nervosa scripsit; quam distinguit iure ab aliis coxae malis, licet similibus: Duas summus ischiadis species distinxit: alteram in qua dolor fixus in cona ulterius non excurrit: alteram vero, in qua subiectum sacrae coxae pedem continuo tractu propagatus attingit. Ultimam hanc ischiadis nervosae nomen mox ferè iudicavi egregius auctor, cuius tractatus de hac re editus ab omnibus legi meretur. Videmus iam apud veteres medicos hinc inde quaedam ischiadis nervosae vestigia. Dum Aetius (r) de hoc morbo agit, dicit: Quod si dolor in intimis nervis demoretur, & articulus non calens collapsus sit, neque extinguitur, frigidum hunc esse dixerim, in quo ad caloris revocationem medicamina calida requiruntur: multis autem valde acerbis opus est. Ischiadicos enim ille dolor saepius occurrit absque ullis inflammationis signis, absque febre, & hinc mirum non est, quod frigidus talis morbus a veteribus vocetur; vel si febris & inflammationis signa in initio adfuerint, huiusmodi superari tamen tametsi dolor ille pertinax. Sic Trallianus (s) notat, Euphorbium magnos dolores a frigido humore natos mitigasse, & in genere usum eorum, quae eum calefaciunt, rodunt, vellicant, profuisse. Unde testatur, se vidisse insignem levamen a seminis sinapi, & a cantharidibus applicatis. Nam postula, quae a medicamentis fecit, rupta, multus humor excrebatur, atque hoc excubens multum se levare dicebat aeger. Verum quidem est, quod Trallianus, licet hos effectus vidisset, non laudet haec experimenta, quum acria per se adimpeantur lo-

(n) Hippocrat. de affectionibus cap. VIII, Charter. tom. VII, pag. 629.

dem.

(p) Lib. II, cap. VIII, pag. 75.

(o) Ibi.

commentar. pag. 6, & 2.

(q) De ischiade nervosa

cap. XII, pag. 67.

(r) Lib. II de caus. & sign. morb. diuturn.

lib. III, cap. LXXVIII, pag. 264.

(s) Lib. XI, cap. 4, pag. 623, 624, 625, Paul. Aeginet.

loco dolenti. Credebat enim sic evacuari tantum illud, quod tenax est, crassum autem, & terrestre relinqui, & insigi articulis; quod integram morbi constitutionem redderet difficiliorē. Nec videtur ubique ratione hoc metuisse *Trallianus*. Patetur enim *Cosumnus* (1) sequentia: *Accidit etiam his, qui nervosa ischiade postica laboraverant, ut emplastri (vesicatorii) opera excitata vesica serum quandoque fundentes tenacissimum, glutinique par, quod serum, quum crassit, vetus ischias evanuit. Adco ut in his aegris, si primi vesicantis opere emerisset tantus ille, & tenax humor, primum vesicans depuleris omnino morbum: sin minus, primi vesicantis ulcere consolidato: toties oportuit vesicans iterare, donec glutinum illud penitus eliceretur. Habeo frequentes casus, qui vel tertium vesicans repetito eegerint (u). Plures dein aegrorum casus describit, qui modo dictis probant. In uno ex his a primo vesicatorio effluxit flavissimum tenue serum, cum doloris levamine. A secundo vesicatorio excitata vesica ampla, quae rupta exivit serum ichthyocollae tenacitatem habens. Dolor adhuc inde imminutus fuit. Post tertium vesicatorium orta vesica tres fere uncias lymphas mucosissimae continebat, & post triduum omnis dolor evanuit (v).*

Tenuius illud serum post primum vesicatorium applicatum ex maxima vesica sponte rupta per crus depluens larissimum excoarivit omnia curis loca, quae attingit (w).

Acre ergo adest in tali morbo; quo educto lenitur; sed & acre illud tenaci mucoso humore viscatum morbi pertinaciam constituit vix superandam, nisi illud viscidum, cui irroctum haeret, tolli de loco affecto possit.

Acre illud variam nocendi intensitatem habere posse, docent observata. Lumbago, & ischias merito inter morbos chronicos numerantur. Septuagenario maiorem hominem vidit *Cosumnus* (y), qui per triginta fere annos ischiadem toleravit, cetera sanus. *Storckius* (z) in nosocomio suo addixit homini, qui una cum valida admodum febre dolorem ad lumborum vertebrae patiebatur adeo acutum, ut diu noctuque eiularet. Venae sectiones repetitas, remedia antiphlogistica externe interne applicata nequaquam dolorem mitigaverunt; nec iuvit quarta morbi die applicatum vesicans lacum; omnia in peius ruebant, & septimo die periit convulsus. *Sectione anatomica binas ultimae lumborum vertebrae, ea parte, qua medullam spinalem ambiunt, inventae sunt penitus putridae, & in nigrum foetidum ichorem solutae. Caput ossis femoris in minutissima fragmenta corrosum aliquoties vidit (a).*

Hinc videtur patere ratio, cur medici tentaverint, morbi materiam per alvi evacuationes tollere: per anum enim acris ingesta, bilis corrupta, & similes alii humores degeneres toties cum successu evacuantur. A dysenteria intensissimo suppressa quandoque dolor ischiadicus ortus fuit. In senē illo septuagenario tot annis ischiadem passio tanta manserat in crure affecto motus facultas, ut baculo innixus satis commode incederet. *Cosumnus* (b) credit, hoc factum

(1) De ischiade nervosa pag. 72.

(u) Ibidem pag. 72.

(w) Ibidem pag.

73, 74.

(x) Ibidem pag. 73.

(y) Ibidem pag. 6.

(z) Ann.

medic. secund. pag. 124.

(a) Ann. medic. pag. 98.

(b) De ischiade

nervosa pag. 8.

factum fuisse, quia tertio quoque mense, etiam in provecta hac aetate insignem sanguinis copiam per haemorrhoides excerneret.

Magnae mutationes partium, quae coxendici vicinae sunt, forte quandoque profunt: *Quaedam priusquam conciperet, coxendicem dolebat; postquam vero concepit, non amplius dolebat. Vigesima autem a partu die iterum doluit (c).* Quantum mutetur uterus tempore graviditatis notum est; sed viginti dies post partum mutatio illa vel in integrum restituta est, vel saltem insigniter minuta.

Sed videntur medici sperasse ischiadis levamen a mutato intestino recto imprimis. Sic *Hippocrates (d)* de ischiade agens ex sale, oleo, & decocto hordei paratum clystma iniici iubet; *si a sanguine aegrotanti velis emaciat alvum subluere, quo pituitam, & sanguinem a coxendicibus revoces. Verum, eodem loco postquam granum cnidium propinavit, acrius clystma ex cumino trito, colocynthide tenuissime trita, sale, & melle adhibet. Acris succi tithymali guttas quinque sicu exceptas commendat Galenus (e).* Ubi de *ischiadi* feminibus agit (f), agnoscit, quod acrem vim habeant, adeo ut internos abscessus rumpant, si poterint, menses moveant, & foetum necent. *Semen hoc per sedem insusum sanguinolentia evacuant prodest ischiadici.* Clysmata ex colocynthide, & nitro parata, adeo acria, ut sanguinem educant, laudat *Rhazes (g)* ad curandam ischiadem, additque, quod in mille aegris, & amplius semper successerit cura, & tantum defecerit, ubi adeo inveteratum esset malum, ut exultionem requireret.

Fatetur *Cotunnus (h)* ingenue, quod haec tentamina ischiadem curandi per acria clysmata viderit, & ab his factas perfectas curationes observaverit; plurimas etiam acceperit ab hominibus fide dignis. Agyrtae enim, & agriculae sambuci decoctum, cui tithymali lac uberrime addebant, toties per anum iniiciebant, donec deiectiones sanguineae sequerentur. Alii ex saturo bryoniae decocto magna copia parato tot clysteres consequenter inieciabant, donec inter fummos cruciatus sanguinem funderent intestina. *In quibus tamē affuit saepe, corroboruit, & aegrotantium miseriam doluit vicem, quos videbat sub ista clysterum carnificina fere evanimes; magis etiam illos, qui his novis cruciatibus toleratis, morbum nihilominus integrum retulerunt.*

Unde confirmari videntur illa, quae *Rhazes* dixerat; qui, ubi haec incassum tentata fuerant, unicam sanationis spem in cauterii actualis usu posuisset videtur; sed *Cotunnus (i)* in presbytero triginta trium annorum ischiade laborante plura incassum tentata fuisse asserit. *Intra biennium bis dolentior sedes post maiorem femoris trochanterem ignito ferro fuit inusta profunde; bis plena tolerata hydrargyris; ex bryoniae decocto pluries usurpati clysteres, usque*
ad

(c) Epidem. lib. II, Charter. tom. IX, pag. 139.

cap. LIII, Charter. tom. VII, pag. 677.

cap. XXIV, Charter. tom. X, pag. 671.

facult. lib. VI, cap. VIII, Charter. tom. XIII, pag. 178.

history of Physick tom. II, pag. 52.

(i) Ibidem pag. 61.

(d) De internis affectionibus.

(e) Lib. II de remed. parabil.

(f) De simplic. medic.

(g) Freind

(h) De ischiade nervola pag. 59.

ad sanguinis deiectionem &c., dolentiori sonae loco superposita cutis fetido iracunda est, maximaeque mercurii dulcis sibilio advenit per tres pene menses copia data, sic ut saliva ubertim efflueret; morbo tamen, ulli iam antea, viribus integro.

Dum haec omnia perpenderet attenta mente egregius ille auctor, causam ischiadis posse haerere in ipsis nervis, imprimis in ipsis nervorum truncis, vel & in ramis maioribus credidit, & hanc rem sedulo investigavit. Non quidem putavit, quod acie quid haereret unquam in liquido hoc subtilissimo, quod per nervos ab encephalo receptum distribuitur per totum corpus. Sed percipit, nervosam substantiam, dum a capite per corpus distribuitur, & tenerimae fabricae est, semper muniri vaginis, satisque firmis quidem, & solidis; vasa sanguinea perreptant has vaginas satis copiosa, & in maioribus truncis nervosis magnae satis molis inveniuntur. Ab his vasibus secerni credit tenuem lympham, quae perpetuo sovet, & humectat nervosam proprie dicendam substantiam, & ab omni exsiccatione defendit; lymphamque hanc tenuem a venis bibulis resorberi denuo, postquam munere suo functa est: nisi enim hoc fieret perpetuo ex oculis arteriarum in cavam vaginam hiantibus excreta augeretur nimia eius copia, & vaginae hydropem produceret.

In hac lympham aciem solum potest haerere, & dolorem magnum excitare in substantia nervosa, quae membranosa hac vagina continetur, & defenditur.

Verum notari meretur, quod spinæ dorsii cavum, medullam spinalem continens maius sit, nec integre repleatur a medulla; adeoque circa medullam spinalem per cavum spinæ dorsii descendentem spatium insignis superest: dura mater per magnum occipitis foramen transit, & vaginae cavæ instar usque ad imum os sacrum spinalem medullam includit.

Vagina haec duræ matris adeo ampla non est, ut undique ambitum attingat circumpositi spinæ cavi, neque adeo angusta est, ut inclusam medullam proxime complectatur; sed a spinæ cavo aliquantum distat, maxime retrorsum ad sedem apophysium spinosarum, & ab ambitu inclusae medullae insigni spatio seungitur. Duo haec intervalla, quum integer est homo, vacua non sunt, sed quoque sua repletur materia. Nam quantum dura mater a spinæ cavæ parietibus distat, tantum sarcimine semper celluloso repletum vidit *Cotunnius* molli, fluenti, & pinguedine saepe diviti; cuius vice in tabidis vapor mucidus, mucus verus in hydropicis, sanguineus vapor in foetibus adfuit, qui laboriosum ob partum suffocari perierint. Quidquid autem spatii est inter vaginam duræ matris, & medullam spinalem, id omne plenum etiam semper est: non medulla quidem ipsa in viventibus turgidiori, non nube vaprosa, quod in re adhuc obscura suspicantur summi viri, sed aqua ei quidem simili, quam circa cor continet pericardium, quae ventriculorum cerebri cava implet, quae auris labyrinthum, quae reliqua tandem complet corporis cava libero aëri nequaquam adeunda.

Similem aquam adesse in calvariae cavo credidit egregius auctor, & omnia replere intervalla, quae inter cerebrum, ac duræ matris ambitum inveniuntur; qualia sub cerebri basi semper aliquot occurrunt: haec imprimis in tabidis, & fo-

sanibus appareant, in quibus cerebrum insigniter coarctatur, durisque fit, quodque nasura vix capere calvaria potuit, aetatis incremento, aut tabis vix duratur, & sensum suu calvaria minus. Unde in tabidiorum, & senum cadaveribus, calvariae fornice diligenter exsecto, sicuti iam illaesa dura mater circa cerebrum incidatur, aquosius rivus statim exsiliit; quo exhausto cecidit dura mater in cerebrum, laxa tota, & in rugas fatiscit.

Unde concludit *Columnius* (*), quod in hominibus haec lex obtinere videatur, ut circa ambitum medullae spinalis spatium aqua completum crescat aetate. Nam, quod nullum est pene in foetu, cuius medullam, maxime in collo, durae matris vagina amplectitur, aetatis incremento in magnam amplitudinem evadit. Ipsissimis fere *Columnii* verbis usus sum, ut tanto evidentius pateret eius de ischiade nervosa sententia.

Credidit simul, anatomicos non observasse illam aquae circa cerebrum, & in spina collectionem, quia cerebrum perforaturi caput a cervice reserant, hinc effluit omnis humor circa cerebrum, & medullam spinalem collectus. Quare dat methodum dissecandi integri cadaveris, ut illa lymphae demonstrari possit. Lobis enim cerebri suspensa manu elevatis, utraque ethmoidis cribrosa sedes aquae scatera observabitur, cerebrique reliqui elevationes apparebit sub nervorum opticorum coniunctione, & ad latera protuberantiae ovalis, quidquid in capitibus a collo seiunctis vacuum apparet, aqua plenum esse; quae & sium vaginalem quinti paris, & meatum acousticum totum implet. Circa caudicem vero oblongatas medullae omnis intercapedo aqua completur, & si encephalo integre ablato erigatur totus cadaveris truncus, vagina durae matris, quae spinalem medullam continet, aqua medullam omnem circumcingente plena observabitur. Si his factis ab aliquor lumbarum vertebrae latera praescindantur, atque inferior pars vaginae durae matris caudam equinam complectentis iam detecta incidatur, humor lymphidus effluet, & humor, qui circa summam medullam spinalem aderat, sensim descendet, donec per imam aperturam totus effundatur. Quod si capite integro lumbarum vertebrae aperiantur, & dura mater medullam spinalem includens incidatur, humor affatim emerget; quo exhausto, si caput cadaveris attollatur, & concutiatu versus locum apertum, quasi nova scaturigine referata, vis aquae uberior redundabit.

Quum haec tentamina in viginti pene adutorum hominum cadaveribus iteraverit, quatuor uncias aliquando & quinque ex spinae cavo educere potuit aquae lymphidae, quandoque in flavedinem vergentis; in foetibus vero difficili: partu suffocatis subrubram semper, atque opacam offendit (!).

Aqua haec igni admota non concrevit, sed, dum ebullit, spumescit, odorem exhalat iuris carniurn calentis odori persimilem, & sensim resotura in vaporem absque minimo coaguli signo evanuit. Septies haec experimenta tentavit eodem cum successu.

Quum autem singulos nervos ex medulla spinali productos, appendice quadam

(*) De ischiade nervosa pag. 6, 9.

(!) Ibidem pag. 10, 11.

dam infundibulo simili laxaeque instar vaginæ excipiat dura mater, hinc videtur lymphæ spinalem medullam ambiens in has nervorum vaginas transire posse. Plura tentamina instituit *Columinus* (m), in iis potissimum nervorum vaginis, quæ nervos in ischiadicum truncum coalituros extra spinam perducent. Laxior hæc vagina est, quæ truncum ischiadicum ambit, & arteriarum ibi magnitudo tanta est, quantam non vidit in aliis ullis nervorum vaginis *Columinus* (n); unde deducit rationem, quare ischias nervosa frequentius oriatur.

Hinc patet, ischiadem nervosam oriri posse a nimia copia lymphæ, quæ distrahitur nervi vagina, & inclusa nervosa filamenta comprimuntur; unde dolebit minus, quam torpebit crus. Si acrimonia lymphæ peccet; tunc dolor erit acrior, & permanens. Sed utralibet ex causa duxerit originem, vespertinis temporibus ischiadica passio erit acerbior (o).

Ischiadem nervosam in duas species distinxit *Columinus* (p); in posticam nempe, & anticam.

Postica fixum dolorem habet in coxa, præcipue post maiorem femoris trochanterem, qui sursum ad os sacrum, deorsum per exterius femoris latus ad popliteum usque vim suam extendit: raro hic dolor in poplite definit, sed fere semper a poplite per capitis fibulae exteriora declinans in priorem descendit cruris partem, quam secundum exterius latus spinæ tibiae anterioris percurrentes ante malleolum anteriorem, in dorsum pedis tandem definit.

Altera species ischiadis nervosæ, antica nempe, fixum dolorem in inguine ostendit, qui per interiorem femoris ac suræ partem propagatur.

Monet (q), quod ischias nervosa postica morbus sit longe frequentissimus, antica longe rarior, minusque molesta: insidet hæc nervo crurali, cuius ductum doloris sensus manifeste persequitur. Quum autem ille nervus in toto suo decursu undique stipetur musculis, dispellitur humor, qui in vagina moram trahendo plus augetur. Unde facilius curatur, & semper cessit misso primum sanguine ex hæmorrhoidibus, vel pede subiecto, tum alvo matutinis horis evacuata communibus clysteribus. Memini, me in *Hippocrate* (r) legisse sequentia, quæ partim ad ischiadem anticam, partim ad posticam forte referri possent. De coxendicis morbis agens dicit: *Quibus hic morbus est quidem in lumbis & cruribus, non autem affligit adeo, ut decambant, consiliare oportet, an alicubi sint collectiones in coxa, & interrogare, an ad inguen dolor progrediatur; si enim nimbo hæc habet, diuturnus sit morbus. Hæc ad anticam ischiadem spectare videntur. Dein subiungit: Interrogandum insuper est, an in femore torpores adsint, & ad popliteum progrediuntur, & si hoc consiciatur, rursus interrogandum, an & per tibiam ad summum pedem procedant: quicumque enim pleraque horum confessa fuerint, bis dicendum est, quod crura ipsi aliquando calida, aliquando frigida fiant. Ista ad posticam ischiadem potius referenda videntur.*

Dein

(m) De ischiade nervosa pag. 26.

(n) Ibidem pag. 32.

(o) Ibidem pag.

36, & 37.

(p) Ibidem pag. 2.

(q) Ibidem pag. 78.

(r) Prædict.

lib. II cap. XVIII Charter. tom. VIII pag. 827.

Dein generalem prognosin dat. *Quod si morbus hic, lumbos relinquens, aliquibus ad infernas partes vertatur, eos confidentes esse iube. Quibusquamque vero, coxae & lumbos non relinquens, ad supernas partes convertitur, malum esse id praedicendum est.*

Postica ergo ischiatis, quae antica longe frequentior est, maiorem curae difficultatem habet: illam consilium in nervi ischiadici affectione, *Cotunninus* (s) statuit, nec potuit in cadavere unquam investigare huius asserti veritatem, quum hac ischiade peremptus nemo ipsi occurreret. *Quod ad sedem doloris attinet, ea est talis, ut si velis arger eius decursum ab ossis sacro ad subiectum pedem digito, demonstrare ille, velus peritissimus anatomicus, succurrentis ischiadici nervi viam egregie persequetur.*

Confirmari videtur hoc assertum ex epistola *Conradi Gesneri*, quam misit 15 novembris 1560 *Cosmae Holzarbio* medico, describens ischiadem, qua laboraverat: ubi sequentia leguntur: *Laboravi hoc malo acerrime, quum prius fere ignorarem, quid dolor esset: in coxendite quidem levis dolor fuit, sed ingens ad quatuor sub genu digito, parte exteriori, ubi etiam nimis manent reliquiae, si digito praeteritum premam. Quum doloris vehementia cessaret, stupor quidam & gravitas exceptis* (s). Est hic praecise ille locus, cui *Cotunninus* vesicatorium iussit applicari ad curandam posticam ischiadem nervosam.

Contigit tamen postea *Cotunnio*, ut homo moreretur, qui ischiadem nervosam passus fuerat, extinctus febre epidemica putrida, & ingenti alvi fluxu. In cadavere nates corruptae erant, & pes uterque ad tibiam mediam usque laborabat aqua intercute. Inveniebatur nervus ischiadicus dexter, adhuc vaginis indutus, a coxa ad tibiam solito coloratus, quum omnes vaginae flavescerent, crassiores solito: ipse nervus etsi pallidior, non erat a colore flavo immunis: a fibula capite ad pedem imum albidior erat nervus, & lymphae plenus, ita ut vaginae repletae insigniter distarent a nervo.

Ut posset constare, an color illa nervi ischiadici dextri forte proprius & naturalis in hoc homine esset, oportuisset videre & sinistram nervum ischiadicum, qui hoc morbo non laboraverat. Verum servida tempestas, aperti abdominis eluniumque foetor, & metus contagii, qui summus erat apud omnes, impederunt, ne hoc temeretur. Unde fateatur auctor, quod nihil ex hac dissectione decernere ausus fuerit (n).

Ad curationem obtinendam ischiadis morbosae posticae maximam spem posuit in applicatione vesicatorii, etiam repetita ad talem locum, ubi nervi notabiles, nullis fere musculis tecti, sub cute incumbente decurrunt. Quum autem in hac ischiade a coxa ad fibulam dolor magis saeviat, a fibula ad pedem minus, credidit, materiae acris maiorem copiam a coxa ad fibulam in nervi vaginis haerere, indeque metuendum, ne, vesicatorio ad imam tibiam dorsumque pedis applicato, viae longitudo, aut vaginarum nervosarum

(s) De ischiade nervosa pag. 4.
Gesneri lib. III pag. 83 versa.
pag. 42, ad 45.

(t) Epistol. medicin. Conrad.
(n) Cotunninus de ischiade nervosa

rum maior in illis locis angustia, descensui materiae & eius evacuationi obstaculum facerent; hinc applicuit illi loco, ubi caput fibulae locatur, sub genu, in externa cruris parte vesicatorium, & in femoris crurisque delineatione, quam dedit, hunc locum exacte notavit.

Probat huius curae efficaciam variis observationibus. Notabant autem aegri, dum flueret locus a vesicatorio irritatus, supernas sedes doloris originem relinquere, & sensim versus ulcus vesicantis descendere, donec irritans lymphæ exivisset tota. Postea dolor, qui adhuc aderat, a fibula ad pedem usque evanuit; quo tempore ulcus vesicantis solidatum est. Unde putavit, ob situm cruris horizonti paralelum, aequè ad ulcus descendisse humorem occupantem nervi vaginas tum a coxa ad fibulam, tum a fibula ad pedem, eademque via fuisse evacuatam (v).

Fatetur auctor, quosdam casus se vidisse, ubi vesicatorio ad caput fibulae applicato, dolor a coxa ad fibulam evanuerit, manente tamen dolore a fibulae capite ad pedem usque. In tali casu ad imum tibiae quatuor transversus digitis supra malleolum anteriorem, aut ad summum pedis dorsum, vesicans applicuit, felicissimo cum effectu. Bina haec loca in icone huic libello affixa exacte notata sunt. Fatetur, quod olim crederetur, vesicatorio pedis dorso applicato posse directe omnem humorem, qui superas omnes ischiadici nervi vaginas infarciret, educi. Sed constanti experimento didicit, nullibi vesicatorium dolentius agere, quam in hoc loco; unde dein non amplius tentavit.

§. 1495. **H**inc apparet morbi huius frequentia, varia admodum facies, summum periculum, si cerebrò vel pulmòni incubuerit, maxima difficultas eum hic detegendi, discrimen in quod praecipitat calidiorum usus, vel praematura narcoticorum exhibitio.

Ex illis, quae hactenus dicta sunt in praecedentibus paragraphis, patet rheumatismum frequenter satis occurrere medicis, imò quandoque epidemico modo grassari; imprimis autumnali tempestate (vide §. 1491); quumque toties originem ducat, dum calefactum corpus subito frigori exponitur, nova ratio frequentiae huius mali patet.

Varia autem facies morbi est, quum demonstratum sit §. 1490, quod arthritidi, podagrae, scorbuto agnatus sit rheumatismus; quum iuncturas quorumcumque artuum obideat; quum toties locum mutet, quandoque idoneae curationi cedat feliciter, aliquando pertinaciter resistat (vide §. 1492), & articulos motu privet per totam vitam. Si lumbos, vel coxam obideat, curatur difficilior (vide §. 1494).

Quamdiu rheumatismus articulos occupat tantum, acerbissimis saepe dolori-

(v) Cotunnus de ischiade nervosa pag. 70, 71.

ribus miseros torquet aegros, & magnas molestias per totam vitam relinquit, sed raro lethalis est; ubi capiti, vel pulmone incubuit, summum adest statim periculum, & quandoque subita mors sequitur (vide §. 1491.). Difficultas detegendi rheumatismum, dum cerebrum vel pulmonem occupat, quandoque non levis est. Ubi prius articulos occupavit malum, & dolores articulorum absque bonis signis: levantur subito, novaque apparent symptomata, quae cerebrum aut pulmonem affici docent, peritus medicus non dubitabit de metastasi materiae morbosae in haec viscera, & monebit, summum vitae periculum adesse. Verum, si incipiens rheumatismus, antequam ullam partem corporis affecerit prius, statim pulmonis aut cerebri incumberet, in diagnosi morbi summa foret difficultas. Quum autem (vide §. 1493.) in rheumatismo curando antiphlogistica adhibeantur remedia, in medendi methodo non sequeretur insignis error ab hac causa..

Calidiorum remedium usum imprimis non vacare periculo, praecipuum in morbo incipiente, eodem loco monitum fuit. Postquam autem febris, rheumatismi comes, desit, vel insigniter minuta fuit, feliciter & tuto callida remedia larga aquae copia diluta data fuerunt; uti pariter ibidem dictum fuit.

Narcotica remedia spe leniendi acerbos rheumatismi dolores exhibita nocuisse saepius, (§. 1493.) constitit, simulque monitum fuit, quo morbi tempore, qua cum cautela illorum usus concedi possit. Quae omnia fidelibus optimorum medicorum observationibus confirmata sunt.

F E N I S.



I N D E X A U C T O R U M.

A.

- ABENZOAR** Abhomeron colligit Averois, cura Hieron. Iuriani. Venetiis 1514, fol.
- ACADEMIE** Royale des sciences (vide in H). ACTA Eruditorum anno 1682 publicata. Lipsiae 1682, & sequenti, 4to.
- ACTA** Physico-medica Acad. Caes. naturae curiosorum exhibentia Ephemerides, sive observat. historias, & experimenta. Norimbergae edit. 2da. 4to. 20 vol.
- ACTA** Helvetica-physico-mathematico botanico medica. Basileae 1751, 4to. 2 vol.
- AGNETAS** (PAUL) Opera medica a Ioan. Quinterio versa. Lugduni 1551, fol.
- AGNETAS** (PAUL) Libri VII Graece. Venetiis apud Aldum 1528, fol.
- AESOPUS** epulans, sive discursus mensales inter confabulantes petinos cunctos. Viennae 1749, 4to.
- AETII** medici contractae ex veteribus medicinas tetrabiblos. Per Ioan. Cornarium. Lugduni 1549, fol.
- AETII** Amideni. Librorum medicinalium libri octo Graece. Venetiis apud Aldum 1534, fol.
- AELIUS** (BERN. SINGR.) Historia musculorum hominis. Lugd. Batav. 1734, 4to.
- AELIUS** (BERN. SINGR.) Icones ossium foetus humani. Leidae Batav. 1734, 4to.
- AELIUS** (BERN. SINGR.) Academicarum adnotationum libri. Leidae 1754, 4to. 8 part.
- AELIUS** (BERN. SINGR.) Index suppellectilis anatomicae, quoniam Acad. Batavae Leidae legavit Io. Jac. Rau. Lugduni 1725, 4to.
- AELIUS** (PROSP.) Medicina Aegyptiorum. De bullismo; rhauponico; & fac. Boniti de medicis ludicrum. Lugd. Bat. 1719, 4to.
- AELIUS** (PROSP.) De praefugienda via, & morte aegrotantium lib. VII. Lugduni Batav. 1734, 4to.
- AMATI** Lusitani. M.D. curationum medicinarum centuriae septem. Burdigalae 1620, 4to.
- ANDRY.** L'Orthopedie, ou l'arts de prevenir & corriger dans les enfans les difformités du corps. Bruxelles 1745, 8vo. 2 vol.
- ANDRY.** De la generations des vers. Paris 1741, 8vo.
- ANSON** (GEOGE) Voyage round the World. London 1748.
- ANTYRCHAUS.** Relation de la peste de la ville de Toulon en 1726. Paris 1756, 8vo.
- APHRODISIACUS,** sive de Ius Venerae, cura Aloys Luisini. Lugduni 1728, fol. 2 vol.
- APULIUS** Madaurens. philof. Platonici operum cum Phil. Beroaldi commentar. Basileae apud Henric. Petri 1560, 8vo. 2 vol.
- AQUAPENDENTE** (HIERON. FABRICII AB) Opera omnia anatomica, & physiologica. Lipsiae 1687, fol.
- ARISTARI** Cappadocis de causis, & signis acutorum, & diuturnorum morborum libri IV, cura Herm. Boëthae. Graec. & Lat. Lugduni 1735, fol.
- ARISTARI** Cappadocis aetiologica, semeiotica, & therapeutica morborum acutorum, & diuturnorum Graec. & Lat. Aug. Vind. 1605, fol.
- ARISTOTELIS** Opera omnia Graec. & Lat. cura Guil. de Vallii. Parisiis 1654, fol. 4 vol.
- ARISTOPHANIS** Comediae Graec. & Lat., cura Nicodemii Frislinii. Francof. 1597, 8vo.
- ASTRUCUS** (IOH.) De morbis veneris libri sex. Lutet. Paris 1736, 4to. Idem Paris 1740, 4to. 2 vol.
- ASTRUC** (I. M.) Traité des maladies des femmes. Paris 1761, 8vo. 4 vol.
- ATTAQARAT** Dipnosophittarum libri XV Graece. Basileae 1715, fol.
- ATRENTI** (TOM) Lutoromia, ovvero del cavar la... tra. Firenze 1720, fol.

X

AURELIANI (CARL.) de morbis acutis & chronicis. Amstelædami 1709, 410.
 AVICENNÆ Arab. Opera ex Gerardi Cremonensis versione & Adrææ Alpigi castigat. Venetiis 1595, fol. 2 vol.

B.

BAADRA (IOS.) Observationes medicæ, incisionibus cadaverum illustratæ. Brigau 1762, 8vo.

BACII (ANDR.) Elpidiani de thermis libri VII. Batavii 1711, fol.

BACH (ANDR.) Elpidiani de venenis & antidotis prolegomena Romæ 1586, 4to.

BACHSTROM (IO. FRÆD.) Observationes circa scorbutum. Lugd. Bat. 1734, 8vo.

BACONIS (FRANC.) de Verulamio. Opera omnia, quæ existant. Francofurti 1665, fol.

BAGLIVII (GEORG.) Opera omnia medico practica & anatomica. Antverpiæ 1719, 4to.

BAILLIET (ADRIEN.) Jugemens des Sçavans sur les principaux ouvrages des auteurs. Amsterdam 1725, 8vo. 6 vol.

BALLONII (GULIEL.) Epidemiorum & ephemeridum libri 5, cura Io. Thevart. Vezetiis 1734, 4to. 4 vol.

BARBETTE (PAUL.) Praxis medica cum notis & observat. Frid. Deckeri. Lugd. Batav. 1669, 12.

BARTHOLINI (THOM.) Medicinalium epistolarum centuriæ IV. Hafniæ. 1663, 8vo. 4 vol. & Hagæcomit. 1740, 8vo. 4 vol.

BARTHOLINI (THOM.) Histor. anatomicarum rarior. centuriæ IV. Hafniæ 1654, 12.

BARREAE (PIETRE) Observationes anatomiques tirées des ouvertures d'un grand nombre des cadavres. Perpignan 1753, 4to.

BAUHINI (CASP.) Theatrum anatomicum. Francofurti 1605, 8vo.

BEQUE de Pressé. Memoire pour servir à l'usage interne du mercure sublimé corrosif dans les maladies veneriennes. A la Haye 1763, 8vo.

BELLOSTR. Le chirurgien d'hôpital. Amsterdam 1708, 8vo.

BENEVOLE (ANT.) Dissertazioni e osservazioni. Firenze 1747, 4to.

BENEDICTI (CHR.) Tabidorum theatrum. Londini 1656, 12.

BENSA (FRANC.) Historica relatio pestis anni huius seculi 12, 13, & 14 Austriam infestantis. Viennæ 1717, 8vo.

BETREDER. Histoire de l'hydrocephale de Belg. Bordeaux 1755, 8vo.

BEVERWICH (IO.) Steenlucck. Tot Dordrecht. 1649, 8vo.

BIANCHI (GIO.) Se il vitio pittagorico dei soli vegetabili sia giovevole per conservare la sanità, discorso. Venezia 1752, 8vo.

BIANCHI (IO. BAPT.) Historia hepatica. Genevæ 1725, 4to. 2 vol.

BIBLIOTHEQUE nouvelle Angloise par M. D. L. R. Amsterdam 1714, 8vo.

BOERHAAVE (HERM.) Libellus de materia medica & remedium formularis. Lugduni Bat. 1740, 8vo.

BOERHAAVE (HERM.) Elementa chymiae. Lugduni Batav. 1733, 4to. 2 vol.

BOERHAAVE (HERM.) Institutiones medicæ. Lugd. Batav. 1734, 8vo.

BOERHAAVE (HERM.) Aïrois rarissimique morbi historia. Lugd. B. 1714, 8vo.

BOE (FRANC. DE LA) Sylvii. Opera medica. Genevæ 1680, 4to.

BOECLER. Recueil des observations qui ont été faites sur la maladie de Marseille. Strasbourg 1721, 8vo.

BORNI (IO.) De renuncione vulnere lethali exameno. Amstelod 1710, 8vo.

BORNI (IO.) Circulus anatomicus, seu oeconomia corporis animalis. Lipsiæ 1686, 4to.

BONACIOLI (LUDOV.) ad divam Lucetiam Boigiam Ferrariae Ducissam Eneas muliebri, fol.

BONETI (THEOPH.) Sepulchretum, sive anatomia practica. Lugduni 1700, fol. 3 vol.

BONONIENSIS. De scientiarum, & artium instituto atque academia commentarii. Bononiæ 1748, 4to. plura vol.

BONTIUS (IACOB.) Vide Pifo.

BONNET. Considerations sur les corps organisés. Amsterdam 1762, 8vo, 2 vol.

BORELLI (IO. ALPH.) De motu animalium, cum Io. Bernoulli de motu musculorum. Lugd. Bat. 1710, 4to.

BOUDET. Recherches, & observations sur toutes les parties de l'art du dentiste. Paris 1757, 8vo. 2 vol.

BOYLE (ROB.) Exercitationes de utilitate philosophiae naturalis experimenta. Lindaviae 1693, 4to.

BOYLE (ROB.) Apparatus ad historiam naturalem sanguinis humani. Genevae 1685, 4to.

BOYLE (ROBERTI) Opera omnia varia. Genevae 1714, 4to. 4 vol.

BOYLE (ROBERT.) Medicina hydrostatica. Genevae 1695, 4to.

BROCKLESSBY (RICHARD.) Oeconomical and medical observations in two parts &c. London 1764, 8vo.

BROUETZ. Medecin du Roi. Essai sur l'education medicinale des enfans. Paris 1754, 8vo. 2 vol.

BROWNE (PATRICK.) the civil and natural history of Jamaica. London 1756, fol.

BRUNNERI (IO. CONR.) Experimenta nova circa pancreas, accedit diatribe de lymph. Amstelod 1683, 8vo.

BRUNNERI de scorbuto (Vide Eugleni.)

BUTTER (WILLIAM) a methode of cure for the stone of inections. Edinburgh 1754, 8vo.

C.

CALII (IO. BRITANNI) De ephamera Britannica liber. Londini 1721, 8vo.

CALDANI (M. ANT.) Lettera sull' insensibilita e irritabilita d' alcune parti degli animali al chiariss. sign. Alberto Haller. 4to.

CAMUS (LE) Memoires sur divers fuits de medicine. Paris 1760, 8vo.

GANGIAMILA (FR. HEMAN.) Embryologia sacra, sive de officio Sacerdotum & medicorum circa aeternam parvulorum in utero existentium salutem. Panormi 1758, fol.

CARDANI (HIERON.) Opera medica. Lugduni 1663, fol. VII. tom.

CASTERA (DE) DU PERRON. Histoire du mont Vesuve. Paris 1741, 8vo.

CELSI (AUR. CORN.) de medicina libri octo, cura Th. ab Ameloveen. Amstelodami 1713, 8vo.

CHAMBERLEN (HUGO.) Het Roonhuyfnaanf, h geheim in de Vroedkunde ontdekt. Te Leiden 1754, 8vo.

CHARAS (MOSES) Opera pharmacopoea regia Galenica. Genevae 1684, 4to.

CHARLETONI (GUALTERI) Inquisitiones medico physicae de causis catameniorum, & uteri rheumatismo. Lugd. Bat. 1686, 8vo.

CHEVALIER. Lettre a Mr. de Jean sur la maladie de st. Domingue. Paris 1752, 8vo.

CHIRURGIE. (Academie Royale de) vide memoires.

CICERONIS (M. TULL.) Opera cum delectu commentariorum. Parisiis 740, 4to. 9 vol.

CITESII (FRANC.) Opuscula medica. Parisiis 1639, 4to.

CLERC. (DANIEL. EE.) l' Histoire de la medicine. Amsterdam 1702, 4to. 2 vol.

CLERICI (DAN.) Historia naturalis, & medica latorum lumbricorum intra hominem, & alia animalia nascentium. Genevae 1715, 4to.

CLUSII Atrebatii. Rariorum plantarum historia. Antverpiae off. Plantio. 1601, fol.

COCCHI (ANT.) dei bagni di Pisa trattato. Firenze 1750, 4to.

COCCHI (ANT.) Del vito Pittagorico per uso della medicina. Venezia 1745, 12.

COCKBURN. (GULIELM.) Virulenta gonorrhoea symptomata, natura, causa, & curationes. Lugduni 1717, 8vo.

COR (THOM.) A Treatise on billiary concretions &c. London 1757, 8vo.

COELIUS AURELIANUS (Vide in A.)

COLLIN (HENR.) Nosocomii civici Pazmaniani annus medicus, sive observationes de morbis acutis. Vindobonae 1764, 8vo.

COLUMBI (REBALDI) Cremon. De re anatomica libri XV. Venetiis 1559, fol.

COLUMNNAE (FABII) Phytobasanos, sive plantarum aliquot historia. Neapoli 1592, 4to.

COLUMNNAE (FABII) Minus cognitarum stirpium, ac etiam rariorum nostro caelo orientium: cephrasis. Romae 1606, 4to.

COMBALUSIER (FR. DE PAULA) Pneumato pathologia, seu tractatus de flatulentis humani corporis affectibus. Parisiis 1747, 8vo.

COMMENTARIA Academiae Scientiarum Pe-

- tropolitanae 1728; 4to.
 CORDAMINE (de la) Relation abrégée d'un voyage fait dans l'intérieur de l'Amérique méridionales. Paris 1745, 8vo.
 CORNACHINI (PIETRO) della pazzia. Istituzione, e due discorsi Accademici di medicina elettrica. In Siena, 1758
 CORNARO (LUIS) Raadgeving in verzecker-middelen om zeer gemakkelijc derd en meer Jaaren in gezondheid te kunnen Leeven. Tot Leiden 1703; 12.
 COSTERI (BERNARD.) Historisch Verhaal. Te Leyden 1735, 4to.
 COSTE Traité pratique sur la goutte. Amsterdam 1757, 8vo.
 COTUNNIUS (DOMINIC.) De ischiade nervosa commentarius. Carpi 1768, 8vo.
 COULET (STEPH.) Tractatus historicus de ascaridibus, & lumbrico lato. Lugd. Bat. 1729, 8vo.
 CRANTZ (H. NEP.) Dissertatio de re instrumentaria in arte obstetricia. Norimbergae 1757, 4to.
 CRANTZ (HEN. NEP.) Commentar. de rupto in partus doloribus utero a foetu. Lipsiae 1756, 8vo.
 CRANTZ (IO. NEP.) Einleitung zur Hebammen Kunst. Wien. 1756.
 CURTII (RUFFI) Historia Alexandri M. cum notis variorum. Amstel. 1684, 8vo.
 D.
 DARAN (JACQUES) Observations chirurgicales sur les maladies de l'urethre. Paris 1748. A. 1750, 8vo.
 DECKERT (FRID.) Exercitationes medico practicae. Lugd. Bat. 1673, 8vo.
 DEGENERI (IO. HARTMANNI) Historia medica de dysenteria bilioso-contagiosa quae 1736 Neomagi grassata fuit. Traiecti ad Rhenum 1738, 8vo.
 DEMETRIUS (vide Pepagomenus).
 DEMETRIUS Altheicius. Ouvrage de Penelope ou Machiavel en médecine. Berlin 1748, 8vo, 4 vol.
 DENYS (JAC.) Heelkundige Aanmerkingen over den Steen, der Nieren, blaaze. Te Leyden 1730, 8vo.
 DENYS (JAC.) Verhandelingen over het ampt der Vroed meesters en Vroed Vrouwen. Te Leyden 1743, 4to.
 DESAULT. de la rage, 1734, 4to.
 DEVENTER (HENR. A.) Operationes chirurgicae, quibus manifestatur artis obstetricandi novum lumen. Lugd. Bat. 1725, 4to.
 DICTIONARIUM medicum, vel expositiones vocum medicinalium excerptae ex Hippocrate, Aretaeo, &c. Graec. Lat. apud Henr. Steph. 1654, 8vo.
 DIEMERBROECK (ISSRANO.) Opera omnia anatomica, & medica. Ultraiceti 1685, fol.
 DIEMERBROECK (ISSRANO.) De peste libri IV. Atebaci 1646, 3to.
 DILLENI (IO. IAC.) Historia muscorum iconibus illustrata. Oxonii 1741, 4to.
 DIONIS (CHARL.) Dissertation sur le Taenia ou ver plat dans la quelle on prouve, que ce ver n'est pas folitaire, &c. Paris 1749, 8vo.
 DIOGENIS Laërtii. De vitis dogmat. & apophthegmat. clarorum philosophorum Graec. & Lat. cura If. Casauboni. Paris. Henr. Steph. 1593, 8vo, 2 vol.
 DIONIS. Cours d'Operations de chirurgie démontrées au iardin Royal. Bruxelles 1708, 8vo.
 DIOSCORIDIS (PEDACII) Anazarbaei. Opera omnia Graec. & Lat. ex nova interpretat. Io. Aut. Saraceni, apud Wechel 1598, fol.
 DISSERTATION on the origin of Venereal disease. London 1731, 8vo.
 DODONAEI (REMBERTI) Med. Caes. stirpium historiae pemptades sex. Antverpiae ex off. Plant. 1616, fol.
 DODONAEI (REMBERTI) medicinalium observationum exempla rara. Hardevici 1521, 8vo.
 DODONAEI (REMBERTI) Praxis medica. Amsterd. 1616, 8vo.
 DOEVEREN (GUALTERI VAN) Dissertatio de verbis intestinalibus hominum. Lugd. Bat. 1753, 4to.
 DONATI (MARCELLI) De medica historia mirabili libri sex. Manuae 1586, 4to.
 DONCKERS (LAUR.) Idea febris petechialis, sive tractatus de morbo punctulari. Lugd. Bat. 1686, 12.

DOUGLAS (IAC.) *Bibliographiae anatomicae specimen, sive catalogus omnium pene auctorum, qui ab Hippocrate usque ad Harvacum de re anatomica scripserunt.* Lugd. Bat. 1734, 8vo.

DOUGLAS (IAC.) *Lateralis operationis historia, seu descriptio methodi calculum extrahendi.* Lugd. Bat. 1728, 4to.

DRAKE (JAMES) *Anthropologia nova, or a new System of anatomy.* London 1727, 8vo. 3 vol.

DRAKE (HENR. FR. LE) *Traité des opérations de chirurgie.* Paris 1742, 8vo.

DRÄLINCOURT (CAROLI) *Opuscula medica.* Hag. Com. 1727, 4to.

E.

EISENSCHMIDT (IO. CASP.) *de ponderibus, & mensuris veterum.* Rom. Graec. & Hebraeorum. Argentorati 1708, 8vo.

EMERY (ROBERT.) *Theorie nouvelle du fluxe menstruel, & un traité des maladies de la tête.* Paris 1757, 8vo.

ERNDTII (CHR. HENR.) *Warrsavia physice illustrata, sive de aëre, aquis, locis, & incolis &c.* Dresdae 1730, 4to.

D'ESCHERNY Brother in Law to Mr. Stephens. *A Treatise of causes and symptoms of the stone.* London 1755, 8vo.

ESSAI sur l'usage & les effets de l'écorce du Garou, appelé-sain bois. Paris 1767, 8vo.

ESSAI and observations physical and literary read of Society in Edinbourg 1754, 8vo.

ETMULLERI (MICH.) *Opera medica Theoretico-practica, cura Io. C. Westphalii.* Francof. 1696, fol. 2 vol.

EUGALINI (SEVERINI) *Docemani de morbo scorbuto liber.* Amstelod. 1710, 8vo.

EURIPIIDI *Tragoediae* 19 Gr. & Lat. cura Aemilii Porri. Heidelberg 1697, 8vo.

EUSTACHI (BARTHOL.) *libellus de dentibus.* Venetiis 1563, 4to.

EUSTACHI (BARTH.) *Opuscula Anatomica.* Lugd. Bat. 1707, 8vo.

EUSTACHI (BARTHOL.) *Tabularum anatomicarum explicatio.* Bern. Siegf. Albini. Leidae 1761, fol. & Leidae 1744, fol.

EXTON (BRUDENELL.) *anewv and general system of Midwifery.* London 1753, 8vo.

F.

FABRICI (ALBERTI IO.) *Bibliotheca Graeca.* Hamburgi 1718, 4to. 14 vol.

FAUCHARD (PIERRE) *Le Chirurgien dentiste, ou traité des dens.* Paris 1728, 8vo. 2 vol.

FARNELLI (IOH.) *Ambiani. Universa medicina cum notis Ioh. & Othonis Heurnii.* Traiecti ad Rhen. 1656, 4to.

FEUILLE (LOUIS) *Journal des observations physiques, mathématiques, & botaniques.* Paris 1714, 4to. 3 vol.

FISCHER (DAN.) *De remedio rusticano variolas per balocum aquae dulcis, post vero sero lactis felicitate curandi commentatio.* Erfordiae 1745, 8vo.

FLOYER (JOHN.) *Ευχελογεωγία, or the history of Cold Bathing.* London 1733, 8vo.

FORESTI (PETR.) *Alcmariani med. observationum & curationum chirurgicarum libri V.* Francofurti 1661, fol.

FOUGEROUX *Memoires sur les os.* Paris 1760, 8vo.

FRACASTORI (HIERON.) *Opera omnia.* Venetiis apud Iuntas. 1555, 4to.

FREIND (J.) *the history of physic from the time of Galen to the beginning of the sixteenth Century.* London 1715, 8vo. 2 vol.

FREIND (J.) *De purgantibus in secunda vss. riolarum consuetudine febri adhibendi epistola.* Rotterdami 1720, 8vo.

FREIND (J.) *Emmenologia, in qua fluxus muliebri mensitruu phaenomena dirigitur.* Oxoniae 1703, 8vo.

FREIND (J.) *ad Celeberrimum Ric. Mead. de quibusdam variolarum generibus Epistola* 1724, 8vo.

FROMOND (P. D. CLAUDIO) *Risposta apologetica a una lettera filosofica sul commercio degli olii navigati, procedenti da Iughi appetati.* Lucca 1745, 8vo.

G.

GIAGLIARDI (DOM.) *Anatomie officium.* Romae 1639, 8vo.

- GALLO (GIO. MICH.) Dissertazione di
so e sicuro metodo dell' uso del
e suo abuso in medicina. Firenze 1
8vo. 2 vol.
- GARENGEOT. (RENE' JAQ. DE) Traité des
Opérations de Chirurgie. Paris 1731.
8vo. 3 vol.
- GARENGEOT. (RENE' JAQ. DE) Nouveau
Traité des Instrumens de Chirurgie - Pa-
ris 1723, 8vo. 2 vol.
- GASSENDI (PET.) Viri Ill. Nic. Claudii - Pa-
trici de Peiresce. Senat. aquis octiens
vita. Hagae Com. 1655, 4to.
- GAUBI (H. D.) Institutiones philosophi-
thologiae medicinalis. Leidae 1758.
Jo. Frid. Gronovii. Lug. Bat. 1688.
GESNERI (CONR.) Epistolarum medica-
rum libri III. Figuri 1577, 4to.
- GESNERI (CONRADI) De aconito primo
Dioscoridi asservatio, & de oxyphelitis
eleborati utriusque descriptio. 1577 - 4to.
- GRISI (MART.) Lettere mediche. Cremo-
na 1749, 4to.
- GILCHRIST (EBENEZER) The use of sea vo-
yages in medicine. London 1757. 8vo.
- GLISSONII (FR.) Opera medico-anatomica.
Lugd. Bat. 1691, 12°. 3 vol.
- GORRAEI (IO.) Paris Opera. Definitionum
medicarum libri 24, cura Jo. Gorraei
filii. Parisiis 1622, fol.
- GORTER (IO.) Het regt gebruyk der Sluit-
band. te Amsterdam 1751, 8vo.
- GORTER (IO.) de perspiratione insensibili.
Lugd. Bat. 1736, 4to.
- GORTER (IO.) Medicina Hippocratica ex-
ponens aphorismos Hippocratis. Amste-
lod. 1739, 4to.
- GOULA RD. Traité sur les effets des préparatifs
du plomb, & de l' extrait de saturne.
Pezomas 1760, 8vo.
- GOULA RD. Remarques & observations pra-
tiques sur les maladies veneriennes. Pe-
zomas 1760, 8vo.
- GRAAF (REGNERI) de mulierum organis ge-
nerationi inservientibus Tractatus. Lugd.
Bat. 1672, 8vo.
- GRAAF (REGN.) Tractatus anatomico-me-
dicus de succi pancreatici natura & usu.
Lugd. Bat. 1761, 8vo.
- GRASHUIS (IO.) Dissertatio de generatione
puris. Amstelod. 1747, 8vo.
- 's GRAVESANDE' (GUIL. JAC.) Physices ele-
menta mathematica experimentis confir-
mata. Leidae 1742, 4to. 3 vol.
- GÜNTZ (IOST. GOTHOF.) Prolusio ad pa-
negirim med. anni 1753, de utero &
naturalibus foeminarum, 4to.
- H.
- HAEN (ANT. DE) Historia anatomico-me-
dica morbi miri incurabilis. Hagae Bat.
1744, 8vo.
- HAEN (ANT. DE) Theses pathologicae de
haemorrhoidibus. Viennae. 1759, 8vo.
- HAEN (ANT. DE) ad Balth. Tralles epi-
stolam apologeticam responso. Viennae
1764, 8vo.
- HAEN (ANT. DE) De colica pictorum dis-
sertatio. Hagae Com. 1745, 8vo.
- HAEN (ANT. DE) Ratio medendi in no-
socomio practico Vindobonensi. Viennae
1755, 8vo. 12 vol.
- HAHN. (IO. GOR. DE) Variolarum antiqui-
tates nunc primum a Gracis erutae.
Bregae 1733, 4to.
- HAHN. (IO. GOR. DE) Carbo pestilens a
carbunculis, sive variolis veterum distin-
ctus. Wratislaviae 1736, 4to.
- HAHN (IO. GOR. DE) Historia podagrae
Em. Cardin. Phil. Lud. Com. de Sin-
zelndorf. Norimbergae. 1751, 4to.
- HAHN (IO. GOR. DE) Morbilli variolarum
vindices. Wratislaviae 1753, 4to.
- HAHN. (IO. GOR. DE) Variolarum ratio ex-
posita Acad. Reg. Berolinens. Wratisla-
viae 1751, 4to.
- HALLER (ALB.) Disputationes ad morbo-
rum historiam, & curationem facientes,
quas collegit. Lausannae 1737 4to. 6 vol.
- HALLER (ALBERT. DE) Deux memoires sur la
formation des os. Lausanne 1758, 8vo.
- HALLER (ALB.) Primae lineae physiologiae.
Gotttingae 1751, 8vo.
- HALLER (ALBERT. DE) Memoire sur la natu-

- re sensible & irritable des parties du corps de l'animal. Lausanne 1756, 8vo. 2 vol.
- HALLS (STEPH.) *Vegetable Itarick and Hæmesticks*. London 1727, 8vo. 2 vol.
- HANDER (Io. IACH.) *Apiarium observationibus medicis centum, & physicis elementis illustratum*. Basileæ 1687, 4to.
- HARRIS (GUALTERI) *Observationes de morbis aliquot gravioribus, & lue venerea*. Genevæ. 1727, 4to.
- HARRIS (GUALTERI) *Tractatus de morbis acutis infantum*. Genevæ 1727, 4to.
- HARTLEY (DAVID.) *De Lithontriptico a Ioanna Stephens nuper invento dissertatio epistolaris*. Lugd. Bat. 1741 8vo.
- HARVEI (GUIL.) *Exercitationes de generatione animalium*. Patavii 1666, 8vo.
- HARVEI (GUIL.) *Exercitatio anatomica de motu cordis, & sanguinis in animalibus*. Francofurti 1628, 4to.
- HASENORHL (Io.) *Historia medica morbi epidemici, sive febris petchialis, quæ anno 1757 — 59 Viennæ grassata est*. Vindobonæ 1760, 8vo.
- HAYERS (CLOFTON) *No vae quaedam observationes de ossibus*. Amstelod. 1731, 8vo.
- HEERS (HENR. AB) *Spadacrene, hoc est fons spadanus, & observarionum medicarum liber*. Lugd. Bat. 1645, 8vo.
- HEINSII (NIC.) *Naauwkeurige Verhandelng van het podagra en d'algemeene Jigt*. Amsterdam 1698, 8vo.
- HEISTERI (LAURENTII) *Institutiones chirurgicæ*. Amstel. 1739, 4to. 2 vol.
- HEISTER. (LAUR.) *Medicinische chirurgische und anatomische Wahrnehmungen*. Rostock 1753, 4to.
- HELMONT (Io. BAPT.) *Dageraad, of de Nieuwe Opkomst der Geneeskunst in verborge grondegulen der nature*. Rotterdam 1660, 4to.
- HELMONT (Io. BAPT. VAN.) *Orrus medicinae, idelt physicae initia inaudita*. Edente Fr. van Helmont. fil. Amsterod. 1652, 4to.
- HELWETII (ADRIANI) *Methodus febres omnis generis ita curandi, ut nihil ore assumentum exhibeatur*. Lipsiæ 1694, 12.
- HEMSTERHUTS (SIBOLD.) *Mellis aurea exhibens anatomica novissima experimenta. De vasis lymphaticis tabulae Rudbeckianæ*. Heidelberg 1759, 8vo.
- HERNANDEZ (FR.) *Nova plantarum, animalium, & mineralium Mexicanorum historia*. Romæ 1651, fol.
- HERODORI Halicarnassæi *historiarum libri IX Græc. & Lat., interp. Laurentio Valla, cura Jac. Gronovii*. Lugd. Bat. 1715, fol.
- HESIODI Aferæi quæ exstant Gr. & Lat. cura CORN. Schrevelii. Lugd. Bat. 1653, 12.
- HEYDEN (HERMAN VAN DER) *Discours, & advis sur les flux de ventre douloureux*. à Gand. 1645, 4to.
- HILDANI (GUIL. FABRICII) *Opera observationum & curationum medicæ-chirurgicæ*. Francofurti 1682, fol.
- HILLARI (WILLIAM) *a rational and mechanical essay on the Small pox*. London 1735, 8vo.
- HIPPOCRATIS Coracæ prænotationes, interprete, & enarratore Lud. Dureto. Gr. & Lat. Parisiis 1588, fol.
- HIPPOCRATIS Cui liber de morbis mulierum Gr. & Lat. Maur. Cordaco Rhemo interprete. Parisiis 1585, fol.
- HIPPOCRATIS Coacæ præfagia cum interpretatione & commentariis Jacobi Holleri & Desiderii Iacotii. Lugd. 1576, fol.
- HIPPOCRATIS Cuii & Claudii Galei opera. Reuati Charterius Græc. & Lat. Lutet. Paris 1679, fol. 13. vol.
- HIPPOCRATIS Cui opera omnia, quæ exstant, Græc. & Lat. cum interpret. & annot. Anni Fossii. Genevæ 1657. fol. 2 vol.
- HISTOIRE naturelle du gabinet du Roy. Paris 1749, 4to. 15 vol.
- HISTOIRE de l'Academie Royale des sciences. Amsterdam 1706, 8vo. depuis 1699.
- Idem à Paris 4to.
- HOFFMANNI (FRID.) *Observationes interessantes sur la cure de la goutte & du rhumatisme*. Paris 1747, 8vo.
- HOFFMANNI (FRID.) *Observationum physico-chymicarum libri III. Halæ 1722, 4to.*
- HOFFMANNI (FRID.) *Opuscula pathologica practica*. Halæ 1738, 4to.
- HOFFMANNI (FRID.) *Medicina rationalis sy-*

- Stemmatica. Francofurti 1738, 4to, 5 tom.
 HOFFMANNI (FAID.) Opuscula physico-medi-
 ca. Ulmae 1725, 4to. 2 vol.
 HOLLAND (RICHARD) Observations on the
 Small, pox. London. 1741, 8vo.
 HOLLERI Stempiani. Omnia opera practica
 cum scholiis eiusdem & Lud. Duretii &
 Ant. Valentii exercitationibus. Genevae
 1613, 4to.
 HOLLERI Stempiani. Opera omnia practica.
 Coloniae Allobrog. 1623, 4to.
 HOMERII quae exstant Graece cum versione
 Lat. & com. Io. Spondani. Basilicae fol.
 1606.
 HORATII Flacci poemata cura Io. Cuningami
 Hagae comit. 1721, 8vo. 2 vol.
 HORNE (Io. VAN) Opuscula anatomico chi-
 rurgica, studio Io. Guil. Pauli. Lipsiae
 1707, 8vo.
 HUXHAM (Jo.) an essay of tevers and their
 various Kinds. London 1750, 8vo.
 HUXHAM (Io.) Observationes de aëre & mor-
 bis epidemicis. Londini 1739, 8vo. 1 vol.

J.

- JALLABERT. Experiences sur l'électricité. Pa-
 ris 1749, 8vo.
 JAMES (R.) a new method of preventing
 and curing the madness caused by the bite
 of mad Dog. London 1743, edit. 2da.
 JOURNAL des sçavans par le sieur Houdeville.
 Amsterdam 1685, 8vo.
 JOURNAL de médecine, ou recueil périodique
 de médecine, chirurgie, & pharmacie. Pa-
 ris 1754, 8vo. 30 vol.
 JOURNAL Britannique par Maty. 8vo. 24 vol.
 IUSTINI Historiae Philippicae cum notis va-
 riorum, cura Abr. Gronovii. Lugd. Bat.
 1719, 8vo.
 IUVENALIS, & Aulii Persii Flacci satyrae cus-
 tante Cornelio Schrevelio. Lugduni Bata-
 vor. 1648, 8vo.

K.

- KAAU (ABRAH.) Perspiratio dicta Hippo-
 crati per universum corpus anatomico illu-

- strata. Lugd. Bat. 1738, 8vo.
 KAAU (HERMAN.) Dissertatio inauguralis de
 argenio vivo. Lugd. Bat. 1729, 8vo.
 KAEMPFERI (ENGELB.) Beschryving van Japan
 Amsterd. 1733, fol.
 KAEMPFERI (ENGELB.) Amoenitatum exori-
 carum politico physico-medicarum
 culi V. Lemgoviae 1712, 4to.
 KETELAER (VINCENT.) Commentarius medi-
 cus de aphthis nostratibus. Lugd. Bat.
 1672, 12.
 KIRKPATRICK The analysis of inoculation.
 London 1754, 8vo.
 KOLBE (PETER) Beschryving van de Kaap de
 Goede Hoop. te Amsterdam 1727, fol.
 2 vol.

L.

- LABAT (P.) Nouveau voyage aux isles
 Ameriques A la Haye. 1724, 4to. 2 vol.
 LAISSE (DE) Recueil d'observations de chi-
 rurgie. Paris 1753, 8vo.
 LAMZVEERDE (Io. BART.) Historia naturalis
 molarum uteri. Lugd. Bat. 1686, 8vo.
 LANCISI (Io. M.) De motu cordis, & ancu-
 rismatibus opus posthumum. Lugd. Bat.
 1740, 4to.
 LANCISI (Io. M.) De subitaneis mortibus li-
 bri duo. Luccae 1707, 4to.
 LAUTTER (FR. Io.) Historia medica biennalis
 morborum ruralium anni 1759. Viennae
 1761, 8vo.
 LEUVENHOECK (ANTONI) Arcana naturae
 detecta. Lugd. 1522, 4to.
 LETTAES edifiantes, & curieuses ecrites des
 missions étrangères par quelques misio-
 naires de la Comp. de Jesus. Paris 1717,
 8vo. 28 vol.
 LEVRET. L'art des accouchemens. 1753. A
 Paris 8vo.
 LEVRET. Observations sur la cure radicale de
 plusieurs polypes, de la matrice, de la gon-
 ge, & du nez. Paris 1749, 8vo.
 LIGER (CH. LOUIS) Traité de la gonorrhée.
 Paris 1753, 8vo.
 LILLE (CHR. EV. DE) Traité de la cure radicale
 de la gonorrhée. Paris 1753, 8vo.

- ces. Paris 1750, 4to. 4 vol.
- MERCURIALIS (HIERON.) De arte Gymnastica, lib. IV, cura Christ. Coriolani. Amstelred. 1672, 4to.
- METRIE (DE LA) Abregé de la Théorie chymique tirée des écrits de Mr. Boerhaave. Paris 1741, 8vo.
- METRIE (DE LA) Traité de la petite verole. Paris 1741, 8vo.
- MISCELLANEA curiosa, sive ephemeridum medico-physicarum German. Acad. curiosorum. Lipsiae 1671, 4to.
- MONRO (ALEX.) de venis lymphaticis valvulis. Berolini 1757, 8vo.
- MORNO (ALM.) Nervorum anatome contra-cta. Francofurti 1754, 8vo.
- MONRO (DONALD.) An essay on the Dropsy. London 1756, 8vo.
- MONTFALISCO (GABRIEL IGN.) de usu aquae frigidae in haemoptysi. Romae 1756, 4to.
- MONTAIGNE (MICHEL) les essais par P. Coste. Paris 1725, 4to. 3 vol.
- MOR (DE) Dissertatio in aphorismum Hippocratis sect. VI. Lugduni Batav. 1736, 4to.
- MORANDI MORANDI. Prima decade di lettere famigliari. Ferrara 1748, 4to.
- MORAND. Histoire de la maladie fébrile & de l'examen du cadavre d'une femme &c. Paris 1752, 8vo.
- MORRAU (RENAUD.) De missione sanguinis in pleuritide. Halae 1741, 8vo.
- MORGAGNI (LO. BATT.) De sedibus & causis morborum per anatomen indagatis. Venetis 1761, fol. 2 vol.
- MORGAGNI (LO. BATT.) Adversaria anatomica. Lugd. Bat. 1723, 4to.
- MORICEAU (FRANÇOIS) Traité des maladies des femmes grosses, & de celles, qui sont accouchées. Paris 1712 4to. & Paris 1694 4to.
- MORICEAU (FRANÇOIS) Observations sur la grossesse & l'accouchemens des femmes & sur leurs maladies. Paris 1715, 4to.
- MORTON (RICH.) Opera medica. Genevae 1727, 4to. idem Genevae 1696, 4to.
- MOTTE (DE LA) Traité des accouchemens naturels, non naturels, & contre. à la Haye 1716, 4to.
- MOTTE (GUILL. DE LA) Traité complet de chirurgie. Paris 1732, 8vo. 4 vol.
- MUNTINGII (ABR.) De vera antiquorum herba Britannica. Amsteld. 1680, 4to.
- MYE (VAN DER) De morbis & symptomatibus popularibus Bredanis tempore oblationis. Antverpiae. 1617, 4to.
- N.
- NANNONI (ANGELO) Trattato chirurgico delle malattie delle mammelle. Firenze 1746, 4to.
- NAVIER Observations Theoriques, & pratiques sur l'amolissement des os en general, & particulièrement sur celle de la femme supiot. Paris 1755, 8vo.
- NEEDHAM. Nouvelles observations microscopiques. Paris 1750, 8vo.
- NANEL (P. ANT.) Parere intorno alle acque stagnanti delle colmate per rapporto all'insalubrità della Valdinevole. Firenze 1760, 4to.
- NICHOLLS (A. FR.) De aëria medica praetico. Londini 1750, 4to.
- NIMELL (JAMES) New and extraordinary observations concerning the prediction of various Crises of the pulse. London 1741, 8vo.
- NONNI (LUD.) Diætericon, sive de re cibaria libri IV. Antverpiae 1646, 4to.
- NOORTVYCK (VILHELM.) Uteri humani gravidi historia. Lugd. Bat. 1743, 4to.
- NUCK (ANT.) Adenographia curiosa, & uteri foeminae Anatome nova. Lugd. Bat. 1692, 8vo.
- O.
- OBSERVATIONS intéressantes sur la cure de la goutte & du rhumatisme. Paris 1747, 8vo.
- OLAI magni Gothi Archiep. Upsalens. Historia de gentibus Septentrionalibus. Romae 1555.
- OPIDII Nasonis opera cura Helvetii ad usum Ser. Delphini. Lugd. 1689, 4 vol. 4to.

INDEX AUCTORUM.

P.

- PALAEOPRATI.** De incredibilibus historiis. Vide opuscula mythologica physica & æthica. Græc. & Lat. Amstel. 1688, 8vo.
- PALLUCCI (D. M.)** Lettre a Mr. Humelauer. med. sur la cure de la pierre. Vienne 1764, 8vo.
- PALLUCCI.** med. chirurg. Nouvelles remarques sur la lithotomie. Paris 1750, 8vo.
- PALMARIUS (IUL.)** De morbis contagiosis libri VII. Hagae Com. 1604, 8vo.
- PARACELSI (AVA. PHIL. THEOPHRASTI)** Opera omnia medico chymica, chirurgica. Genevæ 1658, fol. 2 vol.
- PARAET (AMBROS.)** Opera a Io. Guillemeau climata. Paris 1582, fol.
- PARÉ (AMBROISE)** Chirurg. du Roy. Les Oeuvres. 3me edition. Lyon 1641, fol.
- PECHLINI (Io. Nic.)** de aëris, & alimentis delectu & vita sub aquis, meditatio. Kilonij 1676, 8vo.
- PECHLINI (Io. Nic.)** Observationum physico-medicarum libri tres. Hamburgi 1691, 4to.
- PEPAGOMENI (DEMITRII)** Liber de podagra. Græc. & Lat. cura Io. Steph. Bernard. Lugd. Batav. 1743, 8vo.
- PERRAULT. (C. & P.)** Oeuvres de physique & de mechanique. Amsterdam 1727, 4to.
- PETIT (JEAN LOUIS)** Traité des maladies des os. Paris 1741, 8vo. 2 vol.
- PETRARCA,** con l'esposizione di Alessandro Vesutello. Venezia 1554, 4to.
- PEU.** La pratique des accouchemens. Paris 1703, 8vo.
- PETERI (Io. CONR.)** Parerga anatomica & medica septem. Genevæ 1681, 8vo.
- PETERI (Io. CONR.)** Merycologia, sive de ruminantibus... & ruminazione commentarius. Basilæe 1685, 4to.
- PHILOSOPHICAL (THE)** Transactions. Giving some account of the present undertakings of the ingenious in manii considerable parts of the world 1655, 4to.
- PHILOSOPHICAL (THE)** Transactions and collections to the end of the year 1700. Abridged and disposed under General Heads. London 1731, 4to.
- PISONIS (CAROL.)** Selectiorum observationum & consiliorum de morbis ab aqua seu vie ortis. Lugd. Bat. 1733, 4to.
- PISONIS (GUIL.)** De naturalibus & medicis libris XII. Idem fac. Bonæd. 1658, fol.
- PITCARNII (ARCHIBALDI)** Opuscula medica. Roterodami 1714, 4to.
- PLAGUE (THE)** No contagious disease. London 1744, 8vo.
- PLATERI (FELIC.)** Prælex medicæ. Opusculum. Basilæe 1666, 4to.
- PLAUTI (M. ACC.)** Comœdiæ cum notis variorum cura Gronovii 1684, 8vo.
- PLIN. (C. SECUND.)** Historiæ mundi libri 37 cura Jacob. Dalecampii. Francofurti 1599, fol.
- PLUTARCHI (CHÆRON.)** Omnia quæ exstant opera cum interpr. Henr. Cusery & G. Xilandri. Francofurti 1620, fol. 2 vol.
- POLLUCIS (IUL.)** Onomasticum Græcæ & Latine cum variorum notis. Amstelod. 1706, 2 vol. fol.
- POUTEAU (CLAUD.)** Melanges de chirurgie. Lyon 1760.
- PRINGLE (JOHN.)** Observations on the disease of the armies in camp and Garrison. London 1752, 8vo.
- PRINGLE (JOHN.)** Observations on the nature and cure of hospital and layl fevers. to M. Mead. 1750, 8vo.
- QUILLERUS (CL.)** Callipoedia, seu de pulcræ prolapsæ habendæ ratione poemâ. Lond. 1708, 8vo.
- RAMAZZINI (RAH.)** Opera omnia medica. Londini 1717, 4to.
- RAMAZZINI (RAH.)** Historia plantarum generalis. Lond. 1735, fol. 3 vol.

- RAULIN (JOSEPH) Des maladies occasionnées par les promptes, & fréquentes variation de l'air. Paris 1752, 8vo.
- REAUMUR. Memoires pour servir à l'histoire des insectes. Paris 1736, 4to. 6 vol.
- RECHERCHES sur le pouls rapport aux crises. Paris 1756, 8vo.
- RECTI (NARD. ANT.) Nova plantarum, animalium, & mineralium Mexicanorum historia, a Fr. Hernandez compilata. Romae 1651, fol.
- REDI (FRANC.) Le opere. Venezia 1712, 8vo. 3 vol.
- REDI (FRANC.) Observationes de vipetis scriptae in literis ad Laurentium Magalotti ex Italica in Latin. translatae. 4to.
- REDI (FRANC.) Experimenta naturalia ex Italico Latinitate donata. Amstelod. 1675, 8vo.
- REINE (WILHELM. TEN.) Dissertatio de Aethritide. Mantipia Schematica de accupura. Londini 1683, 8vo.
- RIDLEY (H.) Anatomie cerebri. Londini 1698, 8vo.
- RIDLEY (H.) Observationes medico-practicae de asthmate, & hydrophobia. Lugd. Bat. 1738, 8vo.
- RIVER. (LAZAR.) Opera medica universa. Genevae 1728, fol.
- RONDEL. (QUILIELM.) Methodus curandarum omnium morborum corporis humani in tres libros distincta. Lugduni 1576, 8vo.
- RONCALL. (FR.) Europae medicina a sapientibus illustrata. Brinae 1747, fol.
- RUSSELL. (RIC.) de tabe glandulari, sive de usu aquae frigidae in morbis glandularum. Londini 1750, 8vo.
- RUSSELL. (AL.) the natural history of Aleppo, and parts adjacent. London 1756, 4to.
- RUTSCH. (FRED.) Opera omnia anatomico-medico-chirurgica. Amstel. 1737, 4to. 5 vol.
- SAL. (DIVERS. PETR.) De febre pestilentiali tractatus. Bononiae 1584, 4to.
- SALMAS. (CLAUD.) Epistolae curante Ant. Clementio. Lugd. Bat. 1656, 4to.
- SALMAS. (CLAUD.) Interpretatio Aphorismi Hippocrati 79, sect. IV. de calculo, cum epistolis Io. Beverovici. Lugd. Bat. 1611, 8vo.
- SALMON (TH.) Hedendaegsche historie, of tegenwoordige staet van alle Volkeren. Amsterdam 1729, 8vo. 10 vol.
- SALTZMANN. (GOTHO.) Dissertatio medica. Argentinae 1734.
- SAMMONICUS (QUINT. SEREN.) De medicina, cura Keuchenii. Amstel. 1662, 8vo.
- SANCTORII De Statica medicina aphorismorum sect. VII cum comment. Litteri. Londini. 1701, 8vo.
- SANTORINI (IO. DOM.) Observationes anatomicae. Venetiis 1724, 4to.
- SAUVAGES (FR.) Dissertation sur la nature & la cause de la rage. Toulouse 1749, 4to.
- SAUVAGES (FR.) Sur les medicaments qui affectent certaines parties du corps humain. Bourdeaux 1752, 4to.
- SAVIARD. Nouveau recueil d'observations chirurgicales. Paris 1702, 8vo.
- SCALIGERIANA, Thuana, Perroniana, Pithoeana, &c. Remarques historiques critiques de Jo. Scaliger, Jo. de Thou, &c. avec les notes des plusieurs savants. Amsterdam 1740, 8vo.
- SCHARF (SAMUEL) A critical enquiry into the present state of surgery. London 1750, 8vo.
- SCHLAMMEREI (GUNTHERI CHRIST.) De genuina febris curandae methodo dissertatio. Ienae 1793.
- SCHENKII (IOAN. A GRAFENBERG) Observationum medicarum rariorum libri VII. Francofurti 1665, fol.
- SCHREIBER (JO. FRED.) Observationes & cogitata de pestilentia, quae 1738 & 39 in Ucraina grassata est. Berolini 1744, 8vo.
- SCHULTENS (ALBERT.) Oratio Academica in memoriam Hermannii Boerhaavii die IV Novemb. 1738. Lugd. Bat. in 4to.
- SCHULTZII (JO. HENR.) Historia medicinae a rerum initio ad annum urbis Romae 535. Lipsiae 1728, 4to.

S.

- guinis Historia. Hagae Com. 1743, 8vo.
- SCHWENSDORF. Academie der Wissenschaften abhandlungen aus den Schvedischen übersezt. 1719, 8vo. 10 vol.
- SCOPOLI (Io. Ant.) De Hydragro Idrieusi testamina Venetiis 1761, 8vo.
- SCRIBONIUS Largi. De compositione medicamentorum liber, cura Ruellii apud Cratandrum 1529, 8vo.
- SCYPTORES rei rusticae veteres Latini, Cato, Varro, &c. curante Matthia Gesnero. Lipsiae 1735, 4to, 1 vol.
- SENAAC. Traité de la structure du coeur, de son action, & des maladies. Paris 1749, 4to, 1 vol.
- SENECARI (L. Ant.) Opera a Iusto Lipsio illustrata. Antverpiae 1651, fol.
- SENNERTI (DAN.) Opera. Lugduni 1650, fol. 3 vol.
- SEVERINI (M. AUR.) De efficaci medicina libri III. Francofurti 1681, fol.
- SEVERINI (M. AUR.) De recondita abscessuum natura libri VIII. Lugd. Bat. 1724, 4to.
- SEVERINI (M. AUR.) Trimembris chirurgia. Lugd. Bat. 1725, 4to.
- SEVERINI (M. AUR.) Antiperipetias adversus Aristoteleos de respiratione piscium diatriba. Amstelod. 1661, fol.
- SIMSON (THOM.) The system of the Womb. Edinburgh. 1729, 8vo.
- SIMSON (THOM.) De ra medica dissertationes quatuor. Edinburgi 1726, 8vo.
- SIMSON (THOM.) An inquiry how far the vital and animal actions of the more perfect animals can be accounted for independent of the brain. Edinburgh 1752, 8vo.
- SINOPARI (DAM.) Patetga medica. Petropoli 1734, 8vo.
- SLARE. De saccharo, & lap. bezoar. Londini 1715, 8vo.
- SOLANO de Luque. Lapis lydius Apollinis. Madrid 1731, fol.
- SOLANO de Luque. Origen morbofo, comun, y universal generario de los accidentes malos segun la doctrina del grande Hippocratico. Malaga 1718, 8vo.
- SORBIT (PAUL. DE) Consilium medicum, seu dialogus, oder feundliches gesprach über den betübten zuffand der Stadt Wiens bey dieser gefatlichen contagion. Wien. 4to.
- SPACHII (ISAEL) Gyneciorum, five de mulierum tum communibus, tum gravidarum, parturientium, & puerperarum affectibus & morbis libri Graec., Arabum, Lat., Veterum. Argentinae 1597, fol.
- SPACIMEN. Novi medicinae conspectus. Patia 1751, 8vo.
- SPIGELII (ADRIAN.) De humani corporis fabrica libri X. Venetiis 1627, fol.
- SPRINGSFELD (GOT. CAR.) Commentatio de praerogativa theismarum Carolinarum in dissolvendo calculo vesicae. Lipsiae 1756, 4to.
- STORCK (ANT.) Annus medicus, quo fiuntur observationes circa morbos acutos, & chronicos. Vindobonae 1759, 8vo. 2 vol.
- STORCK (ANT.) Libellus, quo continuantur experimenta & observationes circa nova sua medicamenta. Viennae 1765, 8vo.
- STORCK (ANT.) Libellus de stramonio, hyosciano, & aconito. Vindobonae 1762, 8vo.
- STORCK (ANT.) Libellus secundus, quo confirmatur cicutam non solum usu interno tutissime exhiberi &c. Vindobonae 1761, 8vo. & Primiti 1 vol.
- STURCHS (D. ION.) Historia hydropis universalis. Eisenach. 1752, 4to.
- SUETON. (C. TRANQUILL.) Opera ex recens. Grevii cum comment. variorum. Traiecti ad Rhenum 1708, 4to.
- SUTODAS Lexicon Graeco Lat., cura Aemilii Puzii. Colon. Allobrog. 1619, fol. 1 vol.
- SUTERLAND (ALEX.) A medical essay vwith observations on the small poxe. London 1750, 8vo.
- SUTTON (SAM.) Methode de pomper le mauvais air des vaisseaux, avec une dissertation sur le scorbut par le Dr. Mead. Paris 1749, 8vo.
- SYMMERDANTI (IOAN.) Biblia naturae, five historia insectorum Hollandica, & Latinae

verſa per H. D. Gaubium. Leidae 1737, fol. 2 vol.

STDENHAM (THOM.) Praxis medica experimentalis, ſive opuscula univerſalia. Lipſiae 1711, 8vo.

SVLVIUS de la Boe (vide in B.)

T.

TABARRANI (P.) Obſervationes anatomicae. Lucce 1742, 8vo.

TACHENII (ORTON.) Hippocrates chymicus. Lugd. Bat. 1671, 8vo.

TACITI (CORN.) Opera, cura Juſti Lipſii. Antverpiae 1668, fol.

TAGLIACOTTI (GAſP.) De curtorum chirurg. per inſiſtione libri duo. Venetiis 1597, fol.

TARGIONI TOZZETTI (Giov.) Prima raccolta di obſervazioni mediche. Firenze 1752, 8vo.

TARGIONI TOZZETTI (Giov.) Sopra le cauſe & ſopra i remedi dell' inſalubrità dell' aria della Valdinevole. Firenze 1761. 4to.

TERENTI (Petr.) Comoediae ſex cum notis variorum, cura Corn. Schrevelii. Lugd. Batav. 1671, 8vo.

THEODOSII (Io. Bapt.) Epistolae medicales. Baſilae 1553, 8vo.

THEORII and practice of ſurgical pharmac. London 1761, 8vo.

TILLING (Io. Chas.) De calculo ad veſicam adhaerente. Lipſiae. 1737. 4to.

TISSOT. Avis au peuple ſur la ſanté. Lauſanne 1761, 8vo.

TISSOT De morbo nigro, ſcirris viſcerum, cephalia, &c. Lauſannae 1760, 8vo.

TITSINGH (ABR.) Verhandelinge over de tegenwoordigke ſpytinge der Ruggegraat. te Amſterdam 1732, 8vo.

TORTI (FRANC.) Therapeuticae ſpecialis ad febres periodicas pernicioſas. Mutinae 1730, 4to.

TOURNEFORT (PITTON) Relation d'un voyage au Levant. Amſterdam 1718, 4to. 2 vol.

TRALLEs (B. LUD.) Vexatiſſimum noſtra aetate de variolarum inſiſtione argumentum. Vratiſlaviae 1765, 8vo.

TRALLEs (B. LUD.) Uſus opii ſalubris & noxius in morborum medela. Vratiſlaviae 1759. 4to. 1 vol.

TRALLIANI (ALEX.) Libri XII. Graec. & Lat. Io. Guinterio interprete. Baſilae 1556, 8vo.

TREMBLEY. Mémoires pour ſervir à l'hiſtoire d'un genre des polypes de l'eau douce à bras. Leide 1744, 4to.

TRILLERI (DAN. WILH.) Epistolae duo de anthracibus, & variolis veterum ad Gothoff. de Hahn. 4to.

TRILLERI (DAN. WILH.) Succinta commentatio de pleuritide eiusque curatione. Francofurti 1740. 8vo.

TRIGEN (CORN.) Obſervationum medico-chirurgicarum ſacculus. Lugd. Batav. 1743, 4to.

TRONCHIN (T.) De colica piſtionum. Genevae 1757, 8vo.

TULPII (NIC.) Obſervationes medicae. Amſtedel. 1672, Elzev. 8vo.

TURNER (DAN.) Syphilis a praetical diſſertation of venereal diſeaſe. London 1732, 8vo.

V.

VADERLANDSCH. Hiſtoire vervattende de Geſchiedeniſſen der Vereenigde Nederlanden. Amſterd. 1749, 8vo. 21 vol.

VALER. Maximi. De exemplis memorabilibus. lib. 9 ad uſum Delphini. Pariſiis 1679, 4to.

VALSALV. (ANT. MAR.) De aure humana: tractatus. Traiecti ad Rhenum 1717, 4to.

VANDEL. (DOM.) Diſſertationes tres de apoplethia, de ſeſſibus terreſtribus, & marinis, & de vermium terrae reproductione. Patavii 1758, 8vo.

VANIER. (IAC.) Praedium ruſticum. Coloniae. 1750, 8vo.

VAN DER MOND. Eſſai ſur la manière de perfectionner l'eſpèce humaine. Paris 1756, 8vo. 2 vol.

VANDEL (HENR. COR.) Diſſertatio inauguralis de muſculo ingreſſu in teſtina & aliis machinis humanae extraordinariis. Lugd. Bat. 1742, 4to.

VERCELLON. (IAC.) *De puercorum morbis, & lue venerea.* Lugd. Batav. 1722, 8vo.
 VERHANDELING. Van de Tegenwoordige Ziekte en Sterfte van het Kuddvee door vier Geneesheeren. in 's Hage 1645, 4to.
 VERHANDELING. uitgegeeven door de Hollandische Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. Haarlem 1755, 8vo. 9 vol.
 VERNEY (DU) *Traité des maladies des os.* Paris 1751, 8vo. 2 vol.
 VESAL. (ANDR.) *Opera omnia anatomica & chirurgica,* cura Hermanni Boerhaave, & B. J. N. Sigfr. Albini. Lugduni 1725, fol. 2 vol.
 VIEUSSENS (RAYMUND.) *Neurographia universalis.* Lugduni 1761, fol.
 VILLERS (SERV. DE) *Analyse des eaux minérales du Chateau Rcy. de Marimour en Hainaut.* à Louvain 1741, 8vo.
 VIOLANTE (PHIL.) *De variolis, & morbillis tractatus.* Dresdae 1750, 4to.
 VIRGIL. (P.) *Maronis opera cum notis variorum.* Lugd. Bat. 1680, 8vo. 3 vol.

W.

WEPFER. (IAC.) *Cicutas aquatilis historia & noxae.* Basilae, 4to.
 WEPFER. (IOH. IAC.) *Observationes medicopraeticae de affectibus capitis internis & externis.* Scaphusii 1727, 4to.
 WEPFER. (IO. IAC.) *Historiae apoplecticorum observationibus, & scholiis illustratae &c.* Amstelod. 1724, 8vo.
 WARHOF (PAUL. GOTTL.) *Disquisitio medica,*

de phlegmone uti in artibus, & in medicamentis. Hanooverae 1735, 4to.
 WARTHON (TH.) *Adenographia, sive glandularum totius corporis descriptio.* Veti-liae 1771, 8vo.
 WIANN. *Pest beschreibung, und infections ordnung.* Wienn. 1727, fol.
 WIEL (STALPART. VAN DER) *Observationum rariorum medic. anatomic. chirurgicarum centur.* Lugduni 1687, 8vo. 2 vol.
 WILLIS (THOM.) *Pharmaceutice rationalis, sive distributio medicamentorum operationibus in corpore humano.* Hag. Com. 1675, 2 vol.
 WILLIS (THOM.) *Opera omnia,* cura Ger. Blasii M. D. Amstelodami 1682, 4to. 2 vol.
 WILLIS (THOM.) *Pathologia cerebri & nervosius generis specimen.* Oxoniae 1667, 8vo.
 WITTINGHAM (CLIST.) *Commentarium ophthalmologicum in urbe Eboracensi, & locis vicinis.* Londini 1733, 8vo.
 WINSLOTT (IAC. BEN.) *Expositio anatomique de la structure du corps humain.* Paris 1732, 4to.

Z.

ZACUT. Lusitan. *Opera medica.* Lugduni 1667, fol. 2 vol.
 ZACUT. Lusitan. *De medicorum principum historia.* Lugduni 1642, fol. 2 vol.
 ZAVIANTI (G. O. VISAARD.) *Della cura de' bambini attaccati dalla rachitide.* Verona. 1762, 4to.

LITTERA Tomum indicat usque ad quintum: at in Tomo
quinto partis alterae inscripta est Littera F,
a NUMERO vero pagina indicatur.

A *Adomen indurari, & tumefari* in febre autumnali incipiens quid designet B 82.
Abdominis vulneris in cavum eius non penetrantis signa A 514: ad peritonaeum usus perveniens effectus A 515, 516: cura A 516, 517. In cavum penetrantis signa A 517: viscerum ibidem illa-
formum diagnosi A 517, 518: cura A 518, 519, 520, 527, 528, 532. *Lae-
forum* diagnosi A 520, ad 524: effe-
ctus A 524, 525: prognos A 525: cura A 525 ad 535.
Abdominis fistularum prognos A 516. Eius-
dem hernia quid A 515.
Abdominalium viscerum viis hepar adeo fac-
cite cur afficiant C 141. Horum *ad*io
cur in integrum quandoque aboleatur C 489.
*Ata*zio, & circa illam observanda D 686.
ad 689.
Abortus quid D 468. Quo graviditatis tem-
pore saepe contingat D 469. *Huius*
stadium *striplex* D 468: causae D 486,
488. Vido causas haemorrhagiae utri.
Abortus in feminis cur frequentior, quam
in brutis D 486. Hunc procurare peri-
culosum D 487, 488.
Abcessus quid A 692. *Huius* causae A
656 ad 659: diagnosi 659, 660: haec
in viscerum *abcessus* difficili C 667.
indicationes A 692 ad 696: cura A
696 ad 716. *Abcessus* maturati diagno-
sis A 701 ad 704: clausi manentis effe-
ctus A 704 ad 709: indicatio A 709
ad 714 per caustica aperti sequelas A
Tom. V Pars II.

715. *Immaturo* non est sperendus A 700.
Abcessus *bifidus* quid A 702.
Abcessus *hepatis, pleurae, pulmonis*. Vido
hepat &c.
Abcessus *apparens, & iterum* *disparens* in
acutis cuius praesagii B 314.
Absterbenis quid A 90, 91. *Acidum* ad
se trahunt A 91. B 118. In intestino-
rum scirrhis utilis C 190.
Aspergentia quid A 71.
Asplenentia in morbis apud Celsum duplex
B 416. *Huius* & *Asclepiadis* est teiicron-
da B 98, 99, 108, 109, 416.
Asplenentia nimia cur febricitantibus mas-
tine febribus nocet B 107.
Accessiones diebus paribus ante festum diem
in ardente cuius omnis B 481.
Aveni vis in putridis morbis quis C 572.
Huius in putridis morbis usus quis A 126,
127, 751.
Acetum medicatum in rabie canina bonum
C 578.
Acidum quid A 80. *Huius* in corpore ori-
go A 80, 81, 82: causae A 82, 83:
sedes A 83, 84: effectus in primis viis
A 84, 85, 86: in sanguine A 86, 87,
88: diagnosi A 88: prognos A 89:
cura A 89 ad 93 B 127, 128, 142.
Acidum quibus familiare A 93, 94. *Illud*
eructantes cur raro pleuritici C 653.
Acida sunt quaedam solventia, coagulantia
quaedam A 177.
Acemii vires F 305, 306. Sanavit invete-
ratam lueem F 203, 204: scumalissimum
F 306, 307.

Y

Acetes

Acrores quid F 219. *Suppressi* rachitidem faciunt F 220.

Acria quaecumque in scirrhis, & canceris nocent A 876. *Ingesta* haec diluta sanguinem subeunt B 30. *Horum* effectus B ibid. & 31, 32: cura B 96, 97.

Acria mechanica quid B 122. *Rubefacientia* quid B 113. *Quid venenata* B ibid.

Acre aromatum tenaci oleo involvitur B 131, 132. *Quomodo* solvatur B 132.

Acrimonia est naturae humanae aliena B 30. *Nutritionem* depravat C 663. *Effectus* D 11, 12, 17, 18, 24, 30: signa hunc iam ab illa affici D 12, 13. Est apoplexiae causa D 308: rheumatismi F 273, 274, 275.

Acrimonia acida quae & unde A 130. *Effectus* signa, & effectus C 663, 664, 308. Est causa podagrae D 293, 295: convulsionum in infantibus C 406.

Acrimonia alcalina quid & eius effectus qui A 130. *Vid. alcatini* spont. morbi. *Biliosa* eiusque effectus A 130: haec corrigenda B 209. *Oleosa* unde, & quae efficiat in corpore A 130.

Acrimonia aquarum in hydropse funesta 107.

Actiones vitales quid A 2: *naturales* quae A 3, 4: *quid animales* A 4.

Ad KIA quid B 590. In acutis cuius praesigii B. ibid. & 601.

Adstringentia quid A 36, 40, 346. *diarrhoeis* cum cautela sunt exhibenda 392. *Incaute data* quid sequatur B 393, 395. In intermittentibus quando indicentur B 572: in anginis quando 677: interne pariter data in magnis haemorrhagiis inutilia A 347, 353: in venter porrecta paralytina facere possunt C 359, 360. In haemorrhagiis hoc modum adhibita quid praestent D 34, 36, 42.

Adstringentia aspera quando antiscorbutica sunt C 634. *Fibram debilem* roborant A 36.

Aer quid B 113. Est omnium haeterogeneorum calos B 123. E 162, 175, 176.

malumatis pessimeri sedes E 157 ad 161.

In multis variorum regnorum corporibus abundat B 223, 247, 715. Omnibus firmiter adhaeret E 314: sed fixus E 315. Ad illorum cohaesionem multum confert E 316. Magna copia reperitur in calculo E 315. Liquidis nostris non solum inest, sed & notabilem solidorum partem constituit C 332, 333, 657. Requiritur ad effervescentiam E 319. A corpore solutus sit elasticus, tamen ab aethmosphaerico differens E 318.

Aeris dotes B 232, 233. Libere primas vias subit B 233: huius in digestionem usus B ibid. Nullam partem magis afficit, quam pulmonem B 713. *Eius* gravitas aëria vix a sanis, ab aëthmaticis autem: illico percipitur B 714. *Aëria* levitas plus discriminis habet, quam aëria gravitas B 715. *Aëris* renovatio cur acute decumbentibus proficit B 314, 315. In nosocomiis valde utilis A 319. Non renovati, frigidi, calidi, fœci in vulneribus effectus A 227, 319, 320. *Correctio* quomodo instituenda A 320. *Ardenste* febre laboranti quis conveniat B 491, 492. *Aër* habet in corpus nostrum efficaciam summam B 123. *Infectus* quomodo corrigendus B 124, 125, 126. Huic saepe debentur omnes febrium causae communes B 128, 129. *Varie* peccant in corpus nostrum effectus, & correctio B 119, 120, 121, 713, 714, 715, 794. *Aër* calidus epilepticum paroxysmum renovare potest C 411, 412: nephritidem facere C 217: *flagrans*, *pulvis*, *umbrosus* melancholiae causa C 505. *Humidus* tepefcens cur melancholicis utilis C 479: *maritimus* ad scorbutum disponit C 595: *humidus* frigidus potagricis nocet D 308: *frigidus* in haemorrhagia uteri prodest D 503, 504.

Aëris circa pectus, & praecordia cur malus B 551.

Aërium varii sunt morbi A 74, 75, 126, 127.

Alcahest Glauberi quid D 368. Datur in podagra. D ibid.

Alcali fixum quid A 113, 204. In corpore nascitur

nascitur nunquam A 113. Laudatur in hydropse D 223, 224: in podagra D 361, 367, 368: in cachexia C 666. Tophis applicatum prodest D 380.

Alcalia infantibus acido laborantibus non danda; sed quid B 240.

Alcalia volatile quid A 113, 114. *Huius* proprietates, & usus A 204. Laudatur in podagra D 376.

Alcalini volatiles spiritus cum calce viva parati cum acidis cur non effervescent E 318.

Alcalini spontanei morbi. Vide putredo.

Alcohol calidum in haemorrhagiis utile A 346.

Alasapharmaca quid B 441. *Horum* in acutis usus B ibid.

Alimenta qualitate, & quantitate peccantia quos producant effectus A 24, 25, 316 B 32, 33, 34. Ex abdominali valvula effluentia quid denotent A 321.

Alimenta cotta que dicantur B 49. Non nutriunt, nisi prius corporis vitibus nutrentur A 3. De ceteris. Vid. cibi.

Alvus diu suppressa febris causa B 35. In morbis non semper illis solvenda B 140. In phremitide cur mala? B 588, 589. Quibus naturaliter strictior B 141. In ardente febre nimis laxa cur noceat B 486, 487: fluxa quibus in morbis bona, & quando B 479, 480, 608, 609: in initio pleuritidis noxia C 48. Quid indicet C 61. Quotuplici modo in apoplexia iuvet C 285. Eiusdem subductio valida cur in angina inflammatoria efficax B 675, 676. Liquida nec critica peripneumoniarum sputa supprimit B 795. Quae ergo bona B 736, 37. Albicans in acutis quid denotet B 589.

Alba, vel *intercepta* in febricitantibus cur mala C 355. Biliosa cum paucis cruore in hepatitide ante quartum diem cuius ominis C 99, 100. Qua ratione haec iuvanda C 102. Alvi deiectione, quae optima B 377: quae lethalis B 376, 377. Per hanc sana aequae, ac morbosae corpore expelluntur B 380. Sincera deiectione quid B 382. Fluxus colliquantius

quid B 382. Hic quibus familiaris B ibid. Eius prognos B ibid. Alvi deiectione sine sensu in anginis cuius ominis B 708. *Huius suppressio* in gravidis uolens D 478, 479. Quomodo aperienda D 479.

Alumen in collyriis cur noxium C 335.

Amalgama solvens in vesica humana plumbum F 98.

Amara obefis proficua C 338.

Amaurosis immedicabilis post acutos morbos unde C 356.

Amylum quid D 106.

Amnios liquore nutriaturne foetus B 652.

Humor excrementitius an sit D 652.

Ammoniaci salis dotes A 201.

Amor melancholiae causa C 466. *Huius* cura C ibid.

Anura quid C 465.

Analytica quid A 775.

Analopia quid doceat A 14.

ANADAPKA hydrops quid C 645, D 246, 157. *Huius* a leucoplegmaria disparitas D 157, 158: prognos D 158, 159: effectus D 159: cura. Vid. hydrops.

ANAZAPKA feroci quid; & eius expositio D 179, 180, 181.

Anasome ad determinandas morborum causas utilis C 414.

ANASTOMOSIS quid, & eius diagnos D 4, 5.

Anchylosis quid: *huius* causae A 97, 593, 607, 705, 949 ad 952: prognos A 953: cura A 46, 190, 191, 951, 952, 953.

Aneurisma verum quid A 160, 166, 287. Eius causae A 287, 288, 289, 294: diagnos A 289, 290: effectus A 166, 290, 291: prognos A 291: cura A ibid.

Aneurisma spurium quid: *huius* a vero disparitas A 296: causae A 294, 296: diagnos A 296: effectus, & cura A ibid.

Angina quid B 618, 619. *Huius* species duplex B 619, 620: prioris speciei causae B 620, 621, 622. *Huius* prognos B 623, 624: posterioris nomina diversa uade

- unde B 624, 625. *Huius sedes variae*
B 626 ad 632.
- Angina aquosa* quid B 634. *Eius sedes* B
635: causae B 635 ad 639: effectus B
639: diagnosi, & prognos. Bibid.: cu-
ra B 640 ad 643. *Hanc speciem cur raro*
dolor comitetur B 634. Quibus sit fa-
miliaris B ibid.
- Angina catarrhosa tenuis*. Vid. *angina aquo-*
sa. Convulsiva quibus familiaris B
Huius causae, prognos. & cura B
706. *Inflammatoria* quid B 651.
causae B 652 ad 655: sedes B 655-
Haec si in *sfisula pulmonali* sit, quae
gnos. B ibid., & 656: effectus B
657: prognos. B 657. Si in *larynge*.
qualis B 657: prognos. B 659. Si
huius & ossis hyoidis *musculis*, quae
659, 660: prognos. & effectus B 660.
Si in *pharynge*, qualis B 661, 662.
effectus, & prognos. B 661, 662.
in *tonsillis, uvula* &c. quae B 663, 664.
prognos. B 665: symptomata B 666, 667.
Generalis *harum quinque specierum* pro-
gnos. B 668, 669, 670. Exitus *qui*
druplex B 671: *primae*, & *secundae* *speciei*
cura B 681 ad 684. Omnibus
non vel sero, vel frustra tentatis quae
agendum. Vid. *Exorcismus*. *Anginis*
inflammatoriis, qui maxime obnoxii B 65
Quo anni tempore frequentiores *haec*
654. *Harum species*, quae saepe leth-
les, & cur B 661, 662. Quae min-
periculosa B 664, 665. Omnium fr-
quentissima quae B. 663, 664.
- Angina omnium morborum inflammatori-*
rum maxime volubilis B 678. Ad quae
loca metastatice deponi soleat B 679
680.
- Anginae suppuratoriae* signa, & tractatio
693, 694. Quo versus rumpi soleat *cuius*
abscessus B 694: cur hic quandoque v-
nae sectionem postulet B ibid. *Angina*
raro, vel nunquam suppurantes quae
695.
- Anginae gangraenosae instantis*, vel iam pra-
sentis signa B 696, 697: causae B ibid
effectus B 697: prognos. B ibid., & 698,
699.
- Angina scirrhusa* quid B 644. *Huius cau-*
sae, & cura B 644 ad 650: diagnosi
B 644, 700. Prognos. 700.
- Angina oedematosa*. Vid.
- Angina aquosa*.
- Anginae paraliticae* causae, signa, & pro-
gnos. B 701 ad 705.
- Angina suffocativa*. Vid.
- Angina convulsiva*. Corollaria ad *anginarum*
prognos. formandam spectantia B 706
ad 709.
- Animalium spontanea degeneratio* quae A
107, 109, 704.
- Animi affectus* quid A 147 C 475. *Horum*
in corpus nostrum effectus A 147, 148
B 719 D 497. Generant *apoplexiam* C
528: *epilepsiam* C 413, 414: *marasmodum*
C 663: *haemorrhagiam* in gravidis D
497: *podagram* D 306, 307: *syncopen*
C 365: in *peripneumonia* *sputorum* sup-
pressionem B 796. In *hypochondriacis*,
& *hystericis*, quos in *sistema urinolum*
edant effectus C 180. *Puerperis* sunt pe-
riculosi D 601, 602. *Melancholicis* *quales*
sunt C 475.
- Animi affectus* quomodo corrigendi A 147,
148, 149 C 512, 513, 514. *Oppositi*
in *melancholia* profuerunt C 478, 513.
- Animi deliquium* robustis periculosius, quam
debilibus A 176: huius a larga sangui-
nis missione *instantis* signa A 214, 215.
- Animi perturbationes* quos morbos sanave-
rint C 383, 384.
- Anodyna* quid A 322. *Horum actio* A ibid.
In *epilepsia* quando bona C 444. In
febris quando profuit, quando obfuit
B 159, 172: item in comate B 343:
in delirio quando B 332. Quem in va-
riolis habeant usum E 110, 111, 112.
Viam calculo parant E 303, 304.
- Anthrax* quid A 729. *Huius species*, &
cura A ibid.
- Anidotum libidinis* optimum F 36.
- Anii emetici Riverii* compositio, & usus B
261. Actio quae B 261.
- Antihysterica* quid B 243 C 445. *Diver-*
sorum in diversis casibus utilitas B 243.
In *epilepsia* quando dentur C 444, 445.
Sub

I N D E X

- Sub partu quando D 523. Quum indicantur in graviditate, parva dosi. danda D 476.
- Antimonium expectorans* esse videtur B 797. Hoc & *praeparata* in variolis data sunt E 61, 62.
- Antimonii butyrum* quid A 803. *Eius* in sphacelo usus A ibid.
- Antipleuritica specifica* sunt innocua C 49.
- Antiscorbutica* quando, & quomodo exhibenda C 625, 626, 627: quando contra indicata C 628. Laudantur in hydropse D 262, 263: in podagra D 361, 364. Internae etiam sumta tumores rheumaticos dissipantur F 310.
- Antispasmodicum universale* non datur B 361.
- Anxietas* verbis explicari non potest B 189. *Eius species* B 195: unius ab altera dissipata B 194.
- Anxietatis febrilis* causae B 189 ad 193 effectus B 193, 194: cura B 200 ad 207. Quae ab affecto genere nervoso est, quomodo noscatur B 197. *Huius* cura B 201, 202, 203. *Anxietas* in omni fere morbo circa mortem adest B 197, 198. *Eius summus* sensus unde in intermittentium frigore B 62. Illa phthysicorum unde D 76.
- Aorta* quid A 266. *Huius vulneratae* prognosis A ibid: ligatae experimenta A 185.
- Aphthae veterum* quid C 196: cura ab illis quomodo instituta C ibid. & 197. Hae apud recensiores. quid, & quomodo fiant C 198, D 57. *Earum* sedes C 199. Quibus familiares C 200, 201. *Earumdem* cum miliaribus comparatio C 200. Causa proxima C 198, 199: remotae, symptomata eas praecedentia C 201 ad 205: diagnosi, & prognosis C 205 ad 208, 211: effectus C 208 ad 211, D 58: cura C 211 ad 216. Collaria quaedam solvuntur C 216 ad 221. *Aphthae* etiam criticae dantur C 202, 203. *Aphthae* causa phthisis D 57. In ultimo phthisis stadio saepe cur observentur C 204, 220.
- Apoplegmatismi* quid B 641. Ubi indicentur B 643.

- hydrops* subitaneae causa C 333, D 192, 193: *hydrops* thoracis D 136. *Frigida* affatim haulta actuante corpore haemoptysin fecit D 23: sensum & repetitis vicibus spora sedavit haemoptysim D 38 ad 41: imo exteroe applicata D 41. In sui febrili haec an conueniat B 214, 215. An in febrili continua putrida condenda B 442, 443. *Huius affusio* quando convulsionem solvat B 360, 361. *Haec ipsa* fibras roborat A 463: *tepidus* autem laxat A 39, 44, 46, 190. *Huius vapor* magis efficax A 190: *inspiratus* anxietates circa vitalia lenit B 205: in flatibus cur bona B 219, 140. *Eadem* *Hauius potius* abusus ventriculi, & intestinorum stuporis, & paralytis causa esse potest C 362, 367. *Calida nimis* gradus quis A 832, 833. *Huius effectus* A ibid.
aquae stagnantes epidemicorum morborum causas E 171.
Aquarum medicatarum principia C 345: *usus* in chronicis C 345: in hydropse D 221, 222: in melancholia C 515: in podagricis quibus in morbis conueniant C 345, D 578. *Aquae Carolinae, Spadunae, Selteranae* in quibus *Antoniana, Buchensens, Wildungenses* in quibus C 335. *Spadunae* quando in epilepsia bonae C 449: *ferratae* quando ferro antependae C 660.
'Ardens febris. Vid. Febris.
Argentum vivum. Vid. Mercurius.
Aristolochicorum classis duplex D 630. *Quando indicata*, quando non D 631. *Aromata* unde doceantur C 336. *Horum abusus* quae mala faciat C ibid. *Calida* cur non conueniant in aquae mercuriali C 336. *Rheumatismum* facere Aromaticarum plantarum producta, praeparata, usus, & exhibendi forma C 376, 377, 378.
Arsenicum tendinibus vulneratis applicatum convulsionem creat A 221: fixatum per nitrum ad haemorrhagias sistendas notum A 221. *Arsenici vaporis effectus* B 715. Mictum cruentum fecit C 227, 228. *Arsenicale amuletum* in febrium causa adhibuit pessima produxit symptomata B 113.
Arteriae dilatatio est cordis contractionis synchrona B 16. *Minoris* integre vel partim dissectae phaenomena A 233, 234: *maioris* in integrum dissectae effectus A 234, 235.
Arteriae asperae hydrops D 145, 146. *Huius* diagnosis, & cura D 146. *Eius vulnera*, & horum prognos A 268.
Arteriotome in phrenitide laudatur B 613. Maniam sanavit C 532. In epilepsia quando utilis C 441. Quibus in casibus venae sectione praestet A 158, 159.
Arium tumor in phthisi cuius omnis D 78. *Horum vulnera* non sunt absolute lethalia A 278. *Inferiorum venae* cur ceteris valvulas plures habeant C 603. *Horum tumor* subitus quos saepe levet C 373.
Ascarides quid D 709, 710, 711. Vide vermes.
ASZRITE quid 160. *Huius* a tympanitide disparitas D 172: species triplex D 160. *Diagnosis primae* speciei D 165, 166. *Secunda* species. Vid. hydatides. *Diagnosis tertiae* speciei D 163, 164: *prognosis* D 164: cura. Vid. hydrops.
Asites purulenti unde nasci possit A 732.
Asparagi podagrae paroxysmum accelerant D 305, 306.
Asthma anxietatis causa B 199.
Atheroma quid A 111, 165. *Anginam* facere potest B 636.
Athmosphaera. Vid. Aer.
Atonia musculorum quid C 353.
Atroliarius humor quid C 464, 465. *Huius principia* C 476: *causae* C 465 ad 471: *diagnosis* & *effectus* C 471 ad 476: *prognosis* C 477: *cura* C 477 ad 481. *Hic humor* cur, quando, & quo deponatur C 481, 482. *Huius depositio*

tionis diagnosis, & effectus C 483, 484;
indicatio C 485, 486, 487: *cura* C 487,
 488.
Attribilis quid A 853 C 488, 489, 490.
Cur ita dicta C 463. *De illa quid cen-*
suerunt veteres C 461, 462, 463. *Huius*
species duplex A 853: *effectus* C 488,
 489: *signa* C 490: *cura* C 490 ad 493.
Natura quandoque *hanc* perit, & tunc
quid agendum C 508, 509, 510.
Attribilis turgens quid A 853 C 493, 494.
Eius proprietates C 499, 500: *eiusdem* a
simplici attribile disparitas C 494: *causae*
 C 493 ad 496: *effectus* A 117 C 496
 ad 499: *prognosis & cura* C 500, 501.
Metastases quando *locum* habeant C
 497. *Vomicae*, dum *rumpuntur*, quibus
cum symptomatibus id fiat C 497, 498.
Atrophia quid A 58 C 643. *Huius* a
cachexia disparitas C 643. *Partem paraly-*
ticam si occupet, cuius *omnis* C 369,
 370.
Attentionis definitio & effectus B 310.
Attenuantium efficacia quibus *promoveatur*
 B 166.
Attrahentia quid A 101.
Avenae decocti cum oxymelle in *febrili ca-*
lore usus B 309.
Auris dolor in *acutis* quid *indicit* B 329.
Tinnitus ab *encephalo affecto* cuius *prae-*
sagii C 193.
Autumnales febres. Vide *Febres*.
Autumnus cur *morborum maxime ferax* B
 36. Est *rheumatici causa* E 649, 650.

B

B
Balnea quae cachecticis convenient C
 661. *Calida* in *flatibus*, & *spasmi* adhi-
 bentur B 244: *epidica* in *rheumatismo*
 bona F 298, F *ibid.*: *frigida* cum *suc-*
cessu ibidem *data* sunt F *ibid.* & 199,
 300: *item* in *paralyfi* C 387. *Cur saepe*
in pertinacissimis morbis profuerint
 B 65, 66.
Balnea pedum quando in *apoplexia* adhi-
 benda C 306: in *cataplexi* C 321: in
mania C 335: in *menium suppressio-*

ne D 438: in *scorbuto* & *quae* C 627.
Horum in *variolis* usus *quis* E 75, 107,
 108, 109.
Balnei terrae in *phthisi* usus, & *adhibendi*
modus D 101.
Balneum vaporis *rigidas*, imo *durissimas*
partes emollit B 142, 143. In *paralyfi*
quando conducatur C 386: in *obstructione*
nibus laudatur A 191, & *quandoque*
in alcalino spontaneo A 129.
Balsama laudantur in *haemoptoe* D 42. In
phthisi D 88, 89, 93.
Balsama nativa quid *analyfi* *chemica* exhi-
 beant A 327. *His* *vulnera* cur *inasciri*
non debeant A *ibid* & 333. In *renum*
ulcere bona C 240, 241. *Haec* *artificia-*
libus in *ulcere pulmonum* praeferenda B
 789.
Balsamus sulphuris antimoniatu quid D 381.
Barba quando *nascatur* B 325. *Cur* *hac*
careant castitati B *ibid.* & 326.
Betae folia cuti applicata *efflorescentias* re-
 vocant C 412.
Biliosae febres quando *grassare* solent B
 44. Cum *hepatide* quando *observentur*
 C 87.
Bilis quid A 105. Est *inter inquilinos hu-*
mores acerrima C 86. *Magna* *copia* *fer-*
citur C 94. *Eius* *usus* A 96, 97,
 117, 119, 105. In *sanguinem* *resortia*
ad *usus* *efficacior* *evadit* C 96. *Magna*
copia in *ventriculo collecta* *appetitus* *tolli-*
lit B 219, 220. Ex *abdominali* *vulnere*
effluens quid *designet* A 521. *Huius* *vo-*
mitus in *capitis* *vulnere* quid A 434.
Bilis accensa quid B 44.
Bilis atra. Vide *Atra-bilis cystica*, cur in
exitu *retardetur* C 87. *Huius* in *cystida*
degeneratio *quae* C 499, 500. *Sympto-*
mata & effectus C 500.
Bilis aeruginosa unde fiat C 429.
Bilis hepaticae a cystica *disparitas* C 96.
Facile in *sanguinem* *regurgitat* C 126.
Regurgitationis effectus C *ibid.*
Bilis animalium saepe *pulcrum* *dat reme-*
dium B 121.
Boli armenae *dotes* A 128. *Medicatae* in
morbis *putridis* *profunt* A 129.
 Borax

Borax quid A 203. *Huius* natura & do-
res A 204.
Borberygmus quid A 85 B 237.
Bronchia quid A 269. *Horum* vulnera cur
periculosa A ibid.
Bronchocele quid D 245. *Eius* cura D 246.
BRONXOTOME quid B 685. Quando in-
dicetur, quando non B 684 ad 687.
695. Abique periculo vitæ institui po-
test B 686. Ubi & quomodo instituenda
B 687, 688. *Instrumenti* ad hanc ope-
rationem expositio B 688, 689. *Hac* in-
stituta quid superstit B 690, 691.
Butenes quid A. *Horum* sedes A E ibid.
Inter eorum nascentium ligosa F 67. Sunt
recepti in venas contagii indicium F 68.
Quo citius a suspecto concubitu appa-
rent, eo peius F 68, 69. *Horum* ab
aliis inguinum tumoribus disparitas F 69:
cura F 123, 124, 125. *Suppurantes* an-
te perfectam maturationem aperti scirrhus
relinquunt A 858.
Bulimus quid D 716.

C

Cachectici cur ad motum alacritate de-
sistantur C 645, 646. Cur *Plurimi*
fiant in urbibus obfcessis C 649. *Ho-*
rum qui evadunt, qui pereant C 650.
Cachexia quid C 636. *Plurimos*
comitatur C 637. *Eius* causa *morbos*
proxima C 637, 638: remotæ C 638 ad 642.
647, 648, 649: effectus C 642 ad 647.
diagnosis C 649: prognosis C ibid. &
650, 651: indicatio C 652 ad 654.
cura C 654 ad 655. *Cachexia* *hydro-*
pis, leucophlegmatiae, & tabis *causa* C
642, 643, 644: item palpitatio-
nis C 644, 647. *Cachexiae* causa *dum*
nullis signis detegitur, quid latero su-
spicetur medicus C 641.
Cacoehymia quid B 296. Cur non *adeo*
facile solvitur, ac plethora B 310. *Ne-*
cessario cachexiam comitatur C 336. *Ad-*
modum diversa in diversis observa-
tur C 644. *Arabituraria* apoplexiam facere
C 264: glutinosa pariter C 258, 263, 264.

Cadaverum inspectio summi in medicina usus
A 13, 14, B 604, C 318.
Cæsarea scissio quando indicata D 548 ad
554: eisdem cum cautelis in mortua in-
stitui debet, ut in vivente D 551.
Coffæ potius abusus sanitati nocet F 216.
Calcanei fracturæ effectus A 560.
Calculus quid E 201, 245. *Huius* sedes C
245, D 59, E 201, 215 ad 224: eius
materiæ, & originis indagatio E 201,
202, 203. Rudimenta in sana quavis
urina habentur E 203.
Calculus natus quid E 204. In maiorem
excrecere vix potest, nisi alia accedat
causa E 204, 205. Qua ratione id fiat
E 205, 210, 211. *Calculi* rudimenta cui
corpori facilius uniuntur 209. *Helmontii*
sententia de calculi generi est falsa E 212
213, 214. *Eius* ergo materiæ quæ sit
E 225 ad 233. Circa hanc observatio
quid doceat E 233 ad 239. *Analysis*
chemica quid E 239 ad 245: calculi dia-
gnosis sæpe dubia, imo deficiens E 245.
Ad hunc iuniores cur adultis promiores
E 227, 249. Inter illos pauperculi cur
magis E 227, 249. Viris mulieres cur
minus pronæ E 227.
Calculi renalis generis E 273 ad 278: ef-
fectus E 250 ad 253: indicatio E 299:
cura E 300 ad 343. *Huius* remotioni in
pelvi facientes causæ E 254, 255: ef-
fectus, & cura E 343. Hic per ureteres
transiens unde retardetur E 255, 256.
257 *Huius* diagnosis E 344, 345: ef-
fectus, symptomata E 256 ad 260: in
vesicam delapsi diagnosis E 344, 345, 346,
348 ad 299: non est determinata de-
facilis E 282, 283. Hoc in vesicam de-
lapso quid contingat E 260, 261. *Huius*
natura unde noscatur E 262, 263. *Uri-*
na cur tunc foetet E 262. Effectus E
264 ad 270: cura E 347, 348, 355
ad 369. Scissio vesicæ quando instituenda.
Vid. Lithotomia. *Calculi* quandoque
levius, quandoque molestius habent E
263. *Stranguriosum* urinae stillicidium per
se non dat certum calculi vesicæ signum
E 287: viscosum eius sedimentum non
est.

est pus proprie dictum E 287 ad 290. *Calculi* in collo vesicae haerentis effectus, & cura E 349 ad 355. *Calculi* in vesica *solles nati* interni causa C 132. Huius causae diagnosis C 133, 134: cura C 134 ad 137. *

Calefacientia cur ita dicta B 300, 301.

Calus quid A 167. *Huius* natura A 192: causa proxima A 167: effectus A 167, 192: cura A 192.

Callus ossium quid A 363, 364. Quomodo fiat A 374, 375: quantum temporis requiratur, ut fiat A 391, 392, 393. *Luxuriantis* cura A 395: *deficientis* restitutio A ibid. & 396.

Calor corporum aequalis est aëris *ambientis calori* B 173. *Calor corporis* nostri unde A 143: *huius* vari gradus esse possunt A 332: horum effectus A 177, 832. *Praesentis* vitae comes, & signum est A 783. Semper superat atmosphaerae *calorem* A 797. *Caloris externi* in corpus nostrum effectus A 41, 119. C 361. *Hic*, si maior, rheumatismi &c. causa F 276, 277, 278. Quae hic loci indicata F 278. Quibus apoplexiam facere possit C 266, 306. *Calor* adolescentulorum vegetorum aegris debilibus applicatus quid boni praestet B 163. *Calor hominis* sani lateat in liquidis aërem extricare non valet B 233, 234: calor febres producit B 41: pro diversa febris indole variat B 24, 25. *Caloris febrilis* diagnosis B 287, 288. *Hic* quomodo mensuretur B 287. *Huius* causa B 290 ad 300. Gradus sequuntur causae augmentum B 301, 302. Effectus B 302 ad 305: prognosis B 305: cura B 303 ad 313. *Calor* in chloroticis, leucophlegmaticis cur deficit B 292. *Huius augmentum* cur adeo cito ab assumtis percipiant phthisici B 300. *Mordax* & de profundo *emergens* quid in febris detinet B 423, 424.

Calvaria quomodo perforetur. Vide Trepanum. *Huius perforatae* cura A 481, 482, 488, 489: symptomata hanc perforationem quandoque comitantia A 483 ad 486:

prognosis A 486, 487, 488. Haec perforatio in epilepsia quandoque felix C 444. *Calvariae confusio*. Vide *confusio*. Eius delatio quid A 414, 415: *fractura* quid. Vide *Fractura*.

Calvariae figura A 395. *Huius* cognitio pro vulnere profunditate detegenda utilis est A ibid. *Mala configuratio* epilepsiae infantum causa frequens C 436. *Vulna* a pro causarum varietate diversa sunt A 412 ad 415: horum diagnosis A 415 ad 420: effectus A 420, 421, 422: prognosis A 422: indicationes A 422, 423: cura A 423 ad 429. Exploratio quomodo instituenda A 415 ad 420. *Locus vulneratus* quomodo detegatur A 424, 425: *huius* mundatio A 425.

Calvariae fissura. Vide *Fissura*. *Haec* fissura, fracta an semper terebranda A 422, 423.

Calvariae intropressio duplici modo fit A 414: *intropressae* effectus A 431 ad 441, C 408: diagnosis A 441: cura A 442 ad 445. *Haec* fissura, fracta, confusa, si tumantur vasa quaecumque, quid sequatur A 445 ad 450. *Effusorum* in cavum cranii humorum diagnosis A 450 ad 453: locus collectorum humorum quomodo detegatur A 453 ad 459: indicationes A 459, 460: cura A 460 ad 489.

Calx in calculo laudatur E 317 ad 327.

Eius aqua praestat E 377 ad 382: eius lixivium quibus conveniat, quibus non B 130. Sub eius usu cur urina sedulo examinanda B ibid. *Calx* recens sedificia *inruflans* apoplexiam producere potest C 278.

Canalis quid A 160. *Huius axis* quid A 64. *Canalium* nostrorum per perpendicularum ad axim sectio quae A 465. *Detritus* quae. Vide, *Vasa*.

Cancer quid A 872, F 21, 22, 38.

104. Eius a scirrho disparitas A 873:

item a gangraena, & sphacelo A 884.

Cancer aquaticus quid A 749, 766. Est

aliquando epidemicus A 766. *Huius* si-

gna, & cura A ibid. & 767.

Cancer occultus quid A 875: *apertus* sive

ulcerosus quid A ibid.: *fungosus* quid A 879.

- Canceri fodes* A 878, 879. *Causa proxima*
 A 873. *Remotae* A 876 ad 880. *Oculi*
diagnosis A 880 ad 894. *Prognosis*
 A 890, 890, 894, 895, 896. *Cura*
 A 890 ad 900. *Curatio per exstirpationem*
 quando institienda, quando non
 A 890 ad 894. *Perfecta* non datur, nisi
canceri causa auferatur cum cancro A 894.
Palliatio A 897 898, 899. *Cancer oc-*
cultus per plures annos in corpore sine
 incommodo haerere potest A 889. *Aperti,*
 sive *ulcerati* diagnosis A 883. *Effectus* A
 883 ad 889. *Cura palliativa* A 900, 902.
Exstirpatoria A 902. *Prophylactica* A 903,
 904. *Eius malignitatis gradus* unde de-
 tero, si in alia corporis parte scirrhus est,
 ille brevi in *cancrum* mutatur A 891.
 Non integre ablati, reliquiae peius repul-
 lant A 891, 894. *Canceri radice* quid
 A 893. *Eiusdem semen* quid A 894.
Canceri insanabiles, curatu difficiles qui
 A 894, 895, 896. *Canceri in internis*
 etiam partibus deprehensi sunt A 904.
Horum diagnosis A 882. *Effectus* A 904.
Canceri Ab interna causa orti, etiam re-
 autem recidivas rarius faciunt A ibid.
Canceri veneri generis F 38. *Sedes* F
 39, 40. *Cura* F 130 ad 137.
Cantharides variis corporis partibus applica-
 tae quid faciant B 41. *Usum in frigi-*
dis morbis usus B ibid. *Usum in ternis*
 aliquibus in hydrophobia arcaenum sed
 an tutum C 578. Merito *suspectus* ha-
 betur C 47, 501; adeoque in *Gonor-*
rhea nocet F 115, 116.
Caput anginae inflammatoriae causa B
 Item apoplexiae C 270, 271. Haemo-
 D 12, 23. Peripneumoniae B 717.
Capitulum origo D 78. *Horum descriptio*
 phthisi causa D ibid. *Usum in morbis*
 cuius utilitatis B 143, 144, 283.
Caput magnum cur apoplexiae obno-
 C 255. *Huius cum ventriculo ma-*
 est consensus C 147. *Eiusdem comp-*
 in infantibus farinatosi, & convulsioni-
 ginem dedit C 330. *Integumenta* quatuor
 653.
 718.
 in
 morbis
 xium
 805.
 pressio
 ori-
 quatuor
- plicia* A 390. *Externorum laesorum* dia-
 gnosis A 391, 392, 393; *prognosis*, &
effectus A 393, 394. *Cura* A 400,
 401, 402. Magnae cur sequi soleant
cicatrices A 394. *Raro cur deliganda*
 A 400, 401, 402. *Capitis contusio*: vi-
 de *contusio*. *Capitis vulnera* varias eius
 partes laedere possunt A 390, 391.
 Quid in his prima deligatione inquiren-
 dum A 391. Quando *incidenda*, *dilatan-*
da: & hoc factu quid superfluum A 404,
 405. *Eadem & contusiones* levia licet post
 longum temporis intervallum subito saepe
 mortem inferunt A 252. In his praeci-
 pua cura spes quae A ibid. *Huic* in
 epilepsia proluere C 443, 444. *Capitis*
ulcera in infantibus manantia cur non
 exsiccanda C 411.
Carbunculus quid? A 730. *Anthrax* affinis
 est A ibid.
Carbonum vapor, nidor soporem apoplecti-
 cum fecit C 278, 279. Hoc tacti quo-
 modo tractandi C 310.
Cardia quid A 85. *Veteribus* quid C 419.
Eius nervorum per dissectionem experi-
 menta A 254, 255, 256.
Cardiaca quid B 159, 160, D 219. *Ho-*
rum divisio D 214. *Laudantur* in mania
 C 530, 531: in melancholia C 517:
 in podagra D 369. *Cautelae* in his Hy-
 dropico porrigendis D 214, 215: item
 perturienti D 522, 523: puerperae D 588.
Cardialgia quid C 419. Est epilepsiae cau-
 sa quandoque C ibidem.
Caries quid A 421, 942. *Huius* ab exfu-
 liatione & ossis abcessu disparitas A 421,
 942. *Haec* unde sit A 917 ad 920,
 931, 934. *Diagnosis* A 945, 946; *pro-*
gnosis A 946, 947, 948; *effectus* A 943,
 944, 947, 948: *cura* A 936, 937.
Carnianitia quomodo agant B 240. *Flatus*
 aequae producant ac pellunt B ibid.
Carnes animalium saporem valde diversum
 habent A 316. *Harum insula* debilibus
 profusum A 31, 32. Si nimis spissae, no-
 cent A ibid. Ex quibus *carnibus* optima
 parentur A ibid. *Horum* in putredinem
 proclivitas quomodo emendetur B 8c8.
 Carnes

Carnes salitae, *infumatae* ad scorbutum disponant C 597.
Caro fungosa in vulneribus unde A 319: *huius cura* A ibidem.
Carotidum arteriarum ortus, decursus & divisio A 266. *Harum* vulnere prognos A ibid.
Carunculae quid F 77. *Harum* symptomata, & effectus F ibid. *Illae* post gonorrhoeam non adeo frequentes, ut vulgo creditur F 78 ad 83. *Variae* ad illas extirpandas *methodi* F 83 ad 86, apud *Iacobum Daran* quomodo tractentur F 86 ad 91.
Carus quid C 323. *Huius* ab apoplexia, lethargo disparitas C 323, 324: causae 325: prognos C ibid.: cura C 326.
Casus unde fiat A 109. *Huius* indoles A 115. Singulare viscidum speciem in corpore format A 114, 115. Quomodo patretur C 598. *Huius abusus* ad scorbutum disponit C ibid. Curatum revocat C 626.
Cataleptis quid C 311. *Huius* a tetano & apoplexia disparitas C 312. Signum pathognomicum C 311: causa proxima C 312, 313: remotae C 315 ad 318: effectus C 314: prognos, & exitus 319, 320: cura ope naturae C 318, 319: artis C 320, 321, 322. *Cataleptis* atrophiae causa C 319. *Vera* in acutis raro observatur C 318. *Cadaverum* insipido quid hic doceat C 318.
Cataphora. Vide Coma.
Cathartici expositio D 316, 317, 318. Symptomatum diversitas unde B 634, 638. *Hic* quando maxime affligat, & quibus familiaris B 638: est saepe causa phthisidis D 2, 56, 57. *Cathartici* materiae evacuatio suppressa podagrico noxia D 308.
Causas. Vide Febris ardens.
Cauteria actualia quae dicuntur A 345. *Horum* in haemorrhagiis sistendis usus non est tutus A 345, 346. In epilepsia quis C 431. *Hic* plurimos morbos tentant veteres C 67.
Cauterium potentiale quid? A 346. Quibus

constet A 804. *Huius effectus* A ibid.
Cerebellum cerebro tutius defenditur C 254. Insigniter laedi potest superfluitate vita C ibid. Hinc *huic soli* an motuum vitalium origo adscribi possit C 255. *Huius vulnera* quando lethalia A 259. *Huius vulnera* circa hanc rem facta A 259. Experimenta circa hanc rem facta A 251.
Cerebrum est sensoriorum sensorium C 254. Locum habet, a quo omnes nervi sensigenam habent B 323. *Huius actio* an decessata sit A 455 ad 459. C 289. *Membranae* in phrenitidis subscirrhosae sunt repetitae B 604. *Cortex* in capitis vulneribus in fungos excrescit A 419, 440. *Hic* ante mortem subidere solet A 484. *Resedi* cito recrescunt *cerebri actione* illibata A 485. *Horum cura optima* A 485. *Cerebrum* inflammationi, & supurationi subiectum est A 137, 438. *Huius vulnera* non semper sunt lethalia A 251. *Horum* diagnosi, & effectus A 441. *Cerebrum* quale in apoplecticis inventum C 261, 263. In maniacis quale C 522.
Cerevisiae praeparatio A 105. F 246. *Quae* in rachitide laudetur *species*: in phthisi quae D 94, 95. *Meractor* bene fermentata cardiacum movens optimum B 160. Laudatur in glutinoso spontaneo A ibid.
Chiniae radix non magis in luc usus F 200, 201, 202.
Chirurgia est medicinae pars vetustissima A 217.
Chirurgo in vulneribus quae scitu necessaria A 220, 278, 284, 285.
Chlorosis quomodo nascatur A 101. *Huius initium* ubi conspicitur C 472. *Hae* laborantes puellae cur tument A 204. Diagnos, prognos, & effectus A 126: cura. Vid. glutinosum spontaneum.
Cholera totum corpus subito exhaurire potest B 376. *Huius cura* B 388.
Chronicorum morborum causa generalis duplex C 319, 330: prioris causas, & cura C 331 ad 340: posterioris in fluidis effectus, & cura C 340, 341, 342: item in solidis C 342. *Utriusque* causas effectus C 342.

- C 342. *Hos morbos in quasdam classes reducere cuius utilitatis* C 347. *Regulæ in his diæteticeæ* C 343, 344. *Curandi methodus cur non adeo diversa* C 344. *Curæ generales* C 344 ad 349: *prognosis* C 347.
- Cyphicationis*. expositio D 335, 336.
- Cylus* in sanguinem quomodo ingreditur B 716. *Per venas melaeraicas non sorbetur* A 276. *Ingressus huic pro tempore supernat, quum sit levior* A 174. B 294. *Febriculam, & dispoceam levem facit* B 49, 716. *In sanguinem quomodo mutetur* A 137, 138, 174. *Ex abdominali vulnere effluens quid designet* A 521.
- Cibi vis quid* B 104. *Cibi austeri, duri, terrefres ad melancholiam disponunt* C 469, 470. *Laborum horror in acutis quid designet* B 451. *Laborum intropulsio quid sit* B 276.
- Cicatrix quid* A 342. *Huius nascentis, signa* A *ibid.* *Hanc tractandi modus.* A 342, 343, 841, 842.
- Cicutæ aquaticæ radix convulsiones lethales creavit* A 372. *Epilepsiam* C 420. *In his casibus vomitus optima cura* A 371, C 420. *Cicuta Storkii luem ad omnia rebellem sanavit* F 202, 203: *etiam arthritidem* F 303, 304: *gonorrhoeam in veteratam* F 153. *Testem venerum in rhosum dissolvit* F 129.
- Cinnabaris suffumigia in lue efficacia* F 141, 144. *Sed non ita* F 143. *Hinc exoleverunt, nisi in malis* F 145.
- Circulatorii motus aucti causæ* A 138 ad 142: *effectus* A 142 ad 145: *diagnos.* A 145, 146: *cura* A 145 ad 151. *Eius defectus quos morbos producat* A 151. *Vide Plethora.*
- Clamoris effectus* B 53, 717, 718. *Est hæc mopylis causa* D 22, 23.
- Clavus quid* A 167. *Vid. Callus.*
- Clystrata laudantur in apoplexia.* C 306: *in diarrhoeis* B 391: *in febriliter* B 497, 498: *in flatibus* B 102, 105: *in hydro-*
- phobia* C 575: *in ileo* C 134: *in nephritide* C 234, 235: *in paraphrenitide* C 76: *in peripneumonia* B 807: *in pleuritide* C 48. *Ad partum disponunt* D 528. *Febrim imperui moderamen afforunt* B 168. *In hoc casu venæ sectionibus feliciter substituantur* B *idem.*
- Costa cur solum in morbis movenda, non cruda nisi turgeant* B 141, 142. *Per quas vias eliminari soleant* B 51. *Natura quomodo hic iuvanda* B 167.
- Costio in morbis quid dicatur* A 693, B 49. *Quibus signis cognoscatur* A 694, B 475. *Huius ab alimentorum coctione differentia* B 49. *Hanc febris ipsa facit* B 50. *A quibus turbari possit* B 57, 58. *Determinatum temporis spatium requirit* B 468.
- Coeliaca passio quid* B 372.
- Cogitationes mutantur, mutato corpore, A* 225, 237.
- Colicæ pîzonum effectus* A 225, 237, B 245: *medela* B 245, 246.
- Colici qui dicantur* B 250. *Cur statibus & ructibus vexentur* B *ibid.* & 251.
- Collyrium quid* A 722.
- Coma quid* B 337. *Huius species binæ* B *ibid.*: *harum disparitas* B *ibid.* & 338. *Posterior quibus familiaris* B 337. *Comatis cum somno naturali comparatio* B 338: *causæ* B 338 ad 341: *cura* B 341, 342, 343. *Coma cur abortivis froquens* B 339. *Comatosus gangraena a decubitu facpe accidit* B 341.
- Combustio unde* A 832. *Huius effectus* A 883, 884: *gradus quibus analogi* A 834: *diagnos.* A *ibid.*: *prognosis* A *ibid.* & 835: *cura resolutoria* A 835, 836, 837: *in gangraenam iuvare cura* A 838, 839. *In crustis gangraenosas, & spha-celatas adæ quomodo tractanda* A 840.
- Combustis locis applicata remedia semper renovanda sunt* A 836. *Bulle eisdem in locis occurrentes, non semper gangraenæ præsentis indicium dant* A 838. *Hæc non sunt pertendendæ* A *ibid.*
- Conceptioni aptissimum tempus quod* D 410, 411. *Fœminam ad hanc aptam esse lig-*

gnum D 398. *Huius fadae* diagnosi D 450, 451.

Conceptus falsus D 594, 596: *veri* varia sedes D 557.

Concreiones variae in corpore nasci possunt, morbis variis originem praebentes A 109 ad 113.

Coniugium est summum subinde emenagogum D 445, 446.

Consuetudo in omnibus, tum & in morbis consideranda A 313, 314.

Consumtio quid A 123.

Contagium. Vide epidemia.

Contusio quid A 536. *Huius effectus* A 536 ad 543: diagnosi A 544, 545: prognosis A 543, 544, 546, 547: cura A 547 ad 555.

Convulsio quid A 374. *Huius* a tremore disparitas A ibid. a vulnere *proveniens* causae A 375, 376, 377: effectus A 378: cura A 379. Haec vulnere *superveniens*, *lethalis* A 378. Si haemorrhagiae, antispasmodicis maceratur A 381.

Convulsionis febrilis causae B 350, 351, 352: diagnosi B 352: effectus B ibid. & 353: prognosis B 352 ad 359: cura B 359 ad 363. Convulsionem sunt vel a repletionem, vel ab inanitionem B 352.

In febribus raro sunt absque delirio B 357. *Convulsioni* febrem succedere praestat, quam febri *convulsionem* B 353.

Cerebro inflammato si superveniat unde, & cur pessima B 356. *Convulsionem* intertinae tertianae paroxismo iunioribus unde B 327. Pueris febricitantibus quando fiunt B 354: his minus periculosa, quam adultis A 74. *Epilepticae* infantibus sub variolarum initio cur, & cuius omnis E 44, 45.

Cor est musculus A 139. In pericardio liberum haeret A 274. *Huius nervi*, an sensui, vel motui magis inserviant A 139. *Cor* originem, & fontem vitalis motus habet A 15. *Eius motus* mirae proprietates A 2. *Huius explicatio* B 18, 19, 23, 24. *Hunc* variae excitant, & accelerant causae A 139, 140. Mentis imperio non subiacet B 24. Id ab omni-

bus vas *resedum* movere pergit A 3. Latens vitale principium habet in se A 2. Sibi parat motus sui causam per intermedium cerebellum B 24. *Eius a.lio*, cui impendatur A 142: in quo consistat A 291. *Diafole*, & *Systole* ex quibus intelligantur A 254. *Exsedi*, supertite in animalibus vita, experimenta A 257. *Pulnera*, quae lethalia A 256 ad 260: ulceribus *erofi* *inventi* exempla B 271.

Cordis Aneurisma quid A 291. *Huius ortus*, & causae A ibid. & 292, 293: diagnosi & effectus A 293: medela A 294. *Cordis palpitatio* in senibus unde A 65. Haec syncopen passis frequens est A 156.

Coringo quid B 793. *Huius cura* B ibidem.

Corpora per fluidum mota resistentiam patiuntur B 718. Haec augentur pro aucta velocitate B ibid. *Bibula sicca*, dum madescunt, ingenti vi, partes, quibus coeherentur, a contactu remonent A 388. *Corpora* pro maxima parte fluidis constantia ingentem etiam duritiem habere possunt A 701.

Corpus humanum est sui sanguinis opifex A 437, 438. Ita factum est, ut nequidem stimulum minorem ferre sine molestia possit B 85. *Corpus* muliebre virili laxius est A 47, 774: a levissimis causis mutatur A 176, 774.

Corrodentia quid A 330. *Horum effectus* A ibid.: his utendi modus A 331.

Corrosiva. Vide cauterium potentiale.

Corrosivum vulgare chirurgorum quibus constat A 715.

Cortex peruvianus haemicraniam periodicam sanavit B 534. In gangraena, & sphacelo laudatur A 790: in haemoptili D 36, 37: in phthisi D 88, 93, 94: in variolis qua ratione dandus E 130: in hysterico, & hypochondriaco morbo quem usum habeat B 527, 560. Alrum quandoque promover B 565, 566. In febribus intermittentibus quando indicatus, quando non B 559 ad 566. Qua forma dandus, & quo febris tempore B 567,

567. 568. 569. Qua dofi B 569. 570. *Præmaturus eiusdem usus* quæ mala creet B 59. 562. 563. Cognitionem fert absque iactura B 567. Dum intermittentem tollit, quid agere videatur B 538. Huius efficacia non a vi roborante, sed ab alia calor, & calefactientia B 569. *Hic* nimium protrahens rheumatismum scorbuticum facit B 565. Huius cura B ibid. In continuis epidemicis & morbis inflammatoriis plane obest B 569. 114.

Coryza quid A 97.

Cranium. Vide calvaria.

Crupula epilepsias causa C 419. 420.

Crisis quid B 52. 52. Rona, mala, imperfecta quid B 52.

Crisium in morbis observatio summi usus: B 57. 58. 59. *Crisis* accessionem præcedens nox cur molesta, subsequens autem levior B 83. *Crisis* per vomitum solutum, sine diarrhoea comite raro observatur B 89. *Crisis imperfecta* recidivas facit B 55. 56. 464. 465. *Crisis* in omnibus morbis non sunt, & inde quid sequatur B 54. 465.

Critica perturbaciones quid B 52. *Evacuationes* quæ optimæ B ibid. & 468.

Critica materia non semper ad semel e corpore eliminatur B 55. 56. *Quotum* colligatur B 77. De ceteris. Vide *Dies critici*.

Cucuphas ex *ephalicis*, in apoplexia quando indicatæ C 309.

Cucurbitarum duo genera sunt B 244. *Quæ* optimæ B ibidem. Quomodo agant A 675. 778. B 245. C 296. *Laudantur* in apoplexia C 306. In gastræna A 778. in paralyti & præcipue his si iuncta scarificatio C 387. in inflammatione A 675. *Laudantur* in phrenitide B 614. In spasmodicis A 677. in hæmorrhagia narium B 463. denique in paralyti & præsertim scarificatione C 387. Similes in inflammatione applicantur B 675. Cum vel sine scarificatione venæ sectio-

ni feliciter substituitur sunt in peripneumonia vera B 780.

Cupri vis in epilepsia C 438.

Curatio specifica quid C 566.

Curacionem morborum qui optime instituat B 328.

Cutis in omni vulnere, & ulcere semper conservanda A 404. Huius albedo, flavedo, & ex flavo viridescens color in cachecticis unde C 644. 645. Color ruber an inculpatus sanguinis boni testis C 645. Eius raritas, alvi densitas unde B 35. 394.

Cynanthropia quid C 521.

D

Debilitas febrilis quid B 267. Huius a paralyti disparitas B ibid. : causa proxima B ibid., & 258 : remotæ B 268. ad 272 : diagnosi B 272 ad 279 : prognosis B 286 : cura B 279 ad 285. Debilitas in morborum initio unde B 285 : in hac quæ laudata B 285 : in parturiente partum retardat D 522. 523. Quæ tunc facienda D ibid. Debilitas vasorum, fibrarum, & viscerum. Vide vasa, fibræ, & viscera.

Decrementi in senibus ratio A 712. 73.

Decubitus in morbis bonus quis B 432 : quis malus B ibid., & 433 : moribundorum qualis B 433. *Diurnus* renum morbos producit C 225. Calculo generando favet E 248. 249. 250. In ventrem pronus in morbis quid indicet B 318 : in latus laesum tolerabilis : in sanum autem impossibile, vulneratopectore quid denotet A 765. 766.

Dehluitio impossibilis in hydrophobia unde C 567.

Delirare quid B 320. *Delirans* ex terrore sæpe resipiscit B 334. 335. *Delirantibus* cur elicienda intentio B 335. Hi cur animi affectibus tenendi B ibidem. An in luce, vel tenebris servandi B ibidem.

Delirium quid A 134. 149. B 319. Huius a phrenitide disparitas B ibidem. *Deliriorum*

Eriorum varia sunt genera B 321, 322. *Delirii febrilis causae, & diagnosi* B 323 ad 327: *futuri signa* B 328, 329: *cura* B 328 ad 336. *Delirii frequens causa haeret circa praecordia* B 325, 327. *Huius signa* B 327. *Deliria in morbis acutis quid denotent* A 765, 766. Cum *rifu, studio, aut circa necessaria* quid B 322: *circa unam rem mala* C 459. *Delirium in variolis cuius prognos* E 85, 86, 87.

Dementia quid C 506. *Huius ex melancholia natae prognos* C ibidem.

Dementia melancholicis bona C 478, 479, 480.

Dentes cariosi scorbutum produunt C 605: *exsiccati, lentore tecti in febris quid indicent* B 551. *Dentium fridor in morbis quid denotet* B 328, 601.

Dentitio D 741 ad 745. *Huius imminenti vel iam incoepit signa* D 745. *Stadium duplex* D 745, 746, 750: *effectus* D 746, 747: *indicatio* D 747, 748: *cura* D 748 ad 751. *Dentitio epilepsiae causa* C 418.

Depurantis quid A 899.

Derivantis quid A 201.

Desipientia levis quid B 583. *Quid ferum* B 321. *Desipientiae debilitatorum cur possumus* B 578.

Despumationis tempus in intermittentibus quid B 515, 516.

Diabetes quid B 273, 274. *Huius species* B 274: *harum periculosior, quae* B ibid. & 275. *Eiusdem cura* B ibid.

DIABETIS definitio, & *diagnos* D 4, 5. *Diacedonia alvum strictiorem reddunt* C 492. *Horum in calore febrili usus quis* B 308. *Vide narconica, opium.*

Diaeta pro vario vitae tempore varia A 75, 76: *item pro varia anni tempestate.* A 312, 313.

Diagnos morbi quid A 27, B 94. *Huius firmas unde* B ibidem.

Diaphoresis est naturae methodus, qua noxia expellit B 85. *Hanc, ut natura, ars regere nescit* B ibidem.

Diaphoretica quid A 777, 778. *Vide sudorifera.*

Diaphragmatis notio exacta haberi debet, ut thoracis vultus determinari rite possit A 496. *Eiusdem descriptio* A 507. C 73. *Semper tensum est, etiam si non agat* C 73, 74. *Eius vulnera, & horum prognos* A 272, 273. *Vomica fursum rupta empyematis causa* C 669.

DIAPHEDESIS quid D 29.

Diarrhoea quid B 371. *Huius materia* B 372 ad 375. *Ex quibus locis haec veniat* B 375, 376. *Remotissima etiam viscera purgat* B 88. *Causae* B 376 ad 380. *Diarrhoeae diversitas unde* B 380, 381: *prognos* B 380 ad 383: *effectus* B 383 ad 387. *An sinenda an supplicanda.* Cur pro curatione sciendum B 387. *Tollendae curia* B 387 ad 397. *Diarrhoea in hydropse quando bona* B 373. *Quandoque est hydrops causa* D 195, 197. *In acutorum initio saepe funesta* B 381. *Pleuritidi, aut peripneumoniam succedens quid indicet* B ibidem. *Ophthalmia concomitans quid* B ibidem. *Diarrhoea an salutaris futura sit, an non, unde judicari possit* B 384, 385. *In pleuritide quae bona, mala, quae* C 25. *Paraliticis conducit* C 374, 384: *scorbuticis autem quando* C 613. *Diarrhoea infantum quomodo tractanda* B 389: *scorbuticorum quomodo* B 395. *Artificialis in apoplexiae sanguineae metu laudatur* C 366: *spontanea, imo provocata in variolis saepe bona* E 89, 124 ad 127. *Diarrhoea ad matulem.* *Vide diabetes.*

Diastordii Sylvi compositio, & vis F 166.

Dies in morbis quid vocetur B 469. *Dies critici quid* B 464. *Horum enumeratio* B 465, 466, 471. *Dies septimus cur inter criticos maxime insignis* B 464. *Duodecimus, & decimus sexus cur e criticorum numero expungantur* B ibid. *Quartus, & septimus singularum septimanarum cur reliquos antecellant* 466, 469. *Decimus septimus etiam valde celebris est* B 471. *Vigessimus primus e criticorum numero cur eximatur* B 470. *An revera non sit criticus* B 471. Critici

veri, qui diendi B 466, 467. Coincidentes qui B 467. *Hi* in primo septenario qui fiat B ibidem: in secundo autem qui B. ibidem. Coincidentium effectus evanescat B ibidem. Dierum criticorum observatio exacta summi in medicina usus B 468, 469. Ad horum distinctionem requiritur principium morbi cognitum B 459. Id unde habeatur B 67. Horum ordo quis B 469, 470, 471. Distinctio non est ex numerorum proprietate, sed ex observatione nata B 471. Critici qui dimidium septimanae comprehendunt, vel illam finiunt, quid differentiae habeant B 473. *Dus septimus* inter criticos licet secundus, excellentia tamen primarius est B 473. *Quartus* quandoque decretorius, quando index, & sextus cur infamis B ibid. *Dies quaternarius*, & septenarius quando indicent, & quando septenarii soli B ibidem. *Critici* in epidemicis qui sint, B ibid. *Dies indices* qui vocentur B 475. Qui sint, & quid utilitatis quoad prognosin habeant B ibid. & 476, 477. *Dies quartus*, quando index sexti B 477.

Digerentia chirurgorum quid A 329. Horum ab abstergentibus disparitas A 330. Digestio ut bona fiat, quae requirantur B 33, 63. *Huius* impedimenta, & quaeque B 33. Digestio ciborum prima quid A 83. *Huius* & secundae effectus A ibid. Digestio in vulneribus quid A 231.

Dilaceratio quid A 536.

Diluentia quid A 70, 71. *Horum* actio quae B 360. Cur optime agant, si cavida B 118. Efficacia quibus promovetur B 165, 166. Cur saepe sine fructu in acutis potentur B 366: melancholicis cur tantum prosint C 478, 479, 480.

Diploe quid A 421. *Huius* affectus effectus A ibid.

Distorsio quid A 168.

Distractio quid A 168.

Diuretica in hydropse bona D 256 ad 260.

Actiora calculum non promoveant C 237:

in gonorrhoea nocent F 485.

Dolor verbis explicari non potest B 189.

Huius idea A 355, 356, 357: varietas A 357, 358: proprietates A 358, 359: causa proxima A 359: remotae A 359 ad 362: causarum ablatio A 364 ad 368: sensus ablatio A 368, 373. *Dolor* quibus in morbis emollientissimis tollatur; in quibus intendatur A 365. *Eius* causa sine sensu subinde adest A 370. *Dolor* punctorius quis dicatur A 647. *Dolor* in parte inflammata acerrimus subito evanescens quale signum A 662. *Acutus* non est de peripneumoniae natura B 728, 729, 730. *Dolores magni, periodici* epilepsiae causa C 416. *Varii*, vagi scorbutici familiares C 605, 606. *Horum* signa C ibid. *Lancinantes* quomodo scorbuticos torqueant C 611. A lue venerea ut distinguantur C ibidem. *Inflammatorii* cum febre acuta absque bonis signis evanescuntur cur phrenitici B 587. *Doctores* dorsi in qua anginae specie sentiantur B 663.

Dropaces quid C 387.

Dysenteria quid B 371. C 193. *Huius* variae, & mirae causae C 193: signum pathognomicum B 385. Est quandoque contagiosa B 396. E 17. Exempla C 193.

Dysenteria hydropis causa D 195, 196, 197. *Lienteriae* B 387: in inflammatione intestini recti quae bona, & quando C 172, 173. *Purulenta* in intestinalium inflammatione, quid indicet C 183, 184. *Eius* cura C 184, 185. *Fecunda*, cineritia &c. si fuerit, quid denotet C 185, 186. item quid acerrima, & assidua C 189, 190. *Scorbutica* quomodo tractanda B 396. *Haec* quando lethalis C 613. *Dysenteria* manialis proficua C 525, 526. *Suppressa* quando maniae metum incutiat C 526. *Dysenteria* nullum specificum, & universale remedium admittit. *Huius* ergo cura quae. Vide *Diarrhoea*. *Dysenteria* febris quid C 202. *Haec* ad alphas producendas prona C ibid. *Dysenteria* hepatica quid C 143. *Huius* prognosin C ibidem.

Dispositio

Dyspnoea in hydropse mala D 201. *Quae* continuo affligit, an non a fibrato mesenchondriacarum paralyfi C 366. *Quae* post partum coningit, unde B 716.

Dysuria causae E 449 ad 454: cura E 466, 467.

ΔΤΣΦΟΡΙΑ crifim praecedens quando de die, quando de nocte obfervetur B 85.

E

E*mbrietas* convulfionem lethalem creare potest C 412: hydropem D 598, 199: obmutefcentiam B 31: peripneumoniam notam B 803, 804: soporem C 324.

Ebriofus qui vocetur B 136. Cur non fimul & femel a potu fit arcendus, & quo modo id tentandum B 137, 138.

Ebrius qui dicatur B 136.

Ebullitionis tempus in intermittentibus quid B 515. *Huius* a vigore acutorum diversitas B ibid.

Echymofis quid A 538, 539. D 29.

Eccoproica quid A 521.

Educatio varia quomodo corpus mutet A 25.

Effluviarum subtilitas quanta A 773. *Putridorum* effectus 774.

Electrica vis in corpus effectus qui C 382. Haec paralyticis patribus cum fuccellu applicatur C ibid., & 383. Dolores rheumaticos diffipavit poftica reditus F 311.

Elementa quid A 19. *Horum* proprietates A 20.

Elephantifis ad fcorbutum an referri poffit C 610.

Embrocacio fit in paralyfi C 386: in mania C 532, 533. Tumores ad cetera rebelles diffipavit A 191, 951.

Emanagoga caute porrigenda D 443, 444, 448.

Emetica. (Vide Vomitoria emollientia) quid A 70. In delirio febrili applicata capiti, utilia B 331: in aegina aquofa quando conveniant B 640, 641. Calculo expellendo favent E 103.

Emmotot qui dicatur C 241.

Emphyfema quid A 358. D 277. *Huius* Tom. V. Pars II.

sedes A ibid. D 278: causae A 398, 399: cura A 399. D 278: vulnera thoracis faepe comitatur A 400. Et nunc quid denotet A 498.

ΕΜΠΝΣΘΟΤΟΝΟΣ quid A 375, C 457. *Huius* ab epilepfia difparitas C 458.

Emphyfema quid A 58, C 665. *Huius* caufa proxima C ibidem: remotae & fedes C 666 ad 669, figna futuri C 669, 670: praefentis C 670 ad 673: effectus C 674 ad 677: cura C 678 ad 682. *Eius* in mortem *transitus* certum tempus an determinari poffit C 676, 677. *Em-*

pyfema hydropis caufa D 197.

Encephalon quid A 278. *Huius* vulnera &c. Vide Calvaria.

Endemius morbus quid E 4, 187.

Ens Veneris Boilei fanavit rachitidem F 256, 257, 258. Qua ratione agat F 257, 258.

Ephenera febris quid B 412. Una *fabularis*; altera *peftilentialis* B ibid., & 413. *Salutaris* caufae B 413: diagnosis B ibid., & 414, 415: prognofis E 152: cura B 415, 416. Qua diei hora ad ftatum perveniat B 415. Ab intermittenti paroxyfmo qua ratione diftinguatur B ibidem. *Peftilentialis*, five *Britannicae* prognofis E 152.

Epidemicae febres. Vide Febris.

Epidemicus morbus quid E 4, 187. *Epidemici morbi* manifeflas fubinde caufas habent E 16, 17. *Horum* caufa proxima E 179 ad 187: remotae E 157 ad 179. Natura unde cognofcatur E 187, 188.

Epidemicum morbofum in aere haerens varium eft E 175. An per infecta propagetur E 176, 177. In aere *natum* an femper huius ope poftica communitur E 179: *natum* femel *contagium* vim exercere potest, mutata etiam aëris conditio, E 180, 181. Mora acius an fiat E 182, 183, 184. Sine caufa praedifponente ad morbum *contagiofum* producendum non fufficit E 186. *Epidemica* conftitutio ad phthifim producendam conducit D 62. *Epidemicus morbus* imperium minans in alios *intercurrentes* imperium exercet

- exercet E 153. *Hi* quomodo curandi E 154, 155, 156. *Epidemicos* curaturo quae observanda, & agenda E 183 ad 200. Magna perspicacia, & attentione opus E 195.
- Epidemidis* natura A 756.
- EPIPHENOMENON** quid B 168.
- Epilepsia* quid C 391. Vartorum eius nominum ratio C ibid., & 392: modo ad chronicos, ad acutos modo morbos referenda C 393. Pro quo morbo olim habuisti C 394, 395, 396. *Exquisitissimae* symptomatum expositio C 396 ad 399. *Chronica* quid C 399. *Huius* varia sunt intervalla C 400. *Reprocorum* paroxysmorum causae C 457: *acuta* quid C 399. *Epilepsiae* causa proxima ubi haereat C 401, 455, 456, 457: remotae C 404 ad 423. Sectiones anatomicae quid circa has causas doceant C 423, 424: *diagnosis* rito tenenda quae C 392, 393: *effectus* C 425 ad 430: *prognosis* C 403, 430 ad 433: *indicatio* C 433, 434, 435: *cura*, secundum causas C 435 ad 452. *Specificae* & *methodi* variae *in epilepsiae* cura, sunt varia C 452 ad 455. *Epilepsiae* causa diu latere potest, antequam in actum erumpat C 405, 424. *Hac* correpti, rarius in paroxysmo vigore, facilius in fine moriuntur C 427. *Cut* in fine eiusdem somnum *epilepticum* habuisti C 428. Sub paroxysmo cur alvus, utina, semen, iuvo sanguis exprimitur C 428, 429. Sub eodem quid agendum C 451. Sub fine quid C 452. *Epilepsia* hereditaria quid? C 430. *Eius* prognos manifestet C 405, 430. *Huius* labes cur ex avo in nepotem transeat C 405, 430, 431. *Idiopathica* quid C 431. *Eius* prognos C ibid. *Sympathica* quid? C 431, 432. *Huius* ab idiopathica disparitas C 432. *Prognosis* C ibidem, & 433. *Epilepsiae* generalis cura cur non detur C 433, 434. *Quo-plex* C 435. *Radicalis* quid C 435. *Facilis* *in infantum* per acetatem curabiles quae, quae minus C 435, 436.
- Epiphysis* quid A 598. *Huius* ab ossis corpore solutae curatio difficilior quam in luxatione A 599.
- Epispastica* quid A 676. *Horum* in corpus actio quae B 350, C 296. *Laudatur* in apoplexia C 302: in catalepsi C 321: in delirio febrili B 330: in epilepsia C 442, 443: in phrenitide B 614. *Cur* tanti fiant in capitis morbis B 283.
- Epithemata* in intermittentibus adhibentur B 571. *Carducae* quibus corporis locis applicanda A 775.
- Equitatio* laudatur in chronicis morbis C 226, 346: in fibra debili curanda A 34, 61, 195: in hectica febris C 194: in melancholia C 515: in pulmonum ulcere B 790. *Eiusdem* abusus effectus C 226, 227, 372. F 93. *Fortis* adversus vento, & frigido salta effectus B 653, 654, 718.
- Error loci* quid A 163, 178. *Quomodo* fiat A 179.
- Eruptiones* in infantibus cur prudenter tractandae C 422.
- Erysipelas* quid A 396, 643. *Huius* sedes B 78, 79, 400: *prognosis* B 78, 400, 680. *Febris superveniens* eam plerumque solvit B 78. *Populariter* quandoque grassatur B ibid. *Ne* introvertatur quid agendum B 680. *Erysipelas phlegmonodes* quid A 643.
- Erysipelatosa febris* quid. *Signa* distinctiva habet nulla B 78. *Quo* anni tempore frequentior B ibidem. *Erysipelatosa febris* alia species exanthematibus febrilibus analogi B 401. *Huius* causae, signa, & effectus B ibidem.
- Eschera gangraenosa* quid A 786. *Huius* a vivo separatim quo modo fiat A 786 ad 780.
- Evacuantium abusus* sequelae B 550, 551. C 623. *His* & *similibus* exhausti quomodo refocillandi B 280, 281, 282.
- Evacuationes necessariae* in sanis etiam dantur; hinc non supprimendae B 34, 35. *Maxime solemnes* quae B 35, 121, 132. *Hatun*

Harum suppressarum effectus A 24, 25. B 35, 139, 140. C 354, 355, 356, 421, 642. D 20. Per alias vias non suppleunt integre C 435: cura B 142, 141: *morbosarum suppressarum effectus* C 421, 422, 642: cura B 141, 142.

ΞΑΝΘΗΜΑΤΑ quid B 397. *Exanthematum febrilium* causae, materies, & nomina B 397 ad 406. Diagnosif, & prognosif B 406: cura B 407, 408, 409. Antequam erumpant insultum epilepticum, quandoque producant C 419: item dum retrocedunt C ibid. *His erumpentibus*, si convulsiones, coma adfint, quid agendum B 408. *Purpura, livida* quomodo a maculis scorbuticis distinguantur B 439. *Exanthematicae eruptiones* mirae per cutim sanis quandoque fiunt B 408. In his quid agendum B ibid., & 409.

Excrementa. Vide Evacuaciones. *Excreta humorum* adolem sequuntur C 654. In acrimonia alcalina, acida, & muratica quae fiat C ibid. Ex horum inspectione acrimonia a perito detegi potest C ibidem.

Exercitii usus B 39. *Hoc corpora leviora* sunt B ibid. Quibus prolit A 60, 61, 64. D 372, 373. *Protracti* noxae B 40. *Exercitia pulmonum violenta* quae mala creent B 717. *Exercitata densa corpora* a pleurite, & peripneumonia cur citius, quam non exercitata pereant B 64.

Exhalationes murorum humidae scorbuti causa C 196.

Exhorrescentiae tempus in intermittentibus quid B 511.

Exomphalos effectus hydrops D 208, 209. *Exoflofis* quid A 940, F 102. *Huius* causae, & prognosif A 941: cura A ibid. & 942.

Extensio membri in fracturis quomodo fiat A 577 ad 580. *Extensum membrum* quomodo restituitur A 583. *Huius operationis* rite institutae diagnosif A 584. *Restitutum membrum* quomodo in situ retinendum A 585.

Extirpatio quando instituenda A 805. In quo loco A 806, 807. *Huius* definitio

A 808, 809, 810. Ad huius operationis administrationem quid requiratur A 812 ad 819. *Operationis* expositio A 819 ad 822: symptomatum hanc sequentium cura A 822 ad 831.

F

Facies in empycis cur rubeat C 673. *Huius distorcionis* quid praefagiat C 368. *Facies Hippocraticae* descriptio C 676. *Hae* in empyemate quid indicent C ibid.

Fames quid B 42. Diu tolerata febrim facit B ibid. Quamdiu protrahi possit superfluit vita B ibid. Molestius fertur a biliosis; a pituitosis autem facilius B 111. Est ciborum optimum condimentum B 31. Eorum dosim determinat C 344. In scorbutico perseverans unde 612.

Farinacea quibus cachecticis profint, quibus obfint C 654, 655. Glutinosum in corpore producant A 96. Cruda non fermentata scorbuti causa C 598. Ad maturandos abscessus profunt A 697, 698.

Fasciarum usus in roboranda fibra debili bonus A 35, 169. Pro ossis fracturae varietate variae esse debent A 585, 586. *Harum* proprietates requisitae quales A 586. Nimis adstrictarum effectus A 169, 589, 590. Qua ratione in pleurinde iuvent C 4, 71. *Harum* in infantibus usus, & adhibendi modus D 664, 665, 666. *Hae* abdomen, & pectus continuo strictum phthisis causae D 10.

Febris in genere quid B 2. Qualis morbus B ibid., & 3, 4. *Febre* pauci tota vita immunes vivunt, pauci etiam absque febre moriuntur B 2. *Febris* varios morbos sanavit B 3, 65, 66, C 286, 287, 373. Nam est naturae instrumentum, quo partes impurae a puris separantur B 4. Hinc saepe a medicis in hunc scopum excitatur B 66. *Febris* natura cur adeo abdita? B 4, 5. Quomodo indaganda B 5, 6: unde cognoscenda B 11, 12. Adest, licet fac-

pe nullus observetur calor B 12. *Huius*
 diagnosis B 6, 7, 8, 94, 95. signum
 pathognomicum B 12 ad 16: causa pro-
 xima B 16 ad 19: remotae B 17 ad
 47: effectus B 47 ad 64: prognos B
 64, 65, 94, 95. Exitus in mortem B
 72 ad 75: in alium morbum B 75 ad
 82: in sanitatem B 82 ad 92. Quando
 ultimus hic exitus obtineatur, & quo-
 tuplici modo is fiat B ibid. Qua ratio-
 ne hi exitus varij praefagiri possint B
 92, 93, 94. Indicatio curatoria quadu-
 plex B 95 ad 98: cura primae B 98 ad
 112: secundae B 112 ad 147: tertiae B
 147 ad 168: quartae B 168 ad 412.
Febrim optima curatio consistit in motus
 moderamine B 148, 149, 150. *Huius* ni-
 bili signa B 150, 151. Moderamen quib-
 us obtineatur B 154 ad 159: nimis
 torpidi diagnosis B 153. Excitatio quo-
 modo fiat B 159 ad 163. *Febris* cali-
 dioribus tractatae in pleuritides quando-
 que mutantur C 46. *Febriantes* quan-
 do cibandi B 98, 99. Cibi, & potus
 quales sint B 99, 100, 101. Quo
 morbi tempore exhibendi, & qua copia
 B 102, 103. *Horum vim*, & copiam quae
 determinant B 103 ad 112. *Varietas*
 unde desumenda B 101. Cur-
 dosi ea-
 B 103.
 Vidu seniore quam paullo pleniori ma-
 ius peccatum committitur plerumque B
 105. *Febriantium* visus cur ad anni
 tempus, regionem, aetatem, consuetu-
 diem, & temperiem accommodandus
 B 109, 110, 111. *Febrim* divi-
 sio B 8, 9, 10. *Febris acuta* quid B 8:
 non exacte per acuta quid B 8:
 ter, non exacte, ex decidentia quid B
 426. Eius prognos B ibidem. *Arasim*
 quid B 7. *Epiola* quid B 7. *Lentia*
 Erysipelatosa. Vide Erysipelas. *Horrida*
 B 7. *Lentia* sive chronica quid B 10.
Febriula alba virginalium quid B 55.
*Fe-
 bres epidemicae* quid B 10. *Harem* cau-
 sae quomodo sint communes, communi
 est medela B ibidem. *Frequentius*

sunt, rarius longae B ibid.: saepe con-
 stanti quodam die critico indicantur B
 473. In illis speciatorem agere debet
 saepe medicus. B 116. *Febres intercur-
 rentes* quid E 170, 171, 192. *Harum*
 ab epidemico regimine disparitas. E 192.
 Vide Epidemia. *Stationariae* quid D 191.
Sporadicae quid B 10. *Harum* causas
 sunt singulares, singularem requirontes
 medelam. B ibid. *Lenticulares* quid B
 402: morbillosae. Vide morbilli. *Petechia-
 les*. Vide Petechiae. *Punctulares* quid
 B 400. *Scarlatinae*. Vide scarlatinae fe-
 bres: variolosa. Vide variolae. *Febres per-
 iculossissimae* quae dicuntur B 65. *Len-
 tae* mutationes tardius habent, nec de-
 finito tempore, neque insignes adeo
 B 67. *Epidemicarum* autem decursus qua
 in te variet B ibidem. *Febres diuturnae*
 vel male curatas quae sequantur B 76.
Febris saepe per febrem curanda B 77.
Febriantes acute cur lecto non sint coër-
 cendi B 314. *Febris continua* quid B
 409, 410: continua simplicissima. Vide
 ephemera. *Continua simplex* quid B 417.
Huius causae, signa, & medela. B ibid.
 & 418. Eius natura eadem est ac eph-
 emerae. B 417. Quamdiu duret B ibi-
 dem. *Continuae* aliquando in intermit-
 tentes mutantur & vicissim. B 72: attri-
 blem turgentem movent. C 495. *Febris*
continua putrida quid B 412, 419. Cur
 putrida dicatur B 419. *Huius* ab eph-
 emera & continua simplici disparitas. B
 419, 420: species B 426: causae B
 420 ad 423. Aliquando ex mala simpli-
 cis continuas medela nascitur B 419:
 diagnosis B 423 ad 426: prognos B
 426 ad 441: cura B 441, 442. *Febris*
 haec non facile discedit in sui initio
 a continua remittente. B 423. *Febrim*
putridarum maximum signum quod B
 423, 424. *Febris continua continens*
 quid B 442. *Continua remittens* quid B
 441, 442. *Febres malignae* quid B 441.
Febris ardens quid B 444. Ad conti-
 nuas remittentes refertur B ibid. Qua-
 re non ad continentes B 453. Haec
 li.

licet exquisita tertiana sit, in quo tamen ab illa differat B 453: *item huius a continua putrida, intermittibus, continuis remittentibus levioribus disparitas quae* B 490: *causa proxima* B ibid.: *remotae* B 453, 454: *diagnosis & effectus* B 447 ad 453: *cura* B 491 ad 501. *Ardens* inter pessimas febres locum tenet primum B 450, 451. *Huius* calor qualis B 447. Dum diebus paribus exacerbatur, quid indicet B 453. *Cur periculosa* B 481. *Cur inter castrenses morbos recensatur* B 454. *Ardens exquisita* quando iudicetur B 414, 455, 456. *Non exquisita* quando B 456, 457: *non exquisita quae vocatur* B 481. Quibus evacuationibus solvatur B 457, 479, 480. Accessio die pari in ardente ante sextum diem cur pessima B 481. *Febrium haemorrhagarum species triplex & harum definitio* B 446: *cuiusvis* prognos B ibid. Febres tertianariae quid B 441. Si haec cum anxietate, cur malignae? B 451. *Febris intermittens* quid B 410, 504. *Quotidiana, tertiana, quartana, quintana, septenaria* quid B 504, 505. Priorum quatuor specierum diagnosis B 506. *Tertiana exquisita* quid B 506: *tertiana extensa* quid B ibidem: *quartanae* incipientis signum pulsus varietas, & tarditas B 21: *imo* ingruens paroxysmus ex uiguim pallore noscitur. B 511. *Hac* qui semel laboravit, si de novo in vita afficitur, brevi liberatur B 61. *Hae* quos morbos curavest B 525. C 437, 527. Ab epilepsia praeservat C 437. Febres intermittentes duplicatae, triplicatae, &c. quid B 506. *Tertiana duplicata*, vel *quartana triplicata* a quotidiana quomodo distinguatur B ibid. & 507. *Tertiana duplicata*, die in tertiana simplici libero, novam accessionem habeat. B 410. *Huius* nova accessio die libero quomodo a quotidiana distinguatur B 410. Paroxysmus est tertio similis non secundo B ibidem. *Tertianarum* indoles pesti est opposita

B 525. *Hae maniam sanarunt* C 527. Febres intermittentes erraticae quid B 410. Febres inter mittentes autumnales praematurae medicum in discernendo saepe fallunt B 411. *Cur pertinacissimae* B 43. Quando incipiunt & cessant: *vernales* quando B 507. E 191. *Hae* cur citius huius, cur tardius autumnales B 539: *item* cur rarius recedunt B 557: *prognosis cuius vis* B 508, 509. Quare diversa curatio B 509, 509. Intermittentes continuam, multiplicatis paroxysmis mentientes unde pondeant, & quomodo noscantur B 510. *Autumnales acutae* exgeniatis intermittentiis paroxysmis constant B 229. Febris intermittens causa proxima B 526, 527, 528: *remotae* B 532 ad 540. *Liter*. *mittentis* stadii prioris phaenomena B 511 ad 514: *alterius* B 514: 515: *ultimi* B 515, 516, 517. *Eius* stadia continuarum stadiis respondent B 513. *Primum* stadium est omnium periculosissimum B ibidem. *Intermittentis* initium quomodo a continuis distinguatur B 512. *Huius* stadia percurrentis effectus B 518 ad 526. Exitus in alios morbos B 517, 518. Paroxysmi cur certis periodis redeant B 529 ad 540. *Intermittentium* cum continuis affinitas. B 530 *accessiones* in intermittentibus eandem vim habent ac *dies* in continuis B 530: *Tertiana exquisita* accessione septima cur terminari consuevit B 530. *Tertiana* verna raro in quartanam, autumnalis vero frequenter in eam mutatur. B 532. *Intermittentium* causae praedisponentes solae hanc vel illam speciem determinant B 532. *Hae* in singulis speciebus diversae licet, magnam tamen habent inter se affinitatem B 533. *Intermittentes* quandoque unam tantum corporis partem occupant B 534, 535. *Tales* quomodo curandae B ibidem. *Intermittentium* paroxysmi anticipatio, aut retardatio unde petenda B 537, 538. *Earumdem* distinctus, & determinatus caracter ubi lateat B 540. *Febris intermittens* indici-

- catio B 539: cura tempore *Arupetis* vel & in primo paroxysmi stadio B 540 ad 554: in secundo quae B 554, 555: in ultimo qualis B 555, 556. Symptomati urgenti quomodo occurrendum B 556, 557. Prophylaxis B 557 ad 570. *Intermittentes* purgantibus, & emeticis irritantur B 546. *Harum* paroxysmus aliquando, contrariis motibus studandi, & deiciendi confundendus est B 549. Cura per corticem *Peruvianum* quando instituenda. Vide *Cortex Peruvianus*. Hoc co curata recidivans eodem amplius tractari non debet B 565: eodem sanata purgante levissimo, imo clysmate statim excitatur B 570. Febrim *intermittentium* singularum prognosin & cura B 572 ad 577. Quando *Hae* profint, & ad longaevitatem disponant B 574, 575. *Quartana* ex indole sua longior tertiana, sed securior B 573. *Quotidiana* tiana B ibid. *Tertiana duplicata* raro vel pit B 573, 574. *Intermittentes* in continuas facile transeunt quae B 574. Quae & quando in arduos mutantur B 444. *Intermittens* scorbuti, *hydropis*, leucophlegmatiae, & icteri causa B 522, 523: confortium cum rheumatismo init quandoque F 285. Quid tunc agendum F ibidem. Illa laboranti commigratio quandoque salutaris B 575.
- Fermentantia* liquida opora quorum malolplexiam facit C 160. *Harum* halitus aporruget in animalium & vegetabilium cineribus demonstratur C 379: laudatur in cachexia C 659, 660: in fibra debili A 56: in scorbuto C 634, 635. Ferulae quid A 587. *Harum* in usu A 587, 588.
- Fibra minima* quid A 19. Quomodo forueretur A 22. *Huius* debilitas quid A 16, 27: *Huius* debilitas effectus A 23, 24, 25: *Huius* debilitas prognosin & pro effectus A 27, 28: cura A 28 ad 38. *Fibras debiles* quibus proprias, quibus fortis A 39, 40, 41, 47, 48.
- Fibrae laxitas* quid A 38. *Flexibilitas* quid A ibidem. *Elasticitas* imminuta quid A ibid. *Nomia* quid A 47. *Huius* effectus, & cura A ibidem. *Rigiditas* quid A 40, 41, 42. *Huius* causae A 42: effectus A ibid. & 43: diagnosis, & prognosin A 43, 44: cura A 44 ad 47.
- Fissura* quid A 412, 413. *Huius* a fractura disparitas A 413, 414.
- Fistulae*. Vide sinus. *Hae* in epilepsia profuerunt C 742. *Fistulae* ani operatio A 725, 726, 727.
- Flatus* quid B 236, 237. Quos morbos faciant B 238. *Harum* diagnosis & causa proxima B 232: remotae B 233 ad 237: impetus, & foetor varius unde B 237, 238: cura B 239 ad 250: variarum circa flatus questionum solutio B 247 ad 252.
- Floecos* corpore in acutis quod signum B 319.
- Fluidorum* nostrorum partes quadam vi inter se cohaerent A 162, 163. *Fluidi vitalis* motus moderamen maximi momenti regula est in praxi A 698. Pro abscessus maturatione qualis requiratur A ibid. *Huius* debiti moderaminis signa A ibidem.
- Flux albus*. Vide gonorrhoea multiebris.
- Foecunditatis* signum D 400, 406, 410.
- Foetus* in utero situs naturalis D 555: praeternaturalis & eius effectus D ibidem. In posteriori situ indicatio D 566, 567, 568. Huic satisfi D 568 ad 581. *Foetus mortui* diagnosi D 558 ad 562: in utero relicti effectus D 563 ad 566: indicatio D 562, 563.
- Fonsiculus* quid A 677. Quomodo fiat A ibid. Quibus profi A ibid. & 678. Instituitur in epilepsia C 442, 443, in hydro C 255: in phthi D 19: in variolis E 107. In rachitide autem non suadendus F 251.
- Fractura* quid A 168, 556. *Huius* a fissura disparitas A 413, 414: item a carie, contusione, & luxatione A 556: species A 556, 557, 568: effectus A 558 ad 566: diagnosi A 566, 567, 568: prognosin A 569 ad 573: cura A

A 573 ad 591. *Fracturae* pessima symptomata unde plerumque A 565. *Fragmentorum* educio in *fractura* quando tentanda A 581, 582: cura ut succedat, chirurgus anatonem probe calet oportet A 589.

Epidionas laudantur in catalepsi C 321: in chronicis morbis C 346: in epilepsia C 432: in fibra debili A 31: in rigida A 47: in gangraena senilis A 784: in haeparide C 98: in haemoptysi D 26: in hydrocephalo D 215: in hydrope D 217, 218: in mensium suppressione D 438: in paralyti C 385, 386, 388: in parotide indurata A 199: in podagra D 374: in rachitide E 251, 252: in scirrhis, quandoque A 278: in scorbuto C 627. Febricitantibus quando conveniant B 143, 162. Locis inflammatis quae, & quomodo adhibendae A 675, 676, 686.

Frigida potentia quid A 665. Frigida capiti applicata in mania profuerunt C 522, 533. *Horum* in ileo usus C 180, 181. ad sanandas inflammationes cur anceps. A 664, 665, 681.

Frigus non est caloris privatio, sed ens physicum A 797. *Huius* in corpus nostrum effectus A 664, C 360. *Frigoris summi* in corpus nostrum actio ignis vivi actioni satis respondet A 740. *Frigus hystericis* vitandum C 272. Omnibus animalibus torporem inducit C 360. Calido corpori applicatum rheumatismi causa F 276. *Vehemens* haemoptysin facere potest D 23: humidum quae mala faciat C 161, 362.

Frigus respectu corporis nostri quid B 173. *Eius* causam in nobis quid constituat B 173. In febrium initis quid designat B ibid., & 174. *Frigus febrile* non sit ab effervescentis frigidis B 175. *Eius* ergo causae quae B 173, 174, 175: effectus B 175, 176: diagnosi, & prognosis B 176, 177, 178: cura B 178, 179. Quo maius in febris initio, eo haec periculosior B 176, 177. Cur aliquando illud lethale B 21. Quo inten-

sus est, eo intensior sequitur calor B 24: calidis stimulantibus male tractatur B 178. Quibus ergo tute curetur B ibid., & 179.

Fruilus horae bene maturi laudantur in melancholia C 479, 480: in mania C 480. *Imaturi commesti* quae mala creant C 345, 360.

Fuligo quid A 205. *Huius* chemica analylis, dotes, & usus A ibidem.

Fulminis vis electrica vi intensior C 384. Quos morbos sanet C ibidem.

Fungi cerebri. Vide cerebrum.

Fustigationum in atrophia usus C 388.

G

G
Gangraena quid A 734, 735, 736. *Huius* sedes A 736, 737: causa proxima A 660 ad 663: remota A 738 ad 739: diagnosi A 739, 754: prognos A 753, 758 ad 772: indicatio A 772, 773: cura A 773 ad 785. *Gangraena* a decubitu quomodo fit A 741. Quomodo praecavenda, aut nata curanda A 742, 743: gangraenae inveteratae effectus A 781, 786: indicatio A 781 ad 789: cura A 789 ad 796. *Gangraenae a frigore* signa A 755: cura A 796, 797, 798. *gangraena senilis* unde A 730. in hac nec suppuratio, nec exitipatio iuvat A 751: cura A ibidem. *Gangraenae* ab arteriarum rigiditate hitoria A 710, 731: *gangraena* in sui initio ad phlegmonem proxime accedit A 772. Cur tunc feliciter saepe tollatur A 785. *Gangraenae* cur illico succurrendum A 761. Quibus in subiectis lentius vel citius proleptat A 759.

Gas sylvestre pestem sedavit E 173, 174.

Gastrostrophia quid A 519. Hanc instituenti modus A 519, 520. Instituta quid agendum A 520.

Gaudii summi effectus C 466, 467.

Gelatinosa ex quibus parentur & ubi conveniant B 132. Quibus cachecticis prosint, quibus obliet C 634, 665. *Gin-*

Gingivae in sanis quales; in scorbuticis autem quae C 605, 606, 607.

Glandulae quid A 631. *Harum abscessus* tarde sunt aperiendi A 710: *hydrops*; huiusque cura D 146. *Glandulae oesophagi*, *tracheae* &c. tumentum effectus B 632. Sub axillarum tumores paralytici facere possunt C 352. *Glandulae vagae* quid B 632.

Glutinosum quid A 95: *glutinosi spontanei* causae A 96, 97, 98: huius sedes A 98: effectus in primis viis A 98 ad 101: in sanguine A 101 ad 104: diagnosis, & prognos A 104: cura A 104 ad 109.

Gonorrhoea quid F 41: *simplex* quid, &c. eius causae quae F 41: *venerea* quid F 104. *Hacc* in Europa est lue recentior F 42, 43. Bene tractata infectio a contagio liberat F 42: male autem curata, vel neglecta sequitur lues F ibid.: eiusdem prima species F 49: huius diagnosis F ibid., & 50: secunda F 50, 51: huius causa materialis F 52: diagnosis F 51: tertia, &c. eius causae F 54: tertia, &c. eius causae F 54: diagnosis F 55: quarta, eiusque diagnosis F 56: effectus F ibid., & 57: quinta F 57: eius effectus F ibid., & 58, 59: horum specierum cura F 104 ad 119. Iniectiones per urethram non suadendae F 105, 106: ex adstringentibus plane relinquendae F 105: materiae virulentae optima est depuratio, quae per urinam fit F 106. Diuretica tamen acrimia damnantur F 114. Sub *Gonorrhoeae* cura panis erectio vitanda, ut & valida corporis exercitia F 115, 116. *Gonorrhoea spuria* quid F 50: quid cordata F 70. *Virulenta sicca* quid F 55: huius causae F ibid., & 56: effectus F 56. *Gonorrhoeae mulieris* a fluore albo disparitas F 63, 64. *Hanc* quomodo concipiant mulieres F 62, 63. *Toleratu facilior* est quam virilis F 64, 66: huius prima species F 64, 137: secunda, & tertia F 64, 137: quarta F 65, 137: indicatio F 136: cura F ibid., & 137, 138. *Gonorrhoea* ad uterum an perveniat F 65.

Gravedo. Vide *Catarrhus*. *Haec* in morbis pulmonum mala B 771.

Gravidae, dum gestaret marem, epilepticae; dum vero puellam, ab hoc malo immunis exemplum C 474. *Gravidarum morbi* D 450 ad 454. Causa in his morborum duplex D 455 ad 461: prioris effectus D 461 ad 469. An soli plethorae hi adscribendi D 461, 462, 463: cura D 469 ad 476: posterioris effectus D 476 ad 483: cura D 483 ad 486. *Gravidarum vitae regimen* 474, 475.

Graviditas plures functiones in corpore muliebri laedit D 451. In hac determinanda magna opus prudentia D 452, 453: huius signa D 451 ad 455. An certa gemellos in utero haerere signa dentur D 482: item quis sexus in eodem geratur, an sciri possit D 482, 483.

Gulae imbecillitas quis morbus B 701. *Huius* signa B ibid., & 702: cura B ibid.

Gumma, gummi quid A 939 F 102: *venerea* sunt epilepsiae causa C 410.

Gutturis strepitus in asthmate senili cur non adeo periculosus, & in peripneumonia B 770.

H

Habitus corporis quid C 636: boni & mali signa C ibid., & 644.

Haemirritea febris. Vide febris.

Haemoptysis quid D 3. Est frequens causa phthisis D ibid.: eius species D 3, 4: harum diagnosis, & prognos D 5 ad 8. *Haemoptysis* causae proegumenae D 9 ad 18: procatacticae D 18 ad 25: diagnosis D 25 ad 33: cura D 33 ad 45: prophylaxis D 45 ad 48. *Haemoptysis* male curata exitus D 6, 7, 8, 49. *Huius* magis subiecta est aetas inter decimum sextum, & trigesium sextum annum media D 14, 15. Serius cur minus subiecta D 16. *Haemoptysis* recidivae signa D 48.

Haemorrhagia quid A 344. *Huius* a vulnere causae, & prognos A 233, 234,

235: cura A 345 ad 352. An revulsio hic iuvet A 352, 353, 354. *Haemorrhagiae* polypos quandoque producunt A 66: ardentem saepe solvunt B 457. In intermittibus unde oriantur, & quid denotent B 521, 522. *Variae* primo leviores, dein *validae* cur scorbuticis familiares C 606, 608. *Haemorrhagias* magnas passim cur non illico multis implendi C 262. *Haemorrhagiae nomen*, dum solum occurrit apud *Hippocratem*, *haemorrhagiam* narium significat B 457, 527, E 89. *Haec* in ardentibus frequentior est, & maxime salutaris B 457: sed *qualis* debeat esse, & quo die contingere B 458, 459. Venae sectione quantum praestet B 459, 460. *Huius futurae* signa B 460 ad 464. Qua ratione proficit C 100, 101. *Hepatitis* *solvens*, quando & unde fluere debeat C 101. Quando pleuritidem curet, quando tantum levet C 24. In plethora, & in morbis inflammatoriis *salutaris* est A 157. Laudatur in mania C 527: in phrenitide B 332, 600: in variolis E 89, 90. Raro peripneumoniam, integre solvit B 739. A phthisi hereditaria quandoque praeservavit D 14, 15: circa pubertatis tempus *salutaris* D 14, 15: *periodica* tabis accessum protrahit B 459. *Haemorrhagia* si nimis profusa sit; quomodo sistenda B 500, 501. *Suppressa* apoplexiae causa C 421: epilepsiae C ibidem. *Haemorrhagia uterina* gravidarum *periculosa* D 486 ad 489. Quando *periculosissima* D 486. *Huius* causa proxima D 489 ad 493: remotae D 496 ad 503: *futurae* prognos D 495, 496: *praesentis* diagnos D 493 ad 495: cura D 503 ad 512. *Haemorrhagia* in graviditate semel contingens facile redit D 496: praesertim si post sextum vel septimum mensem contigerit D 510. Est plerumque *periculosior* quam *illa*, quae post partum contingit D 489. Aborrum saepe causat D 487. Si *valida* fuerit, foetus eductionem indicat D 508. Quomodo haec tentanda D ibid. & 509, 510.

Haemorrhoides fluentes in morbis cuius utilitatis B 608. Profuant in apoplexia B 336 C 272, 284: in mania B 333 C 525: in melancholia A 854 C 510: in nephritide C 233: in pleuritide C 24. *Suppressae* causa catalepsis C 316: cephalalgiae C 285: melancholiae *recidivae* C 510: nephritidis C 233. *Haemoptysis* D 20: obstructionum abdominalium A 854: pleuritidis C 24. *Caccae* intestinorum inflammationis & ischuriae causa C 172. Quomodo moveantur B 333, 613.

Hedica febris quid D 75. Post pastum & circa vespem exacerbari solet D 13, 75, 76. Exacerbatio illa non est de huius febris natura A 747.

Helleboreus fuit datus maniacis C 525: melancholicis C 516: rabiosis C 572.

Hemiplegia quid C 289, 369. *Perfidae* & *imperfidae* prognos A 237. Ante apoplexiam cur *periculosior*, quam post illam C 369. Post epilepticum paroxysmum unde fiat C 425. *Hemiplegia* organum in nobis sensus & motus duplex esse probat C 289.

Hepar in sua substantia adeo acutum doloris sensum non habet C 93. *Huius* sanguificationis munus falso adscribitur A 137. *Hoc insarido* cur lien turbetur C 100: imo eius moles cur augeatur C 495.

Hepatici qui vocentur C 81.

Hepatitis cur non adeo frequens C 81, 82. *Huius* causae C 84 ad 92: diagnos, & effectus B 221 C 93 ad 97: prognos C 92. Exitus *quadruplex* C 97. *Primus* est in sanitatem per benignam resolutionem, haecque quomodo iuvanda C 98: per coctionem & excretionem C 99 ad 102. Haec qua ratione promovenda C 102 ad 105. *Perfidae* curae signa C 105. *Secundus* in *suppurationem* C 106: signa huius *futurae* C 106, 107: *salutae* C 107, 108: effectus & prognos C 109 ad 116: cura C 114 ad 115. *Huius visceris suppuratio* benigna cur raro speranda C 106.

106. *Abfcessus* cur anxietatem adeo magnam cauet C 111. Hic ad exteriora protuberans quomodo tractandus C 115.
116. Hoc aperto salutis, aut mortis signa C 116, 117. Si rumpatur in abdomen, mortem facere potest C 112.
- Vomice hepatis* ex pure in aliis locis collecto saepe oriuntur C 85, 86. *Tertius* in schirrhum. Huius effectus C 117.
- 118, 119. Hic cur satis frequens C 118, 119. Prognosis C 119, 120. *Quartus* in mortem C 121, 122: huius futurae signa C 122, 123, 124: hepatitis leuor species aliquando intermittentes autumnales epidemicos comitatur B 563: haec ut cognoscatur C 98: quomodo tractanda C ibid. Pussum hic datur cortex B 563: hepatitis exigua quibus malis originem det C 120. Corollariorum ex hepatitide defunctorum solutio C 124 ad 144.
- Herbae amarae recentes* cur frigidae dicantur B 165. *Harum* in morbis usus quis B ibid., & 566. *Herbarum recentium* succus copiose haustus in chronicis laudatur C 346.
- Hernia* quid A 743. Huius species A 744. Suffocatae, clausae, in gangraenam tendentis signa A 744: cura A ibid.
- Herpes miliaris* quid F 219: *ficofus* quid F ibid. *Hi suppreffi* rachitidem fecere F 220.
- Hilaritas* perspirationem auget C 461: *summa melancholiae* causa C 467.
- Hrudinum* adio & usus A 779.
- Homo* quibus constet C 460, 461. Huius in origine quae partes maximam molem corpoream faciant C 402, 403.
- Humiliatio* quid B 6. Haec in omni febre a causa interna orta semper adest B ibid. & 7.
- Horror* quid dicatur B 488.
- Humectatio* totius corporis cur tanti ardentis usus B 498, 499.
- Humorum motus* per vasa ut liber sit, quid requiratur B 23. Horum lentor in febribus quid B 64. *Spissitudo* ad quot classes reduci possit C 259. *Cuius vis* cau-
- sa, diagnosi, & effectus C 258 ad 265. *Spontaneae permutationes* quid C 339. In quas acrimoniae abeant C ibid. & 340. *Harum* effectus C 340. *Humorum vis* ab acutis morbis quae C 340, 341: horum effectus, & cura C ibid. *Humorum tenuitas* nimia unde C 652, 653: effectus C ibid. Eorumdem tenuitati a pulmone laeso cur adiuncta acrimonia C 653.
- Hydatidum* definitio, ortus, & sedes A 165, D 168, 169: diagnosi D 169, 170. *Hae* hydropis causa D 199.
- Hydragoga* quid B 642, C 384. Laudantur in paralyti C 384. *Qualia* in angina aquosa conueniant B 642.
- Hydrocephalus* quid D 118. Huius species D 119 ad 123: diagnosi D 124: prognosis D 123: cura D 125 ad 128.
- Hydrophobia* unde dicta C 553. In homine nasci sponte potest C 556: haec lenior, & sanabilis magis C 537. *Hydrophorum* symptomata C 553 ad 557. An aquam ideo horreant, quia canem in illa vident C 554, 559. Cadaverum dissilio quid hic docuerit C 561 ad 565. An haec periculosa C 561. *Hydrophobi* an suffocandi C 578, 579. Vide rabies canina.
- Hydrops* quid D 215. Huius genesis D 215, 216: sedes D 117 ad 118. A leuco-phlegmatia quomodo distinguatur B 523: species D 118 ad 186: causa proxima D 186 ad 191: remotae D 191 ad 199: diagnosi & effectus D 199 ad 210: prognosis D 209, 210, 249, 250: indicatio triplex D 210. *Primae* cura D 213 ad 228: *secundae* D 228 ad 269: *tertia* D 269 ad 782. Quando paracenthesis instituenda. Vide paracenthesis. *Hydrops* intermittenti diuturnae accedens quando purgantibus tractandus, quando non B 536: remanente febre, quomodo curandus B 522, 556. *Hydrops* incipientis cura confirmato cur non conueniat B 115, 116. *Hydrops* quando maniacis proficit C 526. *Diuturnus* cur comitem sibi febrem lentam habeat, recens

cens autem non C 613. Hydropici cur post eductas aquas saepe brevi denuo tumeant A 549. Hydrops saccatus quid D 165.

Hydrops Anasarcha;

Afcites;

Asperae arteriae;

Glandularum;

Λυγερλήματα;

Hydrops

Ovariorum;

Pulmonis;

Thoracis;

Tympanites;

Τυμοειδής;

Uteri.

Vide. Anasarcha. Afcites &c.

Hyems cur morbos circa caput & supra septum producat B 800.

Hypercatarsis quid C 194. Huic superveniens convulsio, aut singultus cur mala C ibid.

Hyperostosis quid F 102.

Hypochondria quid B 324. Plurima dant tam ad salutem, quam ad interitum in morbis praefagia B 439 C 90, 91, 140. Quae huius ratio B 316. Haec paraphreneticis cur sursum revulsa C 75. Horum aestus cur in morbis malus B 316. Tensio, pulsus quid subinde indicent B 328 C 529. Tensio sola quid C 100. Hypochondrium doloris expers, mole, aequabile, in morbis quid denotet B 439. Contrario modo se habens quid B ibid. & 440. Huius tumor durus & dolens pro vario morbi statu quid praefagiat B 400 mollis autem & doloris expers quid B ibid. Dextri in praegnantibus dolor malus D 477. Inter hypochondria & nares magnum habetur commercium B 462, 463.

Hypochondriacus morbus quatuorplex C 91, 92, 482. Hypochondriaci morbi cum materia expositio, causa & sedes C 481, 482: signa, & effectus C 483, 484, 485: indicatio C 485, 486: cura C 487, 488. Huic morbo cur illico obveniendum C 485. Hypochondriacus morbus sine materia quid C 92, 504. Hy-

stericae passioni affinis est B 250, & sicut illa omnes morbos mentitur B 196. Ad melancholiam disponit ibid. C, ad scorbutum C 599: signum huius caracteristicum C 92. De ceteris vide melancholia.

Hysterica passio quid C 416. Huius causa unde C 417: signum pathognomicum C 417, 503, 504: symptomata C 416, 417, 228. Hysterica passio epilepsiae causa C 4, 7. Haec ab epilepsia in ultima eius accessionis parte quomodo distinguenda C 399. Generat melancholiam C 503: scorbutum C 599. De ceteris vide melancholiam.

I

Iactatio in acutis frequentior quid indicet B 432.

Ichor quid A 328 D 211. Huius generatio A 328, 329: huius ex vulnere fluxus cura A 353, 354.

Icterus quid C 95. Varia eius nomina unde C ibid.: causae C 127, 128. In recens natis causa & cura C 128. In gravidis causa C 95, 96, 128: cura C 128: in literatis causa & cura C 128, 129. Icteri prima indicia ubi conspiciantur C 105. Huius differentiae & prognoses unde petendae C 127 ad 133: icterus multiplex C 95: primae speciei, benignae dictae origo C 95: cura C 97 ad 104: secundae paullo gravioris cura C 104, 105: tertiae prioris causa C 110, 111: prognosis C 111: quartae nulla arte sanabilis causa C 112: quintae valde periculosa diagnosis C 112, 113: sextae cito lethalis conditio C 113, 114: indicatio C 114, 115: septimae perpetuae origo C 117, 118: effectus C 119: prognosis, & palliatio C 119, 120: octavae speciei productio & effectus C 121: signa C 122, 123. Icterus cur aliquando facile saeatur, & quando C 128: cur saepe pertinacissimus C 129. Cur saepe cito, saepe tarde occidat C ibid. & 130. Icteri periculi

- dici descriptio C 130, 131: causa C 131, 132, 133: indicatio C 134: cura in paroxysmo C ibid. & 135, 136. Extra paroxysmum C 136, 137. *Klerus* ante septimum diem in acutis cur calamitosus C 138. Quomodo aliquando toleratur C ibid. & 139. Post septimum diem quid denotet C 139. *Ileri* signa secundum ordinem expolita C 140, 141: *ilerus* est causa hydropis A 123 D 196 cur intermittentes quandoque sequatur B 597. Saepè recrudescens post validam hepatitidem, unde B 597. *Ilerum* cur toties vomicae putridissimae & tabus olidissimus dysenteriam faciens excipiant B 195.
- Iktyocelia* in petechialibus, & malignis febribus data C 653.
- Idea* quid B 319. Haec a causa externa excitata unde pendat B ibid. Nihil praesentat quod est in actione obiecti, vel passione organi B ibid. Eadem semper sequitur eandem obiecti in idem organon actionem B ibid. Huius nexus cum medullae cerebri mutatione non concipitur B ibid. *Idea* ab imaginatione saepe fortius sensorium commune mutat, quam alia ex sensuum perceptione procedens C 414.
- ΙΔΙΟΠΡΟΕΙΑ** quid C 14.
- Ieiunium* cur omnium minime ferant infantes B 106.
- Ignis* quando in epidemicis proficit, quando nocet E 164 ad 168.
- Ileus* quid, & unde C 164, 165. Est in recidivam pronus C 182. Vide volvulus.
- Iliaca passio vera* quid B 259, C 159: quid *notha* B ibid. *Vera* in febrilibus unde fiat B 259. Praecipuus in eadem curationis scopus, in quo consistat B ibid. *Iliacorum dolorum* a nephriticis disparitas C 224, 230.
- Imaginatio* quid B 320, C 414. In graviora an mutationes foetui inducere valeat C 406, 407. Epilepsiam causare potest C 414.
- Inmersio* in aquam hydrophobis profuit C 560, 571. Haec ut instituerenda C 571 pro curanda tachtide vix efficax C 632, 633, 634.
- Impraegnatio* quibus profuerit A 877.
- Incaratio* apud chirurgos quid A 231.
- Incrementum foetus* cur adeo velox A 73: corporis cur cessat A 72.
- Incurtus* experimenta & observata A 137.
- Incurtus* quid C 193, 294, quando apoplexiam minuetur C 294.
- Indicatio* in morbis quae prima C 32.
- Inedia epilepsiae* causa C 419, 420: plethoram tuto non tollit A 68. *Tridiana* cur in morbis damnetur B 416.
- Infantes* systema nervosum nimis irritabile habent D 685: effectus D 685, 686: cura D 686. *Eisdem* illico post partum praestandorum expolitio D 647 ad 652. *Eorum vitae regimen* a nativitate ad ablationem usque D 686 ad 689. *Infantes* a purgante a nutrice assumpto purgantur B 30. Temulenta nutricis ubera ducentes unde convulsi B ibid.: post validam convulsionem cur facile *paralytici* C 353: *harum* convulsionum cura D 751. De ceteris morbis. vide Meconium, Vermes, Dentitio, Convulsio, Glutinosum, Lac.
- Inflamatio* quid A 626, 627, 628. *Eius* a phlegmone, erysipelate, oedemate, scirrhus disparitas A 642, 643. 644: causa proxima A 628, 629, 630: remotae A 633 ad 642: diagnosi & effectus A 646 ad 652: exitus in benignam resolutionem A 653 ad 656. Quomodo tentanda 671 ad 691: in suppurationem A 656, 657. Quomodo fiat A 657, 658: diagnosi A 659, 660: cura Vid. abscessus. In gangraenam A 660: huius a suppuratione disparitas A ibid. *Futurae* signa A 661, 662: hanc accelerantia quae A 663, ad 666: cura. Vide gangraena: in scirrhus A 667: futuri ligos A ibid. cura. Vide scirrhus. *Hic* cur testiculorum inflammationem adeo frequenter sequatur A 667. *Inflamatio* in quibus facilis, in quibus difficilis curetur A 215. *Inflamatio primi & secundi generis* quid A 186. *Inflammatio*

tio pura quid B 672: *simples* quid B 420. *Inflammatorii* morbi post aestivos calores cur pertinacissimi B 43. *Inflammatoria* dispositio in quibus prae ceteris obtineatur B 581, 583, 810. In quibus minus B 809. *Inflammatoria materiae* non resoluta calculi causa C 245. *Ingenium perspicax & altum* cur epilepsiae obnoxium C 412, 413.

Ingesta cur remoram in intestinis patiantur B 377. Quibus viribus fiant corpus nostrum C 332, 339. *Horum assimilatio* nis praecipua causa quae C 642: minus bene mutata chronicorum morborum causa C 332, 339. Quae viribus immutantibus resistit C 638. *Copiosa* nimis cur parum nutrimenti suppedient corpori C ibid: *confusa* etiamli deteriora cur minus non assueris noceant C 639.

Inguinum dolores apud gravidas unde D 466, 467: medela D 467.

Inoculatio variolarum an suadenda E 142 ad 151.

Insolatio quae mala producat B 589.

Intemperantia apoplexiae causa C 266.

Intestina inflammationi quae magis obnoxia C 159, 160. *Horum inflammationis* causae C 159: diagnosis C 169, 170. Cautela in hac adhibenda C 168, 169.

Inflammatio incipiens difficulter saepe a nephritide distinguitur E 256: effectus & prognos C 162 ad 168, 170, 171, 172: cura C 173 ad 182. *Crafforum inflammatio* facilius curatur ac tenuium C 172. Exitus in *suppurationem*; huius signa & effectus C 182, 183, 184: cura C 184, 185: in *gangraenam* C 185. Huius futurae signa C 185: praesentis diagnosis C ibid. & 186: prognos C & cura C 186, 187. In *scirrhum* C 187. Huius diagnosis C ibid. & 188: prognos C 189, 190: cura C 189, 190, 191. In *cancerum*; huius palliatio C 190, 191. Corollarium solutio C 191 ad 196. *Intestinorum conspectus* in vivente quis; quis in cadavere C 162. *Est inflammatis* cur dolor per interval-

la augeatur C 163, 164. *Intestinorum vulnera* quomodo tractanda A 526, 527. *Illeusorum* per vulnus elapsorum cura A 527, 528. *Corruptorum* per vulnus evolutorum modela A 530, 531, 532. Saepè *tenuius vulnera* non sunt absolute lethalia A 526. *Discissa* iterum con- crescere possunt A 530, 531.

Ipecacuanhae doses etiam minores vomitum excitant F 254.

Ira causat melancholiam C 466: phrenitidem C 461. Puerosperas saepe reddit maniacas C 528. Vide animi affectus.

Ischias quid F 311. Huius species F 312: *nervosa* quid F ibid.: huius cura A 928, 929. F 312, 313, 314: *cotunni* circa huius originem & curam sententia F 315, 316, 317: *nervosae* species F 317: *anticae* sedes, prognos & cura F ibid. *posticae* sedes F 317: prognos F 318: cura F ibid & 319. *Generalis* in utraque specie diagnosis F 318.

Ischuria quid C 249. Huius species duplex est C ibid.: utriusque diagnosis & cura C ibidem. *Ischuria laborantes* eadem seore experiuntur ac illi qui sphacelo pereunt A 772, 773. *Ischuria gravidarum* unde D 477, 478; quandoque huiusmodi vesicae facit D 478.

Itinera melancholicis utilia C 478. *Iudicatoria* aut iudicantia cuius praesagii B 458.

Iudicium quid B 321: unde pendeat & quoduplex B ibid.

K

Kermes quid F 93.

Kermes mineralis praeparatio & virtus quae B 797.

Xytra quid D 464.

Xymyx quid B 618, 619.

L

Labor corpus firmat A 25: scorbuticis bonus C 626: eius variatio incredibile solamen affert C 466.

Lac quid A 29, 138. Huius natura a chylo & sanguine differt A ibidem: species

- cies D 109, 111. Laudatur in debilitate A 29, 30: in haemoptysi D 44, 45: in phthisi A 30, 32 D 108 ad 111. An serum huic praefereendum D 100, 101: nocet in acutis nisi prius diluatur A 126. Dupla aquae copia dilutum prodelt in aphthis C 212. Sitionibus non convenit B 214: in ventriculi cancro nocet C 194. *Acefcens* in infantibus epilepsiae causa C 418. Lactis serum lacti in melancholia praefertur C 491. Laudatur in calculo E 302, 305: in haepatitide C 102, 103: in ictero periodico C 631, 633, 634. In ulcere renum primo conducit, dein ipsum lac C 240: in phthisi D 94, 95. *Lactea diacta* est podagricis suadenda D 370, 371, 391. *Lactea febris*. quid D 608. *Huius* causae D 605: symptomata eam comitantia D 608. Cur lac circa tertium diem in mammis colligatur C 532. Sanguinem lactis loco ibidem colligi, quid timeendum C ibidem. *Lactis* in mamma stagnantis effectus D 633 ad 638: diagnosis D 638: cura D 638 639, 640. In apostema *tendentis* sedes duplex D 640: diagnosis D ibid.: cura D 640 ad 643. *Lactis* e mammis in sanguinis massam repulsi effectus D 609. *Huius metastasis* causae, effectus & cura D 610, 611, 612. *Lactis abundantioris* effectus D 644, 645. *Huius* minutio quomodo tentanda D 645: deficientis restitutio D 644, 645, 646. *Lactis* in infantis stomacho coagulati causae D 666, 679, 680, 681: effectus D 681, 682, 683: cura D 683, 684, 685. *Lactis boni* diagnosis D 671. *Lactis* altiturne in utero foetus? D 606, 607. Venularum *lactearum oscula obstruila* diarrhoeae causa B 379.
- Lactymae involuntariae* mortem quando praenunciant B 438. Haemorrhagiam autem quando B ibid., & 461.
- Lactationis* utilitas D 666 ad 670.
- Langvor* post sudorem quid denotet B 520.
- Laryngotomie*. Vide bronchotomie.
- Larynx* quid B 658.
- Lassitudo* quando adesse dicatur B 39, 63. Post somnum quid iudicet B 39: *huius* cura B ibid.: *summa* quando adit B 451: in ardentibus quid haec denotet B 452: *spontanea* quod in liquidis vitium accuset B 148. Scorbuto comitatur C 601: *huius scorbuticae* ab alia *lassitudine* *spontanea* disparitas C 601.
- Lateris dolores* qui phrenitici dicantur; qui *pleuritici* B 587, 588: nam non omnis huius loci dolor *pleuritidis* nomen meretur C 2. *Lateris doloris scorbutici* signa C 606: *laterum dolor* quasi *pleuriticus* ante variolarum, vel morbillorum eruptionem quid praefagiat C 18.
- Lexus fibrae*. Vide fibra.
- Lecti abstinentia* nephriticis bona C 235: caro decumbentibus C 326: *eadem* aliquot horarum per diem in morbis cur magnae utilitatis B 155.
- AEIENTEPIA* quid B 371. *Huius* species B 378: harum quae insanabiles B 380: *diurnae* signa ex facie B 386: haec in hydropem desinit B 387.
- Lentor* in humoribus quid B 148. *Duplex* in his reperitur B 277: origo, & diagnosis B ibid. A vasorum vitio qua ratione oriatur B 144: a plethora autem quomodo B ibid.. *Huius* effectus, & cura B ibid., & 145: a fibris spasmo contractis *ortus* qualis B 146: cura B ibid., & 147: *lentor* ab ipsis humoribus natus febre solviur B 148, 149.
- Lepra rheumaticum* sanavit F 274.
- Lethargus* quid B 598, C 313, 326. *Huius* causa C 326: diagnosis C ibid., & 327: exitus, & cura C 327. *Lethargus* nephritidem quandoque sequitur B 598. Estne morbus acutus C 327.
- ATKOΦAETMATIA* quid A 102, D 157. *Huius* ab hydropse disparitas D 157, 158: cura. Vid. hydrops. *Leucophlegmatici tumoris* indicia prima ubi appareant C 645. *Leucophlegmaticus* epilepsiam saepius passus habuit cur nascatur C 428.
- Lien* excidendi potest superstitie vita A 262. *Huius vulnera* quandoque lethalia A 262. *Lien* saepe culpatum dum in colo vitium hac.

- haeret C 152, 153. *Huius inflammationis* signa C 152, 153. *Haec* aliquando sub *pleuritis* nomine tractata C 153: in *suppuratione* abeuntis symptomata C 154, 155: item *scirrhi* C 155: *cancer* effectus C ibid. *Lenis dolor* *mitis* in *hepatide* quid indicet C 100. *Hoc* exsecto, vel *purulento* cur mole augeatur *hepar* C 154: *lenis* cur *haemorrhagiae* B 462, 463.
- Ligaturae artuum* in *haemorrhagiis* omnibus, *usus* quis B 307, C 296, 297: in *calore febrili* quis B 307: in *apoplexia* qualis C 297. *Menses* provocavit D 439. *Foris*, & *subita* ante *insultum epilepticum* applicata, illum impedit C 423, 450.
- Lingua tumens* anginae causa B 626: *densa, aspera, arida*, quid significet B 151, 329, 588. *Lingua* in *ardente* qualis & quid indicet B 448, 449. *Huius mutationes successivae* in *ardente* B 449, 450. *Nigredo* quae bona B 449. *Lingua* *interiorem corporis conditionem* notat B 449. *Primum futurae sanitatis indicium* dat in *morbis* B ibid. *Sordida* quomodo fiat in *febris* C 199. *Sordes* cur tantum in *superiori eius parte* appareant, non in *inferiori* C ibid.
- Liquidum vitale* quid A 160: *morbosum* quid A 161. *Illud*, quod *sphaericam figuram* amisit, cur ad *circulationem* ineptum A 194. *Liquidorum spontanea degeneratio* *chronicos*, ut *acutos* producit C 330. *Horum vitia* unde oriuntur C 331 ad 337: *densitas* unde pendat C 339. *Audā* *motus celeritas* quibus morbis originem dare possit C 339. *Vitia* quae *cachexiam* inducant C 640. *Liquidis nostris*, quae *concretionem* inducere possint A 195. *Hanc* quid tollat, aut impediat A 196.
- Lithiasi laborantes* qui dicantur E 215.
- Lithontripicum specificum* ad detur E 317 ad 343. *Lithontripica* *ex calce viva* parata in *calculo* profusere E 319 ad 327: modo abfuit *ulcus renale* E 323: his *substituta calcis aqua* praestat E 327 ad 332: qua ratione *haec* in *calculum* agat E 331. *Iniectiones ex hac* in *vesicam*, an locum habeant E 332 ad 335.
- Lithotomia* quando indicata E 355, 356. *Lithotomiae parvi apparatus* dictae, & eius *usus* expositio E 356, 357. *Magni apparatus* descriptio E 358, 359. *Haec* non *susdetur* E 359: *methodus lateralis* sive *raviana* laudatur E 360, 361. *Quomodo* instituenda E 362: *severum eius institutioni* *examen praemittendum* E 295, 296: *vernale & autumnale tempus* ad eius *celebrationem* eligi solet E 263. *Lithotomiae eventus* semper est *dubius* E 304. *Hac instituta* quid agendum super sit E 366, 367, 368: in *foeminis* *rarior* instituitur quam in *viris* E 369, 370: qua ratione *ex illis calculis* educatur E 370, 371.
- Literarum disciplina* animo prodest, corpori obest C 466.
- Literati* cur *apoplectici* fiant & quibus cum *symptomatibus* C 263.
- Lobelia* in *lue* cum *fructu* data fuit F 205.
- Lochiorum* copia quae D 589, 590. *Horum fluxus* plus, minusve durat D 592, 593: *fluxus nimis* causae D 589 ad 594: cura D 594 ad 603. *Suppressorum* causae D 603, 612 ad 615: effectus B 140 C 17, 18, 421, 531, 533 D 21, 22, 613, 617, 618: cura D 623 ad 635. *Suppressio eorum* ab *uteri inflammatione* est mala D 615.
- Loricae stridiores* quae *femoris* mala creant possint C 354.
- Lubrificationes nocturnae* causa podagrae D 293, 305.
- Luita* quae mala producere possit B 717: *ultima* morte longe peior B 810.
- Luis venereae* ortus primus F 1 ad 7. *Asit* *morbus epidemicus* F 7: an *contagiosus* F 17, 18, 19. *Qui* *sa* primus laboravit, *eam* sine *contagio* suscepit F 17. In *Europa* per *contagium* orta est F 17: qua ratione *communicetur* F 7 ad 13: *infans* sub *partu lucem* contrahere potest F 8, 9: & quandoque *utilitrix* F 9. *Luis* per *fomitum* *propagatio* quae

quae dicatur F 10. *Exempla huius* F ibid. & 11, 12. *Locus ubi primo se prodit* F 13 ad 16: non semper se manifestat in parte qua contrahitur F 13 ad 16: *diagnosis in illo loco* F 19 ad 22: *signa latentis luis* F 13, 14, 16. *Huius propagatio* quandoque cito, quandoque tarda F 30 ad 36. *Sententiarum Boerhavi & Astruc de sede luis* expositio F 24 ad 30. *Prioris opinio* unde multum confirmetur F 29. *Luis effectus* in partibus genitalibus F 38 ad 98: in membris F 98 ad 103. *Requista ut lues proprio dicatur* F 138, 139: *huius diagnosis* F 103: *cura* F 139 ad 206. *Argentum vivum* summo opere hic laudatur. Vide Mercurius. *Hoc non prohibetur*. Vide Mercurius. *Hoc non prohibetur* quidam *stridum vitæ regimen* praescribere E 358, 359. *Alii sudores* eliciebant F 189, 190: *ad hos praeparatio* F 191. *Quomodo proliciantur*, & quae circa illos observanda F 191, 192, quae circa illos observanda non sit suadenda F 194: *prudencia in cura luis venereae* requisita F 204: *lues non videtur rachitidis causa* F 216, 217, 221, 243. *Lumbago rheumatica* quid F 260, 311. *Huius a nephritide disparitas* F 268, 269: *prognosis* F 311, 312, 318: *cura* F 311. *Lumbago in variolarum initio* mali omnis E 43. *Haec post infectionem variolarum vix observatur* E 44. *Luxatio* quid A 597, 598: *species quae pessima* A 598, 599: *causae* 599 ad 602: *effectus* A 602 ad 610: *diagnosis* A 610, 611, 612: *prognosis* A 612 ad 618: *indicationes* A 628, 619: *harum cura* A 620 ad 624. *Luxatum membrum* cur plerumque brevius fiat, quandoque tamen magis elongetur A 604. *Luxationem si fractura comitetur*, quod malum prius curandum A 614: *luxata quando reponenda* A 615: *luxationem cur inflammatio sequatur* A 606, 615: *cur convulsio* A 607, 616. *Luxationes cum vulnere* cur adeo periculosae A 617: *luxata iam diu cur non facile reponenda* A 614, 625, 628. *Luxationi ressi-*

tutae superveniens inflammatio, cur non noceat, imo prosit A 619, 620. *Luxata* et suis sedibus facile post reductionem elabentia quo modo tractanda A 623, 624.

Lycanthropia quid C 521.

M

M*acula* in genarum interna superficie scorbuticis *familiaris* D 607: *haec ut curanda* C ibid. *Maculae lividae* in scorbuticis quid indicent C 612: *nigrae* quid C 617. *Maculae rubrae* quid & unde B 77. In febribus saepe observantur, & tunc quae prognostis B ibid. *Similes per pectus dispersae*, in valida peripneumonia quid denotent B 770. Per abdomen *livefcentes* brevi in intestino inflammatione quid indicent B ibid.

Malacia quid D 464.

Malignitas in morbis apud imperitos quae confectur B 386.

Malta quid D 106, E 617.

Mammarum expositio A 848 D 636. *Harum papillae structura* D 643: *huius dolentis causae* & cura D 643, 666. *Mammarum dolor* in gravidis unde D 467. *Exinanitio subita* praefagit abortum D 495, 496. *Mammæ lactantium* igni exponi non debent, nec spirituosius foveant A 851, 852. *Harum scirrhus* est frequens A 667, 668. *Qui inveteratus glandulas sub axillares etiam inficit* A 849. *An proprias in utero fugat foetus* D 653. *De ceteris mammarum morbis*. Vide Lac.

Mania quid C 519. *Huius a melancholia disparitas* C ibid.: *item a phrenitide* B 593 C 519. *Melancholiae proles* videtur C 519, 520: *huius causae* C 520: *diagnosis* C ibid. & 521: *cura* ope artis C 523, 524, 525: ope naturae C 525, 526, 527. *Mammarum robur immentum* unde C 520: unde *pervigilium* &c. C 521. *Anatomica scissio* quid in his demonstrat C 522: *maniae aliae species* & causae C 527 ad 530: *cura* C 530 ad 533: *maniae* vero tempore perniciosa

riodicae exempla C 518. *Mania* cur innumera deliriorum varietate ludat C 629. *Huius* diversae species cur sollicitè indagandae C 534. *Mania* intermittentes diuturnas excipiens evacuationibus male tractatur roborantibus cardiacis tollenda B 171.

Marasmus & eius synonyma C 649: *Senilis* aliquando ante aetatem habetur A 44. *Marinum sal* est attenuans, sed a corpore vix mutabile A 202. *Huius spiritus* scorbuticorum gingivis applicati effectus C 629.

Masticatoria in apoplexia frigida laudantur C 297.

Materia medica medico scitu necessaria A 78. *Materiae morbosae coctio* determinatum requirit tempus B 468.

Maturation quid A 693. *Haec* in abscessibus quomodo fiat; & quid ad bonam requiratur A 696 ad 700.

Meconium quid, & unde D 657. *Huius* effectus D 658, 659: cura D 660, 661. *Meconium* est toties convulsivum causa C 406. *Hoc* e corpore evacuatum esse totum quomodo noscatur D 660.

Medela specifica & *generalis* quae A 11. *Mediasinum* quid C 78. *Huius inflammatio* signa, & symptomata C ibid.: prognostis & cura C 79. *Hoc suppurato* an iterum pertundere liceat C 80. *Huius vomica aperta* quando empyema faciat C 669.

Medicamenta quid A 8. Per vitam superstitem actiosa sunt A 7, 9: aegrum aliter afficiunt ac sanum A 9: chronicos morbos quando producent C 354: convulsionem quando excitare possint C 420: pro varia aetate quae conveniant A 76, 77. *Medicamenta* in spiritus nostris agentia dantur A 773, 774.

Medicae institutiones praxim exercituro scitu sunt necessariae A 8, 9.

Medicina aegris sanantem praeiungit B 83. Fere semper in corpus agit A 5, 9: *Optima* est saepe nulla; & quando hoc B 50.

Medicus bonus quis dicendus A 14, 15, Tom. V Pars II.

16, 189. *Medicus aegrum adiens*, ubi residere debeat B 473. *Medicus amicus* cur extraneo utilis B 110.

Meditatio profunda produxit catalepsim C 316, 317: epilepsiam C 413: ad podagram disponit D 242.

Medullas ossium structura A 915, 916: corruptae effectus A 917, 918. Vide *Oleum*. *Medullae spinalis vulnerum* prognostis A 253.

Melancholia quid C 459: *Huius* a desirio febrili, phrenitide, mania, disparitas C ibid.: origo C 460, 451: causa proxima C 502: remotae C 502 ad 506: exitus C 506, 507, 508: cura naturalis C 508, 509, 510: artificialis C 512 ad 519. *Huius* optima methodus quae C 511, 512. *Melancholiae triplicis* gradus expositio C 471. Primus gradus. Vid. *Atrabiliarius humor: secundus*. Vide *Hypochondriacus morbus: tertius*. Vide *Atrabilis*. *Melancholia* morbos praecoexistentes. quandoque solvit vel minuit C 473. *Huius incipientis signum* pathognomicum C 474. *Melancholici* cur sputatores dicantur C 507: illis cur quandoque relinendum C 513, 514: cur non pertinaciter medicandum C 493. *Melancholicis* mulieribus cur dispositio uteri scirrhusa frequens C 481. *Melancholia* quo vitae tempore solet occurrere C 496. Quibus magis, quibus minus familiaris C 505, 506. Quibus in regionibus frequentior, & quo anni tempore C 468.

Melancholia hydropis causa D 199. *Memoria* quid B 286. *Vacillans* quid designet C 292. In senibus literatis quid praefagiat C ibid, & 293.

Meningophila quid A 480.

Mens quid A 4. *Eius* in primam nervorum originem actio cur nos lateat B 262. *Emotiones taciurnae* in acutis cuius omnis B 322. *Vehemens exercitatio* ad atram bilem disponit C 466.

Menstrua quid D 394, 395. Tempus primi & ultimi eorum fluxus D 395, 396. *Hic* cur in mulieribus obtineat C 285. *Menstrui sanguinis* fons D 396, 397. *Huius*

Huius fluxus, causae D 398 ad 408 : copia quavis periodo contingens D 408, 409, 410. *Menstruorum eruptio* gna D 411, 429 C 185. Quot diebus ducet periodicus quivis fluxus D 411. *Menstrui sanguinis natura* D 412. *Huius fluxus suppressi*, retenti, diagnosis D 418, 429 : effectus A 878, C 1285, 316, 421, D 413 ad 419, 427, 428. Evacuatio *menstrui* succedanea D 419 ad 427 : cura D 430 ad 449. *Menstruum fluxus* in apoplexia iuvat C 1285 : rum fluxus non turbat E 90, 91. In variolosis non turbat E 90, 91. In febribus provocatio quando indicata, & quomodo instituenda B 333. *Menstrua* primis graviditatibus mensibus subinde prodeunt, sed minori quantitate D 454, 494. Unde sanguis ille D 494. Sanguis in graviditate retentus incremento foetus & uteri impeditur D 458.

Menses anni qui maxime morbis immunes B 507.

Mercurius sive argentum vivum in variolarum initio profuit E 61, 62. Quomodo in lue prodeffo detectus fuerit F 140, 141. *Huius* in corpus nostrum effectus F 146. *Maximus* est salivatio F ibid. Vido Salivatio. An eius efficacia a proprio pondere & divisibilitate pendeat F 148, 149, 150. Qua ratione agat, non scitur F 150. Internae variae forma datus est F 151, 152. An eius praeparata spicula contineant F 152, 153 : luem sanant F 151. *Mercurius sublimatus corrosivus* aqua F 177 : datur in paralyti C 380. Aqua dilutus internae fumoris ulcera annosa sanavit F 178. In spiritu frumenti solutus luem curat sine salivatione F 179, 180, 185. In hac curae specie quomodo procedendum F 181, 182, 183. Usus eius internum qui non ferant F 185. Lotion ex hoc praeparato verrucas venereas destruxit F 183 : ita tophos &c. F 184. *Mercurius externe applicatus* luem sine salivatione sanavit F 173, 174, 175 : interna eius exhibitio cur praestet F 175. *Mercurialis annus* vel nihil profuit in curandis

gonorrhoeis F 109 : in hydrope tentata sunt D 225, 226, 227. Data sunt in melancholia C 516 : in mania C 523, 524. An in scorbuto locum habere possint C 632, 633.

Metallica corpora in ileo deglutita cuius usus C 178.

Metalum menstru solutum novas acquirit vires C 380.

Metaptoxis paralytis causae C 356.

Metus epilepticae causae frequens C 414, 415.

Mixtio noctu copiosa alvum parcam indicat B 35.

Milus eruentis quibus familiaris C 227. *Huic obnoxii* an sola haemorrhagia moriantur C ibid. Quando calculum in renibus haerere indicet E 274 ad 278. Si ex febris variolae violentia sit, quid significet B 73. *Eius* a motu valido orti cura A 145, 213.

Miliaria ibi frequentia, ubi aphthae rarissimae C 200. *Horum eruptionem* odor frigidus, subacidus praecedens unde C 509.

Millepedes in paralyti laudantur C 379.

Mineralium venenati halitus apoplexiae causa C 177, 178.

Moror maniam, melancholiam, imo phrenitidem producere potest B 585.

Mola eiusque causae D 594, 595, 596, 598 : indicatio D 594.

Momma Brunsvicensis quid, & quibus conveniat C 656. Datur in paralyti C 380 : in rachide E 147.

Morbilorum eruptionem semper praecedit febris B 79, 405. *Huius* a febre variolosa disparitas B 405. In regulari horum specie quando, & quo ordine fiat eruptio B ibid. : in anomalis vero B ibid., & 406. Notae quibus ab aliis exanthematibus distinguantur B 406. Ad erysipelas proxime accedunt A 731. *Morbilli* calidioribus tractati livescunt, & nigrescunt B 401. Horum eruptio cur saepe in infantibus paroxysmum epilepticum producat C 419.

Morbus quid A 1, E 98. *Huius* definitio du.

dupliciter tradi solet B 710. Quomodo
 indagandus A 6. *Huius cognitio*, & *cura*
 quae requirant A 7: causa proxima quid
 C 400, 619: remota quid C 400: praedi-
 disponens, & procatartica quid C ibid.
 Morbus *exacte* peracutus &c. Vide febris
exacte peracuta &c. Morbi *acuti* febiles
 qui vocentur B 11: *chronici* febiles qui
 B ibid. Morbi an propagentur ex patre
 in proles, & qui A 855, C 404, 405.
 Morbus *congenitus* quid C 406: *foemineus*
 quis dictus C 372. Morbus tria stadia
 habet A 651. *Huius initium* quid B 67:
 unde computandum B ibid & 68. *In-*
crementum quid B 69: unde pendeat B
 ibid. & 70. Status quid B 70. In hoc
 maximae perturbationes fiunt & crises
 B ibid. Non in puncto indivisibili con-
 sistit, sed aliquando ad unum alterum-
 ve diem extenditur B ibid. Spectantem
 saepe solum exigit medicum, non agen-
 rem B 71: status varietas unde B ibid.
 Decrementum quid B 71. *Huius tempus*
 incremento respondere solet B ibid. An
 aegri ex decremento pereant B ibid: ef-
 fectus quid A 11. Omni momento cor-
 pus mutat A ibid. Quando effectus cor-
 poreus dicatur A 9, 10. *Huius ablatione*
 quid fiat A 10: haec quomodo obti-
 neatur A 10 ad 16: morbi generales
 exitus A 653, C 340. Haec *superfuturi*
 quae signa exhibeant B 455: *percutientes*
 autem quae B ibid. Morborum describen-
 dae historiae & curationi ordo optimus
 quis A 16 ad 19. Morbum curare quid
 A 18, B 96. Curationis regula genera-
 lis A 381: *specialis* B 96, 97, 98.
 Morbi *simplicissimi* sedes quae A 11.
 Morbi interni externis congruunt A 955,
 956. Hinc *externorum* cognitio est an-
 teponenda A 117. Morbi cur circa no-
 tem ingravescant B 746. Post imper-
 fectas crises in longitudinem protrahi non
 semper periculo vacant B 474, 475.
 Qui a plenitudine orti sunt, evacuatio-
 ne curantur, & contra B 280. Morborum
 insulus divisio cuius utilitatis B 469,
 470. Morbos capitis acutos, qua ratione

excipiant *chronici* B 286. Morbi ex al-
 calino spontaneo. Vide Putredo: ex aci-
 do. Vide Azidum.

Mors inevitabilis est A 50: *senilis* sive na-
 turalis unde A ibid. & 74. *Mors* in
 morbis sine crisi saepe sequitur B 55.
Huius fucuratae signa B ibid.

Moschus laudatur in epilepsia C 417: in
 mania C 523: in morbis malignis C
 581: in hydrophobia C ibid.

Motuum nostrorum origo prima ubi haereat
 C 455. Motus corporis in epilepsia bo-
 nus C 449: in phthisi D 98, 99. Ni-
 minus quoque mala producere possit B 61,
 117, 121: eius medela B 118. Est me-
 lancholiae causa C 468. Hinc in illius
 cura quis conveniat C 491. Item val-
 de gravidis nocet D 498, 499. Motus
 magnus corporis, aut animi, cur rabio-
 sis periculosus C 574. Vide. Exercitium.
 Motus *peristalticus* quid B 252, 377: hu-
 ius usus, & effectus in ingesta B 377,
 C 161, 163, 164: quibus acceleretur
 B 377, 378.

Moxa quid A 370. *Huius* in morbis usus
 A ibid.: adhibetur in paralyti C 383:
 in epilepsia C 450: in podagra D 383,
 384, 385: in rheumatismo F 302, 303.

Mucus quid B 372. *Huius* sedes, & usus
 B 220, 372. Tenacitas in primis viis
 quae mala faciat B ibid.

Muscae in acutis venari quod signum B
 324.

Muscularis motus causa unde C 350, 351:
 nunc adest, nunc abest B 167.

Musculo agenti quae mutationes accidant,
 relaxato quae B 283: *huius* agentis ef-
 fectus C 426. *Musculi* in dormientibus
 non omnes otiosi sunt B 433. Qui diu
 quieverunt, si subito moveantur, cur con-
 vellantur C 373. Horum *minuta* torositas in
 phthisicis unde C 370. *Fabrica degenerans*
 paralytis causa C 351. *Musculorum* respi-
 ratoriorum, gulae &c. paralytis, prognos-
 tis C 366, 367, 368.

Matatio in morbis *subita*. periculosa A 59.

N

Narcotica quid A 523. Alvim adstringunt B 391, E 112. Quando in diarrhoea convenient & dysenteria B ibid. In fluxu hepatico iuvant B ibid., & 394: in rheumatismo F 297, 298. In qua epilepsiae causa primario indicentur C 445.

Narum pruritus in morbis quod signum B 462.

Notatio verum est balneum C 387: quibus convenit C ibid.

Natura quid A 3. Helmontio quomodo vocata B 16. **Huius molimina** in febris cur indaganda B 83.

Navigatio laudatur in melancholia C 515, 516.

Nausea quid B 218. Quomodo oritur C 418. **Huius** a vomitu disparitas B 219.

Nauseae febrilis causa proxima B ibid.: remotae B 219 ad 222: effectus B 223:

prognosis B 229, 230, 231: cura B 223 ad 229. **Hanc** nausea subitam requirit medelam B 223. **Nausea hypochondriacorum**, aut hysteriarum evacuationes an possit B 228. **Nausea gravidarum**

unde D 463. **Huius medela** D ibid. & 464. Saepe tantum tempore curatur B 230.

Necessaria quas vocentur, dum de delirio agitur B 602.

Nephriticum sabulum in urina continuo appareas cuius omnis E 299, 210.

Nephriticus dolor quomodo a colico & iliaco distinguitur C 224, 230.

Nephritis quid C 222. Huius diagnosi C ibid. & 223, 224: causae C 224 ad 229: effectus C 229, 230, 231: cura bonitate naturae & morbi C 231, 232, 233: artis 234 ad 237. **Nephritis calculosa** qualia symptomata frequentius habeat, quam inflammatoria sola C 223. **Huius curatio** C 236, 237. **Nephritidis exitus** in suppurationem, huiusque futurae signa C 237: faecae C ibid. & 238. **Vomicae renalis ruptae signa** C ibid.: cura C 239, 240, 241. Quibus

auxillis rumpatur C 239. **Nephritidis** suppuratae & vomicae ruptae cur adeo anceps eventus C 241, 242. Cur adeo difficilis curatio C 243. Quomodo pus per alvim exire possit C 242: in *feirrhum* C 244. **Huius effectus** & prognosis C ibidem: in *calculus renalem* C 245: in *gangraenam*; huius signa & prognosis C 245, 246. **Nephritidis** infinitae dantur species C 247: harum nomina C ibid.: causa quae frequentissima C ibidem: a diversis causis excitatae cura cur non tantum differat C ibid. & 248. Cur saepe in febris & harum crisis oritur C 248, 249.

Nervorum origo, structura, liquor, vis contrahilis A 297, 298. **Hi** in sua origine distinctissimi sunt B 323, C 349. Unde id concludimus B 601: *distinctissimi* etiam in suo decursu B 323, 353. **Minores ex maioribus** non exiunt, ut rami extruncis B 353: an conici C 358: similibus utpote cavi, ac vasa maiora, affectionibus subiecti sunt B 323, 324, C 358. **Quaevis eorum fibrilla** vagina obvolvitur, hinc variis morbis obnoxia C 359: eorum actio in corpus humanum quotuplex A 237, C 349. **Moventes** flere possunt in sua actione, *sensitibus* illibatis & vicissim C 349, 350. **Nervorum paris tertii, quarti, sexti decursus** iuxta arterias quare C 360, 361. **Recurrentes** distracti, ligati, animal mutum faciunt C 372. **Nervo** integre dissecto, eiusque partibus quid contingat A 235 ad 238, 298, 299: *tenso puncto* vel dimidiato *dissecto*, eiusque partibus quid A 238, 239, 299, 300: **huius prognosis** A 301, 302: cura A 242. **Nervo dissecto** cur partis gangraena A 237, 238. **Nervi optici** non se decussant A 459.

Neurologia pro paralyti curanda scitu necessaria C 389.

Nitri spiritus calculum solvit E 240, 312, 313.

Nixus effectus B 717 C 225.

Nodus quid A 940.

Nu-

Nutricis electio D 670, 671. *Huius vitae*
regimon D 672, 673, 674.
Nutrientiorum facultas determinati naquit.
A 60.
Nutrire quid dicatur C 637.
Nutritious conditiones C 648. *Haec* quo-
modo fiat. A 23, 24, 25.
Nutritiua materia cur blanda sit C 662, 663..

O;

Obesi parum sanguinis habent B 314..
Cur hebetes, obliuiofi, fomnolenti & tan-
dem apoplectici C 257. 468. *His* febrili-
tantiis pingue quidem foluitur, fed.
purum in excretis raro cur reperiatur.
B 48.
Obefitas unde C 256. *Huius cura* B 317.
312, C 256. Cur non validis, exercitiis,
tollenda C 337.
Observatio medica unde habeatur A 12,
13. *Nocturnum & iuvantum* in morbis.
quantae utilitatis B 111.
Obftrudio quid A 160. *Huius causa* pro-
xima A 161: remotae A 161. ad 181:
effectus A 182 ad 188: diagnosis &
prognosis A 188: cura A 188 ad 217..
Obftrudio an in omnibus vafis fiat A.
181, 182.
Oculi a medicis cur examinandi C 472:
ut valent, ita totum corpus B 437..
Hinc plurius, & certiffima dant in mor-
bis figna B ibid. In acutis lumen non
ferentes quid indicent B ibid. *Qualis*
status quartanarum paroxysmus pre-
hendit B ibid. In fyncope lapsuro *qua-*
les B ibid. *Horum maior* ex morbo vigor
quid indicet B ibid. *Squalida, ficei,*
pulverulenti quid B ibid.: *perversi* aut alter
altero minor quid B ibid. *Horum puritas,*
depuratio cito vel tarda quid B 438.
Aperis indomientibus quid denotent B
ibid. *Horum ficitas, & squalor* cur phre-
nitica B 586. *Perversi* in acutis cor
adeo mala C 368. *Disforfiones* post epi-
lepfiam cur quandoque tota vita ma-
neant C 426. Cur. ex flavo viridescens
in melancholia C 473.

Oculus ictericus, caliginofus in pleuritide
quid designet C 6.
Odores graves epilepfiam renovare poffunt
C 410.
Oedema quid A 164, 165, 643. *Huius fe-*
des A 165, 187. *Calidum* quid A 187,
643. *Huius* ab eryfipelate difparitas. A
643: effectus A 644. *Eryfipelatodes* quid
A 397, 643, 644. *Oedematodes* quid A
397. *Oedematofo tumores artuum* inferio-
rum in gravidis unde D 480: *Horum*
prognosis, & cura D. ibid. & 481.
Oefophagi feirrhofi fymptomata, diagnosis
B 646, 647: caufae B 647, 648: cu-
rae tentatae B 648, 650. *Hic feirrhus*
refpirationem cur rarius laedit B 650.
Oefophagi tumor in hyftericis flautentus,
male pro utri accenfu habetur B 230.
Huius vulnera fere femper lethalia A.
274.
Oleum fibras laxat A 46: *medullofum* unde
fecernatur A 909, 915. *Huius fedes* A
913, 914: *Deficientis* effectus A 909.
Degenerans multorum morborum caufa
eft A 910, 917 ad 920. Vid. *Olium*
morbi. *Oleum animale redificatum* in epi-
lepfia laudatur C 446.
Omenti expofitio C 84, 85, 156, 157.
Magna pars excindi potest absque ma-
gno damno C 157. *Eiusdem morbi* co-
gnitu difficiles C ibidem. *Degeneratio* va-
ria C ibid. & 158. *Illud* in vulnere ab-
dominali foras prolapsum, quando cito
reponendum A 532. Ad quid fubrep-
fione attendendum A ibid. *Quando ex-*
cindendum A 533. *Recens* ex animali
mactato evulfum in ileo applicatur C 176.
Pinguetudine diftentum ftultitiae caufa elfe
potest C 257: *Eius pinguedo* mota quo
tendat, & quae mala facere poffit C 85,
ONOTONON quid A 375, C 458. *Hu-*
ius ab epilepfia difparitas C ibid.: fubin-
de fub paroxifmo epileptico contingit
C 426.
Opiata laudantur in haemorrhagia uteri D
506: in ileo C 175: in nephritide C
235, 236: in epilepfia C 444: in atra-
bile turgente & mota C 501: in hy-
dro.
A a 3

drophebica C 377: in mania C 532, 533: in febribus quando proliat, *quantum* obliat B 159, 172. *Horum* in puerperio usus D 587, 588, 591. *Conspicienda* non sunt tuta D 588: in infantibus autem sit cautus D 663. Quem in variolis usum habeant & quomodo *propinanda* E 110, 111, 112: viam calculo parant E 303, 304.
Opium quid A 324. Est *verus* tumultuans spirituum domitor B 141. Est *carminativorum princeps* B 243. *Huius effectus* A 170, 171, 172, 325. *Adio* non facile explicatur A 170, 171. In melancholia cum prudentia est *exhibendum* C 347.
Orthopnoea quid A 502, B 761.
Os internum cur in nobis examinandum B 151.
Ositatio, & *pendiculatio* sunt prima *paroxysmi* intermittens futuri signa B 511.
Offa quid A 905. *Horum* generis A 905, 906, 907 F 127: usus F ibid. *Hae* *firmiores* cur sint in medio, quam in *extremis* A 559, 908. Quandoque soliditatem suam amittunt, & quasi *carneosa* sunt A 906. Similes morbos patiuntur ac partes molles A 905, 907, 909. *Horum* morbi ex oleo medulloso degenerant A 917. *Huius* degenerationis causae, effectus A 917 ad 920: diagnosis A 910: cura A 921 ad 924. *Osteum callus*. Vide Callus. Eorum *caries*. Vide *Caries*. *Integumentorum morbi*. Vid. *Petrionium*. *Eorumdem morbi* a vasis obstructione A 916: diagnosis, prognosis, & cura A 916, 927. *Naturalis color* quis A 543. *Offis vitia* *amoris* primum signum est coloris mutatio A 943, 418. *Affecti* separatio, & *perditi* regeneratio, in quibus citius, in quibus tardius fiat A 487, 574. *Offa* nova fractura disiuncta citius consolidantur, quam in priori A 594. *Fracta* agglutinantur glutine non coalescunt, sed *substantiae offae* regeneratione A 563, 564: in quibus morbis difficillime recreantur A 572, 573. *Offa* in senibus arida, & fragilia sunt A 567.

Offificationes in membranis cerebri inventae apoplexiam fecerunt C 269.
Ostracodermata rachitidem curant F 159.
Otium causa debilitatis cachexiae C 639: scorbuti C 596.
Ovariorum sedes D 147: hydrops D ibid.: diagnosis D 148: prognosis D 150: cura D 149, 150.
Ovi albumen debilibus prodest A 31. *Mellus albumine* digestu difficilior A ibid.
Ovo in utero contento quid contingat D 458. *Huius* cum utero adhaesio quae D 491, 492.

P

Pallor quid designat A 86, 101. In frigore febrili unde, & quibus in partibus primo observetur B 21.
Paludosa loca incolemes ad scorbutum propi C 233, 505, 545: item ad melancholiam C 505.
Pancreatis situs C 156. *Huius morbi* cur difficulter distinguantur C ibid. Quibus morbis *affectum* deprehensum sit C 156. *Huius vulnera* an lethalia A 263.
Panis decoctus debilibus proficua A 32. *Panis pisciculus* quid F 145: laudatur in rachitide F ibid.
Papaveris succi effectus A 149.
Papulae quid B 397.
Paracenthesis abdominis usus D 230 ad 237. *Hanc* instituendi modus, & regulae D 237 ad 249. An non semper institui liceat D 250: prognosis ex aquarum per paracenthesim educatarum indole D 249, 250. *Paracenthesis pericardii* an instituenda, & quomodo D 139. *Paracenthesis scrofi* expositio D 181, 182. *Paracenthesis thoracis* cum fructu instituitur D 235 ad 239. Quando *indicata* C 680: cautelae circa *huius* institutionem C ibid. & 681. Operationis *felix* successus, ex quibus intelligatur C 682, 683: *infelix* autem unde C 684, 685. Cur *periculosa* sit *oxefio* mediastino C 685. In emphyemate veteri cur mortem acceleret C ibid. Operationis expositio. Vid. Thorax.
Paracenthesis uteri sitae tuta D 156.

Pa.

Paralyfis quid C 349. *Huius* a tetano, somno disparitas C 349: causa proxima C 350, 351: remotae generales C 351, 352: singulares C 353 ad 363: effectus, & prognos C 363 ad 373. Naturae ope quomodo quandoque sanetur C 373, 374. Indicatio C 374, 375: cura C 375 ad 391. Cura generalis in paralyfi dari non potest C 375. *Paralyfis sedis* cognitio cuius utilitatis C 363, 364. Haec in faciei musculis sedem habens cur mala C 368. *Paralyfis* ex capitis vulnere quid denotet A 436. Pars paralyfi affecta, si simul atrophica fiat, quid indicet C 369, 370.

ΠΑΡΑΠΤΝΑΓΧΗ quid B 618, 619. *Paraphimosis* quid F 71. *Huius* causae F ibid., & 72: effectus F 72: prognos F 72: cura F 72, 72.

Parapneumonia quid C 72: veteribus quid C 72. Est frequentior, quam creditur C 73: huius diagnosi C 73, 74, 75: exitus C 75, 76: prognos C 77 ad 81: cura C 76. Hic morbus cur acutissimam febrem comitem habet C 73, 74: cur delirium perpetuum C 74.

ΠΑΡΑΠΡΟΣΤΝΗ quid C 72. *Paraplegia* quid C 188, 369. Veteribus quid C 189. *Huius* a paralyfi disparitas C 189: causae C 369: prognos C ibid.

Parapoplexia quid C 280. Quando adesse dicatur C 323. Est apoplexiae causa C 282, 283.

Paragrica in apoplexia quando primario indicentur C 445.

Paræstis quid C 349. *Paronychia* validissimam saepe excitat febrem C 73: delirium C 74: malignas signa, & symptomata A 7, 239, 240.

Parotis quid A 728, B 757. *Parotides nascentes* quando reprimendae, quando aliter tractandae B 485. In ardente suppurantes non semper valetudinem promittunt B 486. His in ardente evanescentibus quae prognos B 485, 486. *Parotides* cum hypochoandriorum dolore cur malignae B 757.

Parturientes cur facile apoplecticae C 269, 270.

Partus divisio D 514. *Huius futuri signa* D 516 ad 519: signa facili D 519: difficili D ibidem. *Nimis facili* saepe periculosus D 512. *Difficili* ratio duplex D 513 ad 516: prioris causae, harumque cura D 519 ad 555: posterioris causae, signa, effectus, & cura D 555 ad 581: impossibili, & quae in hoc agenda D 548, 553, 556, 557. Causae dolorum post partum occurrentium D 581 ad 584: earum ablatio D 584 ad 589.

Pathognomicum morbi signum quid B 15. *Pectus*. Vide Thorax.

Pedum tumor subortus quandoque hydro-pem pectoris levat C 527. Qui subito evanescens pectus aggravat C ibid. Hic est bonum in variolis symptoma E 97.

Pelvis descriptio D 535, 536: vitia, horumque effectus D 536, 537: femininae a virili disparitas D 400: angustior partum difficilem reddit D 535: huius causae D 537, 538: signa D 537. Eius ossa fecedantne sub partu D 538, 539, 540. *Methodus* succurrendi foetui per angustiores pelvim transitorio D 544 ad 558.

Renis expositio F 44 ad 48: inflammati fequelae F 70, 71, 72.

Peregrinatio in catalepsi bona C 321.

Pericardii hydrops: D 132, 133. *Huius* diagnosi D 134, 135: cura: Vid. Thoracis hydrops. An pertundi liceat: Vid. Paracanthesis. Inflammati symptomata C 78, 79: prognos, & cura C 79. Suppuratum, scirrhum cordi accretum inventum est C 79, 80. Vomicae in eius cavum ruptae signa, & prognos C 670. Haec quando empyema faciat C 669.

Pericranium quid A 405. *Huius laesi* diagnosi A ibid. & 406, 407: causae A ibid., & 408: effectus A 408: cura A 408 ad 411.

Periostii externi decursus, & usus A 562, 910, 911. *Huius* inflammationis causae A 927: diagnosi, & prognos A ibid. & 930: cura A ibid., & 931. In graenam vergentis signa A 931, 932.

A a 4

Natae diagnosi, & prognos *A* 932 : cura *A* ibid., & 933. Perioſti *externi* inflammatio quomodo distingatur ab *interni* inflammatione *A* 927. *Perioſtium* oſſi corrupto nunquam accreſcit *A* 928. Perioſti *interni* expoſitio, & uſus *A* 911, 912. Huius inflammationis cauſae *A* 933, 934: diagnosi *A* 935, prognos *A* 934, 935: cura *A* 936. *Suppurationis*, vel gangraenae natae ſigna *A* ibid.: prognos, & cura *A* 937.

Peripneumonia vera quid *B* 710, 711. *Ha-* ius ſedes duplex *B* 711, 712: cauſa proxima *B* 710, 711: remotae *B* 713 ad 716: diagnosi *B* 712, 713, 726, 727, 728, & 765 ad 775: exitus *tri-* plex 731. *Primus* in ſanitate per benignam reſolutionem *B* 731, 732, 733: hanc iuvantia *B* 775, 776: per *sputi* evacuationem *B* 731 ad 736. Quomodo haec fiat *B* 732, 733: haec promoven- tia *B* 776, 777: impediencia *B* 794, 795, 796: impediae effectus *B* 796, 797, 798: per alvi excretionem *B* 731, 736, 737: hanc iuvantia *B* 777, 778. Per urinam *B* 131, 737, 738. Sed haec copioſa eſſe debet *B* 739. Sub hac evacuatione quae proſint *B* 778. *Benigna* reſolutio hoc in morbo quando contingat *B* 731, 739, 740. *Secundus exitus* in alium morbum *B* 740: hinc in suppurationem *B* 741, 742: cur facile contingat *B* 741. Signa futurae *B* 742 ad 745: iam inſtautis *B* 745, 746: cura *B* 782 ad 785. Signa iam factae *B* 746 ad 749: huius exitus *B* 749 ad 753: cura *B* 785 ad 790. In metaſtaſes *B* 753, 754, 755. Harum futuratum ſigna *B* 755, 756. Si ad curam, quae ſigna *B* 756, 757: ſi ad aures, quae *B* 757: ſi ad hepar, quae *B* 758. Metaſtaſis haec quando bonae, aut malae *B* 758, 759, 760. Quid in ſingulis hiſce ſit agendum *B* 790, 791, 792. In *fœrrhum* *B* 760, 761, 762. Huius diagnosi *B* 761, 762: prognos, & cura *B* 793. In gangraenam *B* 763, 764: diagnosi *B* ibid.: prognos, & cura *B* 793, 794. In mor-

tem, quando, & quibus cum ſymptomatibus *B* 766 ad 775. *Peripneumoniae* verae qui magis, qui minus ſubſecti ſint *B* 809, 810. Haec ex alio morbo nata cur rarius venae ſectionem admittit *B* 779. In hoc morbo, quando indicatur venae ſectio, cur ad animi deliquium nunquam celebranda *B* 779, 780. *Peripneumonici* cur quandoque ſuſſus exilis, mollis, & inaequalis *B* 722, 723. Cur *reſpiratio* quandoque parva, frequens, diſſicilis *B* 723. *Tuſſicula* cur continua *B* 724. *Peripneumonia* omnium fere morborum lethaliſſimus eſt effectus *B* 723, 810. Cur validae pleuritidi ſuper- veniat, & quid indicet *C* 61, 62. *Peripneumonia notha* quid *B* 799. Huius a vera diſparitas *B* ibid. Quo anni tempore maxime frequens *B* 799, 800. Quibus magis eſt familiaris *B* 803. Huius cauſa praediſponens, effectus, & prognos *B* 801, 802: cauſae procatarticae *B* 803, 804: diagnosi *B* 803, 806: cura *B* 806, 807, 808. An venae ſectio in *peripneumonia notha* ſit inſtituenda *B* 801, 802, 806, 807. *Hac laborantes* dum tuſſunt, cur diſſidentem capitis dolorem, cur vertiginem percipiant *B* 806. *Peripneumonia ſicca* quid *B* 779.

Perſpiratio libera hilaritatis cauſa *C* 461: ſuppreſſa autem trititinae *C* 461: rheumatismi *F* 180. *Huiusmodi ſuppreſſio* in acutis mala *F* ibid. Haec frequentiores cur inferat noxas, quam aliae evacuationes ſuppreſſae *B* 36. *Perſpiratio ſoliſta* nunquam ſubito minuenda *B* 37. *Aucta corpus debilitat, roborat imminuit* *B* ibid. Multum minui poteſt abſque ſanitatis detrimento *B* 38: *perſpirationem* ex animi affectibus, qui augent, qui minuant, qui ſupprimant *B* 38: eandem ex cibis, & potibus qui augeant, qui minuant *B* ibid. *Perſpirationis ſalubris* augmentum quomodo detegatur *B* 91.

Perterebratio quibus fiat, & quando indicetur *A* 409. Ad diſſocem uſque quando inſtituenda, quando non *A* 410. *Perterebratio cranii* ſanatio quibus phoenomenis

menis fiat A 411. Quomodo instituat
pererebratio. Vide *Trepanum*.
Pervigilium quid B 344. *Pervigilii febrilis*
 causae B *ibid.* & 345: cura B 345 ad

349.
Pestis quandoque jugulat absque febre B
 177. *Hanc* si febris comitur, summum
 frigus adeit, dein calor maximus B *ibid.*
Pestis quomodo nunc in solos homines,
 alias in solos boves, vel cetera ani-
 mantia grassetur, an explicari queat B
 414. Animalium speciebus singulis pro-
 pria & peculiaris est A 141. Quando-
 que sub aliorum morborum larva latet
 E 152, 153. *Huius contagium* an mora-
 acrius fiat E 182, 183, 184. Vide
Contagium.

Petechiae quid B 402. *Quae bonae, quae*
males B *ibid.* Saepae febrem habent pec-
 cularis indolis & epidemicam B *ibid.*
 In aliis morbis quandoque apparent B *ibid.*
Petechiales febres quae proprie dicantur B
 403. In his unde eruptio citior, tar-
 dior unde B *ibid.* Quomodo febris tem-
 pore exanthemata rite erumpant B *ibid.*
 erumpentia qualia esse debeant B *ibid.*
 Si non erumpant, vel si livida quid
 indicent B *ibid.* Quibus cum symptoma-
 tibus prodeant B *ibid.* & 404. *Petechia-*
rum malignitatis gradus ex colore unde
 B 404: inde prognos B *ibid.*

Pharynx quid B 661.

Phlebotomia. Vide *Venae sectio*.

Phlegma apud veteres duplex A 95, 96.

Horum phlegma phlegmonodes quid *ibid.*

Phlegmone. Vide inflammatio. *Phlegmones* di-
 gitum occupantis cum pleuritide com-
 paratio A 954, 955.

¶ *PENITIS* quid A 149 B 579. *Huius a-*
delirio disparitas B *ibid.* *Vera & sympto-*
matica quid B *ibid.* Quomodo inter se
 distinguantur B *ibid.* & 580, 581. *Utrius-*
que causa proxima B 604, 605, 606:
 causae remotae B 606. Signa *veram* an-
 tecedentia B 581 ad 586. *Symptoma-*
tica autem quae B 586 ad 591. Morbos
 alios in hanc vergere signa B 588 ad 591.
Utriusque speciei diagnosi B 591 ad 594,

606: prognos B 594 ad 604. *Verae*
 cura per naturam B 610 ad 615: per
 artem B 610 ad 615: *symptomatae* cura
 B 615, 616. *Phreniticorum* anatomico
 quid exhibeat B 604. *Vera* tertio, quar-
 to, septimo die plerumque nocat B 594.
Symptomata autem magis protrahi so-
 lent B *ibid.* *Haec* a peripneumonia, illo,
 faucium asperitate, & circa necessaria
 cur lethalis B 602, 603. A variolis
 licet mala valde, ipem tamen facit B
 602. *Phrenitis* in quos morbos abeat B;
 595, 596, 598. *Haec* a retentis lo-
 chis maniam, & fatuitatem frequentis-
 sime relinquit B 597. *Symptomata* post
nephritidis curam remanentia quomodo
 tractanda B 615.

Phthisis quid D 1, 2. Ad hoc, ut haec
 adesse dicatur, requisita D 2. *Huius*
 species D 113, 114: causa proxima D
 2, 3. Proegumeneae D 9 ad 18, 56
 ad 61: procatacticae D 18 ad 25.
Phthisis etiam absque praegressa haemo-
 ptoe nasci observatur D 3: causae, si-
 ne praegressa haemoptoe, phthisin fa-
 cientes D 55 ad 62. *Huius* ex haemo-
 ptoe nasci diagnosi D 49 ad 53: *phthi-*
sis prognos D 6, 7, 79: regulae ad
 hanc formandam D 80 ad 84: cura
 D 33 ad 45. Palliatio D 111, 112.
 Prophylaxis D 45 ad 48. De reliquis.
 Vide *Vomica pulmonalis*. *Phthisis* in mor-
 tentis tendentis signa D 79. *Phthisicis de-*
speratis post diarrhoeam colliquativam
 unde inflammatoriae in facie pustulae B
 386. *Phthisis* est quandoque contagiosa
 D 72. *Haereditaria* D 16, 17. *Phthisis*
Tubercularis expositio & cura D 60, 61.

¶ *POH* quid D 2, 53.

Phyma quid A 730, 731.

Phymosis quid F 71: causae & c. Vid.
Paraphymosis.

Pinguedo quomodo in corpore animali pa-
 retur C 256. *Huius* in eodem usus
 C *ibid.* B 297: nimiae effectus C 257,
 336: solutae effectus C 337: cura C *ibid.*
Pinguis assumta cachexiae causa C 639.
 Cur tantam situm faciant B 209. pi.

- Pituita veterum duplex* A 95. *Pituita* non semper est morboſa A 95, 111, 112: *naturalis* cuius utilitatis A 98. Non est evacuada ſed alteranda, ſi abundat A 107: morboſo facere poteſt. Vide Glutinoſum. *Pituita vitrea* quid A 100.
- Placenta* ab utero ſoluta haemorrhagiae cauſa D 489, 490. Pro parte ſeparata an iterum cohaereat D 510. In abortu difficilius educitur, quam in partu maturo D 487: poſt partum quando educenda D 581. Vid. ſecundinae.
- Plethora* quid A 152 B 296, C 252: huius ſpecies A 152: cauſae A 153, 154: effectus A 155, 156: diagnoſis & prognofis A 157: cura A ibid. & 158. *Plethora* eſt apoplexiae cauſa C 411. *Oleſa* quomodo & a quibus oriatur A 128, B 310, 311: huius effectus B 311: cura A 128 B ibid. & 312.
- Plethoricis* cur ſumma quandoque debilitas B 269, 270. *His febricitantibus* ſubris immaniter, cur ſaepe augeatur *febris* veteribus quid Pleurae conſpectus. matris cauſa C 668.
- Pleuritidis* expoſitio C r. ad 4. *Descriptio* a laterum doloribus diſparitas C 2, 3. 4: *eiusdem* cum peripneumonia aſſinitas C 6: ſedes C 5 ad 10: vera & ſpuria quid C 10, 11: idiopathica quando diſvadat D 11, 14: quos & quando inquit C 14: *pleuritidis* cauſa proxima C 18: remotae C 15 ad 18: effectus C 18 ad 21: prognofis C 65, 66, 68 ad 72. Exitus in ſanitate auxilium *naturae* C 21 ad 33: ope artis C 33: ad 49: *metaſtaſes* quae ſalutares quae minus C 25, 26, 27: in alium morbum atque primo, in ſuppuracionem C 99, 50: huius futurae ſigna C 99, 50: *praesentis* diagnoſis C 51, 52: cura C 55, 56, 57. *Absceſſus* rumpendi ſigna C 55: ruptis diagnoſis & effectus C 53, 54.
- 55: cura C 58. Secundo, in *ſcirrhum* C 58. Hic poſt pleuritidem frequens C 15: huius diagnoſis & cura C 59. Tercio, in *gangraenam* C ibid.: huius cauſa C ibid. *Fuſurae* & inſtantis ſigna C 59 ad 65: *praesentis* diagnoſis & effectus C 68, 69: exitus in mortem C 69. *Pleuritis* dextri lateris benignior eſt illa, quae in ſiniſtro eſt C 9. *Pleuritidis* materia cocta, quomodo in pulmones veniat, & per ſputa eiciatur C 18, 19. Hunc morbum curandi methodus antiquiſſima C 42, 43.
- Pleuritis ſicca* & *humida* quid C 4, 5, 34: ſiccae cauſa, diagnoſis, & effectus C 65, 66: cura C 66, 67, 68: *pleuritidis* dorſalis quid C 9, 10.
- Pleuropneumonia* quid B 729 C 7: an detur C ibid. & 8.
- Plumbata* colicae piſtorum cauſa C 357.
- Podagra* quid D 287. Huic magis ſubiectus eſt ſexu virilis, quam ſoeminiſ D 290, 291: huius ſpecies D 287: ſedes D 287, 309 ad 311: progreſſus D 311, 312. Diſparitas ab arthritide D 288, 289: cauſa proxima D 331 ad 335: huius origo D 335 ad 339: cauſae praedisponentes D 289 ad 299: procatarticae D 304, 339, 340: *instantis* paroxyſmi ſigna D 301 ad 304. *Symptomatum* ſub paroxyſmo contingentium expoſitio D 313 ad 320: prognofis D 340 ad 344. *Podagricus* paroxyſmus vehementia, & diuturnitate variat D 319, 320: huius exitus duplex eſt D 320 ad 324. *Podagra* eſt morbus periodicus D 304, 307, 351: contagioſus D 298, 299: hereditarius D 298: indicatio duplex D 360, 361: primae cura D 361 ad 376: ſecundae D 376 ad 379: palliatio D 381 ad 386: cautelaſe ſub hac adhibendae D 386, 387. *Podagra veterum frigida*, & calida quid D 315: *podagra tophacea* quid D 324: eius materiae examen D 324 ad 331: prognofis D 344: cura D 379, 380, 381. *Podagricae materiae* reſtopulſae, vel in ſuo fluxu impeditae effectus, & ſigna C 161,

- 161, 162, 276, D 352, 353, 354: causae D 355 ad 359: cura D 381, 388, 389. *Podagricorum mors* quae D 359. Quaesitorum circa *podagram* solutio D 390 ad 393. *Podagricorum* morbis obnoxii sunt C 235.
- Pollutionum noxae* B 46.
- Polypus* unde ita dictus, & quomodo nascatur A 66: huius sedes C 259: prognosis, & effectus A 67, C 259. Potest partum difficilem imo impossibilem reddere D 530, 531. Ex anxietate febrili quomodo nascatur B 194: *polyporum* in cavis cordon, & maioribus vasis diagnosi C 260: polypi narium quid B 629: horum ortus, & sedes B ibid., & 176. *Polypus* concretiones post morbos lentos unde A 151. *Polyporum* symptomata quomodo ab hysteriarum symptomatibus distinguantur C 260. *Hic quiescentes* commode habent, sed a minimo motu anxii sunt C ibid.
- Posca* quid B 121: huius usus B ibid., D 50. Ponderis circa praecordia gravantis perceptio quid denotet C 483.
- Potatores strenui* cur aromatibus delectantur B 131.
- Potus* ex vulnere abdominali effluens quid indicet A 521: tepidi abusus noxae A 39.
- Praecordia* quid B 324, 325. Sordes circa illa a quacunque causa haerentes, quae producant mala B 325: horum contentio sine doloris sensu quid in ardente indicet B 461.
- Praxis medica* quid A 5. *Huius exercendae causa*, quae scitu necessaria A 8, 9, 678.
- Prognosis* in morbis quid A 27, B 95. *Haec* in morbis putridis unde pendeat B 431.
- Propellentia* quid A 201.
- Psijana* quid D 106, 107: tota quid D 106: eius succus, & eremor quid D ibid.
- Prisanae* usus in morbis C 491: in phthisi D 105 ad 108.
- Puerbas* difficillimos quandoque curat morbos B 46. *Huius* tempore humores ex blandis acres fiunt D 14. Alias adhuc in corpore tunc contingunt mutationes B 45, 46.
- Puerperae* quid primo contingat a partu D 581, 582, 583: quid tunc faciendum D 584 ad 589. *Puerperae* quomodo tractanda D 614 ad 629. *Lactans* metastasi lacteae non ita subiecta, ut, non lactans D 612. *Puerperarum* diarrhoea duplex D 619: indicatio D ibid.
- Pulmonis interna superficies* sensibilissima, huiusque sensilitatis effectus B 715, 728, 729. Eius *phlegmone* cui tam subito ad vicina loca pergit B 721: eiusdem *scirrhi* a vomica disparitas A 860: effectus, & prognosis B 761: diagnosi B ibid., & 762. *Pulmo* cur post morbos inflammatorios pleurae accrescat B 761. *Accretus* vix multa mala facit B ibid., & 763. *Huius accretionis*, & *scirrhi* cura B 793. *Vid.* *Peripneumoniae* exitus in *scirrhum*.
- Pulmonis abscessus* cur maturandus, maturatus cur cito evacuandus B 784, 785. *Huius disruptio* quomodo tentanda B 786. *Spontanea* quo fiat tempore B ibid.: signa huius *futurae* B ibid., & 787: *saeculae* B 787, 788. Quae tunc borantur cur *iusse sicca*, & *perinax* B 746: quae *respiratio* B 747. Quo in pulmone haereat *vomica*, sive *abscessus*, quomodo determinetur B 747. Illam cui sudor nocturnus fere semper comitetur, & quibus in corporis partibus prodeat B 748. *Pulmonis vomicae* saepe diu latent C 667. *Pulmonis hydrois* D 140: sedes huius D 142, 143: cura D 145. *Eiusdem paralytici* effectus C 366. *Vulnera* plerumque lethalia A 260, 261. *Pulmo* ad chyli mutationem multum conducit C 652. *Hoc laeso, affecto*, cur corpus marcescat C 653.
- Pulsus* quid B 427. *Quid* nunciet B ibid., & 428. *Quis est eius* in morbis usus B 428. *Varia experitur mutationes* a morbo non pendentes; sed unde B ibid. *Haec* quomodo dividantur B ibidem. *Harum definitio* B ibid. *Pulsus* exploratio quus

quas requirit cautelas B ibid. *Velocitas*
unde mensuretur B 7: quid designet A
146. Pulsus *frigoris febrilis* quis B 17.
Haus a caloris febtilis pulsus disparitas
B 20. *Eius rhythmus* in vigore febrili cur
saeps non distinguatur B 20. Pulsus *an-*
dofus & mollis in febribus quid indicet
B 87: *durus* autem quid B ibide *Pul-*
suum differentiae non ita possunt verbis
describi ac in aegris demonstrari B ibid.
Pulsus *intermittens* instante crisi quid do-
netur B 89: pro varia eius intermissio-
ne quid B ibid. Instante crisi *intermit-*
tens cum tensione & duritie pulsantis
arteriae quid designet B ibid.: cum mol-
litate quid B ibid. Pulsus *durius den-*
sus quibus *densior* A 146, B
294. Quibus *mollior* B ibid. *Eius magnitudo* quid doceat, & un-
de desumatur B 295. *Plenus* esse potest,
licet non sit magnus E 295. *Inaequali-*
tas unde & quibus in morbis observe-
tur B 424, 425. *Debilior* in morbis quid
indict B 428: *fortior* quid B ibid. &
429: *frequentior*, *inaequalior* &c. quid B
429. In morientibus *qualis* B ibid. In
laetitia, in melancholia quis C ibid.: in
epilepsia *qualis* C 398. *Qualis* in phthisi
D 76. *Quis* in scorbuto C 625. *Durus*
quibus in morbis observetur B 593 C 3.
Qualis in phreneticis obtineatur B ibid.
Cur *debilis*, *vacillans* in debilitate circa
vitalia haerente B ibid. Pulsus *dicrotus*
quid B 463. Quam indicare solet haer-
entem morrhagiam B ibid. *Uterinus* quid D 419:
420: quid indicet D ibid.
Pulsus *pyritus accensus* in epidemicis prodest.
E 169.

Purgantia dantur in cancro ventriculi A
898: in ileo C 178: in dysenterio C
194, 195: in aphthis C 215. in apo-
plexia C 298, 299, 305 ad 309: in apo-
leptia C 441: in rabie canina C 572:
624: in hydrocephalo D 123, 127: in
hydropse D 262, 263, 264: in tympani-
tude D 276: in mentium suppressione

D 441, 442, 443: in gonorrhoea ve-
nerica F 107 ad 112: in rheumatismo F
295, 296: in delirio B 332. An in po-
dagrae cura indicentur D 347, 348,
349, 377, 378. An in phthisi danda
D 91, 92. Cur in acutorum initis sa-
burra praesente indicentur B 229: in nau-
sea a spasms cur contra indicata B 228.
Haec repetita totum corpus exhaurire pos-
sunt B 376. In diarrhoea quando con-
veniant, quando non B 391: saepe cur
continuanda B 392. In exanthematicis
morbis quando prosit B 408. Ne in-
termittentem revocet, quid agendum
B 535. In eius fine data, contumacio-
rem saepe febrem faciunt B 536. In in-
termittentibus indicata quando porrigen-
da B 503, 504. Quibus titulis in in-
termittentibus prosit B 547, 548. Quan-
do obstat B 549, 550. Purgatio in fine
autumnalium qualis & cur necessaria B
558. *Haec neglecta* quid sequatur B ibid.
Purgantia antiphlogistica quae vocentur
C 305. Quibus conveniant C 306. *Pur-*
gantia fortiora cur aliquando vertigines
& animi deliquia sequantur A 678. *Pur-*
gantia injici possunt clysmatis forma; sed
qua dosi C 178. Sequitur purgatio ne-
supra.

Rus quid A 230. In vasis non conficitur
A ibid.: *boni & mali* signa D 70: *boni*
dotes A 230: C 341. Hoc quid boni
praestet A 230: vix reforberi potest B
769. Si reforbeat cachexiam purulen-
tam vix sanabilem producere potest C
640: item humores dissolvere C 653.
Horum infectio metuenda magis est in
ulcere pulmonum, quam in aliarum par-
tium affectione D 85. Bonum raro in
hepate cur fiat C 125. *Pus* sub cruen-
tum quando bonum, quando malum C
684. *Puris* facti & in abscessu collecti
684. *Puris* facti A 701 ad 704: non educti ef-
fectus A 704 ad 708. Huic dum exitus
conciliari debet, quomodo id faciendum
A 710 ad 715. Ex abscessu cur non
simul & semel exprimentum A 713.
apparet quandoque in partibus quibus-
dam

dam absque in iisdem inflammatione praegressa B 81. *Puris* per inferiora seculus in peripneumonia quid designet B 769. *Pus* in quo thoracis latere haereat, cur adeo scitu necessarius, & quomodo id sciri possit C 672, 673: per quas vias *natura* vel *artu* educi possit C 679, 280. De ceteris. Vide Abcessus, & Vomica.

Pustulae quid B 397: unde oriatur B 78. *Harum* a maculis rubris disparitas B ibid.

Furredo quid A 116, 117. *Huius* causae A 118, 119: effectus in *primis viis* A 120, 121, 122: in *sanguine* A 123, 124: *diagnosis* & *prognosis* A 125: *cura* A 125 ad 129. *Furredo* in nobis viventibus raro reperitur A 131.

Puridum in ventriculo appetitum tollit B 219. Quibus caveatur, aut emendetur B 224.

R

R*abies canina* ad quos morbos referenda C 535. Cur ita *dilla* C ibid. & 536. *Eius* ortus C 536, 537. Quomodo *pagari* soleat C 538. Animalia quae huic subiecta C 538, 539. Causae *antecedentes* C 539, 540: *efficientes* C 542 ad 545. *Incipiens* signa, & gradus in animalibus C 546, 547: in homine C 550 ad 558. Diversitas temporis respectu invasionis quae C 546 ad 550: *diagnosis*, & *prognosis* C 558 ad 561: *indicatio* C 566, 567: *prophylaxis* C 568, 574. *Cura* dum venenum sit actuosum C 574. *Cura* dum venenum sit indicata C 577, 578, ad 577. Contra *rabiosum venenum* antidotum dari possit C 579. An *specificum* detur C 583.

Rabiosi canis morsus quomodo a non rabiosi morsu distinguatur C 541.

Rachitis quid F 207. Magnam cum scorbuto affinitatem habet A 938. *Huius* origo F 107 ad 212: *divisio* F 208, 214. *Causa* proxima F 611, 613: *praedispicientes* F 214 ad 217: *procatarticae* F 217 ad 221. Morbi *incipientis* in non-

dum *incidentibus* *diagnosis* F 219 ad 230. Disparitas inter *tumorem* abdominis *rachiticum*, & *illum*, qui febres longas excipit F 210 211, 219. *Rachiticorum* anatomie F 224, 225, 226, 234. *Diagnosis* in *ambulare incipientibus* F 320, 321, 322. Mutationes procedente morbo observatae & effectus F 232 ad 242: *cura* F 244 ad 264.

Ranula quid B 616, 627.

Raresfactio quid A 180.

Recidiva quibus in febribus expectanda B 92. Si expectatur, quomodo aeger tractandus B ibid.

Regionum mutatio quandoque epilepsiam faciat C 436.

Remedia an morborum genio, an nomini applicanda C 635. *Specifica* quid E 380. *Remedium nullum* absolute & semper utile, sed tempestivo tantum usu tale fit B 11.

Renarum vulnera non semper sunt lethalia A 262, 263. *Ulcera* raro sanabilia E 310.

Renunciatio de vulneribus quid, & quomodo facienda A 284, 285.

Repletio in catalepsi quando bona C 321.

Repletionis sensus cur in hypochondriacis C 483.

Res non naturales quid, & quot sint A 281, B 116. Ad *illas* in morbis cur attendendum B 116. Peccatum in *illis* commissum febrem facere potest B ibid. *Illarum abusus* chronicorum multorum causa C 346: podagrae paroxysmum accelerat D 304 ad 309. *Iisdem* in haemipotos utendi modus D 43, 44, 45.

Resolventia quid A 70, 551.

Respiratio sana, optima quae, & quid indicet B 429. Fit absque voluntatis imperio B 430. Haec tamen augeri, minui, imo liti potest B ibid. *Respiratio velox*, & *laboriosa* unde A 146. *Respiratio* quid denotet B 430. In *valida* febre quid B 74. *Sirangulans*, & *sublimis* quid & quid denotent B 430, 431: *frequens*, *parva* quid indicet B 431: *inordinata* quid, & cuius omnis B 431: *frigida*, *fuliginosa* cuius B 432: *servida* vero

- vero summe periculosa est B ibid. *Respirationis* dealitas, raritas, celeritas & densitas unde B 448. *Respiratio brevis*, *anhelosa* erecto corpore unde, & quid pote scita in acutis quid indicet B 328. *Respiratio apoplethica* cur augeat quid saepe profundior somni temporatio scorbuticorum difficilis a *Respiratione* difficili ab aliis morbis orta quomodo distinguatur C 603.
- Revellentia* quae dicantur, & quomodo agant B 360.
- Revulsio* in angina quanti usus B 678. *Haec* in inflammationibus utilis A 674, 675. A 352.
- Rheumatismus* quid F 167. Quomodo formetur, ibid. Ad fluxiones cur referatur F ibid. Pro arthritide olim habebatur F ibid. & 269. Arthritidi, podagrae, scorbuti agnatus dicitur F 267 ad 272, 271: *causa eius proxima* F 289, 290, 291: *antecedentes* F 273 ad 276: *propterea* F 273, 276 ad 282. *Incidit* ad 286: *effectus* F 286, 287, 288. Difficilis quandoque est *diagnos* F 320. Dolor sub paroxysmo partem occupans non semper fixus ibidem manet F 282. 283. *Materiae morbi* vagae in partem recipiens effectus F 284. *Locus in rheumatismo dolens non semper tumet* F 285: *cura* F 289, 291 ad 319. In hoc morbo diathesis inflammatoria lentior habetur F 280, 281. *Rheumatismus* an periodicus F 286. Est quandoque *epidemicus* F 319. *Rheumatismi scorbutici* expositio C 600: *Rheumatismi* *cura* C 600.
- Rigor quid B 488: *ardenti superveniens* quid indicet B 488, 489: *crucis* *qualis* esse debeat, & a *symptomato* quomodo distinguatur B 489. *Rigore* *ardens* *quidem* solvitur, sed tamen raro, *vel nunquam* solo rigore sanatur B ibid.
- Risus apoplexiam facere potest C 270. *Sar-*
- donus* unde oritur C 75. Est *paraphrenitidis* *peculiare* *symptoma* C ibid. In *dentitibus* quid designet C ibid.
- Rodentia* in angina scirrhosa quae optima, & ut applicanda B 645: ab his quando abstinendum B ibid.
- Rubia tinctorum* in rachitide utilis inventa F 159.
- Rutilus* quid A 84. *Acidus* ubi bonus A 129. Vide *Flatus*.
- Rusticatio* in curanda phthisi optima D 98, 99, 100.
- PRIMA* quid C 668. *Huius* circa *thoracem* effectus, & prognosis C ibid.
- S
- Sacchari virtus* F 215: solvit A 71. *Qua ratione* in *rachitide* noceat F ibid. *Sacchari saturni* usus colicam pictonum facit C 357.
- Sales oleosi volatiles* quomodo parentur C 378. *Horum* in paralyti usus C ibid.
- Saliva* quibus constat A 639. *Huius* *proprietates* A ibid: *profluvii effectus* A ibid. *Expulsio* a contagio praeservat E 41.
- Suppressa* paralyfim fecit C. 355, 356.
- Salvatio* in variolis maxime confluentibus quid boni faciat B 87, E 87, 88, 97. *Suppressam* quae mala sequantur B 87, 88. In multis morbis saepe critica est B 88. *Salvatio per artem* in hydropse tentata est D 216, 217. Gonorrhoeam non sanat F 108. Instituitur tamen in *tertia* *eius specie* F 108, 109. *Luem* sanat F 146. Quae sub *salvatione* observentur phaenomena F 146, 147. Sani aequae morbofi humoris per vias *salivales* prodeunt F 147. Tutius est tam per argenti vivi usum internum instituire ac per externum F 154, 155. Plures in uno conclave inunctione mercuriali curare malum est F 155 ad 158. Hoc eviratur si interne propinetur F 157. Aegri ad *salvationem* praeparatio F 159, 160. *Qua ratione* mercurius dandus F 161, 162. *Instantis salvationis* signa F 162, 163. *Sputorum copia* intra *nuchtherum* quomodo

fit C 534. Si in minori copia prodeant quid agendum F 164: si autem in maiori quid F ibid., & 165, 166. Mercurio ad alvum ruente quid sciendum F 167, 168. Gingivae, os, & fauces nimium tumentes, & dolentes quid expolcant F 168, 169. A salivatione desistendum quodnam indicium F 170, 171. *Haec finita* quid superfit F 221, 222. *Salsa* cur tantum sitim excitent B 208, 209. *Sanguis* quid A 134. Quibus partibus consistet A ibid., & 135. Principia eius chemica C 464: maxima pars est aquea B 364: igne tamen citius quam aqua dissipatur B ibid. *Sanguis* est in concretione pronus A 136, 174. Haec ut impediatur in vivente C 260. *Huius rubedinis* origo in embryone quae A 136, 137. In sales, & olea resolutio unde A 144. Quot diversae magnitudinis partes habeat A 173: eius globuli unde sphaerici fiant A 175: *salidus* unde A 175, 176, 177. Laxa autem compages unde petenda A 175. *Sanguinis* serum quo frigoris gradu coaguletur A 176. Quo caloris gradu coaguletur A 177. *Sanguinis* massa quo frigoris gradu coaguletur, difficulter determinatur A 176. *Crusta* eius inflammatoria unde A 177. *Miscela* in aorta unde B 48. *Despumatio* in morbis quid B 51. *Sanguis* robustiorum, debiliorem autem tenuis B 65. *Sanguini* quaecumque liquida nova miscentur, per venas advehuntur B 74. *Hic* in summe plethorici cur fere accumuletur in arteriis B 145. *Crassus, in-spissatus* in cadavere frigore febili defunctorum cur reperiantur B 176. *Sanguinis* immeabilitas unde; *huius* signa B 191. *Sanguinis* motus causa A 138, 139: 191. *Sanguinis* motus causa A 138, 139: quibus aestimetur B 233. *Densus* unde B 294 C 260. *Huius* signum B 294. *Velocius* unde supputetur B ibid., & 295. *Refflentia* ex quibus noscatur B 295, 296. *Motes* unde B 296, 297. *Motus* audit, & imminuti causae. Vide *Circulatorii motus* &c. *Motus* cur retardetur in venis C 646. *Sanguini* sanissimi ho-

minis e vena misso quid contingat B 303, C 610. *Eius* mobilissima, & levissima pars quid sit B 303. Haec in singulis hominibus diversa est, & calore cito dissipatur B ibid. *Sanguinis* insula quid sit A 215: rubri deficientis effectus C 261. *Sanguini* aqua miscetur iatime vasorum, & viscerum motu B 365. Inflammatorie tamen *densus* micelam eius respuit B 366. *Eius* exsiccatio, & viscositas inflammatoria unde A 143, 144. Quomodo viscositatem atrabiliarium acquirat C 464. *Huius* ab inflammatoria visciditate disparitas C 464, 465. Quae pars in scorbuto crassior fiat, quae acrior C 619. *Sanguinem* alvo excernere quibusdam familiare est B 374. *Huius* enaribus *stillas* tortio, aut quarto die in ardente, cur lethales B 458. *Rubra pars* per intermittentes saepe dissolvitur B 519, 521. *Cacoehymia* ex intermittentibus nata quos morbos producat B 522. *Sanguis* *paripneumonicorum* cur quandoque tenuior, fluidior B 721: & tunc quid denotet A 183. *Sanguinis* *stillecidium* in acuris quid designet A 650: etiam si leve sit, quando pravam tamen B 770. *Vitalis* totus quantus per pulmones transit, B 717. *Eius serum* in angina inflammatoria continuo ex ore depluens quid indicet B 708. *Sanguis* per sputa eiectus ex pulmone veniens qualis D 167, 268. *Sanitas* quid A 1, 2: cuique homini prava sua est A 312. *Sanus* perfecte difficilis inventu A 1. *Sapo* quid A 204. *Sapones nativi* qui sint A ibid. *Horum* usus A ibid. *Magma* dosi in plethora oleosa dandi B 311. *Artificiales* quid A 204: C 378: *eorum* usus A 204, & 205. Laudantur in acrimonia acida C 335. Cur salibus alcalinis praefertendi C ibid. *Sapones ascensentes*, & *horum* in melancholia usus C 488. *Sapo venetus* datur in ventriculi scirrhus C 152: in melancholia C 487. *Sapo Starkianus* quid C 378. Datur in paralyti C ibid.

Sapo.

- Saponacea* laudantur in diarrhoea ab acri pingui orta B 388.
- Sarcotica* quid, & an revera dentur A 332.
- Scabies* in melancholia profuit C 508. Rheumatismum sanavit E 645.
- Scarificatio* celebratur in hydropse D 150, 152, 153: in hydrocephalo externo D 126. (Nocet autem in interno.) D 126, 127: in emphismate A 355: in gangraena, & quomodo instituenda A 778, 788, 789, 790.
- Scarlatinae* febris ab erysipelatoſa disparitas B 401. Quibus imprimis contigat B ibid. Quo anni tempore magis observetur B ibid. *Huius* signa, decursus, & exitus B ibid.
- Sciatagoga* sine mercurio lumen non sanant E 303.
- Scirrhouides* quid A 844.
- Scirrhus* quid A 392. *Huius* genesis & sedes A 843 ad 850. Causa proxima A 666, 667, 847: remotae A 850 ad 859: diagnosis A 859, 860: prognosis A 860, 861, 862: cura resolutoria A 862 ad 866. *Exstirpatoria* quando celebranda A 866. Quomodo instituat A 869, 870: palliatio A 870, 871.
- Scirrhus* quis curatur difficilior A 845, 846. *Scirrhus* benignus quis dicatur A 863: malignus quis A ibid., & 872.
- Huius* signa A 869, 872. Malignitatis gradus unde desumantur A 881, 882.
- Vide Cancer. *Scirrhus* extirpari non debet, nisi integre tolli possit A 866, 867.
- Scirrhus* partus tolli possit A 866, 867: item vulvuli A 858, 859: hydropis D 199. *Scirrhus* febre exagitatus in cancrum abit B 48. *Scirrhus* febris intermittens saepe effectus B 513. *Scirrhi* subitii unde fiant B 82.
- Scorbutus* unde ita dictus C 590, 591. An veteribus notus C ibid., & 592.
- Huius* ut bona diagnosis habeatur, cur morbi historia praemittenda C 592, 593.
- Causa proxima C 619, 620: praedisponentes C 593 ad 600: diagnosis primi gradus C 600, 601: secundi C 602 ad 606: tertii C 606 ad 611: quarti C 613 ad 618. *Scorbuti* effectus C 618: indicatio C 621 ad 624: cura primi gradus C 600, 601: secundi C 626 ad 630: tertii C 630, 631: quarti C 631.
- Corollariorum solatio C 633, 634, 635.
- Scorbuti* cum cacochymia atrabiliaria affinitas C 598, 599: item cum pesto C 603, 604. *Inveteratus* multa signa cum lue venerea communia habet A 938.
- Scorbutici* sunt pusillanimes C 599. Cur per acclivia, declivia difficulter ambulare valeant C 603. *Scorbuti* signa ubi se manifestare primo soleant C 749, 938: C 604, 605. *Hic* morbus varia sub morborum specie imperitos ludit C 606. Ossibus maxime infestat, & quomodo C 611.
- An contagiosus C 617, 618: inveteratus hydropis, tabis, convulsioniſ &c. causa C 615, 616, 617: item gangraenae A 749: apoplexiae C 276. *Scorbutus* ratione acrimoniae quomplex: quae: causae, & cura C 619, 620.
- Scotomia* quid C 192.
- Secundinae* quid D 571. An post partum illico sint educendae D 571, 572, 573, 585, 586. Modus educendi D 574, 579, 580.
- Semen* dum generari incipit, quae fiant in corpore mutationes B 46.
- Semicupia* quid E 303. Laudantur in calculo E ibid.
- Seneſcus* cita unde A 50, 193. *Seneſcus* in marasimum qua ex ratione tendat C 370: prognosis C ibid.
- Senes* decreſcunt A 43.
- Senium* ultimum quae mors excipiat A 193.
- Sensorium* commune quid B 323 C 253, 401. *Huius* sedes, origo C 254, 455.
- Locus autem distinctus est a prima origine motuum C 455, 456. In aliis quibus a causis alios minime moventibus cur turbetur C 402. In iunioribus cur tam facile afficiatur C 403.
- Sensuum depravatio* post capitis concussus, aut vulnera quid indicet A 450.
- Setaceum* laudatur in capitis morbis C 296: in phthisi D 19, 20, 103, 104: nec

- eet autem in hydropse aliquando D 255.
 In phthisi cum fructu applicatum D 19,
 20.
Siccitas quando adesse dicatur B 207, 317.
Huius diagnosi & cura B ibid. & 318.
Siccitas totius corporis in ardente unde
 B 448.
Sinapismi quid A 676.
Singultus quid B 265: causae huius B ibid.
 Quando *malus* B ibid. & 226: cura B
 226. In hepatide quid indicet C 84:
 in aphthis quid C 216.
Sinus quid A 716. *Huius* a fistula dispa-
 ritas A ibid. Origo, causa, natura,
 locus, & effectus unde intelligantur A
 ibid. & 727, 713: diagnosis *aperti* &
clausi A 719, 720: cura A 720 ad
 727.
Sitis quid B 207. *Sitis* febrilis causas &
 diagnosi B 207 ad 211: prognostis B
 211: indicatio B 212, 213: cura B
 213 ad 218. *Sitis* in hydropse mala B
 208, D 202, 215, 216. In intermit-
 tentium frigore cur adit B 208. *Sitis*
 causis praesentibus & tamen non *suire*,
 malum B 217, 450. *Sitis* ab immenabi-
 litate liquorum, ubi se primo manifestet
 B 211. *Sitis*, febris symptoma, an sedan-
 da aut negligenda B 212, 213. *Sitis*
 phthisicorum unde D 77.
Sinus corporis frequenter erectus in mor-
 bis quantae sit utilitatis B 493. In apo-
 plexia *bonus* C 306: in empyemate C
 672.
Strigma cutaneum in suis folliculis inspisa-
 rum Rheumatis causa C 340.
Sollicitudo quando ad melancholiam dispo-
 nat C 466.
Somnambuli quomodo ab epilepticis distin-
 guantur C 457.
Somnus quid B 338, C 323. Quibus cum
 phaenomenis obrepat B 346: quomodo
 impediatur B 344: huius effectus boni
 A 322. *Deficiens* in vulneris rektitu-
 gio quae A ibid. & 323. *Somnus*, *malus*
 corpus debilitas A 45: plethoram facit
 A 153: modum *excedens* morbosus est
 C 323. *Hic* varios habet gradus Cibid.
 Jon. V. Pars II.
 Per septimanas *durans* ad lethargum re-
 ferri potest C 327: cura tentata C 318.
Sopor an ubique *malus* C 325.
Sporismi cur venae sectionibus non tollendi
 B 243.
Sphacelus quid A 736. *Huius* a gangrae-
 na disparitas A 738: sedes 736, 737:
 causa proxima A 666: remotae A 738
 ad 753: signa *futura* A 755: *praesentis*
 A 755, ad 758: prognostis A 758 ad
 772: indicatio A 800, 801: cura A
 801 ad 831. *Sphaceli* praesentia deter-
 minatu saepe difficilis est A 755, 756.
 Nisi arte vel natura limes ponatur, pro-
 serpit A 757: *proserpentis* signa A 758.
Sphacelus extremorum tendinosorum in
 senio cur lethalis A 769. *Lethalem* sym-
 ptomata comitantia quae A 770, 771.
Sphacelus artuum nisi citissime ascendat,
 cur citam castrationem non poscat A
 800.
Spinæ bifidae descriptio D 227. Unde lym-
 pha in *spinæ bifidae* tumore contenta D
 228. Spina *ventosa* quid A 917, 918:
 dominis ratio A 919, 920: eius cau-
 sis A 921: diagnosi A ibid.: prognos-
 taphylaxis A 924, 925.
Spiritus nostri qua arte a natura reparan-
 tur A 322. Spirituum ardentium pro-
 prietates, & effectus in corpus nostrum
 B 136. *Abusus* scierthosa viscera reddidit
 A 36, 177: tromorem facit B 186.
Fossium halitus *hausti* saepe monent ia-
 tetur C 378.
Spissitudo inflammatoria cruoris quid C 160.
 Vide Lentor Glutinosum.
Spleniorum in fracturis usus A 587.
Splenium arteriae crurali applicatum me-
 ses promovet D 439.
Sporadici morbus quid E 4, 287.
Spuma ante os in angina quid denotet B
 707, 708: sub sine paroxysmi epilepti-
 ci an epilepsiae causa C 399. Sanguis
 unda in hoc paroxysmo quando
 prodeant & unde C 429.
Sputa in ardente quando, & qualia lo-
 cum habeant B 480, 481. *Sputorum*
 cura
 B b

- cum unarum sedimentis in morbis pe-
ccotis comparatio B 734. C 3. *Sputa*
demonstrantur B 734. 733. *Hæc qualia*
esse debeant B 733 ad 736. *Quæ ma-*
gnitudo in melancholia cur tantopere vo-
ceat C 507. 508. *Frequens & indecora*
in adstantes apud ægros quid indicet
B 599. 610.
- Sputum* flavum, fæcerum, nec album,
viscidum rotundum peripneumoniam cur
non solvat B 743. 744. *Biliosum cum*
pute in peripneumonia post sextum diem
quid indicet B 772. *Flavum, fæcerum* quid
B 772. *Flavum, fæcerum* quid & in pe-
ripneumonia quando prodeat, & quid
& cur non malum, sed inutile tantum
B 773. *Spumofum* quando dicatur & cur
in peripneumonia adeo malum B 773.
Fuscum coctofum, amureofum, nigrum
in peripneumonia quando malum B ibid.
& 774. *Sputa* a quibus supprimantur B
794. *Suppressorum* effectus B 796. *Quo-*
pleuritide quo tempore & qualia *prodi-*
sentia, subsanguinea in valida pleuritide
quid indicent C 60. *Nulla, vel diffici-*
lis quid C 61. In initio *varia, quid* C
63. *Sputacum* in phthisi *favor* quid
civis D 72. *Hæc* si maiori copia pro-
geritudo respondet, quod ulceris, aperti ma-
82. *Sputum sanguinis* unde D 3. *Sputum*
in vomica quo magis degenerat, eo mi-
nor curationis spes D 70. *Dele* in
phthisi instantem mortem non semper
ostendit D 71. *Sputum phthisicorum* in
aqua salsa fundum perentia sunt
D 70. 71. *Inspida* sunt optima D 72.
Suppresse mali omnino D 79. *Sputa in*
morbis pectoris sollicito a medicis exa-
minantur D 81.
- Stereus* diversitas unde peratur C 555.
- Scatoma* quid A 111. 165. Est anguinæ
aquosæ causa B 636.
- Stercus* e vulneribus abdominalibus effluens
quid denotet A 521.
- Sterilitatis* causæ in utroque sexu esse pos-
sunt A 857. In sexu foemineo cur fre-
quentiores A ibid. *Sterilitatem absolvam*
non semper faciunt vaginae & uteri
scitibi A 858.
- Sternutatio* quomodo fiat A 445. Singul-
tum quandoque solvit B 166: in pars-
lysi bona C 381. Quibus excitetur C
ibid. Nimia quomodo compescatur C
ibid. Quando in paru laudetur D 524.
- Sierior* in pleuritica quid indicet C 61.
- Sibium diaphoreticum* quibus constet B 797.
- Eius* vis in quo consistat B ibid.: usus
in morbis B ibid.
- Strithidium* narium in senibus uode C 162.
- Stimulantia* intermittentes aliquando in con-
tinuas vertunt B 31. 32. Quibus eva-
cuationibus prosit, quibus obstat B 180.
281. Quando in apoplexia dentur &
quæ C 301. 320: sunt etiam recen-
natis porrigenda D 663. Post partum
puerperæ data non sunt iuta D 588.
- Stomachus*. Vide Ventrículus.
- Sirangulati* qua ratione apoplectici pereant
C 273.
- Stranguriae* causæ C 613: quæ boni omi-
nis C ibid. & 614. Est illic causa C
230. 232.
- Stupor* quid deliquet C 192. Apoplexiam
saepe præcedit C ibid. In parte conta-
sa quid denotet A 545.
- Subalcolia salia* quid A 899. Quomodo
parentur & quibus conveniant A ibid.
- Subluxatio* quid A 598.
- Submersio* in mania quando tentanda C
524. 525.
- Suctionis* ex parte foetus impedimenta, ho-
rumque cura D 674 ad 679.
- Sudor* bonus quis B 86. 424. *Critici suda-*
ris portæ B 86. Quando expectandus B
ibid. & 363. 364. *Huius* in febribus
signa B 86: eiusdem a symptomatice
disparitas 364. *Sudor* cur nihil boni in-
dicet in febrium initis B 363. *dama-*
cur

tur A 177: adeoque non *exprimendus* B 62. Quandoque tamen elicitus est cum successu B 367. Sudoris febrilis causae B 364, 365: effectus B 365, 366: indicatio B 366, 367: ablatio B 368, 369, 370. *Sudor frigidus* cum pallore & debilitate omni momento auctus in pectoris vasculis quid indicet A 130. *Frigidus, partialis*, in guttas collectus, nec *stillans* in facie & capite acutorum quid B 86, 484. *Sudoris* guttulis oblita facies in ardente cur malum signum B 485. *Sudore* diffuentibus quis conveniat potus B 217. *Sudoris* ex debilitate corporis morbum diuturnum passi cura B 370. *Sudor* in intermitentis paroxysmi fine utilis est B 555. Cur arto eliciendus B ibid., & 556. Quis phrenitidem solvat B 610.

Sudor Anglicus quomodo tractandus B 367. *Sudorifera* quotuplicia B 641. Cur diarrhoeam curent B 374. Saepe intermitentem collunt, & quomodo B 550, 551. Quando his tentari non debeant B 552: profinitus in podagra D 349, 350: in phthisi D 90, 92.

Sugillatio quid A 539. Huius ab ecchymoli disparitas A ibid.

Sulphur pessima venena domat B 126. Huius vapor qua ratione corrigendus, ne suffocet B ibid.: nam attractus illico suffocat B 715. *Sulphuris spiritus* per campanam quid sit B 241. Quando indicatus B ibid. Quas anginas curet B 683.

Suppuratio universale non datur A 699. *Suppuratio* quid A 281. Veram hanc musculorum substantiam non occupat A 712. Quibus in corporis partibus cavenda, & quare B 80. *Suppurationis interinae* incoepae signa prima B 745: De ceteris. Vid. Abcessus.

Surditas post morbos acutos observata C 356. *Suspiria* unde, & quid indicent B 193. *Suturarum* cranii usus A 393. Harum vulnera sunt periculosa A ibid.

Symptoma quid B 98, 150. *Symptomata* agrius molestiora peculiarem a morbo

curam quandoque possunt B 98. Quando negligenda: quando particulariter tractanda B 166, 167, 170. Crisim concomitantia non sunt turbanda B 169, 170. *Crisica* a morbo quomodo distinguantur B ibid. *Intempestina*, nimis *saeva* sunt tollenda B 170, 171. *Symptomatum* perpetua in phrenitidis mutatio quid denotet B 601. *Symptomatum* magnitudo quid denotet B 414. *Symptomata* externe in morbis observata, internis partibus applicata cuius utilitatis B 86.

Syncope mortem saepe tentatur D 549, 550. In *syncope* delapsus quomodo excitandus C 365.

Syncopei cur polyposi C 340.

Syrinx quid B 618, 619.

Syrinx quid B 442.

Syrinx quid B 442.

T

Tabacum qua ratione a contagio praeservet E 42.

Tabes dorsalis quos corripit B 46. Huius symptomata B ibid.

Tabidorum febris quae B 436, 437.

Tachum in acris refugientes quam prognosum dant B 436, 437.

Taenia quid D 702, 703, 704. Species eius D 704, 705: cura. Vid. Vermes.

Talpa quid A 165.

Temperies biliosa signa C 338: *melancholica* C 505: *phlegmaticae* B 803: *stercorae* B 299. *Melancholica* ad cataleptum disponit C 315.

Tempestas austrina, calida, humida, sine ventis quid faciat A 180. *Tempestatis* in calidam, & frigidam repentinae vicissitudines, quae mala producant B 119.

Temporum vulnera cur adeo periculosa A 252: 393. In his cur trebratio non sit tuta A ibid.

Tenuitatis cora B 136, 137.

Tendo tot fibrillis constat quot musculus ipse A 240. *Laesus* eadem fere, ac nervus symptomata exhibet A ibid., & 241.

B b 2 Hinc

- Hinc eandem poscit curam A 142. *Tendinis laceris* live a poneuolitis *eiusdem* in venae sectione perusti signa & symptomata A 238, 239.
- Terra calcarea* magnam cum aëre fixo habet adinitatem E 317: experimenta E agant B 389. Valent in diarrhoea ab aëre orta B ibid.
- Terroris* effectus D 26. *Summus subitus* catalepticae causa E 316. *Terroris* percussus videtur catalepticus C ibid.
- Tesles* venerci, & horum diagnosis F 73: causae F 74, 75, 76. Cura F 128, 129.
- Tetanus* quid A 375. C 457. *Huius* ab epilepsia disparitas C 458: expositio & cura B 203, C 357, 358, 359. *Tetanus* correpti qui pereant, qui effugiant B 355.
- Theae* potus abusus sanitati nocet F 216.
- Thermæ* laudantur in chronicis C 345. *Cassidiae* in scorbuto C 631. In podagra E 340, 341. *Prosternum* in paralyti profusae C 386.
- Thoracici ductus* decursus A 277: *eius vulnera*, horumque effectus A 276.
- Thorax* quid A 490. Experimenta *circa eius vulnera* instituta A 270, 271, 272. *Vulnerum* in cayum non penetrantium diagnosis A 490 ad 493: effectus A 493, 494: cura A 494, 495, 496.
- Vuln* penetrantium diagnosis A 496 ad 502: effectus A 499 ad 502: signa A 502, 503, 504: cura A 504 ad 513. *Thoracis paracentesis* in pectore vulneribus quando indicetur A 507, 508. In situandi modus A 507, 508.
- Ubi loci* instituenda A 507, 508. *Instituenda* quid agendum A ibid., & 511, 512.
- Ubi* loci instituenda A 507, 508. *Thorax pleuræ* adhaeret quid praestandum A 509, 510. *Thorax pleuræ* ad phthisim disponit D 9.
- Huius angustiae* signum D ibid. *Thoracis hydrops* D 128, 129. *Huius sedes* D 130, 131: diagnosis D 131, 132: cura D 135 ad 140.
- Timor scorbuticus* nocet C 599.
- Tinea* quid E 191: *suppressa* rachitidem facit E ibid. *Intempetive sanata* epilepsiam C 422.
- Trititatio* in pedibus facta epilepsiam fecit C 401.
- Tophus* quid A 166, 940: F 101. Quibus familiaris A 167. Cur in lue venerea adeo molestus A ibid. Cura F 184, 206.
- Torpor* in graviditate unde D 467. In hydropse mali ominis D 201.
- Tremoris* idea B 180, & est duplex B ibid. *Uterque* unde oritur B ibid., & 181. A paralyti, spasmo, & sereno, qua ratione distinguatur B 180. In morborum initio quid designet, in fine quid B 181, 182. *Tremoris febrilis* causae B 180 ad 183: effectus B 183: diagnosis, & prognos B ibid., & 184, 185, 186: cura pro vario febris tempore duplex B 187, 188. *Tremorem* diu toleratum cur defatigatio sequatur B 183: cur comitetur frigus B 184. *Tremor* in febrium acutarum decursu ortus quid indicet B 184. Cur in maioribus animi affectibus adfit B 185. Cur circa mortem B ibid. In phreneticis quid significet B ibid. A magis evacuationibus cur oritur, & quid denotet B 185, 186. A nimio potu cur fiat B 186. *Convulsivus* patris paraliticae quotuplici capite bonus C 373, 374. Quando apoplexiam praedicet C 291.
- Trepani descriptio* A 473, 474. Quando indicetur A 464, 465. Applicationis locus quis A 465, 466, 469, 470, 471. Quibus locis non sit applicandus A 466, 467, 468. Saepius repetita fuit variis in plagis applicatio felici cum successu A 471. Praeparatio ad operationem A 471, 472. Hanc instituendi modus A 473 ad 477. *Instituta* quid agendum superstit A 478, 479.
- Tristitia* melancholiam generat C 467.
- Tristitia crudæ* non fermentato renax gluten inest B 33. Quos effectus in corpore producat B ibid.
- Tubæ Eustachianæ* descriptio B 666. Membranæ eius internæ inflammatae effectus, & cura B ibid.

Tumor quid A 164. **Huius** species A 164, ad 167. **Tumores** in encephalo foecurent apoplexiam B 163: sub axillis paralyfin C 336. **Circa** mesenterii exoritur, atrophiam C 648. **Tumor albus** quid A 102. **Turunda** in thoracis vulneribus quando profiat, & quando nocent A 510, 511. **Harum** in abdominis vulneribus ufus nocet A 520. **Tuffis** in pleuritide fere perpetua C 4. **Tuffis** non femper ab affectu pulmonis eff C 8, 9. In hepaticide dum adest, unde C 93: in hydropse eff mala D 201, 202. **Gravidis** nocet D 499. **Tympanitis** D 170, 171. **Huius** ab acido disparitas D 134: fedes D 172: genofis D 172, 178: prognofis D 273; 274: cura D 274 ad 279.

y

Vaginatae concretio. *Huius* effectus, & cura D 532, 534: *prolapsus* B 431, 529. *Huius* cura D 529, 530. *Tumores horum* effectus, & cura D 528, 530.

Valeriana sylvestris laudatus in epilepsia C 413: in vermisibus C 418.

Variolae quid A 731: unde E 1. *Harum* antiquitas E 1, 2; 3. Sunt plerumque epidemicae E 4, 5. Pro vario anni tempore varie grassantur E 5, 6, 7. *His decumbens* solo afflatu adstantes inficit B 64. Nulli sexui, aetati parcunt E 7 ad 15. Neque foetus *passe* sine naturali, sive artificiali via, an *visum* adhuc subesse E 10 ad 14, B 61. *Variolae* quibus leniores E 7, 15, 16. *Piores* quibus leniores E 7, 16. *Harum* inoculatio, quo anni tempore, & qua aetate fieri soleat E 15. *Variolae in stria* stadia dividuntur E 32. *Stadium primum*. Contagium quomodo suscipiatur E 17 ad 28. *Huius* symptomata, & diagnones E 42 ad 49. Durationis variat E 49 ad 52: effectus E 33 ad 49: causa proxima E 52: indicatio E 56, 57: cura E 58 ad 72. *Variolae per contagium* non semper communi-

cantur E 18, 19. Variolæ circa primam
 fomitis *variolofo* originem sententia, ha-
 runque solutio E 21, 22, 23. *Variolo-*
fo materia est subtilissima E 29, 30,
 31. Corollaria de contagio *variolofo* ex-
 posita E 29, 30, 31. *Variolæ* benignæ
 benignas non semper producant; sic etiam
 malignæ non semper malignas E 30, 31.
Pabulum variolosum in humoribus at-
 præfixit E 34, 35. *Variolosum conta-*
gium non semper sensibilem illico effe-
 ctum producit E 36, 37. Ad nares in-
 ternas applicatum periculosum E 39, 40,
 41. Cur raro superficiei pulmonis adhae-
 reat E 41. Frequentius cardia affigitur
 E ibid. Fundit quandoque humores E
 46, 47. *Variolæ* an inflammatorium
 morborum classi adscribendæ E 52 ad
 54. Quæ disparitas E 54, 55. *Meibo-*
rus universalis in morbo inflammatorio
 cur adhiberi possit in hoc stadio E 64
 ad 72: in quo consistat E 72 ad 80:
 quid præstat E 80, 81. *Variolæ*: fe-
 bres sine variolis quandoque contingunt
 C 508, 509: *stadium secundum* E 94.
 Eius decursus, symptomata, & effectus
 80 ad 94. Duratio variat E 94. Signa
 futurarum papularum E 94, 95: *præ-*
regulæ E 98 ad 105: exitus in suppu-
 rationem E 81, 93: in gangraenam E
 94, 95: indicatio E 105, 106: cura E
 105 ad 122. *Variolæ* cur ferius erum-
 pant, si actus in aliqua corporis parte
 dolor C 18. *Harum* eruptio subinde in-
 fantibus paroxysmum epilepticum exci-
 tat C 419. *Variolæ* gravidis periculosa
 E 91. *Stadium tertium*, cuiusque effectus
 E 122 ad 142. Indicatio *quadruplex* E
 117: cura *primæ* E 117 ad 122: *se-*
cundæ E 122 ad 127: *tertiæ* E 127
 ad 131: *quartæ* E 131, 132, 133. *Vari-*
olæ maturæ an aperiente E 120, 121.
 Cur in facie foeveolæ sub in plures, ali-
 bi pauciores E 121. Manuum tumor in
 variolis quid indicet E 124. Symptoma-
 tum variolas comitantium cura E 133
 ad 139. *Variolæ simplices* quid E 48,
 R 1.

B b

101:

102: malignae E 48, 102: discretæ E 95, 99: confuentes E 95, 100: spuriae E 97, 99, 102: sanguineae E 91: anoma-
 malae E 97, 99, 102: crystallinae E 103:
 fistulosae E 105: verrucosae E ibid.
Variæ quid A 166. Haec aneurismate frequen-
 tior A ibid. Melancholicis salutaris cur C 509. *Varices* podagram praecedunt D 302, 303: gravidis familiares A 166: unde proveniant D 480. Ha-
 rum effectus, & medela D ibid.
Vasorum genesis A 48, 49, 50. Horum di-
 visio attingi non potest A 187. *Angustiae* rationes A 161, 162. *Contractilia* unde A 170, 171. *Adiæ* in liquida unde pendat C 339. *Collapsus* effectus A 189.
 Amplius unde A 170, 171. Haec quo-
 modo mensuretur A 26. *Vasa exhalan-*
 tia, quot in spatio unius sabuli hiant di-
 cantur A 202. Vasorum debilitas quid A 52. Quomodo liquida vitietur C 330. *Hu-*
ius causae A 52, 53, 54: effectus A 54 ad 58: cura A 58 ad 62. Est ca-
 chexiae causa C 640. Vasorum rigiditas quid A 63. Qua ratione liquida inficiat C 330, 331. *Huius* causae A 63, 64: effectus A 64 ad 67: anamnesis, dia-
 gnosis, & prognosis A 67: cura A 67
 ad 71. *Vasa* in encephalo rupta apo-
 plexiae causa C 174, 175.
Vitis Roenhuyfiani descriptio, & usus D 547, 548.
Vegetabilia in calculum agere, quae dicantur E 342.
Vegeto-mineralis aqua quid F 125. *Bubones* resolvit C 496, 497.
Venarum nomine quid intellexerint veteres A 629. In venis pulsantibus quid conti-
 neri crediderint A ibid. *Venarum vulne-*
 ra quam prognosim dent A 244. *Ve-*
nae azygos in cavam inferio C 28. An
 materia pleuritica per os reiecta, per
 hanc in tracheam deferatur C 29. *Ve-*
nae sectionis utilitas quae A 68. Haec
 repetita ad plethoram disponit A 154, 155. In homine sano cautela gratia in-
 sistui non debet A 155. *Venae sectiones*
 consuetae cur non simul, & semel

sint omittendae A 159. *Venae sec-*
tio in acutis, si indicata, cur purgan-
 tibus, vomitoriis, praemitti debeat B 32. *Huius* in diversis morbis usus B 156.
 An in febris impetu celebrari possit B 156, 157. Ad quem diem instituire liceat B 157. *Huius* in pleuritide insti-
 tuendae rationes C 35, 36, 37. Haec
 in pleuritidis initio naturae molimina
 non impedit C 35. Hoc tempore ne-
 glecta etiam serius instituenda C 36. Re-
 gulae circa hanc observandae C 37 ad
 42. In pleuritide epidemica occuisse visa
 est C 40: in symptomatica cur quando-
 que minus profit C 63: in apoplexia
 quando conveniat, quando non C 303,
 304, 305. Regulae circa huius institu-
 tionem C 304, 305. Quando in ileo C
 174: in catalepsi C 321: in epilepsia C
 441: in hydrophobia C 573: in podagra D 344, 445, 346: in mensium
 suppressione D 439, 440. An in scor-
 buto conveniat C 627, 628: in melan-
 cholia C 511: in gravidis si instituantur,
 quando id faciendum D 469 ad 472.
 Quis locus ad hanc instituendam eligen-
 dus D 472, 473. Quo tempore, & qua
 copia D 473, 474. *Venae scissio* repeti-
 ta haemoptysim recidivam praecavet D
 46, 47. Ad obestatem disponit C 338.
Venae scissio in rheumatismo magni fa-
 betur F 291 ad 295. Non tamen sem-
 per requiritur in gonorrhoea F 109, 110.
 In calculo renali laudatur E 307, 308.
Venena alia ad quandam acrimoniam re-
 duci possunt, alia non B 32. Horum
 operandi modum ignoramus A 751, B
 32. *Venena* aeris igne odorato saepe de-
 struuntur B 124, 125. Venis etiam sae-
 pius dissipantur B ibid. *Venena* quaedam
 hepar magis turbant, quam alia viscerata
 C 86. *Venena* apoplexiae causa C 277:
 item chronicorum morborum C 334:
 gangraenae A 751: epilepsiae C 420.
 Atram bilem subito movent C 495. *Ve-*
nenum ravidum per cadaverum sectionem
 an communicetur C 561. Quandoque
 tota hyeme silet calore autem verno in-
 tricatur C 548. Ven.

Viscositas humorum quid A 163.
Viscus quid A 52. *Viscerum* adio *qualis* A 53. Debilitas & rigiditas. Vide *Vasa*. *Debilitas* variis acrimoniis locum *dat* D 11, 12. *Illes* iam pulmonem *afficere* signa D 12, 13.
Vita perfecta, laesa, abolita quid A 2. *se ipsam destruit* A 3. *Vitae vis* unde *men-*
furetur. *Vita* dum febris *adest*, *in ipso*
sui fonte afficitur. B 17, 18. *Quando*
augenda, vel *minuenda* pro abscessus *ma-*
turatione A 697, 698. *Vita laeta* ad
podagram disponit D 215. *Sedentaria* ad
scorbutum C 596.
Volvulus quid C 165. *Huius causa* C *ibid.*
 & 166, 174. *Perfectus & imperfectus*
quid C 166, 192: effectus C 167,
 186: cura C 174 ad 181: *prophylaxis*
 C 182. *Volvulo* cur tot pereant *infan-*
tes C 160.
Voluntas directo in vitales *functiones* *im-*
perio caret C 254.
Vomica aperta quid C 665: *clausa* quid
 C *ibid.* *Vomicae* empyoma *ficientes* *quae*
 C 666 ad 670. *Vomicae* *factae* *quae*
ptomata *discreant*, *quae* *maneant* C
 671, 672. *Vomicae* *pulmonalis* *testae* & *aper-*
tae *diagnosis* D 54, 55: *testae* *effectus*
 D 62 ad 69: *item* *ruptae* D 69 ad 73.
Ruptae in *cavum* *thoracis* *sequelae* D
 73 ad 80. *Vomica* *ab haemoptysi* *minor*
est *vomica* *a peripneumonia* D 84. *Ma-*
ior *minus* *periculosa* *saepe* *quam* *tuber-*
cula *minora* D 63, 64. *Vomica* *interna*,
externa *curatu* *difficilior* D 85. *Indicatio*
in vomica *pulmonali* *triplex* D 84, 85,
 86. *Primae* *cura* D 87 ad 95: *secundae*
 D 95 ad 105: *tertia* D 105 ad 111.
Vomitiva in *diarrhoea* *quando* *indicantur*,
quando *non* B 389 ad 392: *item* *in*
delirio B 331. *Profuntne* in *podagra* D
 348, 349: *tentantur* in *hydropse* D 260,
 261.
Vomitus quid B 252. *Huius materia* B *ibid.*
 & 259: *causa* *proxima* B 253, 254.
Unde vomitus *praecipue* *pendeat* B 254.
Vomituro *quae* *contingant* B 255: *causae*
remotae B 255 ad 258. *Hae* *exacerbat*

febris B 256: *effectus* B 258 ad 261:
cura B 261, 262. *Quaestionum de vo-*
mitu *variaram* *solutio* B 262 ad 267.
Vomitus validus *repleto* *ventriculo* *pericu-*
losus B 134. *Vomitus gravidarum* *unde*
D 463: *Medela* D *ibid.*, & 464.
Frequentior, & *validior* *abortum* *facere*
potest D 469. *Vomitus* *sub* *salivatione*
malus F 165. *An* *ad curandam* *podag-*
ram *ciendus* D 347, 348, 349. *Vomi-*
tus *in febris* *quando* & *quis* *bonus*,
quando & *quis* *malus* B 88, 258, 259.
Vomitus *critici* *futuri* *signa* B *ibid.*
Vox clangosa in *morbis* *unde*, & *quid* *de-*
notet B 151, 152.
Vulnus quid A 217. *Huius* *ab ulcere*, *fra-*
ctura, *fistula* &c. *disparitas* A 217, 218,
 536, 537: *causa* A 218: *subiectum* A
ibid.: *effectus* A *ibid.*, & 219. *Vulnus*
lethale quid A 219. *Absolute lethale* quid
 A *ibid.*, & 220. *Vulnrum absolute*
lethaliu *enumeratio* A 249 ad 277. *Per*
se lethaliu, *arte* *vero* *curabiliu* *expo-*
sitio A 220, 227 ad 280. *Ex* *non* *le-*
thalibus *lethalia* *fieri* *possunt*, *quae* A
 221, 280 ad 282. *Vulnrum* *diversita-*
tes *unde* *desumantur*, & *quae* *sint* A
 221 ad 225. *Phaenomena vulneribus*
corpori *sano* &c. *infridit* *proptia* A 226
 ad 233. *Horum* *causa* A 286, 287.
Vulnus recens *cur* *vix* *deleat* A 228.
Huic *cur* *superveniit* *inflammatio*, &c.
quae *bona* A *ibid.* *Labia eius* *cur* *re-*
torqueantur A 229. *In robustis* *magis*
hiant A 48. *Vulnus purum* quid A 231.
Vulnera *non* *ars* *sed* *natura* *curat* A 231.
Vulneris *omodo* *patentis* *praesentia*, &
natura *quomodo* *noscat* A 294. *Ab-*
secundum *quomodo* A 245, 246, 247.
Profunditas, *ut* *exploretur*, *quis* *requi-*
ratur *vulnerati* *situs* A 246. *Vulnrum*
prognosis A 247 ad 286. *Sanatio* *quid*
ad hanc *quid* *requiratur* A *ibid.*, & 303.
Quomodo *instituitur* A 303 ad 345.
An *semper* *requiratur* *causae* *vulnerum*
educationem A 304, 305. *Vulnus purum*
cur *abstergi* *non* *debeat* A 308. *Huius*
sanantis *phaenomena* A 309, 310. *Val-*
neratorum

neratorum diaota A 310 ad 316. Remediorum, quae convenient. A 316, 317, 318. Aer quis A 319. Aliqua quae A 320, 321. Somnus quanti momenti A 322, 323, 324. *Vulnus* raro designanda A 326. Singulis designationibus accurate *lustranda* A 328. Sordes in *valvula* undae, & quid faciant A 329. Harum ablatio A 329, 330, 331. *Vulnere* labia dum uniantur, id fiat in tota superficie A 335. In adunatione quomodo *remenda* A ibid., & 336. Eius perfectissima sanatio in quo consistat A 342. *Vulnus* nihil vel nimis tumens quid denotet A 383. *Vulnere* inter firmas corporis partes descendens tractatio A 386, 387, 388. *Vulnere profunda* quandoque in epilepsia profusa C 450, 451. *Vulnere* abdominis, intestinorum, thoracis, &c. Vide Abdomen &c.

Vulvae labiorum concretio, huiusque cura D 430, 534. *Tumor oedematosus* undae D 480. *Huius* prognos, & cura D ibid., & 481. Si *inflammatorius*, quam stet prognosin D 481.

TAPOKHAE quid D 179. *Huius* species triplex D ibid. Prima D 179, 180, 181. *Huius* diagnosi D ibid.; cura D 279, 280; *secunda* D 179, 181, 182; *huius* diagnosi D 179, 182; cura D 280; *tertia* D 179, 184, 185. An detur adhuc alia species D 185, 186; cura D 280 ad 284.

Ulcera pessima scorbuticis familiaria C 608, 609. *Anno*sa copiam feri quotidie plenaria, cur non illico plenaria, cur non illico sananda C 642. *Ulcera* *fici* quid designet A 231, 277. *Ulcera* *lustrantes* chirurgicus carnis consistentiam explorent A 945. *Ulcere* *venetei* in parte recta cute haerentis signa F 36, 37; effectus F 37. *Ulcera* *saucium* *venerea*, quomodo ab aliis distinguenda F 31. *Undionum* effectus D 36. *Hae* cur olim adhibitae B 37. An semper noceant B

TIPOZAPRA D 156, 157. *Prethrum* dissectorum signa A 280.

Urina quid in se contineat C 619 t. *alios* officium quale A 774. *Hae* sanguinis sales, & olea abluat B 61. Ex abdominali *vulnere* *effluens* quod signum A 322. *Huius* effectus A 322. *Urine* coctionis, & cruditatis signa melius exhibet, quam crisis B 89, 90. An tota morbi materia per *solas* *urinas* evacuetur B 89. *Urina* in acutis quae mala, bona quae B 90. *Urinatum* *turbidum* separatim vel cito, aut tarde facta, vel omnino nulla, quid indicet B 90. *Urinae* *suppressionem* cur febris, & coctio affluens sequatur B 35. *Urina* *subturbida*, in pleuritici levo *sedimentum* habens, quid denotet C 24, 25. *Hepaticum* *stratum* qualem, & quando C 100. *Pauca*, *tenuis* in nephritide quid denotet C 225, 232. *Tenuis* *aquea*, *multa* in hysterici quid C 228. *Crassa*, *incocta* in nephritide quid C 232; intercepta cur ibidem mala C 230. *Urine* intercepta cur ibidem laudabilis conditio quae nec in nephritide C 245. E 209; *sudimentum* calculi habet C 245. E 209; sponte *calculeas* *crustas* deponit C 340. *Huius* *suppressio* quotuplex ratione noceat C 340. *Incontinentia* post puerperium unde C 372. *Urina* *crassa*, *multa*, in qua de C 372. *Urina* utilis C 284. *Urinae* *tenuis*, *apoplexia* utilis C 284. *Urinae* *repletio*, & *crudas* praeter motum sine repletione cuius morbi invasionem denotent C 617. *Urinae* *scorbuticorum* quales C 606, 614. *Urinae* inter praecipua *scorbuti* signa habetur C 614. *Urina* *purulenta* copiosa abdominis abscessum sanant A


707. *Urinae* quomodo *strum* & *fabricam* habeat D 400. *Grandis* ut suum conservet *cras* *simum* D 456, 457. *Hae* cuius post partum *urinae* *urinae* D 456. *Gravidi* *mutationes* *successivae* D 525, 526. *Moles* *urinae* *aucta*, quae incommoda faciat D 450, 451. Quae his *medela* D 460, 461. *Urinae* *mala* *effluens* omnes actiones *turbare* potest D 455 ad 459. *Eiusdem* oris *concretio*, huiusque effectus, & cura D 533, 534, 535. *Colic* *urinae* & *angustia* D 525, 526; cura D 527, 528. *Urina*

Uteri hydrops D 150 ad 153. *Huius*
diagnosis D 154: *cura* D 155. 156.
Inflammatio D 615. *Huius diagnosis* D
 615, 616: *prognosis* D 620: *exitus* D
 ibid.: *cura* 630. *Suppuratio* D 620. *Hu-*
ius diagnosis D ibid.: *prognosis* D 620,
 621: *cura* D 622, 623. *Obliquitas par-*
tus difficilis causa D 569, 570: *causa*
huius praecipua quae D 570: *diagnosis*
 D 570. *Emendatio* D ibid. *Ruptura* D
 541: *prognosis* D 542, 543: *diagnosis*
 D 543. *Signa foetum rupto utero in abdo-*
mine huerero D 543, 544. *Haemor-*
rhagiam ex rupto, vel sano venire D
 544. *Huius se post partum contrahentis*
iudicium quod D 572. *Peculiaris in hoc*

viscere dispositio abortus subinde causa
 D 501: *eiusdem calor maior foetum do-*
struere potest D: 502. *Uteri tympanitis,*
& eius cura D 754.
Uvarum recentior pressarum succus omnia
in corpore solvit B 132. *Pessimam saepe*
diarrhoeam facit B ibid. *Fermentatus au-*
tem. Vide Vinum.
Uvula in enormes scizrhos quandoque de-
generat A 844.

Z

Zarsa parilla in lue profuit F 196 ad
 200.



HERMANNI BOERHAAVE
LIBELLUS
DE
MATERIE MEDICA
ET
REMEDIORUM FORMULIS,
QUAE SERVIUNT
APHORISMIS
DE
COGNOSCENDIS ET CURANDIS MORBIS.

Tom. V. pars II.

A

AUDITORIBUS SUIIS
S.
H. BOËRHA AVE.



go, postquam animum medicinae ex auctori-
tate Procerum academicorum docendae ap-
plicui, id imprimis credidi mei esse muneris,
candide ut vobis exponerem, simpliciterque fir-
ma illa, quae veris experimentorum successuumque eventis fir-
ma in arte cognoscuntur.

Sane eo quidem proposito perscrutabar relicta nobis h-
die ex iis, quae sapienti industria explorata sibi satis
spectata tradidere veteres. Illa vero, ubi composui
quas medicinam faciendo deprehendebam, inveni observ-
sollicite naturae vestigia ubique pressa: neque adeo ce-
quid sperari posse, neque aliunde colligi meliora.

Ferebat interim animus & illa utcumque perlustr-
quae dominante per Europam barbarie Arabes, Prisco
nacti monumenta, eorum inventis addiderunt, quae
Latinum versa sermonem nostrae intelligentiae patebant.
dolui gentem solertissimam, licet subnixa esset tam
adminiculis eius subtilitas, parum boni, mali plurimum,
medicae attulisse disciplinae.

Neque perfunctorie deinde excussi recentiorum placia,
pulcherrima profecto commendata specie, sive physices ex-
cultae fructus, sive spectaveris artium liberalium medicinae

P R A E F A T I O:

promovendae adhibitarum effectus. Gaudebat utique his intentus animus. Interea tamen licentia fingendi, assumendi audacia, festina nimis, & ambitiosa ad consummandam medicinam properatione, primorum vero auctorum contemptu, neglectu, vel ignorance, ipsa quidem scientia medica damni plus, quam emolumenti, omni hoc molimine accepisse videbatur: materiem certe, unde instrui felicius queat illa; liberalissime aggestam a nostris ut gratamur arti, ita deplo-ramus eius fata, quod tumultuaria opum collectione obruta verius, quam adiuta fiet.

Instituto itaque hoc rerum examine, quid, quaeso, rationi consentaneum magis, quam ut conciderentur in adversaria, quaecumque in omnibus hisce adeo sana, ut peritus nemo de fide horum ambigat? Hac itaque perfuncto opera prius dein conandum fuit, ut ex sparsis his conficeretur corpusculum quoddam ad leges disciplinae concinnatum, in quod & ipse intueri possem sedulo, quoties in artis exercitatione versarer, simulque eo referre, si quid novi forte aut insoliti appareret; postremo ut hac agendi ratione veri quid & digesti animo impressum meo vestros in usus fideliter effundere liceret.

His demum causis natum vidistis libellum, quo ausus fui scripta aggravare medica *de cognoscendis, & curandis morbis*. Cuius profecto toties me puduit, quoties defectus eius mihi nimis notos ipsi putare aggredior, veterumve componere operibus. Hoc scilicet me metiens pede impar deprehendor,

P R A E F A T I O.

qui legitime auctoris boni titulum ambire sustineam. Neque tamen abesse poteram ab audacia evulgandi hosce aphorismos, nisi deesse voluisssem muneri, quod mihi dederat publica auctoritas, cui obsequia debeo.

Opus igitur aggressus quum cogitarem semper, sola ut esset cura mederi, atque cavere quam religiosissime, ne quid irreperet, quod periculoso semper hac in arte errori causam praeberet, necessarium duxi in toto opusculo nulum commemorare medicamentum.

Nec iniuria: namque id imprimis arbitrabar nocere, dum, audito remedii nomine & morbi, exercendae se parati arri iactant empirici, impune in hominum perniciem grassantes, donec sero solo tandem cadaverum experimento sapientes.

Quum interim discipulis deberem exempla, praescriptam ideo in privatos horum usus pauca de materie medicae huiusque ordinandae legibus, tantum ut servirent iis, intento me animo audiverant differentem in scholis doctoribus de occasione, qua sola utilia evaderent.

Estis vero idonei vos testes, quanta circumspexitur, quam saepe taediose fere ad fastidium usque tiarum consideratione odiosus sim, priusquam vobis medicamenti nomine vel minimum quid laudare ausim: cre gnarus nihil dari, quod ubique bonum; contra id, quod hac rerum facie salutare fuerat mutata condicione perniciosum saepe deprehendi.

P R A E F A T I O:

Nefas itaque putavi *medicaminum* nomine haec ipsa evulgare, sed cum admonitione severa modo describenda dare his, qui operam mihi sedulo dederant, pro tenuitate mea idoneas cautelas inculcare conanti. Sed, quod doleo, longe aliter evenit: me quippe nec consulto, nec volente, in usus publicos extundenda curavit haec Lundini vir eruditus, alte nimis de vili hoc opusculo, eiusque auctore, sentiens & scribens; neque tamen ita res gesta, quin errores simul bene multi, & noxii in edendo contigerint.

Coactus ita recensui, correxi, amplificavi nonnulla: unde describendi labore levati iis utamini. Audacter interim & moneo fideliter, morbi historiam fideliter edocti, scrutati *materiae medicae* noxios aequae ac effectus salubres, ita demum auxilii utilis bonitatem affecteris assequi: ceteris nocerebit magis quam proderit, quidquid hoc opellae est. Cui; ut emaculatus prodiret, curam impendit, vestrosque in usus indicem adscripsit eruditissimus Vir SAMUEL DU RY, medicinae doctor, atque excultor laudatissimus. Valete. Scripsi Ludg. Bat. 17^{II}/₂19.

IN CURATIONE MORBORUM FIBRAE DEBILIS ET LAXAE.

SECT. 28, n. 1.

Materiae, in qua elementa apta
constituendae fibrae forti, con-
tinentur.

Lac feminae sanae, aetate integra,
motu salubri exercitatae, victu lauda-
bili utentis, si suctu hauritur, aut cal-
lidum bibitur illico, non mutatum igne.
Hoc reliqua superat, si post coctionem
in nutrice peractam potatur. Proxi-
mum est asininum; dein caprinum, ac
bubulum. *Usus definitur iisdem legibus.*

Ovi recentis albumen adhuc tepens,
dilutum in lactis & aquae aequa portio-
ne sine ullo igne adhibito. Iura car-
nium optima huic proposito, quae pa-
rantur ex carne a pinguitudine accura-
te repurgata, animalis fani, iunioris,
exercitati, contusa, minutim scissa,
in machina Papiniana elixa, frigefacta
dein in hac ipsa machina, iterum ab
omni supernatante pingui, & faecibus
depurata.

Si olla haec deficit, alienum substitui
quidem potest, sed subtilius exhalando
perig: unde patet causa ferociae anima-
lium, quae ex raptu aliorum, quae
viva devorant, aluntur.

Ex Gallinaceo genere paratum prae-
fertur ceteris, vitulinum dein, postea
ovillum, bubulum denique probantur:
quae ex permistis sunt, meraciora ha-
bentur reliquis.

Decoctum panis.

*℞. Panis tritici cum surfuribus rite fer-
mentati, bis colli, unc. viij.*

Aq. putalis purissim. lib. iij.

Coque in vase figulino clauso per spa-

tium unius horae, addendo semper,
quantum coëctione exhalar, aquae, deia-
cola per feraceum.

Gelatina panis fit,

Si decoctum praecedens exhalar ad
ignem, donec eius pauxillum in lapide
frigido fufum coeat.

Cremor panis erit,

Si frigefactum decoctum spissitudi-
nem cremoris induit.

Si huius gelatinae pauxillum in aqua
iufculo, vino, cerevisiae, aut aqua
miscetur, sunt varia levis nutrimenti
genera.

Si sumitur decocti descripti lib. j.

Succi citrei unc. ss.

Aq. stil. cinnam. drach. ij.

Vini Rhenani unc. iv.

Sacchari q. s. ad gratum saporis.

habetur decoctum panis gratissimum
saluberrimum. Cuius dosis unc. j.

hora calide sumenda.
Rursum, si eidem vitelli
misceantur, fit aliud, sed viribus
edulii genus; cuius portio,
idem, usus.

Vina Florentina austera, item
lica rubra acerba, ut & Graeca
grescentia adstringenti sapore praeca-
commendantur: quia & uberrima medi-
rituum copia, & roborante fibras vir-
tute, praestant.

SECT. 28, n. 4.

Acido-austera vegetabilia.

Acaciae fructus, succus, Ros. cor.
A 4 tex.

tex. dof. succi inspissati a gran. iv
ad drach. j.

Acaciae germanicae, seu pruni sylvestris, succus inspissatus gran. vi
ad drach. iss.

Acetosae species, succus.

Anserina.

Belliricae drach. i. ad iv.

Berberis fructus, succus.

Bistortae radix.

Capparis fructus, cortex, radix.

Corni fructus immaturi, folia.

Cupressi fructus, folia.

Cynobatos flores, fructus, spongia.

Cydonia mala, & pyra, & horum mivae.

Filicis radix.

Fragaria.

Fraxini cortex.

Granatorum flos, poma, cortex.

Hypericum totum.

Hypocistidis succus inspissatus drach.
j. ad v.

Lapathi folia, flos, semen, radix.

Mespilorum fructus immaturi.

Myrobalani omnes gran. v. ad drach. ij.

Myrti folia.

Nymphaeae mai. folia, flores.

Omphacium.

Pimpinella.

Portulaca.

Pruna sylvestria.

Pyra austera.

Quercus folia, glandes.

Quinquefolium.

Rhabbarbarum drach. iss. ad drach. ij.

Rhus obfconiorum folia, grana.

Rosarum rubrarum flores.

Sanguisorba.

Sedum maius.

Sorbi fructus.

Tamarindorum fructus unc. j. ad unc.

ij. pulpa rite pressa, & purgata unc.
ss. ad un. ij.

Tamariscii cortex.

Terra falso dicta catechu.

Tormentillae radix.

Ex quibus infusa, decocta, extracta
pilulae, vina medicata, formae va-
riae facile parantur, v. gr.

Infusum abstringens.

R. Anserinae m. j.

Pimpinellae, m. ss.

Tormentillae rad. unc. ss.

Concisilla infundantur cum lib. iss.

aquae fervidae spatio i. horae.

Dosis unc. j. omni triborio interdum.

Decodum simile.

R. Fol. oxylapathi m. j.

Flor. rosar. rubr. unc. iv.

Cort. tamariscii unc. ij.

Rad. acetosae unc. iv.

Sem. contusorum Lapathi drach. ij.

Coque cum aquae ferratae libris viij.

per $\frac{1}{2}$ horae. Colature unc. j. Capiat

ter, quater, in die.

Capiat unc. j. ter, quater in die.

Vel.

R. Acetosae m. ij.

Rad. bistortae unc. ss.

Flor. granator. drach. ij.

Cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{2}$ horae lib. j.

admisce syrup. myrtini unc. j. Usus

idem.

Conditum simile.

R. Mivae cydoneorum unc. j.

Conserv. rosar. rubr. unc. ss.

Flor. granat. drach. j.

Syrup. myrtini q. s.

F. Conditum.

Dof. drach. j. ter, vel quatuor de die.

Extra

Extractum simile.

- ℞. *Acetosae* m. viij.
Lapathi hortenſis m. iv.
Quinqueſolii m. viij.
 Minutum ſciſſa, bene pura, in aquae
 q. ſ. cocta, fortiter preſſa per prae-
 lum, in vaſe amplo exhalent in ſpiſ-
 ſitatem extracti a gran. x ad drach.
 ij, vel adde huic extracto.
Radix biſſortae ſicca q. ſ.
 ad maſſam idoneam formandis pilulis.
 Doſ. gran. iv ad xv.

Vinum medicatum.

- ℞. *Sem. contuſ. Acetosae maior.* drach. vj.
Flor. granator. drach. v.
Rad. cappar. unc. ij.
Cortic. ſtraxini drach. x.
Fol. pimpinellae m. ij.
 Conſciſſa & contuſa infunde ad vini
 rubri *Gravib* dicti, vel *Pontaeq*,
 lib. iij.
 Capiat unc. j. ter, quater in die.

- ℞. *Cortic. radic. capparid.*
Tamarife. ana unc. j.
Flor. hyperici cum ſtipit. unc. ij.
 F. S. A. vinum medicatum cum vini
 auſteri rupri lib. iij.

Acido auſtera ſoſſilia.

9

Acida in terrenis abſorpta, quae eo
 potentiora, quo ponderoſius acidum
 plus terrae abſorbuit.

Martis in vino Rhenano ſoluti drach.
 j. ad drach. iv.

— aceto vini ſoluti gut. x ad
 xxx.

— oleo vitrioli ſoluti gr. x
 ad vj.

Rubrica febrilis.

Vitriolum album, nativum gr. i ad iſ.

— Stanni gr. i ad vj.

Alumin. Romani gr. i ad-xxx.

Ex his infinitae ſunt formulae.

Pulvis.

- ℞. *Alumin.* gr. x.
Rhei. gr. v.
Cort. Granat. gr. iij.
 M. F. P. pro una doſi.

Pilulae.

- ℞. *Vitriol. Martis calcinati* ad alb.
 drach. ſſ.
Gallar. quercin. gr. x.
Rad. tormentillae drach. j.
Succi hypociſtidis q. ſ.
 ut fiant pil. ſingulae gr. ij.
 Capiat aeger unam ter, quater de

IN MORBIS FIBRAE RIGIDAE ET ELASTICAE.

SECT. 35, n. 1.

- α Decocta panis dilutiora. Vid. 18, n. 1.
 β Succi maturorum fruſtuum horaeo-
 rum crudi, vel cum aqua diluente
 parum cocti, & ſaccharo mitificati.
Aurant. malorum ſuccus.
Baccarum ſambuci ſuccus.
Ceraſorum dulcium omnia genera.

- Citria poma bene matura, dulcia.*
Cucumeres mites.
Cucurbitae mites.
Ficus.
Fraga.
Granata poma matura.
Juiubae.
Limonia dulcia.
Mala armeniaca.

Melones.

Melones.

Mora.

Persica mala.

Poma acido-dulcia.

Pruna dulcia.

Ribesia rubra, alba, nigra.

Rubi Idaei fructus.

Ex quibus coctione, assatione, &c.

multa *edulia* praeparari possunt, e. g.*Decoctum diaeteticum.*℞. *Pomorum maturorum decoctat.*
unc. x.Cum aqua decoct. spatio unius horae
contere & per setaceum cola, tunc
huius *unc.* xxiv adde*Nucis myristicae contritae* drach. j.*Panis bis cocti contriti* unc. j.*Vini Rhenani* unc. ij.*Sacchari* q. s.*Olera molliissima, & farinosa*
*molli.**Olera, vel his similia.**Atriplex.**Battatas.**Beta.**Borrago.**Brassica rubra.**Bulbocastana.**Chaerophyllum.**Cichorea omnia.**Cinara.**Cucumerus.**Dens leonis.**Endiviae.**Lactucae omnes fere.**Pastinacae.**Portulacae.**Rapa.**Sisari radix.**Scorzonerae radix.**Spinachia.**Tragopogoni radix.**Valeriana pratensis.**Farinosa.**Amygdalae dulces.**Avena.**Fagopyrum, vel**Fru mentum Saracenicum.**Hordeum.**Mays.**Milium.**Oryza.**Panicum.**Pistachia.**Triticum.**Secale.**Spelta.*Ex his fiunt decoct. cremor. puls.
ut de pane 28, n. 1.

Ex iisdem fiunt crudis emulsa.

Emulsio emolliens.℞. *Avenae excorticat.* unc. iij.*Amygdal. dulc.* unc. j.Cum aq. decoct. hord. F. emulsio, cu-
ius *unc.* xxiv. admisce*Syrup. violar.* unc. ss.*Aq. stillat. cinnamom.* drach. iv.

Capiat unc. j. omni hora diei.

Simile decoctum laxans & emolliens.℞. *Fol. recent. Borragin.**Lactucae,**Valerianellae arvensis &*
*na m. iss.**Rad. recent. contusar., scorzonerae*
unc. iv.*Sem. contus. bordet* unc. ij.Cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{2}$ horae *lib.* iv.
admisce*Syrup. Alibacae,**Violar. ana* unc. j.

Bibat unc. ij. omni hora.

SECT.

IN MORBIS FIBRAE RIGIDAE ET ELASTICAE

SECT. 35, n. 3.

*Aquosa, subfarinosa, suboleosa,
mollia, emollientia.*

A. Aq. decoct. cum farinosis n. 1 hui. §.
B. ————— emollientibus n. 2
huius §.

Abutilon.

Alceae rad. fol. flor. sem.

Alchimilla.

Alfane.

Altheae flor. fol. rad.

Bellis.

Bonus Henticus.

Branca ursina.

Consolida maior,
minor,
media.

Cynoglossa.

Hyoscyami fol.

Liliorum albor. bulbi.

Linaria.

Linum.

Lotus haemorrhoidalis, & lotus odora.

Malvae, bismalvae fol. flor. rad.

Melilot flor. fol.

Mercurialis.

Parietaria.

Populi folia, gemmae.

Prunella.

Pulmonaria.

Sambuci fol. flor.

Scabiosa.

Sigillum Salom.

Solanum.

Telephium.

Trifolium bituminosum.

Verbascum.

Violaria.

Vulneraria rustica.

C. butyrum recens, cremor lactis.

Pinguedo volucrum *anas, anser, capom.*

Medulla bovis.

Olea lenia ex farinosis blandis.

Ol. amygdal. amarar.
dulc.

Lini.

Mucaginum.

Olivar.

Palmae.

Papaveris albi.

Solani.

Trifolii odorati.

Violarum.

Syrupi similes.

Syrupus althaeae Fernelii.

Borraginis.

Syrupus capillorum veneris.

Iulubinus.

Papaveris albi,

erratici.

Symphyti Fernelii.

Violaceus simplex.

Mel mercuriale.

Unguenta talia.

Unguentum Althaeae compositum,
Aureum.
Basilicon.
Populeum.

Ex his balnea, vapores, forus
litus, decocta, potus, clymata &c.
sunt; cynoglossa vero & hyoscyamus
tantum externo profunt usu.

CON.

CONTRA MORBOS VISCERUM FORTIUM ET RIGIDORUM.

SECT. 54, n. 2.

Copia minuitur misso sanguine.
Densitas minuitur 1 per aquam tepidam & serum lactis, 2 per minuentia copiam, 3 per minuentia pressionem.
Pressio minuitur 1 minuta copia, 2 minuta densitate, 3 minuto motu.

SECT. 54, n. 3.

Quies corporis & animi huc spectat.

SECT. 54, n. 4.

Humectantia sunt, quae multa aqua cum saponaceo, vel farinoso admixto constant, e. g.
α Aq. decocta cum farinosis 25, n. 1.
β ————— emollientibus 35, n. 1.
γ ————— fructibus horeis 35, n. 1.
δ ————— oleribus 35, n. 1.
ε ————— carne recent. insulsa, vel cum ossibus & cornubus.
ζ Aq. decocta cum piscibus fluviatilibus, vel marinis, cancris, ostreis, astacis, viperis &c.

Ius carniū humectans, leniens, emolliens, resolvens.

R. *Carnis* vitulinae macilentae bene conzusaē lib. ij.

Hordei mundati unc. ij.

Cum lib. viij aquae decoctis, spatio iiij. horarum, vase rite clauso, sub finem adde

Lactucæ retentissimae sativae lib. ss.
Agninae diitiae unc. iv.

Radix scorzonerae unc. vj.

Tum ebulliant rursus spatio $\frac{1}{2}$ horae, addendo semper tantum aquae, ut a coctione supersint lib. vj.

Ius Cancrorum fluviatilium, ad humectandum, leniendum, emolliendum.

R. *Cancror. fluviatil. vivor.* lib. iij.
Coque spatio horae cum aq. lib. xij, tum exentos contunde una cum testis, atque coque in priori iure proprio adhuc per horas iv addendo semper tantum aquae, ut a coctione lib. viij circiter supersint, tum ius fortiter exprime, atque ei infunde.

Flor. Borragin. unc. iij.

Bugloss. unc. j.

Radix Tragopogon. unc. iiij.

Sisari unc. ij.

Dein ebulliant simul spatio $\frac{1}{4}$ horae. Sumatur de utrovis horum ad unc. iijss. omni bihorio.

Decoctum humectans.

α. *Sem. Papaveris alb. contus.* unc. j.

Avenae integrae drach. iv.

Cicer. rub. contusor. drach. xij.

Flor. Borragin.

Althaeae ana drach. viij.

Rad. Scorzonerae. unc. ij.

Glycyrrhizae drach. ij.

Fol. Malvae,

Parietariae ana m. ss.

cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{4}$ horae; pint. ij. admisce

Rob. Ribesorum.

Sambuci ana unc. j.

Capiat unc. ij. omni hora dicti.

Le

CONTRA MORBOS VISCERUM FORTIUM &c.

Lenientia

Sunt, quae duritiem, i. e. rigiditatem tollunt. Vid. § 35.

Emollientia

Fere eadem ac lenientia.

Diluentia

Sunt haec quidem primaria.

1 Aq. pura ad teporem sani corporis calida, balneo, fotu, vapore, clysmate, potu, applicata.

2 Serum lactis recens similiter usurpatum.

Resolventia

Sunt, quae id, quod prius fluidum, dein concretum fuerat, iterum in fluidum reducunt.

1 Diluentia.

2 Salina ex sale marino, gemmae, nitro, ammoniaco, borace, alcalicis volatilibus, vel fixis. Acida rite fermentata &c. composita ex his, sal polychrestus, tartarus tartarifatus, tartarus purgans sennerti, panacea duplicata ducis Holsatiae, nitrum stibiatum, sal viperarum saturatus tachenii &c.

3 Saponacea, sales volatiles spirituosus, aromatici, oleosi.

4 Sapo chemicorum ex ol. destillat. & alcali fixo. Domesticus ex ol. expresso & alcali fixo.

5 Mellita.

6 Succus horaei-maturi, & Aloëtica.

7 Remedia mechanica, frictions

&c.

Haec iterum tot diversis modis applicari possunt, v. g.

Forma mixturae, quae resolvit.

* Aq. stillatit., rutae unc. xij.

Borac. Venet. drach. ij.

Sal. volat. oleos. drach. iij.

Mellis puriss. unc. iij.

M.

Capiat unc. j. omni hora diei.

In guttis.

* Elix. pp. cum sale tartar. praeparat. Sal. vol. oleos.

Sal. purgant., sennerti ana unc. ss. Capiat gut. xxv. quater de die ex vino.

Pilulae resolventes, saponaceae.

R. Sapon. Venet.

Boracis.

Ales purae ana drach. ij.

M. F. Pil. singulae gr. iij.

Capiat unam quater de die.

Decoctum simile.

R. Herbae recentis Saponariae m. iij.
Becabungae m. iij.
Fumariae m. j.

Rad. recent. graminis.

Cicborti ana unc. ij. cum aq. decoct. vase clauso spatio horae, per pannum expressi, per quem tem depurati, decocti pint. iij. admisc.

Rob. sambuci.

Oxymel. simplicis ana unc. ij. Capiat ij. unc. omni hora calidae.

In pulvere.

R. Spermat. ceti.

Boracis ana drach. ij.

M. F. Pulv. divid. in dos viij.

Capiat j. omni biborio ex pauxillo vitae.

Abstergentia.

Sunt, quae glutinosa fluida, vel semihumida corrupta solida, depellunt a locis, quibus sua tenacitate adhaeserunt, suntque

1 Diluentia.

2 Resolventia.

3 Maxime saponacea, lixiviosa, fixa, & mellita cum aceto.

AD MORBOS EX ACIDO SPONTANEO.

SECT. 66, n. 1.

Iura ex avibus, piscibus, & quadrupedibus. Ipsae horum carnes imprimis assae. Gelatinae ex iure inspissato.

Vinum cum sale pauco alcalino.

R. *Sat. absinthii* drach. ij.

Vini gallici albi unc. xxiv.

M.

Bibatur unc. j. *omni triborio.*

Vegetabilia antacida.

Absinthium.

Alliaria.

Allia.

Anethum.

Anthora.

Angelica.

Anisum.

Apium celeri.

Aristolochia longa,
rotunda.

Armoracia.

Arum.

Asclepias.

Asparagus.

Asphodelus albus.

Basilicum.

Brassica.

Calamus aromat.

Calamentha.

Card. bened.

Carduus Mariae.

Carum.

Caryophyllata.

Caryophylli aromatici.

Cochlearia.

Cepae.

Centaur. min.

Dauci.

Eruca.

Eryngium.

Erysimum.

Eupatorium.

Galanga maior,
minor.

Helenium.

Lepidium.

Maiorana.

Marrubium.

Matricaria.

Mezereon.

Napus.

Nasturtium.

Nepeta.

Origanum.

Piper.

Porrum.

Pyrethrum.

Raphani.

Ruta.

Saponaria.

Satyrium.

Serpillum.

Sabina.

Satureia.

Sedum acre vermic.

Sinapi.

Squilla.

Thymus.

Thlaspi.

Victorialis.

Urtica.

Zedoaria.

Zingiber.

SECT. 66, n. 2.

Tales sunt aves & aviculae, quae pascuntur insectis, imprimis & pisciculis, ut anas, anser, passer, fringilla, alauda, turdus, perdix rostrata, latus, coturnix. Harum omnium ova.

Sect.

AD MORBOS EX ACIDO SPONTANEO.

SECT. 66, n. 3.

Roborantia.

Sunt, quae fibris, vasis, membranis, visceribus vim elasticam addunt: 28 n. 1, 4. Item spirituosae fermentata, cerevisia generosa, vina, hydromel, sp. vini.

SECT. 66, n. 5.

Absorbentia acidi.

Quibus immerfa acida vim acrem amittunt ita, ut nec ut acida, nec ut acria agere porro queant: dum interea nullam ipsa acrimoniam habent, qua corpori noceant; inde aliis saepe praeferruntur. Uno hoc damnosa, si inerti pituitae mista mole nocent & pondere.

Sunt ossa sicca piscium; mandibulae lucii &c.

Lapis, chelys, testa cancrorum, astarum.

Ostreodermata, conchae mytilorum &c.

Coralia, perlae, mater perlarum &c.

Creta, bolus, osteocolla, marga.

Lapis haematitis *gram. xv.*

Limatura stanni *gr. viij.*

Limatura ferri *gr. xij.*

Diluentia acidi.

Aqua & aquosa 54, n. 4.

Obtundentia acidi.

Quae molli suo lentore inviscant acria acida ita, ut acies eorum hebetata amittat noxiam; dum simul descendunt membranas, ne offendantur a spiculis acidis; itaque & effecta horum iam impressa tollunt. Solum obsunt

quandoque iis, quibus laxa nimis corporis compages ultra labefactaretur.

1 Oleosa.

Amygdalae dulces & amarae. Pistachiae.

Nuces avellanae, iuglandes, cocos. Sem. papaver. alb.

Ol. expressa ex his, tum olivarum &c. 2 Gelatinosa ex iusculis inspissatis carniū & piscium.

3 Aromata oleosa, leniora, ratione olei. Vid. § 66, n. 1.

Tum praeparata ex his infinita.

Immutantia acidi.

Quae cum acidis mista statim cum hisce effervescent, itaque motum cient, stimulant, agitantque fibras; postea vero ipsis cum acidis unita constituunt novam salis speciem, in qua vis stimulans, diaphoretica, diuretica, resolvens adhuc superest. Male cedunt tantum his, quibus nimius motus adeo infestus.

Sales alcalini fixi ex quocunque combusto vegetante parati *gr. vi.*

— volatiles ex destillatione animalium, stirpium putrefactorum, aut plantarum antacidarum recentium parati. Vid. § 66, n. 1, *gr. x.*

Saponacei fixi, sapo Venetus &c. *drac. ss.*

— volatiles *drach. ss.*

Qui triplices imprimis.

1 Spiritus volatiles, oleosi salini sanguinis, urinae, cornu cervi, ferici &c.

2 Ossa helmontiana ex alcoholenisi purissimo, & sp. salis ammoniaci fortissimo mistis, & destillando unitis.

3 Sales volatiles alcalini fortissimi cum oleis aromatum saepe sublimati, atque ita uniti, e. g.

R. Sal. C. C. purissimi, sicc. unc. j.

Olei stillatit., cortic. citrei drach. j.

Sublima aliquoties ex phiala.

Tum praeparata ex hisce.

CON-

CONTRA MORBOS A GLUTINOSO SPONTANEO.

SECT. 75, n. 1.

Aromata, quibus cibi potusque con-
diri commode possunt, sunt primaria:

Cinnamomum.
Macis.
Nux myristica.
Cort. aurantiorum.
Thymus.
Origanum.
Caryophyl. arom.
Zinziber.
Piper.
Galanga min.
Cortex citri.
Anisum.
Coriandrum.
Serpillum.
Cardomomum.

*Hæc pani, vino, cerevisiæ, fermentan-
dis missa profunt.*

SECT. 75, n. 2.

Vid. 66, n. 1, 2.

SECT. 75, n. 3.

Vid. 28 & 47.

SECT. 75, n. 5.

Diluentia, resolventia, vide 54 n. 4.

Stimulantia.

Quæ mole, densitate, figura, mo-
bilitate, fibrillis vasculorum impacta,
vim contractilem augment. Primaria
sunt,

1 *Acida salina.*

Nativa.

Succi Citri.

Aurantii.

Uvarum.

Horæi acidi.

Sales ex succis vegetantibus pressis
sola parati mora.

Fermentata.

Vinum Rhenanum.

Mosellanum.

Acetum Vini.

Cerevisiæ.

Sp. Aceti.

Tartarus.

Crem. Tart.

Lac acefcens.

Serum lactis acidum.

Ignè producta.

Sp. salis Marini.

Gemmae.

Nitri.

Vitrioli.

Sulphuris per campanam.

2 *Alcalina salina.*

Fixa.

Omnia ex cineribus plantarum, ut,

Sal. Absinthii.

Card. bened.

Tartari.

Cineres clavell. gr. vi.

Volatilia.

Omnia ex destillatis vel putrefactis
animalibus, ut,

Sal.

Sal. & sp. C. C.
 Humani sanguinis.
 Ossium.
 Sal. ammoniaci.

3 *Salina composita.*

Sal. marin.
 Gemmae.
 Ammoniac. nat.
 ——— artificial.
 Nitri.
 Borax.
 Tarr. tartarifatus.
 ——— regeneratus.

4 *Olea acria aromatica vel ambusta.*

Olea stillatit. absinthii
 Corric. citrei.
 ——— aurantiorum.
 Cassiae lignae.
 Chamaemeli.
 Cinnamomi.
 Caryphyll. arom.
 Hyssopi.
 Ligni guaiac.
 ——— juniperi.
 ——— sassafras.
 Macis.
 Maioranae.
 Menthae.
 Nucis myristicae.
 Origani cretic.
 Pulegii.
 Olea stillatit. Rhodii lini,
 Rorismarini, rutae
 Sabinac, salviae, spicae,
 Sem. anisi, anethi, cari,
 foeniculi.
 Succini, tanaceti, tere-
 binth.

Olea pressa.

Amigdalarum amararum.
 Tom. V. pars II.

Laurinum.
 Macis.
 Nucis myristicae.

Olea nativa.

Balsamus Hieruchuntanus.
 Tolutanus.
 Palmae.
 Peru.
 Copaibae.
 Meccae.
 Terebinth.

Olea ambusta acria per retortam destillata.

Ol. ambust. sanguinis.
 Ossium.
 Cornuum.
 Ovorum.
 Urinae.
 Lignorum.
 De lateribus &c.

5 *Spiritus inflammabiles fermentati.*

Farinae & succorum heraceorum.

6 *Plantae acres aromat. distillae, quae sale n. 2, oleoque n. 4, abundant.*

Folia. abrotani.
 Absinthii.
 Agerati.
 Anethi.
 Anisi.
 Aristolochiae.
 Acti.
 Betonicae.
 Calaminthae.
 Cardiacae.
 Chamaedryos.
 Chamaepityos.
 Chelidoni. mai.

Folia. Cochleariae.
 Dictamni.
 Hepaticae nobilis.
 Erysimi.
 Eupator. cannab.
 Foeniculi.
 Hederae terrest.
 — arbor.
 Hyssopi.
 Lauri.
 Levistici.
 Maioranae.
 Marrubii.
 Matricariae.
 Melissae.
 Menthae.
 Nasturtii.
 Nepetae.
 Nicotianae.
 Origani.
 Piperitidis.
 Persicariae acris.
 Porri.
 Pulegii.
 Rorismarini.
 Rutae.
 Sabinæ.
 Salviae.
 Satureiae.
 Scordii.
 Serpilli.
 Soldanellae.
 Thymi.
 Tanaceti.
 Thlaspi.
 Veronicæ.
 Urticæ.

Stimulantia arom.

*Flores herbarum, quarum folia max
 recensita sunt, imprimis.*

Flores. Agerati.
 Aurantior.
 Calthæ.

Flores. Caryophyl. hortens.
 Centaur. minor.
 Chamaemeli.
 Citri.
 Croci.
 Eupatorii.
 Lilior. convall.
 Lupuli.
 Meliloti.
 Mari. Syriaci.
 Salviae.
 Scabiosae.
 Schoenanthi.
 Spicae.
 Stoechad. Arab.
 Tanaceti.
 Tiliae.

Stimulantes aromaticae radices.

Radices Acori.
 Allii.
 Angelicae.
 Anthorae.
 Aristoloch.
 Armoraciae.
 Carlinae.
 Caryoph. mont.
 Ceparum.
 Chelidon. mai.
 Contrayervae.
 Costi hortens.
 — Oriental.
 Curcumae.
 Cyclaminis.
 Cyperi.
 Doronici.
 Fraxinelliae.
 Fumariae bulb.
 Galangae.
 Gentianae.
 Helenii.
 Imperator.
 Iridis.
 Levistici.

Mei.

Radices. Mei.

Ninzing.
 Oxonidis.
 Petasitidis,
 Petroselin.
 Peucedani.
 Paeoniae.
 Porri.
 Ptarmicae.
 Pyrethri.
 Raphani.
 Rubiae.
 Rusci.
 Satyrionis.
 Scrophular.
 Sefeli.
 Squillae.
 Valerianae.
 Victoralis.
 Vincetoxici.
 Zedoariae.
 Zingiberis.

Stimulantia aromatica femina.

Semina. Anacardii.

Anethi.
 Anisi.
 Apii.
 Aquilegiae.
 Bardanae.
 Cardamomi.
 Cari.
 Celeri.
 Chermes.
 Coriandri.
 Cumini.
 Cubebae.
 Dauci.
 Erucae.
 Erysimi.
 Foenigraeci.
 Juniperi.
 Lauri.
 Levistici.

Semina. Napi.

Nasturtii.
 Nigellae.
 Pastinacae.
 Petroselin.
 Porri.
 Raphani.
 Santonici.
 Sefelios.
 Sinapi.
 Thlapfi.

Nux myristica.

• Nuclei perficorum.

Stimulantes cortices.

Cortices. Guaiaci.

Sassafras.
 Juniperi.
 Aurantiorum.
 Citreorum.
 Limoniorum.
 Cinnamomi.

Stimulantes aromat. succi.

Aloë.

Ambra grisea,
 ——— liquida.
 Asa foetida.
 Ammoniac. gum.
 Anime.
 Bdellium.
 Benzoin.
 Elemi.
 Galbanum.
 Juniperi.
 Lacca.
 Labdanum.
 Mastiche.
 Myrrha.
 Sagapen.
 Styrax.
 Tacamacha.
 Tus.

7 *Insecta, aselli, formicae, vermes maiales, cantharides.*

Partes animalium.

Castoreum, zibethum, moschus, urina, stercora avium parum bibentium.

8 *Stimulantia composita.*

Sunt decocta, extracta, conservae, condita, tinctura, spiritus, aquae, sales volatiles, oleosi, spirituosi, pilulae, pulveres.

Decoctum contra glutinosa stimulans.

℞. *Fol. aristoloch. rotund. Chamædryos.*

Rutae ana m. j.

Flor. calibae.

Eupator ana unc. ℥.

Rad. angelic.

Imperator. ana drach. vj.

Sem. celeri.

Rapban. hortens ana drach. iv.

Cors. saffrastr. unc. j.

Magellanic. drach. ij.

Cum aq. infundantur fere fervida spatio ij. horar. dein decoct. vase clauso, spatio $\frac{1}{2}$ horae unc. xlvj. exhibe. Capiat unc. j. omni hora calide.

Extractum contra glutinosa stimulant & attenuans.

℞. *Flor. recent. absinthii.*

Eupator. cannab.

Marrub. albi.

Tanacet. ana q. f.

Conscissis minutim, contritis dein, per praelum succum exprime; hunc leni igne depura per secessum fecis, dein exhala ad spissitudinem mellis crassi, cui adde

Salis absinthii tacheniani $\frac{1}{2}$.
Dof. drach. ℥. bis de die, vacuo stomacho, ex vin. Gall.

Similia extracta sunt ex decoctis inspissatis, & per praelum pressis.

Conserva stimulans contra glutinosa.

℞. *Summitat. recent. rutae,*

Tanacet. ana unc. j.

Flor. recent. mari Syriac.

Rosimar.

Lavand. ana drach. iv.

Rad. recent. Helenii,

Vincetox. ana unc. j.

Semin. raphan.

Nasturtii ana drach. iv.

Contusis admisce S. A.

Sacchar. alb. unc. iv.

Capiat drach. j. quater de die, vacuo stomacho, ex vino Gallico albo, vel Hispanico, Malvatico, Canariensi &c.

Conditum, calidum, stomachicum, stimulans.

℞. *Zingiber. condit.*

Rad. Helen. condit.

Cortic. magell. ana unc. j.

Syrup. menth. q. f.

Ut F. conditum.

Capiat drach. ℥. sexies de die.

Tinctura stimulans, calefaciens.

℞. *Rad. gentian.*

Anthorae ana unc. j.

Flor. centuar. min. unc. j.

Croc. drach. j.

Bacc. lauri.

Juniperi.

Sem. crucac.

Sinapi ana unc. ℥.

Cum sp. vini in phiala alta vitrea decoct. spatio xij. horar. lib. iij. serva. Dof. drach. ij. ter de die, vacuo stomacho ex unc. j. Hydromell.

Spi-

Spiritus aromaticus stimulans.

- ℞. Flor. *Lavand.*
Tanacet.
Aurant.
Rorismar. ana unc. j.
 Rad. *Angelic.*
Helenii.
Imperat.
Levostic. ana unc. iss.
 Fol. *Calamintb.*
Cochlear.
Matricar. ana m. j.
 Sem. *Cari.*
Celeri.
Erucae.
Nasturt. ana unc. j.
 Cort. *Iunip.*
Sassafras.
Cinnam. ana unc. iss.

Cum sp. vini destill. ad dimidium, ut habeantur lib. iij. bis cohobando ex vesica.

Capiat drach. ij. ex vino, vel hydromelle ter de die.

Aqua aromatica.

Si loco sp. vini aqua sumatur in praecedenti, habetur aqua aromatica.
 Dos. unc. iss. ter de die.

Sal volatile oleosum.

- ℞. Sp. praecedent. lib. ij.
Ciner. clavell. unc. iij.
Sal. ammon. unc. iss.
 Destil. ex retort. ad lib. j. in hoc dissolve
Ol. stillat. cort. citri gut. vj.
Lavand. gut. xx.
Maicran. gut. vj.
 Dos. gut. lx. ter, quater de die ex Hydromellis vel vini unc. j.

Pilulae stomachicae stimulantes.

- ℞. *Gumm. ammoniac.*
Opopanax. ana drach. j.
Bulbi ari recentis drach. ij.
Sapon. Venet. drach. j.
Ol. stillat. tanaceti gutt. x.
 M. F. pilulae singul. gr. iij. deaurandae.
 Capiat 1 omni triborio de die.
Pulvis calefaciens, stimulans.
 ℞. *Ol. destill. menthae.*
Maicran.
Tanaceti ana gut. vj.
Sacchari albi siccissimi unc. j.
 F. S. A. elaeosaccharum, cui admisce
Rad. zingib. alb.
Cort. magellanicae. ana drach. iv.
 Capiat drach. ss. ter de die ex vino.

Vinum medicatum.

Fiat ut spiritus hac sectione descriptus, vel ut tinctura decoquendo sum vino, loco sp. vini.

Dos. unc. ij. ter, quater de die.

Cerevisia medicata.

Eadem ingredientia spiritus eadem copia infundantur in $\frac{1}{2}$ tonnae cerevisiae adhuc ferventis.

Pro potu assiduus adhibeatur.

Biliofa.

Fel animalium quadruplum, & fel piscium, lupi imprimis, & anguillae, v. gr.

Pilulae biliosae, stimulantes.

- ℞. *Fell. Tauri.*
Lupi piscis ana drach. iv.
 Leni igne lente exhalent in mellis spissitudinem, tum admisce
Farinae bulb. Ari recentiss. q. 6.
 F. pil. sing. gr. iij. deaurandae.
 B 3 Capiat

*Capiat j. mane, meridiē, vesp̄ri,
una ante cibum hora.*

Huc lapis hystricis, *pedra del porco*
diçus, referendus; cuius infusio in
aq. stillatis. Card. bened. vel & in vino
Rhenano, facta, *propinatur* ad unc. ij.
vel iij.

Item Helmontianum ex *hepate &
felle anguillae* leni igne totius in pul-
verem, dein *dati* ad drach. j. ex
oblatis involucro cum *vini Rhenani*
unc. iij.

Saponacea.

Vid. §. 54, n. 4 inter *resolventia*.

SECT. 75, n. 6.

Balneum ad glutinosa.

2. *Summitatum. rutae,
Sabinæ.
Absinthii,*

Tanacet.

Chamaemel. ana m. iij.

Cum aq. decoct. pintis xij. admisce
Sapon. Vener. unc. iv.

Sal. sarmentor. unc. j.

Vesicatoria.

2. *Raphani rustican. recentis & succu-
lenti, contrit.* unc. ss.

*Applica ad cutem per boras dimi-
dium, aut tamdiu, donec inflammatio-
nem satis magnam excitatam dolor
servidus, & rubor partis tumens te-
stetur,*

2. *Sinapi cum aceto contriti* drach. iv.
Applica per boras quatuor.

2. *Cantharid. sine alis contritæ. in pulu-
tenuem* drach. ij.

Accurate misceantur cum *drach. vi.*

*Fermens panis pauxillo cum aceto
subacti. Applica spatio xij. horarum,
vel donec in vesicam manifesto epider-
mis elata sit.*

CONTRA MORBOS EX ALCALINO SPONTANEO.

SECT. 76.

Herbæ alcalæscentes.

*Edules condimentis servientes,
venenata.*

*Absinthium.
Alliaria.
Allium.
Alysson.
Armoracia.
Arum.
Atriplex olida.
Asparagus.
Barbarea.
Brassicæ.
Bryonia alba,
— nigra.*

*Bunium.
Camelina.
Capsica.
Cardiaca.
Cardamine.
Cataputia.
Centaurium minus.
Chamaedrys.
Chelidonium maius.
Chelidonium minus.
Cochlearia.
Cepæ.
Dentillaria.
Digitalis.
Erucae.
Erysimum.
Eula.*

Eupa-

Eupatorium cannabinum.
 Gratiola.
 Iberis.
 Laureola.
 Lepidium.
 Napus.
 Nalturtium aquaticum,
 hortense.

Nerium.
 Perficaria acris.
 Porrum.
 Raphani.
 Ruta.
 Sabina.
 Saturia.
 Sedum acre min.
 Sinapi.
 Squilla.
 Thlaspi.
 Victorialis.

SECT. 78.

Ruminantia vel non ruminantia.

Asina, bos, capra, equa, ovis &c.
 dant lac acescens.

Animalia, quibus victus ex vegetantibus, gramineis, fructibus horaeis, vel cerealibus, carnes dant & humores haud ita proclives in putredinem alcalescentem; unde & cibi inde petiti homini calido tutius concedendi. Sunt autem.

Agnus.
 Anas cicur, vel domesticus,
 cerealibus pascus.
 Anser cicur, vel domesticus.
 Aper.
 Aries.
 Bos.
 Capra.
 Capella.
 Caprillus.
 Capo.

Cervus.
 Columba.
 Corurnix.
 Cuniculus.
 Gallinae domesticae.
 Haedus.
 Lepus.
 Perdix domi faginata.
 Phasianus domesticus.
 Porcus.
 Sturnus.
 Turdus.
 Turtur.
 Vervex.
 Vitulus.

Huic classi adscribere cochleas & limaces licet.

SECT. 79.

Omnes fere pisces tam marini, quam fluviales, sive molles, sive crustacei, sive ossa habentes; vix ullo excepto.

Alauda.
 Anas fluvialis.
 Anser marinus.
 Cygnus.
 Gallinago maior,
 minor.

Merula.
 Pardalus.
 Passer.
 Phasianus sylvestris.
 Vanellus.

Avium vero multae ambiguae animalculis pascuntur, vel vegetantibus.

SECT. 88, n. 1.

Vid. 35, n. 1.

SECT. 88, n. 2.

Vid. 75, n. 5.

Stimulantia acida salina.

SECT. 88, n. 5.

Decoſtum leniens aceſcens.

℞. *Avenae cum cortic.* unc. ij.

Aq. purae lib. iij.

Decoſt. ad reſiduum lib. ij. tranſcolato admiſce

Succi citr. recentis unc. j.

Aq. ſtillat. cinnamom. drach. ij.

Syrup. mororum unc. j,
utatur pro cibo & poſu.

Aut

℞. *Avenae excorticat.* unc. ij.

Aquae purae lib. iij.

Decoſtum ad reſiduum lib. ij. depuratum ſtet in tepore per horas xij, vel donec leniſſime aceſcat, tum adde

Syrup. violar. unc. iſſ.

Vini Rhenani lib. iſſ.

Aq. ſtillatit. cortic. citrei unc. iſſ,
in uſus eoſdem.

Emuſio ſimilis, anti-alcalica.

℞. *Avenae excorticat.* unc. iij.

Fiat cum aq. q. ſ. emulſio, cuius lib. iſſ. admiſce

Nitri puri drach. iſſ.

Syrup. violar. unc. j.

Aceti ſquillit. drach. ij,
utatur pro poſu familiari.

SECT. 88, n. 6.

Miſurae ſaponaceae, abſtergentes, acidae, ſuboleoſae.

℞. *Oxymell. ſquillit.* unc. iij.

Aceti ſquillit. drach. ij.

Myrrhae in aceto in tincturam dr. j.

Aq. ſtillit. cichorei unc. iv.

M.

Capiat unc. iſſ. omni hora.

Vel

℞. *Aceti in ſpiſſitudinem mellis per collisionem reducti* unc. iſſ.

Mellit puri unc. j.

Syrup. cichorei unc. iſſ.

Aq. ſtillat. fumar. unc. vj.

M.

Uſus ut prioris.

Vel

℞. *Rob. riſeſcor.*

Sambuci ana unc. ij.

Oxymell. ſimplis. ana unc. j.

Sp. ſal. commun. gutt. xx.

Aq. decoſt. bord. lib. iv.

M.

Utatur pro poſu aſſiduo ad lubitum.

CONTRA MORBOS ORIUNDOS AB EXCESSU MOTUS CIRCULATORII SOLO.

SECT. 105.

Dolorem toſentia.

Vid. §. 222, 229 poſtea, ubi omnino de hac re agitur.

CONTRA

CONTRA MORBOS EX DEFECTU CIRCULATIONIS, ET EX PLETHORA.

SECT. 106, L. ζ.

Cibi acres.

Vid. §. 67.

Condimenta acria aromatica §. 75,
n. 1.

— — — — — Acida §. 75, n. 5, classe
prima, sub titulo *acida salina*.

CONTRA OBSTRUCTIONES.

SECT. 135, n. 3.

Sapones in obstructione attenuantes.

Sapones *nativi* ex oleo & alcali
sunt succi recentes, maturi, pressi,
ex herbis omnibus acrimonia alcalina
validis §. 76, vel admodum aromati-
cis §. 75, n. 6.

Sapones *arte compositi* ex alcali &
oleo.

Sapo niger, } *drach. j. drach. ij.*
Venetus. }

Starkeyanus, five Helmontia-
nus gr. iv, *serup. j.*

Sapones *fuliginosi volatiles*.

Sp. oleosi, alcalini ex aromatibus
alcalescentibus §. 76, *gutt. xv.*

— — — — — Fuligine *gutt. xv.*

— — — — — Omni humore, vel
solida parte animalium *gutt. xviii.*

Fuligo ipfa.

SECT. 135, n. 4.

Merc. dulcis *ad gr. x.*

Merc. sublimat. corrosivus *ad gran. ʒ*
dilutus.

— — — — — Praecipitat. ruber. *ad gr. ii.*

— — — — — albus *ad gr. iv.*

— — — — — Turbich. *ad gr. ij.*

— — — — — Niger *ad gr. xvi.*

Attrahentia.

Sunt, quae laxant locum, quo ad-
ducendum, arctant unde deducendum.

Vid. §. 35, 28, n. 4.

Derivantia.

Quae liquores pellunt in locum da-
tum; talia sunt evacuantia in loco;
fractio artificiosa in vicinis.

Propellentia.

Sunt stimulantia §. 75, n. 5.

IN VULNERIBUS.

SECT. 198.

Agrimonia.

Alchimilla.

Aristolochia.

Baccae iuniperi.

Betonica.

Buxus.

Beta.

Centuarium min.

Consolida regia.

— — — — — media.

Conso-

Consolida Saracena.

Cyclamen.

Diapensia.

Dracunculus.

Hypericum.

Limonium.

Lil. convallium.

Ophioglossum.

Pastinaca.

Periclymenon.

Perficaria.

Polytrichon Apuleii.

Sanicula alba,

— sylvestris.

Sophia.

Symphytum.

Valeriana.

Veronica.

Vinca pervinca.

Decocta vulneraria & potus.

1 *Attenuans.*

R. *Fol. Daphnoid.*

Veronica.

Rutae ana unc. *iss.*

Rad. caryophyllat. unc. j.

Flor. centaur. min. pug. ij.

Decoct. ex aqua lib. iij. admisce

Sal. card. benedict. drach. j.

Syrup. 5. rad. aper. unc. iij.

Bibat. unc. iv. *quater de die calidas.*

2 *Inspissans.*

R. *Teleph.*

Consolid. mat.

min.

Malvae.

Parietariae ana m. j.

Decoct. ex aqua lib. iij. admisce

Syrup. altheae unc. ij.

Ufus ut prius.

Huc etiam referri possunt.

Rheum.

Rhaponticum.

Hypericum.

3 *Mitigans.*

R. *Sem. contusor. papav. alb.* unc. iij.

Flor. verbasci unc. ij.

Fol. bugulae m. ij.

Rad. scorxoner. unc. ij.

Glycyrrhizae unc. j.

Cum aqua decoct. lib. iij.

Exhibe in usum eundem.

4 *Excitans.*

R. *Rad. Imperator.*

Vincetox ana unc. j.

Fol. rutae.

Scordii ana m. j.

Sem. contusor. bardan. drach. x.

Sem. contusor. cardamom. drac. iv.

Flor. lavendul.

Centaur. min. ana unc. ij.

Cum aqua decoct. lib. iij.

Exhibe ut prius.

5 *Singulari virtute emendans.*

2 *Glutinosi. Vide Attenuans.*

1 *Acidi.*

R. *Sem. Sinapi* unc. ss.

Rad. armorac.

Fol. crysimi.

Fol. nasturt. ana unc. ij.

Vase clauso leviter decoct. lib. ij. exhibe.

Sumat. unc. ij. *quater de die.*

3 *Alcali.*

R. *Rad. oxylapath.* unc. ij.

Fol. trifol. acetos m. ij.

Rad. acetosell. unc. j.

Flor. borrag. drach. xij.

Cum aqua decoct. leviter. lib. ij.

Exhibe in eundem usum.

4 *Oleosi.*

R. *Tamarind.* unc. ij.

Crystaliz.

- Crystall. tartari* drach. vj.
Rad. gramin. unc. v.
 Cum aq. decoct. lib. ij. admisce
Rob. sambuci unc. ij.
Ufus idem.
 5 *Aperiens.* Vid. *Attenuans.*
 6 *Laxans.* Vid. §. 34, n. 4. *Decoct. humectans.*
 7 *Adstringens.* Vid. §. 18, n. 4. *Titul. Decoct.*

SECT. 101.

Emollientia Alvi.

- α *Iura carnis bubulae* recent. pinguis.
 β *Olera leni iuri* incocta §. 35, n. 1.
 γ *Emollientia & humectantia* epota,
 & iniecta §. 35, n. 3, §. 34, n. 4.
 δ *Olea imprimis pressa*, recentia,
 amygdal. dulcium, olivarum.
Laxantia alvi fere eadem emollientibus.

ΕΛΛΟΠΟΤΙΚΑ.

- α *Fructus maturi*, horaei, acido dulces,
 pulposi, succulenti.
Alkekengi.
Baccæ ebuli,
sambuci.
Caricæ.
Cerasa hortensis quaecunque.
Chamaemora.
Chamaerubi.
Fraga.
Iuiubæ.
Mala Armeniaca, Persica vul-
garia.
Pruna hortensis alba, coerulea,
 — *Damascena, Gallica, Pri-*
 gnolensis, rubra.
Ribesia alba, nigra, rubra.
Rubi vulgares nigri.
 — *Idæi albi, rubri.*
Schæben.

- Tamarindi.*
Uvae vitis omnes species.
 — *Gruinae.*
 — *Crispæ.*

- β *Horum succi recentes & musta.*
 γ *Calliæ unc.* ij.
Mannæ unc. ij.
Tamarindi unc. ij.
Pulpæ tamarindor. unc. ij.
Succi rosar. pallidar. unc. j.
Aloës rosati gr. vj.
Passulæ unc. iv.
Galban. scrup. ff.
Radic. polypodii quercini unc. iss.
Rhabbarbari scrup. iss.
Rhabbarbari infuso drach. j.
Syrup. altheæ fernelli unc. iij.
 — *Cichorei cum rheo unc.* iss.
 — *Fumariæ unc.* ij.
 — *Ros. solutiv. unc.* iss.
 — *Violar. simpl. unc.* ij.
Mellis simplicis in aqua dilut. unc. ij.
Pilulæ rufi ad gram. vj.
Electuarium succi rosar.
 — *Diaphoenic.*
 — *Benedict. laxativ.*

SECT. 102.

Anodyna sunt,

- Quæ causas doloris tollunt, minuunt.*
 1 *Diluentia* §. 34, n. 4.
 2 *Laxantia* §. 35, n. 1.
 3 *Humectantia* §. 35, n. 4.
 4 *Acre emendantia* §. 66, 68.
 5 *Tumores distendentes resolventia* §. 34, n. 4.

Narcotica sunt,

- Quæ acumen sensus obtundunt, & sunt.*
 1 *Paregorica mississima, ut*
Sem. papaver. alb. contusor. unc. ij.
Syrup. capit. papav. alb. unc. iss.

Syrup. diacod. unc. iij.
 — Florum rheados unc. iij.
 Hinc varia commode parari, adhiberi
 tuto queunt, v. g.

Haustus peregricus mitissimus.

℞. Aq. stillat. flor. rhoead. unc. iij.
 Fabar. unc. j.
 Aq. stillat. flor. paeoniae.
 Sambuci ana unc. iij.
 Tiliae unc. j.
 Syrup. flor. rhoeados unc. iij.
 M.

Idem paullo magis hypnoticus.

℞. In praecedenti mistura loco syrupi
 rhoeados, tantumdem syrup. diaco-
 dii, vel syrup. capit. papav. albi.

Emulsio anodyna mitissima.

℞. Amygdal. dulc.
 Strcbylor. pini.
 Sem. papav. alb. ana unc. j.
 Cum aqua stillat. flor. rhoead. q. f.
 F. S. A. emulsio cuius unc. x. admisce
 Syrup. flor. Rhoead. unc. j.

Eadem paullo plus soporata.

℞. Loco syrupi flor. rhoead. eandem
 dosin syrup. diacodii, vel capit. pap.
 albi, in praecedenti emulsione.
 2. Fortiora narcotica.

Pilulae narcoticae.

℞. Opii purissimi gr. ij.
 F. pil. iij
 Datur una pro dosi repetendo post horam,
 si prior nihil effecit, sic & tertio.

Pulvis similis.

℞. Opii puriss. parum siccati gr. ij.

Corall. rubr.
 Sacchar. perlat. ana drach. ff.
 M. F. pulv. dividatur in dos. iij.
 Usus idem, qui in pilulis modo de-
 scriptus.

Conditum simile.

℞. Opii in pulverem redacti praecedentis
 dosin-unam.
 Mivae cydoniorum drach. j.
 M. F. bolus.
 Hic usurpari geminarique potest eodem
 modo.

Haustus in guttulis.

℞. Opii parum siccati drach. j.
 Spir. vini rectifcat. unc. j.
 F. Tinctura.
 Dos. gut. xxx. ex
 Aq. stillat. melissae unc. iij.
 Syr. flor. rhoeados unc. ff.

Vel

℞. Opii parum siccati drach. j.
 Sp. acet. unc. j.
 F. Tinctura.
 Dos. gutt. xxx. ex
 Aq. stillat. flor. rhoead. unc. iij.
 Syrup. flor. rhoead. unc. ff.
 M.

Mistura narcotica calida.

℞. Tind. opii cum sp. vini rectif. gutt.
 Lxx.
 Syrup. papav. albi drach. vj.
 Aq. still. cortic. citri.
 Aurantior.
 Cinnam. ana unc. iij.
 M.
 Sumat. cochlear. 1 omni $\frac{1}{2}$ hora, donec
 sopiatur dolor.

Mistura

Mistura similis frigida.

4. *Tinct. opii cum sp. aceti pp. gutt.*

LXXX.

Syrup. moror. drach. vj.

Aq. stillat. borraginis.

Papaver. erratic. ana un. iij.

M.

In eodem usus.

Emulso narcotica fortior.

7. *Sem. papav. alb. cons. unc. ij.*

Cum aq. decocta. bord. F. emulso,

cuius unc. x. admisce

Syrup. diacod. unc. iss.

Tinct. opii cum sp. vini rectif. gutt.

xx.

Aq. stillat. cinnamom. drach. ij.

Coriic. citri drach. x.

Capiat. unc. iss. omni hora, donec incipiat leniri dolor.

Epithema narcoticum.

• *Tinct. opii in sp. aceti drach. iij.*

Aq. stillat. flor. sambuci.

Rosarum ana unc. iij.

Aceti sambucini.

Rosacci ana unc. ss.

M.

Cum pannis applicetur temporibus utrinque.

Iuvat hic maxime parti dolenti demulcentia ita apponere, ut tollatur causa, quae his aegris somnum arcet, qui est dolor in ipsa hac parte. Eo imprimis valent frequentia tepide applicata, atque in eodem tempore bene conservata tamdiu, donec dolor levatus erit.

Cataplasma narcoticum, emolliens.

8. *Folior. recent. papav. bortenf. m. j.*

Hyoscyami nigri m. ss.

Alibea m. iv.

Cum lacte recenti decoct. sub. finem admisce.

Farin. sem. lini unc. j.

Olei recent. press. sem. lini unc. ij.

F. S. A. cataplasma.

Fomentum simile.

9. *Succum expressum ex decocto prioris cataplasmatidis dilutius parato lib. iij.*

Admisce S. A.

Opium puri drach. ss.

F. Fomentum.

10. *Aceti rosacci, diu digesti cum radice*

Hyoscyami.

SECT. 204.

Balsami blandi vulnerarii ad vulnera pura.

Colla in vino soluta illico consolidat.

1. *Balsami nativi copaybae.*

de Gilead.

Liquidambar.

de Mecha.

Opobalsamum.

Palmae.

de Peru.

-- Tolu.

-- Terebinthina.

Refina abiegna, & laricea.

Butyrum.

Medulla.

Mel.

2. *Balsami artificiales simplices vulnerarii, blandi.*

Olea rectificat. cerae.

Terebinth. crassum.

Lini.

Hyperici.

Rosarum.

Solani.

Trifol. odorat.

Bury.

Butyrum recens, aut cum floribus,
&c paucio sale.

3 Balsami artificiales compositi similes.

R. *Flor. sulph.* drach. iiij.

Ol. lini vel *olivarum* unc. iiij.

Leni igne coq. ad dissolutionem sulphuris integrum.

R. *Gumm. elemi purissimi minutissime confissi* p. 1.

Leni igne lente dissolut. admisce

Terebinth. Venet. purae nativae p. 1.

Soluta per lintheum trahice, tum admisce

Medullae bovin. coctae & separatae

a membranis p. ij.

Est balsamus universalis instar *Arcei*.

R. *Ligni santali rubr.* lib. j.

Aq. communis lib. iv.

Coq. spatio 2 horarum, cola, inspissa in extractum spissum, cui admisce

Sang. dracon. minutissimam in sarnam redacti drach. ij.

Huius aliquantulum misce balsamo praescripto, donec habeat gratum rubrum colorem. Erit balsam. ruber.

R. *Ol. olivarum* lib. iss.

Lign. santali rub. unc. ss.

Coque leniter, donec *Ol.* saturate rubrum, tum fervidum cola per lintheum, in eo solve ad ignem lenem

Cerae citrinae lib. j.

Terebinth. opt. lib. iss.

Est instar balsami *Lucatelli*.

Si ei admisceas

Balsam. Peru. unc. j.

Erit eo praestantior.

Ufus omnium: calescit. instilla vulneri, superpone pulmacellum balsamatum, deliga semel singulis 24 horis.

R. *Masticen.*

Olibani.

Sarcotollae ana q. pl.

M. l. pulvis subtilissimus inspergendus vulncri.

SECT. 205.

Emplastrum defensivum rubrum.

R. *Ol. rosae.*

Cerae alb. ana unc. vi.

Bol. Armen.

Sang. dracon. ana unc. iss.

Rosae. rubr. pulveris unc. ss.

M. Agita donec refrigerata.

Emplastrum defensivum caeruleum.
— de minio.

SECT. 207.

Digestivum.

R. *Terebinth. nativ.* unc. j.

Vitell. ovorum n. 1.

Exacte mistis adde miscendo

Mell. rosae. unc. ss.

Abstergens.

R. *Alvcs.*

Myrrhae. } *minutiss. pulverisat.*

Flor. scord. } ana drach. ij.

Sapon. Venet. tenuissime rasi drac. j.

Accurate contritis simul admisce

digestivi praeced. unc. iiij.

Corrodenia.

1 *Mistissima.*

*Alumen*ustum.

Cinis ligni viridis combusti.

Mercurius dulcis.

albus praecipitatus.

Vitriolum album.

2 *Fortiora.*

Mercurius ruber praecipitatus.

Vitrioli.

Vitrioli colcothar.
Trochisci de minio Vigonis.

3 Fortissima.

Butyrum antimonii.
Lapis infernalis.
Mercurius sublimatus corrosivus.
Oleum tartari per deliquium.
Oleum vitrioli.

Quo fortiora, eo prudentius usurpanda.

Elixir corrosivum.

R. Aloës.

Myrrh. ana drach. j.
Sal. tartari drach. ij.
Aq. comm. unc. ij.

M.

Coque in elixir.

Unguentum exsiccans.

R. Aerugin. unc. v.

Aluminis crudi unc. i.
Aceti fortis unc. vij.
Mellis puri unc. xiv.

Coque in unguentum.

Exsiccantia.

Alumen leviter calcinatum.
Aqua calcis vivae.
Lapis haematites.
Mastiche.
Sanguis draconis.
Sarcocolla.

SECT. 109.

Carnem generantia, sarcotica dicta.

Balsami vulnerarii § 204.

R. Ceræ citrinæ.

Picis nigr.
Resin. vulg. ana lib. ff.
Ol. lini lib. ij.

M.

Est basilicon, seu tetrapharmacum.

R. Ceræ citrinæ unc. vi.

Olei sctorum hyperic. infusione parati
lib. iij.

Lenissimo igne fufis adde

Resinæ pini siccae, contritæ.
Colophoniæ vulgaris electæ. ana un.
ij.

Ubi simul fluunt remota ab igne, per
lintheum traiectis admisce

Terebintbinæ Venetæ puræ unc. ij.
Baculo mota, ubi densari incipiunt,
insperge

Masticæ electæ.

Olibani puri ana unc. j.

Croci tenuissime contriti drach. j.

Est unguentum aureum.

SECT. 112.

Emplastra tenacia.

R. Emplast. diapalmæ q. f.

Ol. olivar. parum.

Solve.

R. Picis vulgaris q. f.

Extensa ad lintheum applicentur.

SECT. 127.

Cicatrifans, epuloticum dictum.

Unguentum desiccativum rubrum.

Diapompholyg.

Calcis.

Nutritum.

Album rhasis.

Emplastrum album coctum.

de Lapide calaminari, seu
griseum.

.. Minio rubrum.

Sparadrapum Gualtheri.

Colophonia ex terebinth. cocta in sa-
rinam redacta.

Tus.

Olibanum.

Mastiche.

CON.

CONTRA HAEMORRHAGIAM.

SECT. 218.

Corrosiva.

Vitriolum album.
Lapis infernalis.
Oleum vitrioli.

Adstringentia.

1 *Quae vasa contrahunt.*
Alcohol.
Sp. terebinth.
Succus cydoneorum recens immaturorum.
Sanguis draconis.
Crepitus lupi.
Crocus martis.

2 *Quae cruorem coagulant.*

Alcohol.
Farina volatilis.
Spir. nitri.
— sulphuris.
Vitriolum calcinatum.
Sacchar. Saturni.
Granatorum cortex.
— — flores.
Lapis haematites.

SECT. 219.

Mastiche.
Olibanum.
Sarcocolla.
Terebinthina ad duritiem cocta.

CONTRA DOLORES.

SECT. 28 & 29.

Vid. 102.

CONTRA CONVULSIONES.

SECT. 234, n. 2.

Vid. 66, 88.

SECT. 234, n. 4.

Tale est ius carniū recentium.

SECT. 235.

Antispasmodica.

1 Laxantia.
2 Diluentia.
3 Resolventia.
4 Absorbentia.
Lapis cancerorum.

Margarita.
Ebur.
Cornu cervi.
Sanguis hirci.
Dens apri.
Ungula alcis &c. § 66, n. 5.
5 Opiata § 202.
6 Nervos sopientia.
Oleum terebinthinae.
— Copaybae &c.

SECT. 236.

Diluitur cruor coagulatus, extravasatus, his vel similibus.

B. Mell.

- ℞. Mell. commun. unc. ij.
Sapon. Venet. drach. ij.
Sal. marin. drach. iv.
Aq. pluviae unc. xij.
M.

- ℞. Sal. ammoniac.
nitri ana drach. iij.
Urinae recent. sam. unc. xij.
Mel. commun. unc. ij.
M.

- ℞. Aloës in aqua solutae a fetibus resinosissimis rite depuratae, iterum leniter inspissatae drach. iv.

- Ammoniacy salis drach. ij.
Boracis drach. ij.
Mellis puri unc. ij.
Vini Gallici albi unc. ij.
Aq. pluviae unc. ix.
M.

Horum reperfectorum prudens iniectio, lenis dein in loco cum sanguine ibi stagnante conquassatio diluit, resolvit, a putredine praeservat, egressum parat: unde summus horum usus, ubi cruor extra vasa elapsus in magnis cavitatibus stagnat, coit.

IN CAPITIS VULNERIBUS.

SECT. 247.

Unguentum digestivum ad contusa attenuans, antisepticum.

Vasent, quae attenuant, diluunt, putredine fervant.

- 1 Imponatur unguent. hoc digerens plumaceolis exceptum.

- ℞. Terebintb. unc. ij.
Vitelli ovor. n. 1.

Exacte mistis admisce
Unguent. basilici unc. ij.
Aloës purae drach. iv.

- 2 Huic superponatur emplastrum hoc.

- ℞. Gum. galban. depurati, & dein cum
Ovi vitello subacti unc. iv.
Cerae citrin. unc. ij.
Ol. hyperici drach. iij.
M.

- 3 Tandem huic apparatusi superadde hoc fomentum pannis laneis calidis exceptum, expressum, digerens, antisepticum, quantum ferri potest calidissime applicatum.

Tom. V. pars II.

- ℞. Fol. recent. rutae.
Scord. ana m. ij.
Flor. centaur. min.
Sambuci.
Rosarum ana unc. iij.
Cum aq. decoct. & express. unc. xxx.
admisce
Sp. vin. unc. v.
Sapon. Venet. drach. ij.

SECT. 252, n. 2.

- ℞. Sp. vini semel rectificat. unc. j.
Aq. stillat. rosar. unc. ss.
Massiches pulverisat. drach. iij.
In phiala alta coctum ferva usui.

SECT. 279.

Purgatio hic conducent.

Hauftus aquam purgans, nec acriter tamen irritans ad extravasatum in venas reforbendum.

- ℞. Scammon. Syriac. puri gr. xiv.
Sp. reginae Hungariae drach. ij.
In mortario vitro S. A. tritis, & a fece separatis admisce

C

Syrup.

- Syrup. rosar. solus. cum semina dr. vj.*
F. haustus.
- ℞. *Radic. ialapp. pulv. drach. j.*
Sacchari puri drach. ij.
 In mortario vitreo diu tritis admisce
 sensim, & divisim.
Aq. pluviae unc. iij.
F. emulio S. A., cui dein affunde
Syrup. rhei unc. ff.
F. haustus.
- Folia rutae m. ff.*
Agrimoni m. j.
Flor. staechnad. Arab.
Lavendul. ana drach. ij.
Rad. foeniculi.
Petroselini.
Rusci ana unc. j.
 Cum aqua decoct. vase clauso spatio $\frac{1}{2}$
 horae lib. iv. exhibe
Sumat. unc. ij. omni semiborio sorbendo.

SECT. 281, n. 2.

SECT. 281, n. 3.

Decoctum attenuans, diluens, aquo-
sum, hic bonum.

Vid. 247, n. 2, 3.

℞. *Lign. santal. alb. unc. ff.*
citrini unc. j.
Sassafras unc. ff.

SECT. 295.

De his remediis singulatim in hi-
 storia horum morborum.

CONTRA VULNERA THORACIS.

SECT. 303, n. 3.

Vid. 236.

CONTRA VULNERA ABDOMINIS.

SECT. 315.

Tum decoctum interserviat pro fomento
 cum pannis applicando.

Fomentum idoneum, sive fons an-
tisepticus calorem vitalem resusci-
tans, intestino per vulnus
abdominis egresso
conveniens.

Extemporaneum.

Sit hac recens tepidum.

SECT. 319.

Fons.

℞. *Intestina pura animalis iunioris q. f.*
 Coque in aqua q. f. spatio $\frac{1}{2}$ horae,
 dein adde

Vid. 315.

Flor. chamæmel.

SECT. 320.

*Lavend.**Centuar. ana m. ff.**Fcl. Mentib. m. j.*

Clyisma lenissime stimulans in vul-
neribus abdominis.

Seruit deinde in infusione per $\frac{1}{2}$ horae.

℞. *Mell. commun. unc. iij.**Sal.*

CONTRA VULNERA ABDOMINIS.

Sal maris drach. j.
Aq. decoct. bord. unc. vij.
M. E. clyster.
Manc & vespere, primis tribis a vul-

neris inflatu dictus, iniciendus.
Diaceta fit ex solo
pauillo salis
35
aure caraium cum

AD CONTUSA.

SECT. 334.

Purgatio fortis nec inflammans.

℞. Agarici drach. iij.
Sal polychrest. scrup. j.
M. F. P.

℞. Ebuli, vel sambuchi, corticis medii,
cent. unc. j.
Conterendo cum aq. pluvi., deinde pa-
rum coquendo, tandem exprimendo.
F. haustus unc. iv.

℞. Jalapp. pp. ut scilicet 279.
Jalapp. radic. pulv. drach. iij.
℞. Meschoacan. rad. pulv. drach. ij.
℞. Soldanellae recentis fol. unc. ij.

℞. Agaric. drach. ij.
Fol. fenugr. drach. iij.
Rad. meschoacan. drach. j.
Tamarind. unc. ij.

Concissa & contusa macera in aqua
pluvia spatio 2. horae, dein ebulliant
leniter spatio 1. horae, tum deco-
cti percolati un. ix. admisce.

Sal. prunel. drach. ff.
Syrup. ros. solut. cum fenugr. drach. ix.
Capiat unc. j. omni semibora, donec
purgetur satis fortiter.

Minori forma idem efficere.

℞. Scammon. Syriac. gr. xij.
Sib. diaphoret. gr. xx.
Syrup. rosar. solut. cum fenugr. dr. vj.
Exacte contritis admisce

Aq. stillat. cicbori unc. ff.
F. haustus.

Fomentum ad contusa laxans;
penetrans, resolvens.

℞. Rad. bryon. alb. unc. ij.
Aristoloch. rotund. unc. j.
Fol. rutae recent.
Sabinae ana m. j.
Flor. tanacet.
Chamaemel.
Matricar. ana unc. j.

Cepar. recent. un. vj.
Cum aqua vase clauso in gradu ca-
loris fere ebullientis digere per horae
dimidium, dein uno momento ebul-
liant; tum succi per pannum fortiter
expressi unc. xxv. admisce

Farin. lini unc. ff.
Ebulliant denuo parum: tum toti
decocto frigidato admisce
Sp. vini theriacal. unc. ij.
Sal. ammon. unc. j.
Applicetur pannis laneis.

Cataplasma ad contusa simile.

℞. Ingredientia eadem,
Praepara in cataplasmata; sub finem
admisce
Farin. lini q. l.
Galban. in vitello ovi soluti unc. j.
Ol. Chamaemel. unc. ij.

Emplastrum ad eadem.

℞. Rad. bryon. in farinam redact. unc. ij.
Flor.

Flor. sulphur. unc. j.
Mercur. nigr. drach. iij.
Galbani puri & S. A. soluti un. iv.
Emplastr. de melilot. unc. ix.
Ol. Chamæmel. q. f.

Ut F. emplastrum.

Bona hic

Emplastra de galbano, seu ceratum
 matricale, vel antidotar. correctius
 Gandavense.

— — — Baccis lauri mesuæ.
 — — — Betonicae.
 — — — Cumino.
 — — — Cephalicum.
 — — — Diaphyl. cum gumm.
 Emplastrum diaphoreticum.
 — — — Iſchiadicum,
 — — — de meliloto.
 — — — Mucilaginibus.
 — — — Oxycroceum.
 — — — de ranis,
 — — — — cum mercurio.

Resolventia interna.

Vid. in §. 54, n. 4.

Eo referri possunt.

Rhabarbarum.

Sperma ceti.
Gummi lacca.
Myrrha.
Radix asclepiad.

Sudorifera sunt.

- 1 Diluentia calida epota, §. 54, n. 4.
- 2 Resolventia interna, §. 54, n. 4.
- 3 Stimulantia, §. 75, n. 5.
- 4 Laxantia, §. 35, n. 3.
- 5 Calor externus humidus ad cutim determinatus.

Diuretica sunt.

- 1 Diluentia frigida & tepida epota, §. 54, n. 4.
- 2 Resolventia interna, §. 54, n. 4.
- 3 Stimulantia: imprimis salina, saponacea, §. 75, n. 5.
- 4 Laxantia, §. 35, n. 3, imprimis foru, clysmate, renibus applicata.
- 5 Calor renibus, hypogastrio, perinaeo applicatus, frigore vero reliquo corpori simul dato paullo magis solito.

SECT. 336.

Vid. 88, n. 1, & 35, n. 1.

IN INFLAMMATIONE.

SECT. 396, n. 2.

Purgatio antiphlogistica.

Cremor tartari drach. vi.
 Crystall. tart. drach. vi.
 Ipse tartarus drach. vi.
 Sal. polychrest. scrup. v.
 Pulp. tamarind. unc. iij.
 Tamarindi unc. iv.
 Roh. sambuc. unc. iv.
 Rhabarbari drach. iſſ.

*Purgans antiphlogisticum;
 evacuans, revellens.*

1. Rhei electi drach. j.
 Sal. polychrest. scrup. iſſ.
 Syrup. cicbor. cum rheo unc. j.
 S. A. accurate contrita simul dilue in
 Aq. stillatis. flor. sambuc. unc. ij.
 Cinnamom. drach. ij.
 F. haustus.

Bolus

IN INFLAMMATIONE.

SECT.

396, n. 5.

37

Bolus purgans antiphlogisticus,
impetum cruoris minuens.

R. *Tamarind. elect. pulp.* unc. ij.
Crystall. tartar. minutim pulveris
drach. iij.

M.

Capiat omni $\frac{1}{2}$ *horae drach. j. donec com-*
mode purgetur.

Hauftus similis.

R. *Fol. fenn. sine stipit. elect.* drach. ij.
Agarici optim. drach. j.
Tamarind. elect. unc. ij.

Cum aq. still. flor. samb. vase clauso deco-
coct. spatio $\frac{1}{2}$ *horae, tum decocti*
per pannum expressi nn. v. admisce
Nitri puri drach. j.

Syrup. rosar. solut. cum fenna dr. vj.
F. Hauftus.

Decoctum simile.

R. *Fol. fennae* drach. iij.

Tamarind. unc. ij.

Agarici drach. iij.

Cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{2}$ *horae pint.*
admisce

Syrup. cicbor. cum ribeo. unc. j.

Capiat unc. j. *omni semibora, donec pur-*
getur.

Reliqua vid. §. 334.

SECT. 396, n. 4.

Epispastica.

Constant attrahentibus ad locum §.
135, n. 4.

Derivantibus eo §. 135, n. 4.

Propellentibus ab illo §. 135,
n. 4, & §. 135, n. 5.

Vesicantia.

Vid. §. 75, n. 6.

Medicamentum
rans simul diluens & refrige-
Decocti forma.

R. *Rad. acetosae* unc. ij.
Gramin.

Scorzon. ana unc. iij.

Fol. Becabung.

Acetosellae.

Agrim. ana m. j.

Cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{2}$ *horae, adde*

Flor. Borragin.

Bugloss.

Rosar.

Violar. ana pug. i.

Stent in digestionem, vase clauso spatio
 $\frac{1}{2}$ *horae, tum depurati, pint. iij.*
admisce

Nitri puri drach. ij.

Rob. samb. unc. iij.

Capiat unc. iij. *omni hora diei.*

Mistura diluens, refrigerans,
antiphlogistica.

R. *Aq. still. flor. sambuci* unc. xv.

Rob. sambuci unc. ij.

Nitri puri drach. j.

M.

Capiat unc. j. *omni bora.*

Emulsio similis.

R. *Semin. contus. Bardan.* drach. iv.

Petroselin. drach. vj.

Cicbori unc. j.

Cum aqua. stillat. petroselini.

F. emulsio, cuius unc. xij. *admisce*

Nitri puri drach. j.

Syrup. 5 radic. aperient. unc. j.

Capiat unc. j. *omni bora.*

Pulvis

Pulvis refrigerans, resolvens.

- ℞. *Sibii diaphoret. non ablut.* drach. j.
I. apid. prunell. drach. ss.
Rad. zedoar. scrup. j.
 M. F. P. dividendus in vj. dof.
Capiat unam omni triborio ex ptisana.

SECT. 398, n. 1.

Liquidum tenue aromaticum, calide potandum.

- ℞. *Ligni santali albi.*
Citrini.
Rubr. ana unc. j.
Rad. carlinae unc. j.

AD ABSCESSUS.

SECT. 403, n. 1, 2.

Maturantia in pus.

- 1 Gumm. aromatica simplicia.
 Ammoniacum.
 Bdellium.
 Elemni.
 Galbanum.
 Opopanax.
 Sagapenum.
 2 Emollientia, laxantia, humectantia
 §. 54, n. 4.

Cataplasma emolliens & maturans.

- ℞. *Farin. secales* unc. iv.
Acei drach. ij.
Gumm. galban. in vitello ovi solut.
 unc. j.
 Cum aq. decoct. in cataplasma, adde
 sub finem
Ol. lil. alb. unc. j.
 F. cataplasma.

Petroselini

Foeniculi ana unc. iij.

Oenonidis unc. ij.

Cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{2}$ horae, adde

Ligni sassafras ras. unc. ij.

Fol. betonic.

Rutae.

Scabiosae.

Tussilaginis ana m. j.

Scent in digestionem fervida spatio $\frac{1}{2}$
 horae, clauso vase, tum puri liquo-
 ris lib. v. exhibe.

Sorbeat omni hora unc. ij. *fervidas.*

SECT. 389, n. 1, 2, 3.

Vid. §. 107, ad 144.

- ℞. *Fol. acetos. recent.* m. iv.

Butyri infus. unc. j.

Ad ignem leniter decoctis parum adde

Fermenti panis unc. ij.

Gumm. sagapen. in vitello ovi solut.
 drach. iv.

F. S. A. cataplasma.

Vel

- ℞. *Mellis ad spissitudinem paullo maio-
 rem costi* unc. iv.

Ceparum sub cimeribus assatar. un. iij.

Ficum pinguium unc. iv.

Cum pauxillo aq. S. A. decoct. in ca-
 taplasma, adde

Farin. lini unc. iss.

F. cataplasma.

Vel

- ℞. *Avenae excorticat.* unc. j.

Farin. lini recentis unc. ij.

Bulbor. lil. albor. unc. iij.

Flor. alibcae unc. j.

Cum lacte recenti decoctis S. A. adde

Butyri

AD ABSCESsus.

Butyri infus. unc. ij.
F. cataplasma.

SECT. 403, n. 3.

Ufus decocti §. 898, n. 1 huic proposito motum excitat sufficientem.

SECT. 409.

Cataplasma modice acre, emolliens, oleosum, tegumenta mortua resolvens.

✧. *Fermenti panis aris* unc. ij.
Sapon. Venet. ras. drach. ij.
Mellis unc. ff.
Ol. Chamamel. infus. drach. ij.
M. F. S. A. cataplasma.

IN FISTULIS CURANDIS.

SECT. 415.

Iniection digestiva liquefacta.

✧. *Terebinth. nativ.* unc. ij.
Vitell. ovorum unc. j.
S. A. subactis, admisce
Mellis commun. unc. ij.
Sp. vini commun. drach. iv.
Aq. commun. unc. iv.
Calcfactum & probe mistum iniice.

Vel

✧. *Balsami Arcaci.*
Vitell. ovorum ana unc. j.
Mista dilue in
Sp. vini commun. unc. viij.
Ufus, ut prioris.

Iniection deterfiva.

✧. *Mellis rosar.* unc. ij.

Profunt & praescripta §. 403, n. 1, 2.
SECT. 412.

✧. *Cinereum clavellat.* unc. iv.
Calci vitae Leodiensis unc. vj.
Contusa misce; dein in loco humido liquefiant; filtra, inspissa; fusa ad ignem validum in crucibulo ebene oburato caute in vase sicco Horum pauxillum abrasum, pluma-ccolo exceptum applicetur spatio duarum horarum, dein applica deservio prioris butyrum.
Butyri antimonii pauxillum imponatur apici protuberantis apostemat; Aut teneatur lapis infernalis eidem apici aliquamdiu applicatus.

Elixir. propr. cum sale tartari pp.
unc. ff.

Lexivi barbitonfor unc. viij.
M.

✧. *Aloës.*
Croci.
Myrrhae ana drach. j.
Salis communis drach. iij.
Coctis in aqua, & filtratis unc. x.
adde vini ana.

Vel

Decoctum balsamicum, consolidans fistulam puram.

✧. *Rad. aristoloch. maior.* unc. ij.
Fol. sic. scordii unc. xx. admisce
Baccar. junip. contus. unc. j.
Cum spir. vini debili decoct. in phiala alta spatio 1 horae unc. xx. admisce
Sapon. Venet. unc. j.

Ufus,

Ufus, ut prioris.

Ubi pura fistula, hanc consolidat sequens

Iniectum.

℞. *Ol. infusi hyperici* unc. iv.

Aloës

Myrrhæ.

Olibani ana drach. ij.

Coquendo leniter, mista subige cum

Vitelli ovorum unc. ij.

Dein, calefacta parum, in fistulam puram inice.

IN GANGRAENA.

SECT. 434, n. 1.

Mistura spiritus excitans in gangraena a causa calida, temperie alcalina.

℞. *Succ. rec. expressi citri* unc. ij.

Aurantior. unc. j.

Syrup. recent. moror. unc. ij.

Aq. stillat. citri totius unc. iv.

Melissæ unc. ij.

Cinnamomi unc. j.

Vini Rhenani unc. vj.

Addito, si opus, *saccharo.*

M.

Bibat unc. j. omni hora vel 6 semi hora.

Vel

℞. *Rob. ribesiorum.*

Berberis ana unc. ij.

Sp. salis drach. ff.

Aq. stillat. melissæ unc. vj.

Vini Rhenani unc. x.

M.

Capiat unc. j. omni hora.

Si frigida laborat gangraena, temperies plegmatica vel acidula.

Mistura, spiritus excitans, calida.

℞. *Sal. vol. oleos.* drach. iij.

Elixir. propr. cum sale tartari pp. drach. ij.

Aq. stillat. vitæ Matsbieli unc. iij.

Corticis citrei unc. vj.

Syrup. 5 rad. aperient.

Artemisiæ Lencelii ana unc. j.

Confect. Alkermes completæ drac. ij.

In usum eundem.

SECT. 434, n. 2.

In temperie acidula §. 66, n. 1, 2.

— Alcalina §. 88, n. 5, 6.

SECT. 434, n. 3.

In casu alcalescente calido.

℞. *Vini Rhenani* lib. j.

Cinnamom.

Caryophyllorum.

Fol. maceris.

Nucis myristicæ ana drach. ij.

Coq. in phiala alta vitrea, in arena.

Hoc decocto imbue panem tostum.

In casu acido, frigido.

℞. *Sal. vol. oleos.* unc. ff.

Sp. cortic. citrei unc. ij.

Sp. lavendulæ.

Menthae ana unc. j.

Iberiacal. unc. ij.

M.

Atque hoc tostum panem imbue.

IN GANGRAENA.

SECT. 435, n. 2.

Fomentum ad gangraenam emolliens, antisepticum, resolvens, putrefacti introitum in venas impediens.

℞. *Fol. recent. rutae* m. iv.
Malvae m. ij.
Althaeae m. j.
Farin. lini unc. j.
 Cum aqua decoct. vase clauso *lib.* iv.
 admisce
Sapon. Venet. drach. ij.
 F. fomentum.

Laseis pannis applicandum.

℞. *Aceti sambuci* unc. ij.
Aq. flor. sambuci unc. x.
Salis ammoniac. drach. ij.
Vini albi Gallici unc. vi.
 M. pro fomento.

Cataplasma simile.

℞. *Flor. meliloti.*
Sambuci.
Althaeae.
Chamaemel.
Calend. ana unc. iij.

Cum aq. decoct. in cataplasma adde sub finem

Farinae lini unc. j.
Ol. lini unc. iij.

SECT. 438.

Condimentis talibus materiem praebent.

Sal ammoniacus.
Borax.
Gemmae.
Nitri.
Maris regeneratus residuus a
refstillatione sp. sal. ammon.

Acetum.

Calendulae.
Destillatum.

Dracuncul.
Lavendulae.
Rosaceum.
Rutaceum.
Sambucinum.
Scilliticum.
Theriacale.
hortensis.

Sp. nitri.

Salis.

Sulphuris per
campanam.

Vitrioli.

Vina Rhenana imprimis.

Aromata hic fere propria.

Abrotanum.
Absointhium.
Alliaria.
Angelica.
Balsamita.
Carduus benedictus.
Centaurium minus.
Chamaedrys.
Dictamnus Creticus.
Geranium Robertianum.
Lavendula.
Maiorana.
Marrubium album.
Myrtus.
Origanum.
Polium.
Pulegium.
Rosmarinus.
Ruta.
Sabina.
Salvia.
Scordium.
Tanacetum.
Thuya.

Fomentum putredinem incipientem
corrigen.

℞. *Fol. rutae.*
Scordii.
Absinthii ana unc. iv.
Menthae

Menthae unc. j.

Cum *aquâ* & *aceti* ana q. s. decoct.
vase clauso *lib.* iv. admisce
Sal. gemmae drach. iv.
Sp. vini theriac. unc. ij.
F. fomentum.

*Cataplasma antisepticum ad
gangraenam.*

℞. *Eadem.*

Coq. in cataplasma, sub finem addendo
Sal. ammon. drach. iv.
Farin. lini unc. ij.
Ol. infus. rutae unc. iss.
F. cataplasma, tempore usus irroran-
dum
Sp. vini theriac. vel sp. vini camph.
tantillo.

SECT. 448.

Liquor calidus, corruptioni resistens.

℞. *Aceti dracunculi borten.* unc. vj.
Rosae. unc. ij.
Sp. vini theriacal. unc. j.
Sal. marini unc. j.
Aq. decoct. scordii unc. xij.
M.

*Escharae gangrenosae emolliendae
optimum hoc cataplasma.*

℞. *Fol. scord.* m. ij.
Malvae m. j.
Flor. lavend.
Altheae ana unc. j.
Cum *aceto* decoct. in cataplasma ad-
misce
Farin. lini unc. iij.
Ol. lini unc. j.
Sal. ammon. drach. j.
Unguentum aureum.
Basilicon.

SECT. 450.

*Cataplasma emolliens, diaphoretic-
um, anodynum.*

℞. *Fol. rec. abrotan. mar.*
Absinth. pontici.
Rutae borten.
Scordii.
Alliariae.
Eupator. cannab.
Marrub. alb.
Nicotianae ana m. iss.
Hyoscyami m. j.
Flor. calthae terrestr.
Centaur. min.
Meliloti.
Matricariae.
Tanacet. ana unc. ij.
Altheae.
Papav. errat. ana unc. j.
Cum *aq. decoct.* vase clauso spatio $\frac{1}{2}$
horae admisce
Farina lini unc. iv.
Ol. infus. rutae unc. ij.
Sp. vini theriac. ana unc. j.
Sal. ammon. drach. j.

SECT. 456.

*Mistura cardiaca, calida in gan-
graena, a causa frigida.*

℞. *Aq. stillat. theriac.* unc. j.
Prophyllae. Sylvii dr. vj.
Vitae Mastbiol. unc. j.
Rutae unc. ix.
Syrup. artemis. Ferneli.
Radie. 5 aperient. ana un. iss.
Elixir. propr. cum sale tartari pp.
drach. ij.
M.
*Capiat. cochleare j. omni $\frac{1}{2}$ horae: su-
perbibendo unc. unam vel alteram se-
quentis.*

℞. *Aq.*

IN GANGRAENA.

- ℞. Aq. decoct. bordei pint. ij.
Vini Gallici pint. j.
Zingiber. pulveris drach. ij.
Syrup. botrys. unc. iij.
M.

- ℞. Camphorae gran.
Iberiac. drach. viij.
Zingiberi drach. ij.
M.
Scrup. j. omni liboria.

AD SPHACELUM.

SECT. 462.

Acre lixivium.

- ℞. Calc. viv. ex saxis exustis p. i.
Hanc tege

Cinerum clavellat. p. iij.

In loco subterraneo liquefacta, filtra-
taque serva.

Aut & ipsa calx viva tenuiter in pol-
linem alba inspergi poterit.

Sed & pulcherrime separationes
fiunt, si escharae mortuae applicatu
putrefacientis remedii mollitae, in ta-
bum solutae, diffluentes a sana parte
recedunt; dum interea vivae partes
fotu vivifico animantur. Vid. 435, n. 2.

SECT. 469, n. 5.

Pulvis cardiacus, calidus,
narcoticus.

- ℞. Ol. stillat. cinnamom. gutt. ij.
Carephyll. gutt. j.
Cirt. citrei gutt. ij.

Sacchari puri drach. ij.

F. S. A. clacofaccharum, cui admisce

- Corall. rubr. drach. j.
Laud. puri gr. j.
M. F. pulv. divid. in ij. dof.
Capiat unam hora una ante aditionem,
& si nihil sopivis, alteram $\frac{1}{2}$ horae
ante eandem.

SECT. 471, n. 5.

Pulvis adstringens ad sistendam
haemorrhagiam vulneris
externi.

- ℞. Sang. draconis drach. j.
Sarcocoll. drach. ij.
Lapid. haematit. drach. ss.
Bol. armen. drach. viij.
M. F. pulv. tenuissimus.
℞. Farin. volatil. in molendinis, vel pi-
strinis collectae unc. iv.
Colcochar. vitrioli fortiter exusti &
edulcorati drach. ss.
M. exacte.

- ℞. Fungi lycoperdi disti bene maturi,
atque siccissimi, collectum pulve-
rem, cum vulnere insperge, mox
aperti interiorem superficiem ap-
plica.

IN COMBUSTIONE.

SECT. 479.

Mistura refrigerans, antiphlogistica.

- ℞. Fol. rec. sedi mai. unc. iij.
Contrit. expresso succo, admisce

Syrup. rosarum.
Violarum ana unc. j.

Nuri scrup. ss.
Spirit. salis gutt. x.
Aqua pluvialis lib. ij.

Seet.

SECT. 480.

*Cataplasma emolliens, resolvens.**Fotus partem combustam contra putredinem condians.*

- ℞. *Aceti libargyrii* unc. ij.
Vini Gallici unc. xij.
Aq. stillat. flor. sambuc. unc. xiv.
 M.

Fotus similis, resolvens, emolliens.

- ℞. *Flor. sambuci.*
Meliloti.
Alibear. ana unc. j.
 Cum aq. decoct. & expressis *lib. iss.*
 admisce
Sp. vini iberiac. unc. ij.
Aceti sambuc. unc. j.
Sal. maris drach. j.
Lintheis calidis applicetur.

- ℞. *Fol. malv.*
Bismak. ana m. ij.
Flor. melilot. unc. ij.
 Cum aq. decoct. sub finem admisce
Farin. lini q. s.
Sp. vini iberiac. unc. j.
Ol. lini unc. ss.
 F. cataplasma.

Unguentum simile.

- ℞. *Butyri recentis* q. pl. cum *aqua frigida* ablue, donec albefcat.
 ℞. *Huius butyri.*
Spermat. ranarum.
Succi sedi. ana.
 M. S. A.

AD SCIRRHUM.

SECT. 490, n. 1.

Fotus ad scirrhum resolvens, emolliens.

- ℞. *Flor. alibear.*
Chamaemel.
Melilot.
Sambuc. ana m. j.
Centaurea min. m. ss.
 Fol. *absinth.*
Marrub. alb.
Rutae.
Sabinae ana m. j.
Rad. bryon. alb. unc. iv.
Angelic. sativ. unc. j.
 Cum aq. decoct. vase clauso, & per pannum express. *lib. iv.* admisce
Sp. vini iberiac. unc. iv.
Applicetur pannis lencis ad cutim nudam, superapponendo extrinsecus su-

*pra pannos vesicam suillam expansam, atque pauxillo olei prius inunctam.**Cataplasma simile.*

- Ex iisdem* coque cum s. q. aq. cataplasma, sub finem addendo
Gumm. Galbani in vitello ovi subacti
 unc. iij.
Farin. lini unc. ij.
Ol. lini unc. ij.

Emplastrum ad scirrhum simile.

- ℞. *Gumm. ammcn.*
Galban.
Sagapen.
Opopanax. ana unc. ij.
 Leni igne in testa soluta depura, tum admisce accurate
Vitel. ovorum bene concussor. n. iv.
Cerae citrinae unc. ij.

Farin.

AD SCIRRHUM.

Hæc pro internis.

Farin. rad. bryon. alb. unc. iij.
Ol. infus. rutæ q. l.
 Ut F. S. A. emplastrum.

SECT. 490, n. 4.

Vitus esto ex lacte recenti, lacte ebu-
tyrato, & fero lactis.

Ex iure carniū quarūcumque re-
 centium de quadrupedibus & vola-
 tilibus.

Ex frumentaceis, avena, hordeo,
 milio, phalaride, secali, tritico,
 zea.

Ex oleribus, §. 35, n. 1.

Ex fructibus mitibus, maturis, ho-
 racis, acido dulcibus, imprimis co-
 ctis.

Ex hordeatis, panatellis &c.

Potus esto decoctum ex rad. chinae,
sarsaparillæ, lignorum santalorum
trium &c.

Decoctum anodynum in scirrho non
movendo.

℞. *Semin. papaver alb. contus. unc. ij.*

Rad. foenicul. unc. iv.

Flor. papav. errat. drach. vi.

Fol. malvæ m. j.

Cum aq. decoct. vase clauso spatio $\frac{1}{2}$
 horæ, pint. ij. admisce

Syrup. papav. alb. unc. iijss.

Bibat subinde unc. iij, vel iv.

Pulvis similis.

℞. *Spermat. ceti.*

Coral. rubr.

Sitibi diaphoret. non ablusi ana dr. j.

Laudani puri gr. ij.

M. F. pulv. tenuissim. dividendus in iv.
 dos. æquales:

Quarum unam capiat mane & vespere,
urgente dolore.

Externe fomentum simile.

℞. *Flor. hyoscyami.*

Meliloti.

Papaver. rubrad.

Sambuci ana pug. j.

Cum aq. decoct. vase clauso pint. iijss.
 admisce

Aceti sambuci.

Rosar. ana unc. ij.

Sp. vini rectific. drach. iv.

Unguentum anodynum, saturnium,
blandum ad lium.

℞. *Aceti lithargyrii unc. j.*

Ol. express. semin. hyoscyami.

Papav. alb.

Rosar. infus. ana drach. ij.

F. S. A. nutritum, cui sub finem admi-
 sce

Opii puri gr. vj.

Emplastrum.

Emplastrum de minio.

Unguentum diapompholygos.

Emplastrum anodynum, blandum,
motum sedans, ad scirrhum, nec
resolutione, nec exstirpatione,
medicabilem.

℞. *Succi recent. expressi & puri.*

Fol. hyoscyami.

Papaver. bortenf.

Phellandrii ana unc. iv.

Leni igne coque, inspissa, sub finem
 admisce

Cerae albae unc. viij.

Ol. infus. rosar. unc. j.

F. S. A. emplastrum.

Empla-

*Emplastrum saturnium, mercuriale
blandum.*

R. *Sacchar. saturni.*
Cerussac.

Amalgam. mercur. & saturni.
ana drach. ij.

Cerae albae unc. iv.
Ol. infus. rosar. drach. ij.
M. F. *emplastrum.*

IN CANCRO.

SECT. 507, n. 1.

Vid. emplastrum §. 490, n. 4-

Aq. stillat. spermatis ranar.
Sperma ranarum.

SECT. 507, n. 2.

*Pulvis purgans in cancro nondum
exulcerato.*

℞. *Resin. ialapp.* gr. vj.
Diagrydii gr. vij.
Sibii diaphoret. non ablut. gr. xxiv.
M. F. *pulv.*

Similis mercurialis.

℞. *Mercur. dulc.* gr. xv.
Diagryd. gr. xij.
M. F. *pulv.*
Capiat semel in septimana.

SECT. 507, n. 3.

Decocta ex bardana.
China.
Foeniculo.
Petrofelino.

Sarsaparilla.
Scorzonera.

Pulvis aperiens, plandus.

℞. *Antimon. diaphoret. non ablut.* gr. viij.
Sperm. ceti. drach. j.
M. F. *pulv. divid. in ij. dos.*
Sumat unam mane & vespere.

SECT. 509.

Fomenta & litus.

*Fomentum lene, saturnium,
anodynum.*

℞. *Aq. stillat. papav. rhoead.*
Rosar.
Sambuci ana unc. ij.
Sacchar. saturni drach. j.
Tinct. opii drach. j.
Sp. vini theriacal. drach. ij.

Linimentum saturninum, lene.

℞. *Aceti lithargyrii* drach. vj.
Ol. rosacei drach. iv.
F. *nutritum.*

IN MORBIS OSSIUM.

SECT. 529, n. 1.

*Infuso-decoctum abstergens, antise-
pticum, in spina ventosa.*

℞. *Ligni guaiaci virid. ponderos. ras.* u. x.
Sal. tartari drach. ff.

Cum aqua comm. lib. vi. spatio xxiv.
horar. digestum in diplomate deco-
que spatio 2 horar. sub finem admi-
scendo.

Sp. vin. rectific. unc. iv.
Ebulliant iterum parumper, tum exhibe.
Super

IN MORBIS OSSIUM

Super residuo decocti novae aq. lib.
iij. affusae ebulliant per iv. horas

Prioris decocti unc. iv. sumat quater
de die vacuo stomacho: mane hora septi-
ma, dein hora undecima, iterum quarta
pomeridiana, & ultimo hora septima
vespertina.

Altero decocto utatur pro potu quoti-
diano.
Sic ex ligno juniperino, salisfras,
buxi, quercino &c. decoctum fieri
potest.
Linthea his decoctis madida samenta
sunt.

IN CURATIONE FEBRIUM IN GENERE

SECT. 599.

Vid. 28, n. 1, 4.

SECT. 603.

Fomentum mucosum, anodynum,
blandum, leniter aperiens.

℞. Semin. pomor. cotoneor. n. vj.

Cum aq. stillat. flor. rosar.

Sambuc. ana un. iij.

F. S. A. emulsio, cuius puro liquori
admisce

Sp. vin. rectific. unc. ff.

Tinct. opii drach. j.

Unguentum aureum.

Basilicum.

Diapompholyg.

Nutritum.

Populeum.

Rosarum.

SECT. 605, n. 1.

Pisanae.

Decoctum laxans.

SECT. 605, n. 2.

Mistura subacida, nitrosa, in febribus a nimio calore.

℞. Aqua decoct. bord. unc. xxv.

Nitri puri drach. j.

Vini Rhenani unc. vj.

Rob. ribesior.

Sambuci ana unc. ij.

M.

Capiat omni $\frac{1}{2}$ horae unc. j. vel ij.

R. Aq. stillat. siboret.

Fumar.

Meliss. ana unc. iij.

Sp. salis comm. drach. j.

Syrup. moror. unc. ij.

Nitri puri drach. ff.

M.

Capiat cochlear. j. omni semihorio.

Pulvis similis.

℞. Cryshall. tartari drach. ij.

Nitri puri drach. ff.

M. F. pul.

Capiat scrup. ff. omni triborio ex pi-
sana. Reliqua vid. in cap. de putre-
dine alcalina, & de excessu circula-
tionis.

SECT. 605, n. 3.

Pulvis temperans, aromaticus, in
febris ab aere humido.

℞. Herb. recent. maioran.

Mentb. crisp.

Origan.

Rorismar. ana m. ij.

Flor.

Flor. chamaemel. Roman.
Rosar. rubr.
Tanacet.

Lavend. ana m. j.
Mari Syriaci m. ss.

Rad. irid. Florent.

Angelic. sativ.

Imperat. ana unc. iij.

Rosar. lign. sassaf. unc. ij.

Semin. contus. celeri unc. iij.

Conscissorum F. pulv.

Spargendus in loco ubi aeger est.

SECT. 605, n. 10.

Vomitoria lenia in febribus ex copia ciborum.

℞. *Aq. decoct. bord. levis unc. xxxvj.*

Oxymell. squillit. unc. iij.

Tart. vitriolat. non acid. drach. ij.

M.

Capiat unc. ij. omni semiborio.

Vel

℞. *Rob. samb. unc. iij.*

Aceti squillit. unc. j.

Aq. stillat. meliss. unc. vj.

M.

Capiat unc. ss. omni semiborio.

℞. *Tartar. emetici gr. v.*

Pro una dosi.

℞. *Vini emetici unc. iss.*

Pro una dosi.

℞. *Rad. specuacanth. alb. scrup. j.*

F. pulvis.

Pro una dosi.

Hauftus emeticus, ventriculo cibis nimium infarcto.

℞. *Rad. specuacanth. pulveris. scrup. iv.*
Cum vini albi unc. iij.

Coque in phiala alta per hor. quatuor.
Colaturam exhibe pro una dosi.

Vel

℞. *Fol. recent. asari conscis. n. v.*

Cum aq. fervida infusus spatio $\frac{1}{2}$ horae
abque ebullitione,

Succum expressum exhibe pro una dosi.

SECT. 610.

Clyisma motum temperans, refrigerans in febribus.

℞. *Nitri puri drach. ij.*

Mell. rosar. unc. j.

Seri laetis recent. unc. xij.

M.

Vel

℞. *Aceti comm. unc. j.*

Nitri nativ. drach. iij.

Syrup. rosar. solutiv. cum senna un. ij.

Aq. decoct. bord. unc. ix.

M.

Vel

℞. *LaB. chutyraei unc. x.*

Syrup. ros. pallid. unc. ij.

M.

Vel

℞. *Decocti comm. emollient. unc. xj.*

Nitri puri drach. iij.

Mell. mercurial. unc. iss.

M.

SECT. 611.

Medicamenta in languore febrili.

Mistura aromatica cardiaca.

℞. *Oxymell. squillit. unc. iij.*

Sp. vitae matthiol. drach. iij.

Aq.

IN CURATIONE FEBRIUM IN GENERE.

Aq. stillat. menthae unc. iv.
Cinnam. unc. j.
M.

Capiat unc. j. omni hora.

Similis calida.

℞. Diascord. Sylvii scrup. iij.
Iberias. Androm. drach. iij.
Syrup. 5 radis. aperient. unc. ij.
Aq. stillat. cardui bened. unc. vj.
M.

In eundem usum.

Conditum calidum, aromaticum,
excitans, in eodem casu.

℞. Confect. Alkerm. drach. j.
Zingib. condit. drach. vj.
Rad. contraieru.
Serpentar. virgin. ana drach. j.
Syrup. 5 radis. aperient. q. l.
Ut F. conditum.
Capiat drach. ss. omni quadriborio.

℞. Pulv. vomitissae Kents. scrup. iij.
Detur omni quadriborio.

Pulveres similes in eodem casu.

℞. Zing. alb.

Cortic. winter an.
Rad. zedoar.
Contraieru.

Serpent. virgin. ana drach. j.
Trochisci. de viperis drach. ij.
M. F. pulv. tenuis divid. in doses scrup.
Capiat unam omni quadriborio.

℞. Sal. card. bened. drach. ss.
C. C. alb. drach. j.
Corall. rubr. scrup. ij.
Ol. stillat. cinnam.
Corticis citrei ana gutt. iij.
M. F. pulv. divid. in x. doses.
In eodem usum.

SECT. 614.

Amara laescentia frigida.

Chondrillae.
Cichorea.
Hieracia.
Intubi.
Lactucae.
Scorzonera.
Sonchi.
Taraxaca.
Tragopogona.

IN FRIGORE FEBRILI.

SECT. 615.

Emulsio in eundem sinem.

Potus in frigore febris sumendus.

℞. Aq. decoct. bord. unc. xxx.
Nistri puri drach. ij.
Oxymell. simpl. unc. iij.
Aq. stillat. caryophyll. arom. unc. ij.
M.
Capiat unc. ij. omni ½ horae, calide
valde sorbendas.

Tom. V. pars II.

℞. Quatuor sem. frigid. mai.
min ana dr. ij.
Cum aq. F. emulsio, cuius lib. iij. ad-
misce
Aq. stillatit. feniculi unc. iv.
Sal. prunell. scrup. ij.
Syrup. 5 rad. apr. unc. ij.
Violarum unc. ss.

Usus idem.

Mistura

Mistura similis.

- ℞. *Aq. stillat. borragin.* lib. j.
Flor. rosar. unc. j.
Sambuc. unc. viij.
Cinnam. unc. issf.
Sp. visae Matth. unc. ssf.
Syrup. artemis. Ferncl. unc. ij.
 M.

Ufus ut supra.

Decoctum coffe.

- — — *Ligni cassastras,*
 — — — *fantali,*

&c similia hic valent, imprimis si

pauillum aromatis circa finem addis.

Decoctum simile.

- ℞. *Ligni santali albi.*
sicrin.
rubr. ana unc. j.
 F. cum aqua decoct. spatio $\frac{1}{2}$ horae,
 tum adde
Radix. foenic. unc. iv.
Rasar. sassastr. unc. ij.
Glycyrrhizae unc. ssf.
 Ebulliant iterum uno momento, dein
 decocti lib. iv. exhibe
In eundem usum.

IN ANXIETATE FEBRILI.

SECT. 634.

Vomitoria in febre commoda.

- ℞. *Oxymell. stillit.* unc. iij.
Aq. stillat. cicbori unc. v.
 M.

Pro haustu.

- ℞. *Fol. asari recent.* n. viij.
 Cum *aq. stillat. sard. bened.*
 F. infusio spatio quatuor horarum,
 dein
Expressae tincturae unc. v.
 Exhibe
Pro haustu.

- ℞. *Vitrioli alb.* gr. xxv.
 F. pulv.
 Fx *pauillo cerevisiae hauriendus.*

Purgantia in febribus.

- ℞. *CrySTALL. tart.* drach. v.
 Ex *sero lallis sepefacto.*

Pulvis lenissime purgans.

- ℞. *CrySTALL. tartar.* drach. ij.
Sal. prunell. gr. xij.

Polychrest. gr. xvj.
 M. F. pulv.

Haustus similis, fortior.

- ℞. *Scammon.* gr. vij.
 Cum *aqua stillat. cicbor.* unc. ssf.
 F. S. A. emulsio, cui adde
Syrup. ros. solutiv. cum fenna
drach. xij.
 F. haustus.

Decoctum simile.

- ℞. *Tamarind.* unc. iij.
Agaric. trochisc. drach. iij.
Fol. fennae drac. j.
Scrophular. mai. aquas. unc. ssf.
 Cum *aq. decoct. & express.* unc. viij.
 adde
Sal. prunell. drach. ssf.
Syrup. ros. solutiv. cum fenna unc.
 issf.
 Capiat unc. ij. omni dimid. hora, donec
 purgari incipiat.

Decoctum simile.

- ℞. *Prunor. acido-dulc.* unc. iv.
Tamarind. unc. j.

Fol.

IN ANXIETATE FEBRILI.

Fol. *fenn.* drach. ij.
Scrophular. aquat. drach. vj.
 Cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{2}$ horae, deinde
 per pannum express. unc. xij. admi-
 sce
Syrup. cicbor. cum rbeo. unc. ij.
 Capiat unc. iij. omni $\frac{1}{2}$ hora, donec pur-
 gari incipiat.

Bolus purgans.

R. *Electuar. diaprun. Sylvii* drach. iss.
 Fol. *fenn. pulv.* scrup. j.
 M. F. bolus.

Electuarium diaprun. seu cholagogum
Sylvii unc. ss.
 Confectio Hamech. drach. iv.
 Hiera picra Galeni drach. iss.
 Electuarium lenitivum unc. j.
 ———— *Succi rosarum unc. ss.*

Sudorifera in febribus.

Sunt semper diluentia & aperientia.

Decoctum sudoriferum.

℞. *Rad. apii* unc. ss.
Bardan.
Chinae ana unc. j.
Cicbor.
Gramin.
Napor.
Petrofelin.

IN SITI FEBRILI.

SECT. 640.

Potus commodissimi in febribus.

℞. *Aq. bord. comm. simpl.* unc. xl.
Rob. Ribesior. unc. iv.

Rapar.
Rufci
Sassafrana unc. ss.
Scorzon. unc. j.
actos. unc. ss.
Cicbor.
Endivo.
Taraxaci ana m. j.
Flor. sambuc. unc. ij.
Sem. contus. apii.
Petrofelin. ana unc. j.
 Cum aqua decoct. pint. iij. exhibe.
Hauriat unc. iij. calidas omni quadrante
 horae, donec leviter sudet.

Ex hac formula infinitae aliae con-
 cinnari possunt.

Diuretica.

Hydrogala ex lactis recent. p. j. aquae
 p. iij.
 Serum lactis.
 Lac ebutyratum.
 Lachryma betulae.
 Succi maturi rec. horaei, aqua diluti.
 Sal nitrum.
 Nitrum antimoniatum.
 Sal polychrestum.
 Decocta praecedentia sudorifera cum
 regimine ad diuresin.

Absterfiva.

Sunt eadem.

Sp. salis tot guttas, quot sufficiens
 ad gratum acorem.

Aq. stillai. cinnam. unc. j.
 M.

Pro potu assidu.

D 2

Ribe-

3℥. Gelatinae.
 Rob. Syrupi.

{ Ribesiorum. Pomorum cydonior. Ceraforum nigr. Berberis. Mororum. Baccarum rubi Idaei. Pomorum granator. Limonior. Citriorum. Aurantior. Chinenfium.	} Horum omnibus unc. iv.
---	--------------------------

Praepara ut prius, v. gr.

3℥. Gelatinae cydonior. unc. j.
 Diamori Nicolai unc. ij.
 Syrup. acetos. citrei unc. j.
 Aq. stillat. borrag.
 Melissae ana unc. iv.
 simplicis unc. xxiv.
 Vini Rbenani unc. iij.
 M.

Hydrogala.
 Serum lactis.
 Lac ebutyratum.
 Cerevesia tenuissima.

Potus coffe.
 Vini p. 1 aq. purae p. xij, succi citri parum.

SECT. 641.

Decoctum in valida siti & debilitate summa.

3℥. Pomorum elect. res. citri, expurgatis seminibus, n. ij.
 Cum cortice conscissa, abiecta alba, fungosa, carne, contusaque immitte
 Aq. decocti bordei simpl. unc. xxxij.
 Adde syrup. mororum unc. iss.
 Vini Rbenani unc. viij.
 Panis tostii unc. ij.
 In vase fictili clauso serventur
 Pro potu assiduo.

Vel

R. Syrup. de limon. unc. iij.
 Sp. vini puri unc. iss.
 Vini Rbenani unc. iv.
 Aq. comm. purae unc. xiv.

AD NAUSEAM FEBRILEM.

SECT. 644.

Potus ad primum.

Vid. §. 640, 641.

Potus ad secundum & medicamina.

Vid. §. 634.

Ad quintam speciem.

Mistura austera, anodyna.

R. Mivae cydonior. unc. iv.
 Syrup. limon. unc. ij.

Aq. still. vitae Mastibioli unc. j.
 Cinnam. drach. vj.
 Cors. citrei unc. vj.

Tinct. opii gut. lx.
 M. accurate.

Capiat unc. j. donec nausea sedetur.

3℥. Aq. stillat. menthae fortis q. s.
 Bibat unc. j. omni $\frac{1}{2}$ horae frigidam.

3℥. Mivae cydonior. q. s.
 Assumat drach. j. omni semibora.

Haustus anti-emeticus.

R. Succo recentis citrei unc. ss.
 Vini

Vini Rhenani unc. j.
Bene mistis, adde
Salis absinthii drach. j.
In ipso actu effervescentiae potentur.

¶. Talcotas tenues citrei, saccharo res-
persas, impositas linguae ore
detineat.

In omnibus interim iuvant fere epi-
themata, fomenta, cerata, stoma-
chica, imprimis ubi inflammatio
abest.

¶. Succi menthae cum aceto extracti
cum pane cocto applica.

Scutum stomachicum, ad nauseam
a motu liquidi nervosi inordi-
nato ortam.

¶. Pulv. aromatic. rosac.
Diagalang.
Diarrho. abb. ana unc. j.
M.

Infusa sindoni applica epigastrio.

Emplastrum in nausea febrili, ex
liquido nervoso turbato,
stomachicum.

¶. Cerati stomachici Galeni q. s.
Ut extensum ad alutam F. emplastr.
stomach.

Vales quamdiu adhaerescit.

Epithema ad nauseam ab inordinato
liquidi nervosi motu ortam.

¶. Aq. vitae Matthiol. unc. j.
Sp. rad. angelic.
Carmin. sylo.
Menthae ana unc. ij.

Talcota panis triticeae testis bene irro-
rata his, applicetur talide epigastrio,
super applicetur vesica suailla oleo hu-
mefata, & dein supra hanc ligatura
renovetur post xj. horas.

IN DEBILITATE FEBRILI.

SECT. 667.

Ius ex carne bubula,
Vitulina,
Ovella,

Galinacea. ana
Decocta in aq. rasperge pauco sale &
succo citri.
Lac recens.
Decocta § 28, n. 1.

IN FEBRI INTERMITTENTE.

SECT. 758.

Medicamenta huc referenda.

Sales herbarum Tacheniani omnes, quo-
rum praecipit ex absinthio, } paran-
Carduo bened. } tur.
Stipitibus fabarum.

Nitrum.

Stibium, &
Stribium diaphoreticum non ablutum.

Sal ammoniacus.

Prunellae.

Polychrestus.

Tartarus regeneratus.
tartarizatus.

Sal tartari cum oli terebinth. in sa-
ponaceam massam redactus.

Herbae omnes aromaticae in omnibus
suis partibus. Vid. totum §. 75, n. 5.
§. 54, n. 4, maxime ad citrulum re-
solventium.

Seet.

SECT. 759.

Vomitorium in febris intermittente.℞. *Tart. emetic.* gr. v.

F. pulv.

*Una dosi sumendus.**Pilulae emeticae.*℞. *Tart. emetic.* gr. v.*Micæ panis q. s.*

Ut F. pil. n. v.

*Pro una dosi.**Hæstus emeticus valde movens.*℞. *Vini emetici* unc. ij.*Oxymell. scillit.* drach. vj.*M. F. hæstus.*℞. *Tart. emetici* gr. v.*Gelatinae ribesior.* unc. ss.*Ol. cinnam.* gutt. j.*M. F. bolus.**Purgans.**Pulvis.*℞. *Pulv. cornachin.* scrup. ij.*Pro una dosi.**Potus.*℞. *Pil. coch. mai.* scrup. ij.*Syrup. rosar. solut.* unc. ss.*Aq. stillat. flor. sambuci* unc. ij.*F. hæstus.**Pilulae.*℞. *Aloës lotæ* gr. xij.*Myrrhæ* gr. x.*Opopanac.* gr. v.*Sal. gemmæ* gr. v.*M. F. pil. n. ix.*

SECT. 761.

Sudoriferum antipyreticon, raro fallens, misturæ forma.℞. *Sal. polycresst.* drach. ij.*Syrup. s. rad. aperient.* unc. ij.*Opii puri* gr. ij.*Aq. stillat. ferment. card. bened.**Absinthii.**Rutæ.**Maïoranae.**Menthæ ana*

unc. j.

Extract. absinthii. unc. ij.*M.**Capiat cochleare j. omni quadrante horæ: superbibendo unc. iv. sequent. decocti post singula quæque.**Simile, decocti forma.*℞. *Rad. imperat.* drach. vj.*Ligni sassafr.**Santal. rubr. ana* unc. ij.*Fol. virgæ aureæ* m. ij.*Flor. centaure. min.* unc. ss.*Semin. contus. dauci cretici.* drach. vj.*Infusa vase arcte clauso per horas ij. absque ebullitione, sed fere fervida, dein parum ebulliant, tum decocti pint. ij. exhibe.*

SECT. 763.

Vid. 643, 640.

SECT. 767.

Pulvis in febris autumnali diuturna, corpore debilitato, sumendus.℞. *Cortic. Peruviani boni* unc. j.*F. pulv. dividend. in xij. dosi., exhibe.**Capiat omni biborio unam ex vino.**Deco-*

Decoctum in eodem casu.

℞. *Cortic. Peruviani* unc. iij.
Aq. comm. unc. xij.
 Infusa spatio duarum horarum, dein
 per horam ebulliant: tum adde
Vini Gallici unc. iv.
 Ebulliant rursus parum in vase alto,
 dein decoctum purum exhibe.
 Capiat unc. iiss. omni biborio.

℞. *Cortic. Peruviani* unc. iij.
 Vase clauso spatio 2 horar. in aqua
 comm. decoctae unc. xvj. exhibe.
 Capiat ut praecedens.

Extractum simile.

℞. *Decoctum praeced.*
 Exhala ad mellis spissitudinem.
 Sumat divisum in iv. doses.
 ℞. *Extractum praeced.*
 Dilue in syrupo; 5 rad. aperient. unc. j.
 Erit syrupus;
 Usus ut extrañi.

℞. *Extractum praeced.*
 Admisce pulv. *glycyrrh.* q. s.
 Ut F. pil. gr. iv.
 Consumat omnes spatio 24 horarum.

SECT. 768.

*Linimentum calidum ad spinam dorsi
 iungendam.*

℞. *Ol. scorpionum.*

Castorei.
Baccar. iuniperi.
Campborae de radicibus cinna-
momi.
Laurinum.
Terebinth.
Balsam. sulphur. Terebinth. ana un.
 ss.
 M. pro linimento descripto.

Decoctum adstringens.

℞. *Plantagin. satius latifol.* unc. x.
Rad tormentill. rec. unc. ij.
 Decoct. in aq. pint. ij. exhibe.
 Bibat unc. iij. omni biborio.

Pulvis similis.

℞. *Alumin. rup.* drach. j.
Nucis myristic. drach. ij.
Pulv. boli Armen. gr. xij.
 M. F. pulv.
 Hora una ante paroxysmum hauriendus.

Epithemata.

℞. *Uvar. Corinthiac.*
Summit. lupuli.
Sal. marin. ana unc. ij.
 Contusa in pulvem,
 Pulsuum locis applica ad arterias.

℞. *Summit. rutae virid.* unc. ij.
Semin. sinapi drach. ij.
 Contusa exhibe ad Epicarpia.

IN ANGINA AQUOSA.

SECT. 796.

Vide ad { n. 1, §. 54, n. 4.
n. 2, §. 201.

IN ANGINA SCIRRHOŒA.

SECT. 797.

R. Ol. Tarsi per deliquium.
Penicillo ex linteo carpto, ad calamumapato, per cannulam applicato, eo
humectato, locus sensim erodatur.
Id fortius paratur cum calce viva, sed
plus discriminis habet applicatio.

IN ANGINA INFLAMMATORIA.

SECT. 809, n. 2.

Haustus purgans.

R. Diagryd. gr. xvij.
F. cum aq. emulſio, cuius unc. ſſ.
admiſce
Syrup. ſennæ unc. iſſ.
F. haustus.

Clyſma ſimile.

R. Fol. ſenn. unc. j.
Decoct. cum. aq. unc. viij. admiſce
Nitri unc. j.
Syrup. ſenn. unc. j.
F. clyſma.

SECT. 809, n. 5.

Vaporarium particulare, emolliens,
reſolvens.R. Aceti ſamb.
Roſar.
Calendul. ana unc. j.
Aq. ſtill. ſamb. unc. vj.
M.Vapor calidus hauriatur inſundibuli ope
in fauces.

SECT. 810.

Cataplaſma laxans, emolliens.

R. Lentis paluſtr. unc. vj.
Fol. nymphaeae rec. unc. v.
Papav. bortenſ. unc. viij.
Biſmatuae unc. vj.
Flor. ſambuc.
Melilot. ana unc. iv.
Cum aq. decoct. ſub finem adde
Nid. birundin. n. ij.
Semin. lini q. ſ.
Ol. lilior. alb. unc. iij.
F. cataplaſma.

Decoctum eſto pro ſomento.

SECT. 811.

Gargarifma emolliens, attenuans,
nitroſum.R. Decoct. a cataplaſ. praeced. un. xij.
Aceti ſamb. unc. ij.
Syrup. althaeae
Nitri puri drach. ij.
F. Ficuum pinguium n. xxij.
Fol. althaeae unc. ij.

De-

Decoctis diu *unc. xxx.* expressis utatur.

SECT. 813.

Clysmata nutrientia.

℞. *Ius carniū ad unc. x.*

Sal. nitri gr. x.

Sp. salis gut. vj.

M.

Initiatur oclava quæque hora, postquam primo clysmate purgante clota alvus fuit.

IN PERIPNEUMONIA VERA.

SECT. 850.

Potus lenis resolvens.

℞. *Aq. decoct. bord. unc. xl.*

Nitri drach. ij.

Oxymell. unc. iv.

M.

Bibat unc. ij. calidas omni quadrante horæ.

SECT. 851.

Decoctum emolliens, sputorum exscreationem promovens.

℞. *Fol. parietar.*

Agrimon.

Taraxac. ana m. j.

Semin. contus. papav. alb.

Foeniculi ana unc. j.

Glycyrrhizæ unc. iss.

Cum aq. decoct. unc. l. exhibe.

Ufus ac præcedentis.

SECT. 853.

Decoctum aperiens, diureticum.

℞. *Rad. gramin.*

Rusc.

Petroselin.

Foeniculi ana unc. ij.

Imperator. drach. ij.

Semin. contus. bardanæ.

Petroselin. ana unc. j.

Cum aqua decoct. unc. xl. exhibe.

In eundem usum.

SECT. 855, n. 2.

Vidus.

Olera.

Farinosa.

Pisa.

Fructus horæi maturi

} Vid. §. 35, n. 1.

SECT. 855, n. 3.

Sunt vapores §. 809, n. 5.

SECT. 855, n. 4.

Mistura attenuans, tussim leniter movens.

℞. *Aceti scillit. drach. vi.*

Oxymell. scillit. unc. iij.

Sal. polysbreft. drach. j.

Aq. decoct. bord. unc. viij.

scillat. byssopi unc. iv.

M.

Bibat unc. j. omni hora dimidiata.

℞. *Potus coffe lib. ij.*

Mellis unc. ij.

Aceti sambuc. unc. ss.

M.

Sorbeat servida quantum inuat.

Sect.

SECT. 838.

*Aperientia deterfiva ad ulcus aper-
tum pulmonis.*

FOLLIA adianthi vulgaris.
— — albi. f. rutae mu-
rariae.
— — nigri.
— — Adianthi aurei.
Agrimoniae.
Alchimillae.
Becabungae.
Betonicae.
Bellidis pratensis.
Borraginis.
Botryos.
Bugulae.
Ceterach.
Chamaedryos.
Chamaepityos.
Cichorei.
Dentis leonis.
Endiviae.
Eryfimi.
Foeniculi.
Fumariae.
Hederae terrestres.
Hepaticae nobilis.
— — terrestres.
Hippofelini.
Hyperici.
Hyssopi.
Isatidis.
Lactucae.
Linguae cervinae.
Marrubii albi.
Morus diaboli.
Nummulariae.
Ononidis.
Primulae veris.
Pronellae.
Pulmonariae maculatae.
Saponariae.
Scabiofae.

FOLLIA fcordii.
Sigilli Salomonis.
Sophiae chirurg.
Tuftilaginis.
Valerianae hortensis.
— — fylveftris.
Verbenae.
Veronicae.
Vincae pervinae.
Virgae aureae.
GUMMI ammoniacum.
Galbanum.
Opopanax.
Sarcocolla.

Mafliche.
Myrrha.
Olibanum.
Terebinthina.

Decoctum aperiens deterfivum.

℞. Fol. recent. agrimon.
Virgae aureae.
Betonicae.
Valerianae hortens. ana
m. j.
Marrubii alb. m. $\frac{z}{j}$

Rad. 5 aperiens. ana unc. j.

Flor. centaury. min.

Agrimon.

Hyperici ana m. j.

Cum aq. decoct. pint. iv. exhibe.

Bibas unc. ij. omni hiborio dici.

Aliud.

℞. Rad. bardan.

Chinac.

Sarsaparill. ana unc. iij.

Cum aq. decoct. spatio femihorae
adde

Ligni faffaf. unc. iij.

Ubi iterum parum ebullierint, admi-
fceto decoct. lib. iij.

Syrup. 5 rad. aperient. unc. ij.

Ufus ut prius.

Pilulae

Pilulae in eundem usum.

℞. *Myrrh. luid. elect.* drach. ij.
Cum vitelli ovi rec. scrup. j.
In mortario vitreo diu contritis simul
admisce
Turis elect. scrup. ij.
℞. pil. sing. gr. iij.
Capiat unam vel alteram ante usum
decocti.

Pulvis similis emolliens.

℞. *Myrrh. elect.* drach. ij.
Spermat. ceti. drach. j.
℞. M. F. pulv. dividend. in xij. dos.
aequales.
Capiat unam mane & vespere cum decocto.

Electuarium simile.

℞. *Myrrhae.*
Olibani. ana drach. j.
Mellis albi unc. ij.
℞. M. S. A.
Sumat drach. j. omni hora.

Lenia opiata vespertina.

℞. *Pilul. de cynogloss.* scrup. j.
℞. pil. n. vj.
Capiat unam vel alteram vespere ante
somnum.

℞. *Pilul. de syraxe* simili dosi.
In eundem usum.

Pulvis narcoticus.

℞. *Opii lamellatum tenuiter sciss.* &
lente exsiccato gr. j.
Corall. rubr. gr. xij.
Oliban. gr. vj.
℞. M. F. pulv. tenuis.

℞. *Syrup. diacodii* unc. ss.
Aq. vitae Mattheiol. drach. j.
Stillat. hyssopi unc. j.
℞. M. F. hauustus.

Vespere sumendus.

℞. *Opii* gr. j.
℞. pilul. 2.
Capiat unam vespere.

℞. *Opii* gr. j.
Syrup. capill. veneris drach. iv.
Aq. stillat. flor. papav. Rhoead. un. j.
℞. M. F. hauustus.

Vapores emollientes.

℞. *Fol. malvae.*
Bismalvae.
Mercurial.
Parictar. ana m. ij.
Farin. semin. lini unc. ij.
Cum aq. decoct.
Vaporem excipe cum aere adducendo.

SECT. 859.

Vide Decoctum secundum §. 858.

Mistura emolliens, & aperiens.

℞. *Cboerophyll. recentis expressi succi.*
Lactis dulc. ana unc. iv.
Syrup. hyssop. unc. j.
℞. M.

Bibat unc. j. omni biborio.

SECT. 861.

*Decoctum post suppurationem, ver-
gente pure ad hepar, magis
aperiens, deterisivum.*

℞. *Lychnid. saponar. mai.* m. ij.
Endiv. recent. m. iv.
Fol. cichor. sylvestr. m. iij.
Cum

Cum aq. decoct. & express. pint. iij.
exhibe.

Bibat omni biborio unc. ij.

SECT. 866.

Vapor.

Vide 858.

Mistura aperiens, resolvens.

- ℞. Oxymell. simpl. unc. iij.
Syrup. 5 radic. aperient. unc. ij.
Decoct. hederæ terrestr. unc. x.
Nitri puri drach. j.

M.

Bibat unc. j. omni hora.

Pulvis leniter, sputo suppresso,
resolvens, antipyreticus.

- ℞. Laudani puri gr. ij.
Flor. sulph.
Spermat. ceti.
Stibii diaphoretici non abluti ana
drach. j.

M. F. pulv. tenuis, divid. in
xij. partes aequales.

Capiat unam omni triborio cum uncia
una, vel altera, misturæ præce-
dentis.

Vel

- ℞. Flor. sulph. drach. ij.
Olibani scrup. j.
Spermat. ceti. drach. ss.
Stib. diaphor. non abluti. drach. j.
M. F. P. divid. in xij. doses.
Sumat unam omni hora cum unc. j.
misturæ prioris.

Linctus valde emolliens, & lubricans,
ad sputa suppressa.

- ℞. Olei amygdalar. dulc. recent. press.
unc. iss.

Syrup. violar.

Mell. virgin.

M. accurate.

Lingat unc. ss. omni hora, donec sputa
redeunt.

PERIPNEUMONIA NOTHA.

SECT. 873, n. 2.

Clystma hic esto hocce.

- ℞. Mell. unc. iij.
Nitri drach. j.
Vitell. ovor. n. i.
Aq. decoct. bordei unc. viij.
F. S. A. clystma.

SECT. 873, n. 4.

Decoctum diluens, abstergens,
lenissime aperiens.

- ℞. Radic. foenicul. unc. ij.

Gramin. unc. iv.

Fol. Parietar.

Agrim. ana m. iss.

Sem. contus. papaver. alb. unc. j.

Glycyrrhizæ unc. iss.

Cum aqua decoct. spat. $\frac{1}{2}$ horæ p.
iiss. exhibe.

Capiat unc. ij. omni biborio.

SECT. 887.

Vid. Decoñ. §. 873, n. 4, 861, 859.

SECT. 890, n. 2.

Fomentum laxans, resolvens, mitigans, paregoricum.

℞. Fol. *malvae.*

Bismalvae.

Parietar. ana m. ij.

Papaver. hortenſ.

Hyocyami ana m. j.

Flor. sambuci.

Chamaemel.

Melilot. ana unc. iij.

Cum *lacte dulci* decoct. est fomentum.

Hinc balnea & reſeſachoria intelliguntur.

Linimentum ad inungenda latera laxans, resolvens, avertens.

℞. *Sacchari saturni* drach. iv.

Aceti drach. vj.

Ol. roſae. infuſ. unc. j.

M. F. nutritum.

℞. *Unguenti popul.* unc. ij.

℞. *Emplaſtr. diapomphol.* q. l.
Extende ad alutam.

SECT. 890, n. 3.

Decoñum laxans, resolvens, leniter aperiens

℞. Fol. *iufflagin.*

Maturae ana m. ij.

Flor. papaver. errat.

Aſtheae ana m. ſſ.

Rad. Petriſelin.

Sarſaparill. ana unc. iij.

Sem. Lini contuſ. drach. iv.

Lactucae.

Card. Mariae ana unc. j.

Cum aq. decoct. pintas iij. exhibe.

Bibas unc. ij. *omni b.ra.*

Emulſio ſimilis.

℞. *Sem. 4 frigid. mai.*

min. ana drach. iij.

Papaver. alb. unc. ij.

Cum *agua decoct. bordei F. S. A.* emulſio, cuius *unc. xiv.* admiſce

Nitri puri drach. iſſ.

Syrup. capill. veneris unc. j.

Bibas unc. j. *omni bora, vel & omni* $\frac{1}{2}$

horae.

Miſtura in eundem uſum.

℞. *Aq. ſill. ſor. rbocados.*

Sambuc. ana unc. viij.

Borraginis unc. v.

Lapid. cancror. drach. ij.

Prunellae drach. j.

Syrup. ſor. rbocad.

Papav. alb. ana unc. j.

M.

Bibas uncias ij. *omni ſemibora.*

SECT. 903.

Decoñum antiſepticum, aperiens.

℞. Fol. *ſordii.*

Alliariae.

Marrub. alb. ana unc. ij.

Cum. aq. decoct. pint. ij. admiſce

Oxymel. ſcillit. unc. viij.

Nitri drach. iij.

Aceti iberiacal. unc. j.

Bibas unc. ij. *omni* $\frac{1}{2}$ *horae calidiſſimas.*

IN

Cum aq. decoct. & express. pint. iij.
exhibe.

Bibas omni biborio unc. ij.

SECT. 866.

Vapor.

Vide 858.

Mistura aperiens, resolvens.

- ℞. Oxy mell. simpl. unc. iij.
Syrup. 5 radic. aperiens. unc. ij.
Decoct. bederae terrest. unc. x.
Nitri puri drach. j.

M.

Bibas unc. j. omni hora.

*Pulvis leniter, sputo suppresso,
resolvens, antipyreticus.*

- ℞. Laudani puri gr. ij.
Flor. sulph.
Spermat. ceti.
Stib. diaphoretici non ablusi ana
drach. j.

M. F. pulv. tenuis, divid. in
xij. partes aequales.

Capiat unam omni triborio cum uncia
una, vel altera, misturae praeco-
dentis.

Vel

- ℞. Flor. sulph. drach. ij.
Olibani scrup. j.
Spermat. ceti. drach. ss.
Stib. diaphor. non ablusi. drach. j.
M. F. P. divid. in xij. doses.
Sumat unam omni hora cum unc. j.
misturae prioris.

*Linctus valde emolliens, & lubricans,
ad sputa suppressa.*

- ℞. Olei amygdalar. dulc. recent. press.
unc. iss.
Syrup. violar.
Mell. virgin.

M. accurate.

Lingat unc. ss. omni hora, donec sputa
redeunt.

PERIPNEUMONIA NOTHA.

SECT. 873, n. 2.

Clyisma hic esto hocce.

- ℞. Mell. unc. iij.
Nitri drach. j.
Visc. ovr. n. 1.
Aq. decoct. bordei unc. viij.
F. S. A. clyisma.

SECT. 873, n. 4.

*Decoctum diluens, abstergens,
lenissime aperiens.*

- ℞. Radic. feniculi. unc. ij.

Gramin. unc. iv.

Fol. Parietar.

Agrimoni. ana m. iss.

Sem. contus. papaver. alb. unc. j.

Glycyrrhizae unc. iss.

Cum aqua decoct. spatio $\frac{1}{2}$ horae p.
iss. exhibe.

Capiat unc. ij. omni biborio.

IN

SECT. 887.

Vid. Decoñ. §. 873, n. 4, 861, 859.

SECT. 890, n. 2.

*Fomentum laxans, resolvens, mitigans, paregoricum.*R. *Fol. malvae.**Bismalvae.**Parietar. ana m. ij.**Papaver. borrens.**Hyoscyami ana m. j.**Flor. sambuci.**Chamaemel.**Melilos. ana unc. iij.*

Cum lacte dulci decoct. est fomentum.

Hinc balnea & tepesfactoria intelliguntur.

*Linimentum ad inungenda latera laxans, resolvens, avertens.*R. *Sacchari saturni drach. iv.**Aceti drach. vj.**Ol. rosae. infus. unc. j.**M. F. nutritum.*R. *Unguentsi popul. unc. ij.*R. *Emplast. diapomphol. q. l.*

Extende ad alutam.

SECT. 890, n. 3.

*Decoñum laxans, resolvens, leniter aperiens*R. *Fol. suffilagin.**Malvae ana m. ij.**Flor. papaver. errat.**Alibrae ana m. ss.**Rad. Petroselin.**Sarsaparill. ana unc. iij.**Sem. Lini contus. drach. iv.**Lactucac.**Card. Mariae ana unc. j.*

Cum aq. decoct. pintas iij. exhibe.

*Bibas unc. ij. omni b.ra.**Emulsio similis.*R. *Sem. 4 frigid. mai.**min. ana drach. iij.**Papaver. alb. unc. ij.*

Cum aqua decoct. bordei F. S. A. emul-

sio, cuius unc. xiv. admisce

*Nitri puri drach. iss.**Syrup. capill. veneris unc. j.**Bibas unc. j. omni bora, vel & omni $\frac{1}{2}$ borae.**Mistura in eundem usum.*R. *Aq. still. flor. rhocados.**Sambuc. ana unc. viij.**Borraginis unc. v.**Lapid. cancror. drach. ij.**Frunellae drach. j.**Syrup. flor. rhocad.**Papav. alb. ana unc. j.**M.**Bibas uncias ij. omni semibora.*

SECT. 903.

*Decoñum antisepticum, aperiens.*R. *Fol. seordii.**Alliariae.**Marrub. alb. ana unc. ij.*

Cum aq. decoct. pint. ij. admisce

*Oxymel. scillis. unc. viij.**Nitri drach. iij.**Aceti theriacal. unc. j.**Bibas unc. ij. omni $\frac{1}{2}$ borae calidissimas.*

IN HEPATITIDE ET ICTERO MULTIPLICI.

SECT. 922.

Vide de refo-
lutione §. { 54, n. 4.
75, n. 5.
88, n. 5, 6, 135.

SECT. 924.

Vide §. { 54, n. 4.
88, n. 5, 6.

SECT. 927.

*Stipticum hic necessarium in hæ-
morrhagia narium.*

1 *Lenius.*

℞. *Alumin. rup.* drach. j.
Aq. stillat. plantag. unc. j.
M. solve.

*Turundis ingestis applicetur cavo na-
rium.*

2 *Fortius.*

℞. *Sacchar. saturn.* drach. j.
Aq. stillat. rosar. unc. j.
M.

In eisdem usus.

3 *Fortissimum.*

℞. *Vitriol. commun.* drach. j.
Aq. stillat. rosar. drach. vj.
M.

Similes in usus.

SECT. 928.

Vide 54, n. 4.

SECT. 930.

Remedia hic fere propria.

Acetosa hortensis,
pratensis,
rotundifolia.

Acetosella.
Atriplex sylvestris.
Bonus Henricus.
Chondrilla.
Cichoreum agreste,
fativum.

Dens leonis.

Endivia.

Fumaria.

Hieracium.

Lactuca.

Oxylapathum.

Portulaca.

Syrupus borraginis unc. ij.

Cichorei cum rhab. unc. iiij.

Fumariæ unc. ij.

5 *Rad. aperient.* unc. ij.

Decoctum antiphlogisticum aperiens,
leniter alvum movens.

℞. *Tamarind.* unc. j.

Pruner. acido-dulc. unc. iiij.

Uvar. passular. sine gigartis.

Corinthiacar. ana unc. ij.

Flor. saraxæ.

Cichores sylvestris ana unc. j.

Rad. scorzonæ. unc. iv.

Cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{2}$ *horæ lib.* ij.

admisce

Sal. polychrest. drach. j.

Syrup.

Syrup. cicbor. cum rheo unc. iss.
Bibul. unc. j. omni semiborio, donec le-
niatur alvus cum regimine.

Mistura similis.

℞. *Syrup. cicbor. cum rheo. unc. iss.*
Sal. prunell. drach. j.
Aq. stillat. cicborci.

Fumar. ana unc. ij.

M.

Capiat cochleare j. omni semiborio in
eosdem usus.

SECT. 944.

Aestivo tempore.

Hauftus refrigerans, putredini res-
tens, vires rescuillans, suum sedans.

℞. *Baccar. matur. mori.*

Ribefor.

Sambuci.

Cerasor.

Berberis ana un. iv.

Contusis expressum succum decoque,
tum unc. j. huius succi admisce

Vitell. ovorum n. j.

Succi citrei drach. j.

Vini Rhenani unc. j.

Panis tostii tenuissime contriti q. s.

Sacchari q. s.

F. haustus.

Hyemali tempore.

Similis, sed paullo calidior.

℞. *Rob. ex iisdem unc. j.*

Elacosactib. de nuc. myrist. gr. v.

Aq. stillat. cortic. citrei unc. ij.

Vini Rhenani unc. j.

Vitell. ovorum n. j.

Sacchar. q. s.

Haec cum pauxillo panis tostii infusa
expressa exhibe.

Ad idem.

℞. *Fol. elect. rec. & caulium lactucæ*

Endiviac.

Taraxac.

Portulac. ana

unc. vj.

Acetosæ unc. iij.

Mundata, lota, iterum excussa aqua,
cum iure carniū & pauxillo buty-
ri, salis, & nuc. myristicæ, leni-
ter vase clauso cocta comedat.

AD VENTRICULI INFLAMMATIONEM.

SECT. 954.

Clysmma leniens, emolliens.

Potus leniens &c.

℞. *Fol. recent. endiv.*

Cicbor.

Fumar.

Malvac.

Bismalvac ana m. j.

℞. *Fol. rec. trifol. acetos. unc. iij.*

Malvac m. iss.

Avenac integræ unc. j.

Cum sero lactis rec. decoct. unc. xij.
adde

Vitell. ovorum n. ij.

Rob. ribefor. unc. j.

Cum sero lactis decoct. & express.
unc. x.

Adhibe pro clysmate bis vel ter de die.

AD

AD INTESTINORUM INFLAMMATIONEM.

SECT. 966.

Vidus medicamentosus.

- ℞. *Rad. scorzon.*
Tragopog.
Sisari.
Petroselm.
Cichor. ana unc. ij.
 Cum iure carnis S. A. decoct. ad unc.
 xxx. iusculo admisce
Vitell. ovorum n. ij.
Salis q. s.

Decoctum balsamicum, detergens.

- ℞. *Rad. valerian. hortenf. unc. ij.*
Fol. levisleri m. ij.
Flor. hyperici m. j.
Agrimon. unc. ij.
 Cum aqua decoct. lib. ij. exhibe.
Bibas unc. ij. omni hora.
 Ex eodem etiam fit *clysma.*

AD APHTHAS.

SECT. 990, n. 1.

Potus emolliens, leniens.

- ℞. *Amygd. dulc. excortis. contus. unc. ij.*
Pistachior. unc. j.
Scam. 4 frigid. mai. } contus. ana
min. } drach. ij.
Avenae excortis. drach. ij.
 Cum aq. vase clauso decoque spatio
 1 horae, tum adde
Rad. excortis. glycyrrhiz. unc. j.
 Ebulliant de novo parum, tum decocti
 accurate contriti lib. ij. exhibe.
Hoc bibas, fauces eo colluas &c.

*Vel**Decoctum magis aperiens,
& abstergens.*

- ℞. *Rad. psillinacae tenuifol. rubr.*
Sisari.
Chinae.
Sarsaparillae.
Raparum ana unc. iv.
Hord. integri unc. j.

Minutim contusa cum aq. decoct. &
 fortiter express. unc. xxx. admisce
Syrup. albae unc. j.
In usus eosdem.

*Succus diluens, resolvens,
abstergens.*

- ℞. *Bull. rapar. cum cortice q. s.*
Tyroceusti, vel radula, ex bractea
ferrata, radantur: tum exprimatur
succus, qui ebulliens leniter despu-
metur, huius unc. xvj. admisce
Vitell. ovorum n. ij.
Syrup. violar. drach. iv.
Bibas unc. ss. omni semihora.

Cibi optimi.

Vid. §. 35, n. 1, 3.

SECT. 990, n. 2.

Decoctum emolliens, detergens.

- ℞. *Fol. malvae.*
Branc. urfin.

Albae

*Alibææ.**Parietar.**Verbasc.**Mercenial.**Alcibimill. ana unc. ij.**Rad. alibææ unc. j.**Bulbor. rapar. unc. x.**Cum aq. decoct. & express. unc. xxxvj. admisce**Vitell. ovorum n. iv.**Mel. rosar. unc. ij.**F. collutorium semper in ore tenendum, & gargarisma assiduū.**Fiat ex fecce residua cataplasma externe faucibus applicandum.**Clysm. ex iisdem.*

SECT. 990, n. 3.

*Mistura emolliens, anodyna, parum roborans.*** Syrup. papav. alb. unc. ij.**Cremor. lact. dulc. unc. ij.**Vitell. ovorum n. ij.**Aq. stillat. rosar. unc. ij.**M.**Huius pauxillum ore assiduo contineat.**Vel*** Gelatinæ CC. aut**Carnis bene spissæ, in frustra conficiæ parum q. s.**Assiduo imponatur linguae, ut soluta ibi obliniat: & sic lente deglutiat.*

IN NEPHRITIDE.

SECT. 997, n. 2.

*Decoctum anti-phlogisticum, leniens, aperiens.*** Fol. recens. charophyll.**Becabung.**Tom. V. pars II.**Hæc leniunt excoriata.**Decoctum in aphihis deciduis, resolvens, cor roborans.*** Decoct. fol. rec. agrim. unc. vij.**Mell. rosar. unc. j.**M.**In eisdem usus.**Hoc laxata roborat.*

SECT. 990, n. 4.

*Decoctum post aphthas, adstringens, magis roborans.*** Rad. oxysapib. unc. j.**Cortic. Peruvian. drach. vj.**Tamarisc. drach. vj.**Fol. agrimon. m. j.**Cum aq. decoct. lib. iss. admisce**Syrup. kermes unc. j.**Bibat unc. ss. omni hora.**Hoc intestinorum laxata vascula roborat.*

SECT. 990, n. 5.

*Haustus purgans, & simul post operationem roborans.*** Rhei drach. iss.**Myrobalan. citrin. sine nucleis. un. iss.**Cum aq. decoct. & express. unc. iij. admisce**Syrup. cicor. cum rheo. drach. xij.**F. haustus.**Parietar. ana unc. ij.**Rad. acetosell.**Cichor.**Bardan. ana unc. ij.**Cicer. rubr. unc. iss.**Semin. contus. papav. alb.**Cad.**E*

Card. Marias ana
drach. vj.

Cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{2}$ horae lib. iij.
exhibe.

Capias unc. ij. omni $\frac{1}{2}$ horae.

Simile.

R. Rad. gramin. unc. vj.

Semin. contus. melonum unc. iij.

Glycirrhiz. unc. j.

Cum aq. decoct. lib. iij. exhibe.

In usus eisdem.

SECT. 1000.

Remedia hic propria.

Agrimonia.

Alcea.

Alchimilla.

Althea.

Becabunga.

Bellis minor.

Bugula.

Chaerophyllum.

Daucus sylvestris.

Dens leonis.

Foeniculum.

Fraga.

Glycirrhiza.

Gramen.

Herniaria.

Lactuca.

Lingua cervina.

Mercurialis.

Nummularia.

Nymphaea.

Ononis.

Parietaria.

Perficaria.

Scabiosa.

Virga aurea.

Urtica.

Syrup. altheae Fernelii.

Capillor. veneris.

Cichorei cum rhea.

Papav. alb.

— erratici.

Violaceus.

Sal ammoniacus.

Gemmae.

Marinus.

IN APOPLEXIA.

SECT. 1025.

Collutoria & gargarifmata in hoc
casu.

Decoctum sialogogum, impetum sangui-
nis a capite revellens, ingruente
apoplexia frigida utilissimum.

R. Rad. imperator.

Pyrethri.

Galang. ana unc. j.

Fol. recent. origani.

Rutae.

Tibymi ana m. j.

Flor. Lavandul.

Matricar. ana unc. j.

Cort. magellan. drach. vj.

Cum aq. decoct. vase clauso lib. iij.
admisce

Sp. sal. ammon. drach. iij.

Masticatoria salivam moventia.

R. Mastich.

Cerae alb.

Zingib. ana unc. j.

F. S. A. parvi pastilli.

Apo-

Apoplegmatisantia sunt ex iisdem. 2. *Aceti acerrimi.*

Timā. castor. ana drach. ij.

M.

In eisdem usus.

SECT. 1026.

Vomitiva.

2. *Vini emetici unc. iij.*

Oxymell. scillit. unc. j.

M. F. haustus.

2. *Cremor. Tartari emet. gr. vij.*

F. una dosis.

2. *Succi ex raphan. rustic. express. un. j.*

Oxymell. scillit. unc. ij.

M. F. haustus.

2. *Mercurii vitæ gr. ij.*

Purgans.

2. *Diagryd. gr. x.*

Resin. talapp. gr. x.

Sp. vini rectific. drach. ij.

Accurate tritis, & solutis admisce

Syrup. rosar. solutiv. cum fenn.
drach. vj.

F. haustus.

SECT. 1028.

Vapor stimulant nares.

2. *Timā. castor.*

Sp. sal. ammon. ana drach. ij.

M.

Subolfactas saepe.

Balsamus in apopl. lenta calidus.

2. *Ol. stillat. rosmar.*

Tanacet.

Lavend.

Rutæ.

Albinib. ana gut. iv.

Infus. castor. drach. j.

Unguens. nervini unc. j.

Sal. vol. oleos. drach. j.

M. F. S. A. balsamus.

Pro suffitu sub naribus, & circa tem-
pore affricandus.

Acre clysm.

2. *Pulp. colocynth. drach. ss.*

Fol. tabaci drach. iij.

Aq. unc. x. incoctis admisce

Solis gemm. drach. ij.

F. clysm.

SECT. 1030, n. 2.

I primis vero ex fenna & tamarindis.

Vide §. 396, n. 2.

SECT. 1030, n. 3.

Vide §. 954, 966.

IN PARALYSI.

SECT. 1068.

Vide 75, n. 3, §. 54, n. 4.

SECT. 1069.

Pulvis aromaticus pro suffumigio.

2. *Majstibes.*

Olibani.

Succini ana unc. ss.

M. F. pulv.

Huius drach. j. super prunam sparsæ,

fumus excipiat panno sicco, calido
ex lana. Quo dein fortiter fricantur

partes.

E 2

M.

Mistura penetrans, nervina ad partes flaccidas stimulandas.

- ℞. *Sp. lavendulae* unc. iij.
Sal. ammon. drach. ij.
Tinctur. castorei drach. iv.
Aq. stillat. lavendulae unc. vj.
 M.

Perfricentur hac cum mistura partes.

Emplastrum acre, aromaticum, calidum.

- ℞. *Emplast. de cumin.*
Melilot.
Galbani purati ana unc. j.
Olei castorei unc. ss.
 M. F. emplastrum ad alutam.

Parti affectae, prius fricatae, apponatur.

Linimentum ad paralysin nervinum, penetrans.

- ℞. *Olei infus. absinth.*

Anerbi.
Chamaemel.
Nepetae.
Rutae.
Trisul. odorat. ana drach. j.
Castorei.
Crovi.
Irini.
Lumbricor. terrestr.
Nardini.
Terrae ana drach. j.
Unguent. agrippae.
Arisbanitae.
Martiat.
Nervin. ana drach. vj.
 M. F. linimentum.

Unguent.

Emplastra acria,

De cumino.
Galbano.
Melilotto &c.

IN MANIA.

SECT. 1126.

Conditum roborans, cardiacum.

- ℞. *Cortic. Peruvian.* drach. ij.
Magellan. drach. iij.
Conserv. anthos unc. j.
Syrup. kermes q. s.
 Ut F. conditum.
Capiat drach. ss. cum triborio de die.

Vel simile.

- ℞. *Diascord. Sylvii* drach. j.
Elacosacchar. ex ol. citri drach. ij.
Rad. Helenii condit. unc. j.
Syrup. s. rad. aperient. q. s.
 Ut F. conditum.
Ufus idem.

Vel magis aromaticum.

- ℞. *Rad. zingib. condit.* unc. iij.
Cortic. aurant. condit. unc. ij.
Nucis myrist. drach. iy.
Syrup. artemis. Fernel. q. s.
 Ut F. conditum.
Capiat ut prius.

Vel simile.

- ℞. *Iberiac. androm.*
Diatessar. mesuae ana un. j.
Conserv. absinth. unc. ss.
Rad. angelic. drach. ij.
Syrup. uniceae q. s.
 F. conditum.
Sumat drach. j. quater interdum.

Vinum

Vinum medicatum cardiacum,
calidum, roborans.

- ℞. *Cortic. Peruvian.*
Magellan.
Citrei.
Aurantior.
Chinac.
Cinnam. ana unc. j.
Summit. Scrpill.
Thymi.

Marz Syriac. ana unc. ℥.
Fl. *Steechad.*
Lavend. Arab.
Tanacet.

Liné Agalloch. ana unc. j.
Saffafr.

Cum vini *Hispan.* ana drach. vi.
F. S. A. vinum lib. vi.

Capiat unc. ij. quater de die vacuo
stomacho.

I N R A B I E C A N I N A.

SECT. 1143, n. 6.

Potus parati ex pomis, prunis syl-
vestribus, limonibus, aceto rosaceo.
Vidus brassica muria condita &c.

Mell. rosar. ana unc. j.
Aq. decoct. bord. unc. x.
M. F. clyisma.

Simile.

SECT. 1144.

Clyisma refrigerans.

- ℞. *Nitri* drach. ij.
Aceti sambuc.

- ℞. *Sal. marin.* drach. ij.
Aceti flor. calend. drach. vj.
Mell. commun. unc. j.
Aq. stillat. rutae unc. x.
F. clyster.

A D S C O R B U T U M.

SECT. 1160, L. a.

Pulvis purgans.

Aq. stillat. cicbor. unc. ij.
M. F. haustus.

Similis virtutis.

- ℞. *Tartar. vitriol. non acid.*
Cristall. tartar.
Sal. polybreft. ana drach. ℥.
M. F. pulv.

Mane hauriendus ex sero lactis: super-
bibat dein feri unc. xij.

Aliud purgans haustus forma.

- ℞. *Sal. polybreft.* drach. ij.
Pil. coib. mai. scrup. j.
Syrup. rosar. solut. cum fenn. dr. vj.

- ℞. *Elixir. propr. cum sale tart. pp.*
drach. ij.
Syrup. rosar. solut. cum fenn. drac.
vij.
Aq. still. fumar. unc. ij.
M. F. haustus.

Pilulae purgantes in scorbuti
principio.

- ℞. *Pil. coib. mai.* drach. j.
F. pil. n. xxj.

Capiat

*Capiat duas vespere ante somnum, mane
quinque ante ientaculum.*

SECT. 1160, L. β.

Attenuantia digerentia.

Tinctura salis tartar. helmontiana dr. j.

Ex vini unc. ij.

— — Harveiana drach. iv.

Ex vini unc. iij.

— — Martis Ludovici drach. j.

Ex vini unc. j.

Tartarus vitriolatus.

Crytalli & cremor tar- } *Singula su-*
tari. } *mi possunt*
 } *ad drac. ss.*

Vitriolum martis.

Sal polychrestus.

Sales tacheniani ex vegetabil. drach. j.

Ex vini unc. iij.

Elixir propr. cum sp. aceti pp. drach. ij.

Sale tartar. pp. drac. ij.

Aquis aromat. pp. dr.

ij.

Sales volat. oleosi, aromatici drach. j.

Sapo Venetus drach. iv.

Starkeianus scrup. ss.

Oxymel. simplex unc. iv.

Scilliticum simplex unc. iij.

compositum un. ij.

Conserva acetosae.

Luiulae.

Poma aurantia.

Chinenfia.

Citrea.

Limonia.

Granata.

SECT. 1160, L. γ.

Specifica antiscorbutica leniora.

Abrotanum mas.

femina.

Abinthium latifolium.

tenuifolium.

Acetosae omnes species.

Acetosellae omnes species.

Ageratum.

Agrimonia.

Anagallis mas.

femina.

Artemisia.

Balsamita.

Bardana.

Becabunga.

Botrys.

Brassica rubra, capitata.

Bugium.

Buxus.

Chaerophyllum.

Chamaedrys.

Chamaepitys.

Cichorea.

Crambe.

Cuminoides.

Endivia.

Eupatorium cannabinum.

Foeniculum.

Fumaria.

Galegae ambae species.

Hedera terrestris.

Lapatha.

Levisticum.

Maiorana.

Melissa.

Mentha.

Nasturtium aquaticum.

hortense.

Nummularia.

Rheum barbarum.

Salvia.

Scabiosa.

Scordium.

Sophia.

Veronica.

Urtica.

AD SCORBUTUM.

Poma aromatica odorata.

Aurantia.
Citrea.
Granata.
Limonia.

Fruſus berberis.

Ceraſa matura quaecun-
que.

Fraga.
Groſſulariae.

Mori.

Poma acido dulcia.

— Armeniaca.

— Perſica.

Pruna matura quaecun-
que.

Fruſtus rubi vulgari caſſi.

— — — rubri.

— — — Idaei.

— Sambuci.

— Tamarindi.

— Vitis idaeae.

SECT. 1161.

Scorbutica acriora.

Acriviola.

Allia.

Alliaria.

Arum.

Armoracia.

Abſinthium.

Cepae.

Chelidon maius.

Cochlearia.

Enula.

Eryſimum.

Eruca.

Gentiana.

Gratiola.

Ilaiſ.

Piperitis vel lepidium.

Porrum.

Pearmica draco.

Raphanus hortendiſſis.

— ruſticanus.

Ruta.

Sabina.

Santonicum.

Saponaria.

Sedum minus vermiculare acre.

Sinapi.

Trifolium aquaticum.

Succus expreſſus, antiſcorbuticus.

℞. Raphan. ruſtican. radula raſi. un. iv.
Fol. rec. coſhlear.

Nummular.

Urticae ana m. iv.

Succum S. A. exprime & ſaccharo
miſce.

Capiat drac. ij. quater vel ſexies de die.

Spiritus ſimilis.

℞. Semin. ſinapi.

Raphan. hortendiſſis.

Erucae.

Eryſimi.

Nafſurt. hortendiſſis. ana unc. j.

Fol. coſhlear.

Lepidii.

Raphan. ruſticani ana m. ij.

Conſciſſis & contuſis adde

Sal. marini unc. ij.

Flor. cereviſiae unc. j.

Sp. vini q. ſ. ad exceſſum duorum
digitorum.

Deſtilla & cohoba ter.

Sal volatile.

Precedentibus, loco ſalis marin. &
ſlor. cereviſiae, admiſce

Sal. ammon. contus.
Cinerum clavellat. unc. vij.
 Destilla ut ante.

Cerevisia medicata, antiscorbutica.

℞. *Fol. recent. cochlear.*

Erucæ.

Erysimi.

Trifol. aquat. ana m. j.

Semin. recent. contus. nasturt. hortens.

Raphani hortens.

ana unc. ij.

Flor. centaur. min. unc. j.

Rad. raphan. rustic. unc. v.

Conscissa reconde in Cerevisiæ recentis & fervescens $\frac{1}{2}$ dolio:

Pro potu assidu.

Vinum medicatum simile.

℞. *Bulb. ar. recent. effess.* unc. ss.

Raphan. rustic. unc. j.

Fol. cochlear.

Trifol. aquatic. ana m. j.

Semin. sinapi unc. ij.

Vini Rhenani lib. vj.

F. S. A. vinum medicatum.

SECT. 1162.

Antiscorbutica modice adstringentia.

Capparis.

Flos geniftæ.

Fraxinus.

Lapathum, omnesque eius species.

Lupulus.

Polypodium quercia.

Rhabarbarum.

Tamariscus.

Antiscorbutica frigidiuscula.

Poma odorata. {
Aurantia.
Citrea.
Limonia.
Chinenfia.
Granata.

Fructus horæi acido dulces.

Acetosa.

Acetosella.

Cichorea.

Endivia.

Luiula.

Lactucæ.

Taraxaca.

Hydrogala, æsttate.

Serum lactis.

Lac ebutyratum.

Tartarus & omnia acida tartarifata.

Calida & acrida.

Vide §. 1161.

SECT. 1163.

Collutoria oris.

In calidis.

℞. *Myriæ limonam.*

Mell. rosæ. ana unc. ij.

Sp. sal. dulc. drach. ss.

Ag. stillat. rutæ unc. ij.

M.

℞. *Sp. salis marini* drach. ij.

Ag. stillat. salviæ unc. viij.

M.

℞. *Succi limon. recent.* unc. j.

Salis ammoniac. drach. j.

Ag. stillat. rutæ unc. vj.

M.

In

AD SCORBUTUM.

73

In frigidis.

- ℞. *Sp. iberiacal.*
Cochlear. ana unc. j.
Mell. Anisofat. unc. ij.
M.
- ℞. *Sp. vini camphorati unc. ff.*
Tinctur. myrrhac unc. j.
Rob. juniperim. unc. ff.
Aq. stillatit. absinth. unc. iv.
Sal. gemmae drach. j.
M.

SECT. 1164.

Decoctum in scorbuto acri lene,
antisepticum.

- ℞. *Fumariae.*
Acetosae.
Becabungae.

Trifol. aquat. ana m. j.
Seri lactis.
Lactis ebullientis ana pint. ij.
F. decoctum.

Serum lactis anti-scorbuticum.

- ℞. *Accosellae m. iss.*
Betonicae.
Chacrophylli ana m. ff.
Tamarinder. unc. iss.
Conscissa infunde cum
Seri lactis aëstivi lib. iij.
Spatio horae, in calore fere fervido,
absque ebullitione tamen, dein per
linteum expresso admisce.
Syrup. & succo citri.
Rubi idaei.
Violacei ana unc. j.
Bibat de alterutro omni semiborio in-
terdum unciam unam.

IN PHTHISI PULMONALI.

SECT. 1200, n. 2.

Conditum incrassans, stypticum.

- ℞. *Conserv. ros. rubr. unc. iij.*
Bol. armen. lavigat. drac. ij.
Syrup. myrtini q. s. ut
F. conditum.
Capiat drach. j. omni biberio.

Conserva refrigerans, styptica.

- ℞. *Fol. teneror. plantagin. unc. iij.*
Flor. papaver. rhacod. unc. iss.
Semin. plantag. rec. unc. j.
M. S. A. cum s. q. sacchari, ut
F. conserva.
Dosis ut supra.

Decoctum refrigerans, antisepticum.

- ℞. *Fol. acet. fac m. ij.*
In seri lactis lib. j. decocti & expressi,
Unc. j. bibatur omni hora diei.

Simile stypticum.

- ℞. *Rad. tormentill. unc. ij.*
Pentaphyllides argentinæ ra.
ijj.
Flor. pentaphyllid. rubr. palustr.
unc. j.
Semin. contus. acetosae unc. ff.
Cortic. tamarisci unc. ij.
Cum aq. decoct. spatio ½ hor. lib. iv.
admisce.
Syrup. myrtini. unc. ij.
Bibat unc. ij. omni biberio diei.
Balsa.

Balsamica lenissima.

Oleum expressum, lenientissimum.

℞. *Amygdal. dulc.*

Nucleor. cocor.

Pistachior.

Semin. papav. albi ana unc. iv.

Accurate confusis S. A. sine multo igne exprime oleum.

Huius ol. drach. j. bibatur omni biberio, vel quadriborio cum regimine.

Pilulae balsamicae, lenes.

℞. *Terebinth. nativ. unc. ss.*

Glycyrrhiz. q. f. ut

F. massa pil. formandis idonea.

Capiatur una gr. iv. omni quadriborio.

Vel

℞. *Terebinth. nativ. unc. ss.*

Gumm. tragacanth. pulveris. drac. v.

Amyli q. f. ut

F. massa in eisdem usus.

Balsamus lucatellae. Capiat drach. ss. ter quotidie, vacuo ventriculo, superbibendo unc. j. mulsae sequentis.

Mulsa balsamica.

℞. *Flor. purorum, recentium betoniac.*

Hyperici.

Paralyticor.

ana pug. j.

Cum aq. calida fiat infusio, vase clauso, spatio semihorii, tum infusi puri lib. iss. admisce

Mellis Massiliensis unc. iiss.

SECT. 1200, n. 3.

℞. *Aq. purae lib. iss.*

Lactis recens mulsae lib. j.

M.

Hoc solo utatur pro potu, quantum labes.

℞. *Lactis recens mulsae lib. ss.*

Panis biscocti unc. j.

Sacchari drach. ij.

Cruda misce.

Sumatur quater quotidie, nec utatur alio cibo.

Pulvis antacidus.

℞. *Lapid. cancror. drach. ij.*

Sapon. Veneti drach. ss.

Sacchari perlati drach. ij.

M. F. pulv. divid. in xij. dos.

Capiat semper unam ante usum lactis cum pane.

SECT. 1209.

Mistura aperiens acida.

℞. *Oxymell. simpl. unc. iv.*

Tart. vitriolat. drach. j.

Syrup. s. rad. aperient. unc. ij.

Aq. stillat. fermentatae abstibit.

Card. bened.

Hyssopi. ana

unc. iv.

M.

Bibas unc. iij. omni biberio.

Thea medicata anti-phthifica.

℞. *Lignor. trium santalor. ana unc. j.*

Sassafr. unc. iss.

Rad. cbinac.

Sarsaparil. ana unc. iij.

Flor. centaur. min. unc. ss.

Cum aqua decoct. vase clauso S. A.

spatio dimid. horae, adde

Glycyrrhiz. decort. unc. j.

Ebulliant denuo parum: dein decocti lib. iv. exhibe.

Similis

Similis magis composita.

Rad. *caryophyllat. montan.* unc. ij.

Apii.

Bardanae.

Eryngii.

Graminis.

Liquiritiae.

Mei Athamant.

Petroselin.

Rhu.

Rubiae tinctor. ana unc. j.

Fol. *Agrimoniae.*

Artemisiae.

Capill. veneris.

Chamaedryos.

Chamaepityos.

Hyssopi.

Parutariae.

Scabiosae.

Tussilaginis.

Urticae.

Chaerophylli ana m. j.

Semin. *apii.*

Hyperici.

Poenoniae ana unc. j.

Flor. *betonicae.*

Hyperici.

Centaur. min. ana pugn. j.

Ex his vel ex quibusdam horum F.
decoctum S. A.

Cuius unc. iij. bibantur omni triborio.

*Pilulae balsamicae sanguinis cor-
ruptioni ab admisto pure
resistentes.*

Myrrhae tenuissime contritae drac. ij.

Spermat. ceti drach. iv.

Accurate trita permisce

Terebinth. nativ. unc. ff.

Admisce

Pulveris Olibani q. s. ut

F. massa formandis pil. apta.

Cipiat gr. iij. omni triborio.

Myrrham Peruvian. albi.

Copayb. albi ana drach. ij.

Vitell. ovor. unc. ff.

Accurate subactis adde

Pulv. glycyrrhizae q. s. ut

F. massa pilularis.

Cipiat gr. ij. mane, meridie, vespere.

Myrrhac.

Olibani ana drach. ij.

F. pulv. subtilis, interim fluat in fi-

ctili ad ignem lenissimum.

Succi glycyrrhizae, inspissatae.

Terebinthinae purissimae ana un. ff.

Tum admisce pulverem praescriptum

sub finem addendo

Balsami ex Mecha drach. j.

F. massa copioso glycyrrhizae pulvere

respergenda.

Sumat quotidie quater, vacuo ventri-

culo, massulam granor. vj. superbi-

bendo unc. vj. sequentis potus.

Infusum vulnerarium balsamicum.

Fol. tenerior. agrimon.

Betonicae.

Botryos.

Hederac terrest.

Scabiosae.

Tussilaginis.

Veronicae ana unc. ff.

Glycyrrhizae unc. iss.

F. infusum sine ebullitione in magno

calore, vaso accurate clauso, cum

aquae lib. ij.

SECT. 1210.

Vid. omnia praescripta §. 1209.

Decoctum deterisvum aperiens.

Fol. recent. veronic. maris. m. iss.

Parietar.

Rutae ana m. j.

Valerian. hortens. m. ff.

Semin.

Semin. papaver. contus. unc. iij.
Rad. petroselin. unc. vj.
 Cum aq. S. A. decoct. ff. iv. adde
Syrup. capilli. veneris unc. ij.
Bibat unc. iv. *omni trivorio.*
*Vesper*umat *pilulam* unam harum.
 R. *Pilul. cynogloss.* drach. j.
 F. pil. gr. iv.

Consolidans paregoricum, dandum
ubi iam desinit pus cum leva-
mine decocti forma.

¶ *Fol. recent. Borragin.*

Symphyti min.
Malvac. ana m. j.
Flor. papav. rhoead.
Verbasci.
Hyperici ana unc. j.
Rad. symphyt. mai. unc. ff.
Alibae unc. ..
Semin. contus. melon.
Papav. alb. ana unc. j.
Cortic. Peruvian. drach. vj.
 Cum aq. decoct. lib. iv. exhibe.
Bibat unc. iij. *omni quadriorio.*

IN HYDROPE.

SECT. 1233.

Vinum medicatum ex stomachicis &
roborantibus ad fluorem stagnans
lymphae conciliandum.

¶ *Rad. imperator.*
Aristoloch. utriusque.
Zedoar.
Siler. montan. ana unc. j.
Zingib. drach. vj.
Flor. Centaur. minor. unc. ij.
Rorismar. unc. j.
Gratiol. Germanor. drach. iv.
Baccar. lauri.
Lunperi ana unc. iss.
Thymi.
Serpill.
Mari Syriaci ana unc. j.
Semin. absinth.
Tanacet.
Santon. ana unc. j.

M. F. S. A. omnium pulv. tenuis, tum

¶ *Pulv. praescript.* unc. vj.
Vini Gallici meri lib. iv.

F. S. A. vinum medicatum.
Bibat unc. ij. *quater de die vacuo sto-*
macho cum regimine.

Vel conditum simile.

¶ *Pulv. praescript.* unc. ij.
Conserv. anthos. unc. j.
Syrup. artcmis. Fernelii. q. s. ut
 F. conditum.
Dosis drach. ss. *omni quadriorio.*

Aut

¶ *Pulv. praeced.* unc. xij.
Cerevisiae meratoris $\frac{1}{2}$ tonnae.
 F. cerevisia medicata.
In usus quotidianos.

Quint

¶ *Pulv. eiusd.* drach. iv.
Vini albi generosi. unc. viij.
 F. S. A. infusio.
Bibat unc. j. *omni biborio.*

Huc, elixiria propriet.
Sales vol. Oleofi.

—	—	Aromatici.
Sp.	vol.	Oleofi.
—	—	Aromatici.
—	—	Cephalici.
—	—	Matticales.
—	—	Stomachici.

&c. pertinent.

Vide §. 75, n. §. 54, n. 4, §. 135.

SECT. 1234.

Mistura aromatica, cardiaca, acida,
suum sedans, vires vitales excitans,
lymphae fluorum concilians.

℞. Ol. stillat. cortic. citrei.
Aurant.
Cinnam. ana gut.
iij.

Flor. lavend.

Juniperi ana gut. ij.

Cum sacchari drach. vj.

F. S. A. elaeosaccharum, quod admi-
sceto dein

Rob. samb.

Juniperi.

Sp. salis drach. j.

Aq. stillat. cortic. citrei.

Aurant.

Cinnam. ana unc.

ij.

Menibae unc. x.

Capiat unc. j. omni biberio.

Decoctum aperiens, acidum.

℞. Succ. rec. ex-
pressi ex tota
rec. herba con-
scissa. { Fumariac.
Cicborci. } analib. j.
Taraxaci.
Acetosac.
Cremor. tartari lib. ff.

Leni igne decoque ad $\frac{2}{3}$, dein depu-
rati huius decocti unc. x. admisce

Rob. sambuci unc. x.
Capiat unc. ff. omni biberio.

Mistura cardiaca, aperiens, acida.

℞. Sp. niri dulcis drach. sy.

Cochleariae drach. vj.

Syrup. cicborci cum rbes.

rad. aperient. ana unc. j.

Vini Rhenani lib. j.

M.

Bibat unc. j. omni biberio.

SECT. 1237, n. 3.

Pulverum purgantium mercurialium
formulae.

℞. Turbith. mineral. gr. ff.

Zingib. albi gr. x.

M. F. pulv.

Mane sumendus alterno die, ex pauxillo
pulpae pomi tosti.

℞. Mercur. praecipit. rubri gr. j.

Nucis myrist. gr. vj.

M. F. pulv.

In usus eosdem sumendus ut prior.

℞. Mercur. sublim. dulc. gr. vj.

Cortic. magellani gr. viij.

M. F. pulv.

In usus eosdem.

Pulvis emeticus.

℞. Tartari emetici gr. ff.

Elaeosacchari citrei gr. vj.

M. F. pulv.

Tertio quoque die sumendus.

℞. Emetici mitissimi ex antimon. p. ij.

Niri p. v. detonando preparati.

gr. iv.

F. pulv.

Omni mane assumendus.

Tinctura

Tinctura diuretica, solvens.

- ℞. *Limatur. capri* gr. x.
Sal. vol. oleos. drach. vj.
 M. F. tinctura coerulea.
Capiat gutt. xij. *ter de die vacuo stomacho*
ex syrup. 3 rad. aperient.
 unc. ff.

SECT. 1243.

Vide 334.

SECT. 1245.

*Medicamenta fortia, saepe, sine
 longa mora interposita,
 repetenda.*

- ℞. *Vini emetici vulg.* unc. iijff.
Una dosi.
 ℞. *Tartari emetici* gr. vj.
Una dosi.
 ℞. *Turbitib. mineral.* gr. vij.
Una dosi.
 ℞. *Succi recent. expressi cortic. medii.*
Sambuci unc. j.
Syrup. violar. unc. ff.
Pro una dosi.
 ℞. *Fol. soldanellae marin.* unc. j.
Comedat una vice.
 ℞. *Elaterii* gr. iv.
Syrup. de bacis thami cathart.
 unc. j.
 M.
Pro una dosi.

SECT. 1247.

Tinctura fortiter purgans.

- ℞. *Resin. ialapp.*
Scammon. ana drach. j.

Fol. sennae pulv.

Semin. contus. castorami ana drach.
 iv.

Sp. vini rectific. lib. j.

- F. S. A. tinctura, cui purae admisce
Syrup. rosar. solut. cum senna unc.
 vj.
Bibat unc. j. mane.

℞. *Lunae purgativae Boyleanae.*

Micac. panis ana gr. iv.

M. F. pil. gr. ij.

Capiatur una cni semiborio, donec in-
cipiat purgatio.

SECT. 1250.

Vinum medicatum roborans.

- ℞. *Limaturae ferri rec. non rubigin.*
 unc. ij.
Cortic. Peruviani.
Magellan. ana unc. ij.
Rad. rhei exsiccat. unc. ff.
Vini Rhenani generosissimi lb. ij.
 F. S. A. vinum medicatum.
Dof. unc. ij. *ter de die vacuo stomacho.*

SECT. 1252, n. 2.

Cataplasma valde discutiens.

- ℞. *Rad. elect. Bryon.*
Ialapp.
Fel. rusae.
Absinthii.
Cinarae hortens. ana unc. ij.
Flor. Melilot.
Centaur. min.
Bulk. Ceparum.
Allior. ana unc. ij.
 Cum aq. comm. q. f. decoct. S. A.
 in cataplasma sub finem admisce
Galbani in vitello oui f. a. subtili
 unc. ij.

Farin.

Farin. lini unc. j.
Ol. lini drach. iv.
Sal. ammon. drach. iv.
 M.

Fomentum in eundem usum.

℞. *Sapon. Venet.* drach. iv.
Sp. vini sberiacal. unc. xij.
 M. accurate pro fomento,
Cum lancis pannis applicando.

Epithema ficcum ad hydrocelen,
serum dissipans, educens.

℞. *Sal. marin. decrepit. siccissimi,* ca-
lidi, tenuissime triti q. s.

*Intra linca confuta applicetur, remo-
 vando simulac maduerit.*

Pulvis pro suffumigio, discutiens,
ad hydrocelen.

℞. *Benzoin.*
Olibani.
Saccollac.
Resin. guaiaci ana unc. ss.
Campborae drach. ss.
Mastiches. unc. j.
Salis ammoniac. scrup. ij.

M. F. pulv. Cuius incensi vapor exti-
 piatur nudo seroto, dein panni lanci
 fumo hoc vaporosi, calidi superap-
 plicentur.

IN PODAGRA.

SECT. 1275, L. α.

Vide 1233.

SECT. 1275, L. β.

℞. *Alcabest. Glauberi.* unc. j.

*Sumat omni mane gutt. ix. ex iure
 vitulino.*

℞. *Ciner. genistae* unc. j.
Vini Rhenani lib. iss.
 M.

Bibat depurati liquoris un. ss. omni mane.

IN MORBIS VIRGINUM.

SECT. 1291, n. 3.

Aloë.
Myrrha.
Bryonia.
Colocynthis.
Gumm. Ammon.
Bdellium.
Sagapenum.
Opopanax.
Galbanum.
Asa foetida.

Elixir proprietatis quodcumque.

SECT. 1291, n. 4.

Omnia hic supra n. 3.

Aristolochia.
Artemisia.
Cardiaca.
Chamaemelum.
Iuniperus.
Maiorana.
Marum.
Matricaria.
Pulegium.
Ruta.
Sabina.
Salvia.
Sambucus.
Serpillum.
Tanacetum.
Thuya.
Thymus.

Tum

Tum §. 75, n. 5, §. 54, n. 4.

SECT. 1291, n. 5.

Emplastra de cumino.

Meliloto.

Galbano.

Baccis lauri.

Labdano.

Oxycroceum.

Applicata cavis pedum, umbilico & inguinibus.

Fotus ex sapone Venet. & decoct. herbarum

N. 4, §. 1291.

Linimenta ex unguento martiato.

Nervino.

Enulato sine

mercor.

Agrippae.

De Arthanita.

Olea aromatica stillatitia vid. §. 75, n. 5 inter stimulantia praecipue vero

Oleum stillatit. baccar. iuniperi.

Hyssofi.

Macis.

Maioranae.

Origani cretici.

Rosmarini.

Sabinae.

Spicae.

Tanacet.

Succini.

Olea infusa absinth.

Anethi.

Chamaemeli.

Nepetae.

Rutae.

Castorei.

Crocini.

Iriui.

Lumbricor. terrestr.

V. G.

Linimentum stimulans.

℞. Unguent. martiat.

Nervini ana unc. j.

Olei stillatit. baccar. iuniperi drach. j.

Sabinae.

Infusi rutae.

Castorei ana unc. ss.

M. F. linimentum in hoc casu, Umbilico, pube, inguinibus applicandum. Vapores ex decocto n. 4. Utero excipi.

SECT. 1291, n. 6.

Vide 1250.

AD GRAVIDARUM MORBOS.

SECT. 1360.

Vinum medicatum, aromaticum, cardiacum.

℞. Corci. elect. depurat. citrei.

Aurantior.

ana unc. ij.

Cinnam. drach. vj.

Magellan. drach. ij.

Vini Hispan. lib. iij.

F. vin. medicatum.

Capiat unc. ij. vesperi itura cubitum.

Tinctura cardiaca, antihysterica.

℞. Sal. vol. oleif. drach. j.

TinB. gumm. lac. drach. ij.

Castor. drach. ss.

M.

Capiat gutt. xij. in paroxysmo hysterico.

Mistura

AD GRAVIDARUM MORBOS.

81

Mistura cardiaca, aromatica, acida.

- * Succ. citrei rect. expresso. unc. iv.
- Syrup. kermesin. unc. iv.
- Vini Rhenani lib. iij.
- Tinct. cinnam. unc. ij.
- Cortic. citrei. unc. ij.

M.

Capiat unc. iss. in languore.

Similis.

- * Rob. ribesfor.
- Mixae cydonior.
- Syrup. berberis condit.
- Acetosf., citrei. ana unc. ij.
- Sp. vine Matiboli unc. j.
- Aq. stillat. cortic. citrei unc. xij.

M.

Capiat unc. ss. in languore.

SECT. 1302.

Linimentum emolliens.

- * Unguent. populi.

AD PUERPERIOS MORBOS.

SECT. 1316.

Linimenta.

Vide §. 35, n. 3, §. 1302.

IN PARTU DIFFICILI.

SECT. 1324.

Mistura cardiaca, antacida anodyna,
ad dolores a partu.

- * Lapid. tantr. drach. iij.
- Corall. rubr. drach. ij.
- Margarit. drach. j.
- Laud. puri gr. iij.
- Syrup. kermes drach. vj.
- Aq. stillat. cort. citrei.

Tom. V. pars II.

Meliss.

Maiozan. ana unc. iij.

M.

Capiat unc. ss. omni $\frac{1}{2}$ horae, donec sopia-
tur dolor, superbibendo unc. ij. sequent.

Decoctum cardiacum, diluens,
levissime nutriens.

- * Hord. mund.
- Avenae integrae ana unc. j.

F

Cum.

Cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{2}$ horae lib. iij.
admisce

Vini Rben. lib. j.

Aq. stillat. cinnam. unc. ij.

Syrup. Kermesin. unc. iss.

Pulvis antacidus, anodynus.

q. Olei stillat. cinnam. gutt. ij.

Sacchari perlati drach. j.

F. S. A. elaeosaccharum, cui dein ad-
misce

Margarit. occid. drach. ss.

Matris perlar. drach. j.

Corall. rubr. drach. ss.

Laudani pari. gr. iij.

M. F. pulv. subtilis. divid. in vj. dof.
aeq.

Sumas unam omnium semihorae ex vini Rbe-
nani unc. ss. donec dolor misceat, dein
detur una tantum, mane & vespere
per binos dies.

SECT. 1336, n. 1.

Antacida.

Vide §. 66, n. 5, §. 67, & §. 1324.

SECT. 1336, n. 2.

Diluentia.

Vide §. 54, n. 4.

IN MORBIS INFANTUM.

SECT. 1342.

Mistura glutinosa, dissolvens.

q. Mell.

Vini Gall.

Hydromell. ana unc. ss.

M.

Una dosis.

Similis leniter purgans.

q. Syrup. sicbor. cum rben. drach. iij.

SECT. 1336, n. 3.

Discussiemia hic bonas.

q. Flor. Chamarmel.

Sambus.

Melilot.

Lavend. ana unc. ij.

Croci drach. j.

Cum laite dulc. decoct. in cataplasma
admisce

Sapon. Venet. drach. ij.

Micac panis albi q. l.

SECT. 1336.

R. Sp. flor. rosismar. q. l.

Applicetur cum linteo.

Linimentum leniens, discussiens.

q. Ol. Amygdal. dulc.

Infusi hyperici.

Violar.

Rosar. ana unc. ss.

M. F. linimentum.

R. Unguent. rosar.

Popul.

Nutrit. ana unc. ss.

M.

Sapon. Venet. drach. ss.

Aq. stillat. melissae unc. ss.

M.

Una dosis.

SECT. 1343.

Tinctura aromatica, spirituosus, pro
epithemate.

R. Cinnam.

Macerat.

Nutis

Nucis myrist.

Mastic.

Obtund. una drach. ij.

Sp. vini iberiacal. uno. iv.

F. tinctura.

Epithema aromaticum, promovens
suburrae intestinalis excretionem
in infante recens nato.

Dein

℞. Vitell. ovi. a. j.

Tincturae praescriptae unc. ss.

Aq. stillat. rosar. drach. ij.

Excepta panis micas panis stomacho
applicentur.

℞. Flavet. coria. citrei rasi unc. ss.

Nucis myrist. drach. ij.

Vini Hispan. drach. iij.

M. conterendo simul in mortario.

Et mica panis excepta applica ut prius.

SECT. 1346.

Syrupus leniter purgans, expellendo
meconio idoneus.

℞. Cassiae ro. extrah. drach. ss.

Rhei. gr. iij.

Syrup. sisbor. cum vbra. drach. ij.

M.

Pro una dosi.

Mistura in eundem finem.

℞. Mannae Calabrin. drach. ij.

Syrup. rosar. solut. drach. j.

Aq. stillat. flor. sambusi drach. iv.

M.

Pro una dosi.

℞. Mell. albi drach. iij.

Syrup. rosar. solut. cum semina drac. j.

Aq. stillat. sisbor. drach. iv.
M.

Pro una dosi.

℞. Rhei. elect. gr. vj.

Agaric. elect. gr. ij.

Syrup. violar. drach. ij.

Exacte contritis admisceto

Aq. stillat. metiss. drach. ij.

Pro una dosi.

℞. Sapon. Venet. parum in globulum
vel conum formati.

℞. Globulum exiguum vel conulum, fa-
ctum ex saccharo coniformi.

℞. Mel ad duritiem coctum & in sup-
positorum exiguum formatum.

℞. Sibi undularam parum, forma in
speciem debitam.

Cardiaca hic bona, haustus meco-
nium propellentes cardiaci.

℞. Mell. drach. j.

Vini Hispan. drach. iij.

Vitell. ovi. drach. ij.

M. F. haustus.

℞. Aq. stillat. cinnam. drach. ij.

Elixir. propr. cum sale tartar. ppa-
gut. vi.

Syrup. Kermes. drach. j.

M. F. haustus.

SECT. 1347.

Haustus meconii duritiem emolliens.

℞. Seri laet. rec. drach. vj.

Mellis drac. j.

M. F. haustus.

Clyfma in eundem finem.

- ℞. *Seri laſſ. rec.* unc. ij.
Sapon. Venet. drach. iſſ.
Mell. drach. ij.
 M. F. clyfma.

SECT. 1348.

*Linctus oleoſi ad Intēſtina, duro
 Meconio repleta, lubrificanda.*

- ℞. *Ol. lini.* drach. ij.
Syrup. alibææ drach. ij.
 M.

Pro una doſi.

- ℞. *Ol. olivar.*
Syrup. capillor. vener. ana drach. ij.
 M.

Pro una doſi.

- ℞. *Ol. amygdal. dulc. rec.* drach. iij.
Syrup. glycyrrhiz. drach. ij.
 Pro una doſi.

Clyfma in eundem uſum.

- ℞. *Olei lini* unc. ſſ.
Viſell. ovi drach. ij.
Mell. mercurial. unc. ſſ.
Seri laſſis recent. unc. j.
 M. F. clyfma.

*Applicandum ſemel quotidie, donec lubri-
 citas appareat.*

Linimentum in eundem finem.

- ℞. *Unguent. alibææ compoſ.* unc. j.
Olei lini unc. ſſ.
 M. F. linimentum.

Quo abdomen inungatur mane & vesp̄i.

SECT. 1350.

Pulvis antacidus abſorbens.

- ℞. *Lapid. cancror.*
Oſteuſell.

Cretac.

Mandibul. lucii piſciſ.

Oſtracoderm. oſtrææ ana drach. ij.

M. F. pulv.

Dofis gr. vij. bis vel ter de die.

Miſtura antacidæ.

℞. *Aq. ſillatiſ. flor. rhœad.*

Foeniculi. ana unc. ij.

Lapid. cancror. drach. ij.

Sapon. Venet. gr. vij.

Syrup. alibææ unc. ſſ.

M.

Bibas drac. ij. omni hora, ſi non dormis.

SECT. 1356.

*Miſtura antacidæ, lac coagulatum
 reſolvens, alvum leniter*

ſtimulans.

℞. *Sapon. Venet.* drach. ij.

Viſell. avor. drach. iv.

Lapid. cancror. drach. iij.

Rhei. drach. ſſ.

Bene terendo miſce cum

Aq. ſillat. menth. unc. iv.

Syrup. alibææ unc. iſſ.

*Capias unc. ſſ. omni hora, donec ſe-
 dentur ſymptomata.*

*Clyſmatum formulæ ad lac in
 inteſtiniſ coagulatum
 diſſolvendum.*

℞. *Sapon. Venet.* drach. ſſ.

Sal. Gemm. gr. iij.

Mell. Aniboſat. unc. ſſ.

Aq. ſillatiſ. fœniculi unc. iſſ.

M. F. clyfma.

℞. *Fellis bubuli* drach. ſſ.

Mell. mercurial. unc. ſſ.

Aq. ſillatiſ. menth. unc. iſſ.

M. F. clyfma.

Oleofa

Oleosa interna.

Vide §. 1348.

Oleosa externa hic.

Ung. martiat.
Nervin.

Olea infusa abfinthii.
Anethi.
Chamaemeli.
Rutae.

Olea pressa lauri.
Macis.
Nucia myristicæ.
Palmae.

SECT. 1369.

Mistura attenuans, nidum vermium destruens.

℞. Gummi copanac. drach. j.
Vitell. ovr. drach. ij.
M. S. A. dein adde:
Sapon. Venet. drach. j.
Syrup. artemis. unc. iij.
Aq. stillat. fœniculi unc. iij.
Capiat drac. j. omni quadriforio uno
vel altero die cum regimine.

*Pulvis purgans, mercurialis
antihelminicus.*

℞. Mercur. nigri.
Agarici trochis. ana drach. j.
Sacchari puri drach. iij.
M. F. pulv. dividendus in x.
partes.

Capiat unam man. & vesp. , vacuo
stomacho.

Mistura attenuans, antihelminica.

℞. Sal. card. bened. drach. ij.

Syrup. §. rad. *aperient.* unc. j.
Aq. stillat. *sumar.* unc. iv.
M.

Capiat drach. iij. omni triforio.

Electuarium simile.

℞. Semin. absinth. vulg.
Sanonic.
Tanacet. ana drach. ij.
Mell. unc. ij.
M.

Sumat drach. ij. omni mane.

SECT. 1370.

*Linimentum nidum vermium de-
struens, & simul purgans.*

℞. Unguent. Agripp.
Arthanit. ana unc. j.
M. F. linimentum.

Cuius paucillo inungatur subinde locus
umbilici.

*Unguentum purgans, antihelmin-
ticum.*

℞. Fellis taurini.
Aloës pur. ana drach. j.
Unguent. alibeat. unc. j.
M.

In similes usus.

*Simile, valde aromaticum, sed
sine purgantibus.*

℞. Ol. Tanaet.
Castorei. ana unc. ss.
Unguent. nervin. unc. j.
M.

In eundem effectum.

In quibus observandum, an nimis tur-
bet alvum; id quippe accidit sæpe:
ne in dysenteriam prolatur infans
ex usu nimio, cavendum tunc erit.

E. 3

Sect.

SECT. 1371.

Mislura vermes necans.

- ℞. Mell. unc. ij.
Sal. gemm. drach. iſſ.
Aq. ſtil. cichor. unc. iv.
 M. F. potus.
 Cuius unc. ſſ. bibas omni hora diei.

Pulveres ſimiles.

- ℞. Corn. cerv. uſum. ad ſcrup. ʒ.
 Capiat quater de die, quo tempore va-
 rius eſt ſtomachus, ex
 Syrup. roſar. pallid. drach. ij.
 ℞. Corallin. marin. drach. ij.
 Limatur. martis drach. ſſ.
 M. F. pulv. dividendus in doſ.
 xvj.

In uſum eundem.

- ℞. Sem. ſantonici.
 Rutæ.
 Tanaceſi.
 Abſinthii ana drach. ʒ.
 Sacchari drach. iij.
 M. F. pulv. dividendus in doſ.
 xvj.

*In uſu eoſdem.**Vinum medicatum, antihelminicum.*

- ℞. Hydromell. rez. lib. ʒ.
 Semin. ſantonici.
 Tanaceſi. ana unc. ʒ.
 F. S. A. Vin. medicatum, cui dein
 puro admifceto
 Mellis albi unc. ij.
 Capiat unc. ʒ. mane, vaſuo ſtomacho.
Pulveres mercuriales; antihelminici.

- ℞. Mercur. nigr. gr. viij.
 Viſiol. martis parum calcinati gr. ij.

*M. F. pulvis dividendus in ij.
doſes.**Capiat unam mane, alteram veſperi,
inani ſtomacho.*

- ℞. Mercur. dulc. gr. viij.
 Diagryd gr. v.
 M. F. pulv.
 Mane hauriendus ex hydromelle.

Similis, ſed ſine mercurialibus.

- ℞. Tartar. vitriolat. gr. iv.
 Viſiol. martis gr. iij.
 M. F. pulv. tenuiſſimus, divide
 in doſ. iij.
 Capiat unam mane, circa meridiem,
 veſperi, vaſuo ſtomacho.
 ℞. Viſiol. comm. gr. ij.
 Syrup. violar. drach. iv.
 M.
 Pro una doſi, mane, ieiuno ſtomacho,
 aſſumenda.

SECT. 1372.

*Pulveres mercuriales ad vermes na-
candos, & per alvum expellendas.*

- ℞. Diagryd. gr. iv.
 Mercur. dulc. gr. vi.
 M. F. pulv. tenuis.
 Pro una doſi.
 ℞. Rad. ialapp.
 Mercur. nigr. ana gr. xij.
 M. F. pulv.
 Uſi prius.
 ℞. Agaric. gr. viij.
 Mercur. nigr. gr. xij.
 M. F. pulv.
 Uſi prius.

Pulvis

*Pulvis purgans, antihelminicus.**Unguenta externa.*

- ℞. Aloës gr. iij.
Resin. ialapp. gr. j.
Vitriol. martis gr. ij.
 M. F. pulv.

Us prius.

SECT. 1373.

*Clysmatum antihelminthicorum
 formulæ.*

- ℞. Ol. lini unc. iij.
 F. clysmâ.
 ℞. Mell. unc. ij.
Aq. still. cicbor. unc. ij.
 F. clyster.
 ℞. Decoct. tanacet. unc. iij.
Aloës gr. vj.
 M. F. enema.
 ℞. *Vitriol. martis* gr. xv.
Aq. stillat. cicbor. unc. iv.
 M. F. lavamentum dictum.

Suppositorium simile.

- ℞. Mell. cocti ad spissitudinem debitam
 unc. iv.
Aloës unc. ff.
Vitrioli martis drach. ij.
 M. S. A. F. parva suppositoria,
Applicanda post alvum exoneratum.

Vide §. 1370.

SECT. 1377.

*Misturæ refrigerantes antiphlo-
 gisticæ.*

- ℞. Nitri gr. xx.
Sp. sal. gutt. v.
Syrup. violar. unc. j.
Aq. stillat. flor. sambuc. unc. iij.
 M.

His foveantur gingivæ.

- ℞. Cremor lactis rec.
Vitell. ovor. ana unc. j.
Syrup. violar. drach. vj.
Aq. stillat. rosar. unc. iij.
 M.

In eodem usu.

- ℞. Flor. recent. rosar.
Sambuci ana pug. ff.
 Includentur linteo, appenso, ut in fun-
 do maneant, plumbo, tum immit-
 tantur vitro longo, cylindrico, af-
 fundatur lac recens; ponantur in
 digestionem; cremor supernatans adhi-
 beatur inflammatis ad gingivas.

SECT. 1378.

- ℞. Spirit. corn. cerv. gutt. iij.
Bibit ex syrup. kermes dr. ij. ter de die.

IN VARIOLIS.

SECT. 1492.

*Pulveres mercuriales & antimonia-
 les, fortè veneno varioloso
 antidoti.*

- ℞. Antimon. diaphores. una cum suo
 nitro fixante conservati drach. vj.

Mercur. dulc. drach. ff.*Sal. polybreff. veri* drach. j.*Diu terendo* F. pulv. tenuissimus, di-
 videndus in xxiv. dos. æquales.*Capiat unam tertiam quaque hora, su-
 perbibendo, post singulas, seri lact.*
 rec. unc. iv.

F 4

℞.

℞. *Flor. sulphur.* drach. j.
Cinnabar. antimon. scrup. j.
Sibii diaporet. nitrati
Salis polychrest. ana drach. iſſ.
 M. F. pulv. subtiliſſimus, di-
 videndus &
Sumendus ut prius.

SECT. 1394, n. 2.

Clyſma laxans.

℞. *Flor. malvae.*
Altheae.
Taraxaci.
Verbſci.
Lycnid. ſaponar. ana unc. ſſ.
Farin. lini drach. ij.
 Coq. cum aq. ad unc. xij.
 F. clyſma.

Imitiendum duodecima quaque hora.
Panni lanci eodem decocto madidi, ex-
preſſique iterum, ſalidi applicentur
corpori inferiori, pedibus, poplitibus,
inguinibus, cruribus, femoribus.
Eodem os, nares, fauces, colluantur,
humectentur, foveantur.

SECT. 1394, n. 3.

Decoctum diluens, acidulum, nitro-
ſum, ad ſtimulum varioloſum
expellendum.

℞. *Flor. papaver. cyrat.*
recentiſſ. ſambuci ana unc. j.
Avenae integrae unc. ſſ.
 Cum aq. decoct. unc. xx. admiſce
Nitri ſibiati, b. c. ab antimon. dia-
phoretico lavando, & cryſtalliſan-
do, ſeparati unc. ſſ.
Succi citrei recent. unc. j.
Syrup. violar. unc. iſſ.
Bibat quantum libet.

SECT. 1394, n. 4.

Vide 28, n. 1.

SECT. 1399, n. 1.

Vide 28, n. 1.

SECT. 1399, n. 2.

Vid. 1394, n. 3.

SECT. 1399, n. 3.

Succus antipycius in ſtatu phlogi-
ſtico variolarum.

℞. *Succus recens expreſſ. cicorci.*
Laſtueae.
Taraxaci.
Fumariae ana unij.
Radic. ſcorzoner.
 unc. iv.

Nitri puri drach. iſſ.
 M.

Bibat unc. j. *omni hora dici.*

Decoctum ſimile.

℞. *Radic. ſarſaparill.*
Cbinæ.
Gramin. ana unc. ij.
Scorzoner. unc. viij.

Flor. Sambuci unc. j.
 Cum aq. decoct. ſpatio 1 horae *ping.*
 vj. exhibe.
Bibat unc. v. *omni hora.*

SECT. 1399, n. 4.

Epispaticum, impetum humorum a
nobilioribus partibus derivans.

℞. *Emplaſtr. de meliſtoſo.*
Gaibani.

Saga.

Sagapeni ana unc. j.

M.

Extensa ad alutam applica cavis pedum.

Idem fortius.

℞. *Fermenti acidi panis unc. vi.*

Rutae m. ij.

Semin. sinapi contusi drach. vj.

Salis drach. iv.

Aceii drach. iv.

M.

*Applica ad cava pedum & poplitum
noctes atque dies.*

SECT. 1399, n. 6.

Hauslus anodynus.

℞. *Syrap. papav. albi unc. j.*

F. austus.

℞. *Landani puri gr. j.*

F. pilula.

℞. *Landani puri gr. j.*

Aq. stillat. melissae unc. ff.

M. F. haustus.

SECT. 1402.

Vid. scripta ad 1394, & 1399, n. 6.

AD CALCULUM.

SECT. 1425.

Olera hic bona.

*pe felix sarpe solvis vel inveteratum
malum.*

SECT. 1426.

Borrage.

Chaerophylla.

Chondrilla.

Lactuca.

Petrofelinum.

Radices dauci.

Raparium.

Sisari.

Sonchus.

Scorzonera.

Taraxacum.

Tragopogon.

*Haec, horumve quaedam, cum iure car-
nium cocta pro viliu optima.*

Serum lactis.

Lac.

Lac ebutyratum.

} *Animalium solo
gramine pasto-
rum.*

*Plurimum valet usus horum tamdiu
continuetur, donec alvum sit, manes-
que, aliquamdiu laxa; licet debilitas
inde quaedam successerit: haec quip-*

*Clyisma aperiens, laxans, molliens,
calculus leniter propellens,*

℞. *Fol. malvac.*

Alibacae.

Ibisci.

Mercurialis.

Parietariae.

Brassicae ursinae.

Atriplicis ana m. iv.

*Ex eodem decocto fiant clysmata, &
etiam potulenta assidua: nam, la-
xant, aperiunt, molliunt, pellunt.*

Decoctum oleosum ad lubricandum.

℞. *Amygdal. dulc. n. xxx.*

Pistachior. n. xx.

Semin. papav. contus. unc. iij.

*Excorticata, & centula decoquo cum
Aq. vulgari q. l. spatio ½ horae, tum
fortiter*

fortiter & diu contritis simul S. A. *Bibat unc. ff. omni hora.*
adde

Sapon. Venet. drach. iv.

Glycyrrhiz. unc. ij.

Ebulliant denuo parum, dein decocti
lib. ij. exhibe.

Bibat un. viij. quater de die vacuo stomacho,
& deinceps parum leniter deambulet.

Opiatum, anodynum, aperiens.

℞. *Syrup. 5. rad. aperient. unc. iiss.*

Laudani puri gr. ij.

Nitri puri gr. xx.

Aq. stillas. petroselin. unc. vj.

M.

Propellens diureticum.

℞. *Cicer. rubr. contus. unc. ij.*

Semin. petroselin. unc. j.

Rad. gramin.

Petroselin. ana unc. iv.

Fol. agrimon.

Virg. aureae.

Veronic. maris ana m. ff.

Glycyrrhiz. unc. j.

Cum aq. decoct. spatio 2 horae lib.

ij. admisce

Nitri drach. ij.

Bibat unc. ij. omni hora.

IN LUE VENEREA.

SECT. 1458i.

Balneum ex antiseptis ad partes.
affectus a putredine servandas,
pro viris.

Sat. ammon. gr. v.

Aq. stillas. foenicul. unc. vj.

M. pro iniectione.

Purgatio.

℞. *Fol. rec. rutae.*

Scordii.

Alliariae.

Meluae ana m. ij.

Cum aq. decoct. & expressa admisce
ad lib. ij.

Sapon. Venet. drach. j.

Sp. vin. comm. drach. vj.

In hoc tepido virga, & scrotum, im-
mergamur ter quaterve de die, spa-
tio 2 horae, dein panis lancei prescri-
pto decocto immersi, & expressi, omni
applicentur pubi, scroto, perinaco.

Fiant ex iisdem iniectiones.

℞. *Rad. ialapp. drach. j.*

Mercur. dulc. scrup. jo.

F. pulv.

Pro una dosi.

℞. *Scammon. gr. xij.*

Rad. ialapp. gr. xvij.

Mercur. dulc. gr. xxv.

M.

Ut prius.

℞. *Pil. scrb. mai. gr. xl.*

Præcipit. albi gr. iij.

M. accurate; F. pil. n. ix.

Summa aurora deaurandae.

Iniectio detergens ad urethram ulcero
venereo erosam.

Emulsio refrigerans.

℞. *Mell. rosar. unc. j.*

Alcoy puriff. gr. x.

℞. *Semin. 4 frigid. maior. &*

minor. ana drachs.

ij.

Cum

Cum aqua bordei F. emulſio, cuius
anc. xxij. admiſce
Nitri drach. j.
Syrup. diaſcod. unc. ſſ.

Pilulae balfamicae per epicraſin
purgantes.

℞. Terebinth. vulg. unc. j.
Rhei-barb. drach. iv.
Glycyrrhiz. ſiccæ q. ſ. ut F. maſſa
ad formandas pilulas.
Capiat j. omni hora gr. iv.

SECT. 1460.

Cataplaſma diſcutiens, anodynum.

℞. Flor. ſamb.
Melilot.
Chamaemel.
Papav. criat.
Althacæ ana unc. ij.

Cum laſſe butyrato coctis admiſce
Farin. lini unc. j.
Ol. lini unc. ſſ.
Sp. vini iheriſcal. unc. j.
F. cataplaſma.

SECT. 1461.

Emplaſtrum diſſipans.

℞. Flor. ſulph. unc. ij.
Mercur. nigr. drach. ij.
Sacchar. ſaturni drach. iij.
Emplaſtr. de Meliloto.
Cumino.
Galbano.
Ammoniaco.
Sagapeno ana unc. ſſ.
M. F. S. A. emplaſtr.

Cum aluta applicandum.

℞. Flor. ſulph. drach. iv.
Sacchari ſaturni drach. j.

Picis ſutoriae unc. ij.
M.

In eoſdem uſu.

Cataplaſma ſuppurans ad butonem
venereum.

℞. Ficus molles, maturas ad lib. ſſ.
Mel. recent. unc. ij.
Galbani in viſello ovi ſoluſi unc. j.
F. S. A. cum aq. coquendo cataplaſma.

Pulvis depurans ad bubonem vene-
reum apertum.

℞. Pulv. fol. ſiccator. ſcordii unc. ij.
Viſcoli albi drach. ij.
Albës drach. j.
M. F. pulv.
Aperto ulcere, deſerſo prius, inſper-
gendus ad depurandum.

SECT. 1462.

℞. Emplaſtr. de Meliloto.
Diapamphol. ana q. ſ.
℞. Emplaſtr. vignon. cum mercur. duplic.
q. ſ.
Extent. ad alutam exhibe.

SECT. 1463.

℞. Mercur. ſublimati drach. j.
Aq. calcis vivæ unc. ij.
M.
Haec aqua tangantur leniſſime una vel
altera vice.
Dein fiat aucta copia aquae calcis ſen-
ſim lenior.

SECT. 1466.

Fomentum detergens antiſepticum.

℞. Fol. recent. ſcordii.

Flor.

Flor. recent. absinth.

Alliar.

Rutac.

Rorismar. ana m. ij.

Tanacet.

Centaur. min.

Card. bened. ana m. iiss.

Rad. imperator.

Hellebori nigri ana unc. j.

Cum aq. decoct. lib. v. admisce.

S. pon. Venet. unc. iiss.

Hoc fomento pudenda depurentur...

℞. *Mell. rosar. unc. iv.*

Mercur. sublim. corrosiv. drach. ss.

Aq. stillat. rutae unc. x.

M.

In eundem usum.

SECT. 1468.

Decoctum diluens, aperiens, ante salivationem sumendum.

℞. *Rad. gramin.*

Chinac.

Sarsaparill. ana unc. ij.

Hord. mundati drach. vj.

Glycyrrhiz. unc. iiss.

Cum aq. decoct. spatio 2 horar. lib. iij. exhibe.

Libat de hoc decocto unc. iv. omni hora dici.

SECT. 1469.

Bolus sialogogus.

℞. *Mercur. dulc. triti. gr. iv.*

E. una distil.

SECT. 1473.

Clyσμα purgans, salivationis impetum minuens.

℞. *Fol. senecae unc. ʒ.*

Agarici drach. iv.

Semin. caribami drach. ij.

Rad. iatapp. drach. j.

Cum aq. decoct.

Unc. xij. intice pro clysmate.

Hausus purgans in eundem finem.

℞. *Diagryd. gr. xv.*

Syrup. rosar. solus. cum senecae dr. vi.

M.

Pro una dose.

℞. *Diascord. Sylii gr. xxiv.*

E. una dose pro sudorifero.

SECT. 1474.

Pulvis anodynus ad fluxum alvi, a salivatione cohibendum.

℞. *Laudan. puri gr. iij.*

Corall. rubr. drach. j.

Sacchari perlati drach. ij.

M. F. pulv. tenuissimus divid. in ʒ. vj. dos. aequales.

Capiat unam omni ʒ. horae, donec sedetur dolor alvi, & diarrhoea.

Vel mistura anodyna & diaphoretica in eundem finem.

℞. *Diascord. Sylii drac. j.*

Syrup. diacod. drach. ij.

Aq. stillat. cortic. citrei unc. iv.

M.

Capiat unc. ss. omni ʒ. horae, donec sedentur modum distil.

℞. *Iberiac. Andromach. unc. ij.*

Extensam ad alutam applica abdomini in usum eundem.

SECT. 1475.

Vid. 1416.

IN.

IN RACHITIDE.

SECT. 1489.

Cibus optimus.

1 Panis bene fermentatus, biscoctus cum admisso pauco croco, huce myristica, cardamomo, cinnamomo, semine celeri, atque similibus gratissimis, & roborantibus aromatibus.

2 Caro columbarum, gallinaceorum, cuniculorum, ovilla, hoedina, vitulina, macilentior, leniter assa, minutim incisa; dein intermisso pane biscocto, sale, & pauco petroselini, thymi, nucis myristicae, aut similium, parata.

3 Oryza, milium, hordeum cum aqua, & uvis passis cocta; dein cum pauxillo vini, & leniorum aromatum, condita.

Potus optimus.

Vinum Gallicum maturum, rubrum, adstringens ter quaterve de die ad unc. j. exhibitum.

Vinum Hippocraticum ita datum ad unc. ff. eodem tempore.

Cerevisiae { Mumma Brunsvicensis.
recentes, { Ale Britannorum.
ut { Cerevisia Batava, quae xij.
 { florenorum pretio venalis.

Hae aestivo tempore aqua portio aquae ferratae medicatae admisceri potest, imprimis vero acidularum spadanarum.

Pulvis aromaticus, roborans, exsiccans pro lectulo & pulvinari roborante.

¶ Folior. recent. in umbra secatorem, Filicis maris. lib. iij.

*Folior. recent. maioranae.**Melissae.**Menthae ana m. ij.**Flor. recent. in umbra secatorem,**Meliloti.**Trifolii odorati.**Sambuci.**Rosarum ana unc. ij.*

Terantur in pulverem tenuem, misceantur duplo tanto paleae bordei, atque dein his linteis immixtis fiant lectuli & pulvinaria, quibus incumbant, quique ab humido rite defendantur, & saepe exsiccantur.

Similis pro suffumigio.

B. Benzoini.

*Mastiche.**Olibani.**Succini.**Turis ana unc. j.**M. F. pulv.*

De hoc pulvere inspersum parum prunae fumes, super hoc fumo panni lanci detenti frigidis partibus adhibentur.

Haustus emeticus minor pro infante.

¶ Radis. hippeacuanthae scrup. j.

*Vini albi Gallici unc. j.**Sacchari drach. ij.*

Infusa totam noctem, depurata exhibe mane.

Hoc repetatur quarta quaque die in vicem quintam.

Similis purgans, & simul roborans.

¶ Rhei. selebi. unc. ff.

*Myrobolani citrini sine nucleis dr. iij.**Agarici trochiscati scrup. ij.**Infus.*

Infundantur frigida cum *cerevisiae* *fortioris* lib. iv.

Post xxiv. horas paratus erit potus, quo utatur pro familiari quotidiano, spatio iv. septimanarum.

Si vero nimis inde purgetur, aqua copiae *cerevisiae* alacrius dilui poterit, aut etiam maiore, si usus indicat.

Herbae roborantes, siccantes, excitantes, antiscorbuticae, rachitidi sanandae propriae.

Agrimonia.

Betonica.

Capparidis cortex ex radice.

Ceterach.

Cichoreum.

Cuscuta.

Diapensia.

Endivia.

Filix mas.

Hepatica.

Lingua cervina.

Melissa.

Myrobalani pruna.

Osmunda regalis.

Polypodium.

Quercus folia, glandesque.

Rhabarbarum.

Rubi folia & radix.

Ruta muraria.

Scabiosa.

Tamanisci cortex, flores, folia.

Trichomanes.

Veronica.

Ex his *cerevisiae*, *vina*, *infusa*, medicata parari queunt, maximo cum fructu, aut & *condita*, & similia componi, ex. gr.

Cerevisia medicata excitans, roborans, siccans.

℞. *Agrimoniae.*

Ceterach.

Filicis radix.

Linguae cervinae.

Polypodii radix.

Rutae murariae ana unc. ij.

Minutim scissa, mista, linteo immissa, infundantur frigida cum lib. xij. *cerevisiae*.

Utatur pro potu communi.

Vel vinum ex similibus.

℞. *Folior. & flor. betonicae unc. iij.*

Cortic. radice. Capparidis.

Tamarisci.

Rubi sylvestris.

Trichomanis ana unc. ij.

Limaturae martis unc. ss.

Cum vini lib. viij. in frigore infusae adhibeantur, ter de die, ad unc. j.

℞. *Entis veneris Boylei. gr. ij.*

Exhibe vesperti, ex vino *Canariensi*, quotidie, spatio iij. septimanarum.

Tinctura martialis roborans.


℞. *Limatura martis unc. j.*

Aceti stillatis. acerrimi unc. x.

Sacchari unc. iij.

In phiala alta ebulliant leniter spatio xxvj. horarum; filtratus liquor servetur vase clauso.

Dentur gutt. vi. horis quotidie, horis medicis, ex paucullo vini *Hispanici*.





7

